






Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4870/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4870/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4870/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4870/A


1544

A.XIX.0

4870/A

WELLCOME
HIST. MED. MUSEUM






41475
PAVLI AEGINE-
TAE MEDICA-
OPERA.

*
A IOANNE GVINTERIO
Andernaco Medico exercitatissimo sum-
miquè iudicii conuersa, & illustra-
ta commentariis.

Adiectæ sunt annotationes IACOBI GOV-
PYLI medici Parisiensis, in aliquot
singulorum librorum capita.

IOANNE BAPTISTA CAMOTIO PHI-
losopho nouissimè corrigente, cum quibusdam
scolijs in margine positis.



VENETIIS.
M D LIII.



AD ILLVSTRIS.

ET REVERENDISS. CARDINA-

LEM. D. O. COLLIGNIVM CA-

STILLIONAEVM,

*

IACOBI GOPYLI MEDICI

PREFATIO.



V M apud me reputo, qua ratione
doctissimi quidam homines medendi
artem, eiusq; scriptores restituere nō
ita pridem aggressi sunt, eandem il-
los uiam, qua qui artes primū con-
stituerunt, tenuisse uideo. Nam pri-
sci earum inuentores & quasi archite-
cti, parua quaedam initia posuerunt, quibus noua in singu-
los dies posteri adstruentes, quod inchoatū tantum erat,
perfecerunt. neq; enim artes & disciplina tam perfecte
absolui potuissent, nisi multi ad eam rem certatim operas
suas contulissent. Quod Hippocrates quoque significare
uidetur, non solum inueniri artes in hoc tam exiguo, tam-
que breui uitae momento nō posse, sed ad discendum, quae
ab alijs inuenta sunt, breuem hanc uitam esse, dictitans.
Huius autem rei fidem ex historia facere nobis licet, ar-
tium initia cogitantibus. Et ne longius abeamus, rudis ini-
tio & uulgaris medicina fuit, ut imperitissimae etiā gen-
tes herbas, aliāq; prompta in auxilium uulnerum morbo-
rumque nouerint, ueruntamen apud Graecos uetustissimus
auctor Aesculapius eam excoluit, ut ob diuinum illud be-
neficium, quo genus hominum affecerat, in Deorum num-

* ij

merum receptus sit. Huius deinde duo filij Podalyrius & Machaon bello troiano ducem Agamemnonē sequuti, non mediocrem opem cōmilitonibus suis attulerunt: quos tamen Homerus non in pestilentia, neque in uarijs generibus morborum aliquid auxiliij attulisse, sed uulneribus tantummodo ferro & medicamentis mederi solitos esse proposuit. Post eos nonnulli clari uiri medicinam exercuerunt, donec maiore studio literarum disciplina hæc agitari, & pars sapientiæ haberi cœpit: ut & morborum curatio & rerum naturæ contemplatio sub ijsdem auctoribus nata sit. ideoq; multis ex sapientiæ professoribus peritos huius fuisse accepimus: clarissimos rerò ex his Pythagoram, Empedoclem & Democritum, cuius (ut quidā crediderunt) discipulus Hippocrates Cous uir arte & facundia insignis, primus quidem ex omnibus memoria dignis artem hanc diligenter exercuit, & per eum salutaris ista nobis professio multum increuit. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras, & Chrysippus, tum Herophilus, & Erasistratus eam horridam adhuc sic excoluerunt, ut magnum splendorem ei accersuerint. qui cum aliquādiu luxisset, desinentibus præsertim Græcorum scholis obsoleuit, ut non minor postea opera ad restituendum huic arti nitorem suum conferenda fuerit, quàm studium in ea absoluenda positum fuerat. & certè nisi uiri quidam egregiè cordati intra hos centum annos in eo eui gilassent, ut rei medicæ auctoribus à prioribus seculis male habitis, opem aliquam ferrent, nulla ægris medicina salutariter adhiberetur. quanquam hi quidem efficere nō potuerunt ut in medicorum libris, quasi in tenebris homines præsertim parum uidentes nihil offenderent. Quod tamen in eam partem accipi uelim, ut nemo me illis insul-

tare putet. Pro magno enim illo beneficio, quo uniuersam
tam quā regem nationem affecerunt, maximas ijs gratias
agendas & habendas iudico. Nā & nisi Timotheus (quē
admodum Aristoteles ait) fuisset, non haberemus tam ab-
solutam musicam: & nisi Phrynis eum antecessisset, talis
non euasisset: ita nisi principes illi uiri uiam ad huius au-
ctoris lectionem, tanquam ad inaccessam antea locorum
difficultatibus regionem, munuissent, labor Herqulis hic
exantlandus fuisset, atque stabulum quoddam Augiæ re-
purgandum, tantum abest, ut hoc bellum à me profligatū
& confectum dicam: tamen quod à me præstitum est, non
leuem uictoriam iudicabunt hi, qui multos huius auctoris
locos peruersos & conturbatos, à nobis restitutos atque
explicatos intelligunt. Quem laborem eò lubentius susce-
pi, quod cum ab hinc tres annos Alexandri Tralliani li-
bro ex Regia Bibliotheca depromptos emendassem at-
que edidissem sic studium hoc meum doctis quibusdam ho-
minibus, qui mihi pro centum millibus sunt, probaui, ut ni-
hil tam artis medicæ studiosorum interesse censuerint,
quàm ætatis illius auctores restituere, in qua naturalis
nitor medicinæ inerat, non fucatus. Ad te uerò patrone
benignissime quod cōmentatus sum ob eam maxime cau-
sam mittere uolui, ut nihil mihi antiquius esse intelli-
gas, quàm ut tuæ uoluntati paream, hoc
est, ut ex hoc otio, quod mihi tua be-
nignitate contingit, aliquid ad
communem fructum affe-
ram. Vale.

AD HONORATIS-
SIMVM VIRVM IOAN-
NEM BELLAIVM CARDI-
NALEM ET EPISCOPVM
PARISIENSEM,

*

IOANNIS GVINTERII AN-
dernaci Medici in Paulum Aegi-
netam *præfatio.*

*



VAM olim Pauli Aeginetæ
interpretationem latinam tibi
dicaui, vir honorate, & omni di-
gnitate princeps, eam rursus ma-
iore nunc cura, & fide ad uetusta
exemplaria, ipsiusq; artis ratio-
nem exactam, recognitamq; , ac
breuibus quibusdam commentarijs illustratam of-
fero: non dubitans, quin illam eo sis animo exce-
pturus, quo olim veluti rudimenta, & prima ope-
rum nostrorum exercitia solebas. Hoc autem no-
mine potissimū offero: vt egregijs tuis in me bene-
ficijs, literata quadā remuneratione ac debita bene-
uolentiæ memoria gratiā reponā Tu siquidē iuue-
tutis nostrę studijs ad optimas quasque artes cele-
brādas, recolēdasq; fauere nunquā destitisti: per te
labores nostri, qualescunque in Græcis medicinæ
autoribus suscepti, clarissimo Francorū Regi Frā-
cisco innotuerunt. Vnde mihi non uulgaria præ-

18.
mia, & data sunt, & proposita, siue ad opes, siue ad
gratiam. Ergo quicquid à me vnquam exactius
eruditiusque prouenerit, id omne iure tibi opti-
mo debere me libenter agnoscam. Cui enim po-
tius aliquis otij sui fructum acceptum referre po-
terit, quam Meccœnati suo, & patrono, eique eru-
ditione, prudentia, & pietate excellentissimo? sub
cuius etiam nominis celebritate, & patrocínio tu-
rior a maleuolis, & uilitigantibus esse possit.
Nam hodie ita comparatū est, ut statim ubi quis
ingenij sui fortunas magno partas sudore in publi-
cum ediderit, nonnulli maleferiati homines, acu-
tius atque acrius vitia quam recta videant: auctori
potius, quam codicum deprauationi ascribentes,
quāquam nullius hactenus fuerit philosophiæ, aut
medicinæ interpres, quem nō sæpius aberrasse de-
monstrare possem. Nullus autem labor in discipuli-
nis veteribus instaurandis, magis quidē negotij, et
molestiæ plenus, minus autem auctori gloriosus su-
scipi queat, quam qui in auctoribus conuertendis
infumitur. Id quod ego annis iam sat multis, expe-
rior, dum communibus hominum studiis & publi-
cæ utilitati prodesse cogito. Cum enim olim Lu-
tetia medicinam publice docerem, nō paucos obli-
ter Græcorum libros scholæ nostræ quasi latinita-
te donauī, ac in hoc præsertim excudēdos permisi:
primum ut amicis aliquot gratificarer: deinde ut
haberē ex ueteribus medicis, quos studiosis præ-
legerem. Eos tamen libros ex tempore sic potius
quā cura trāslatos, interim per interualla reuise-
re, ac recognoscere decreueram, maius aliquando

* iiij

lotium, & meliorum codicum exemplaria nactus,
sine quibus nihil posse quemlibet ingeniosum pu-
to. Inter cæteros Paulum quoque Aeginetam,
excellentem medicinæ scriptorem, annis mille de-
sideratum, primus integrum latinum facere sum ag-
gressus: ea sane causa & ratione, vt post ampla illa
Galenî the oremata cõpendiosum aliquem autho-
rem scholæ nostræ haberent, ex quo medendi ra-
tionem, quam practicę vocant, fideliter condisce-
rent. Paulus siquidem omnes recentiores a Gale-
no citra controuersiam compendio, ordine, artifi-
cio, perspicuitate, & doctrina superat. Adde quod
multa eruditè tractet, alijs aut intacta, aut etiam in-
cognita. Quid de parte chirurgica dicam? quam
ita feliciter & dilucide persequitur, vt Auicenna il-
le Arabicę familiæ princeps non pauca in suum li-
brum mutuare sit dignatus. Porro quod ad partes
meas attinet, in hisce septem Pauli libris plurimum
laboris mihi subeundum fuit, tum exemplariū vi-
tio, quamuis tria contigerint diuersa, tum quod in
Chirurgica vel instrumentorum nomine difficilli-
ma, nulli fere Latini autores habeantur, quos turo
queas imitari. Quippe is semper mihi in verten-
dis Græcorum monumentis fuit animus, vt præter
fidem, pure omnia Latine & planè quoad eius fie-
ri potuit, exprimerem. Quanquam hodie multos
agrestes hircosolque philosophos, si dijs placet, ui-
dere liceat, quos impolita, & rudia magis delectāt
Ex horū numero nonnulli grauiores disciplinas
exponere aggressi, vocabulis sordidis, & a poli-
tiore humanitate alienis: foedarunt, cõtaminarunt-

que. Vnde fit, vt qui paulo humanius educati, in-
stitutique sint, non reformident illas adeo, sed fu-
giant, oderint, & despiciant: cum magis referret
egregias mentes, præclaraque ingenia, sermonis
venustate, & elegantia, ad seueriores illas,
vt ita dicam, matronas allicere Quod
an nos in hoc opere præstitimus,
aliorum esto iudicium: certe
sedulo conati sumus.

Vale vir clarissime
apud Medioma-
crites.



✱

scriptum legum libro quarto. Ego equidem summè semper laboravi la-
boreq; quotidie magis, ut erga te fratresq; tuos summæ probitatis ado-
lescentes, qui de me optimè mereri summopere gaudetis, quam gratissi-
mus cognoscar esse. atq; ut studiosius colam fidè amicitiamq; uestram,
illud facit, quòd coniunctius atq; in iisdem ædibus uestris, in iisdem stu-
dijs disciplinisq; literarum uobiscum quotidie uiuere soleo. Hac de cau-
sa Paulū Aeginetā ab Andernaco doctissimo atq; celeberrimo medico
superioribus annis in latinum sermonem conuersum & commentarijs
auctum, nostra postremum industria recognitum & cum greco codice
collatum, auctum quoq; à nobis inter legendum quibusdam lucubra-
tiunculis in margine repositis, quem inter nonnulla alia monumenta
Venetijs imprimendum reliquimus, quum inde nos Bononiā recepimus,
amoris ergò dignitati tue consecramus. Et quanquam studia philoso-
phiæ magis nostra sunt, ἀλλ' ὁ μὲν πᾶσι τὸ κρᾶτισον τῆ φιλοσοφίας
μέγ' διατρέβουσαν τὴν ἰατρικὴν ἄριστον μὲν πρᾶγμα καὶ θεο-
κτονὺν παρέχειν experitur quotidie genus humanum. Vale.

PAVLI AEGINETAE
PERIODE VTI IN SVVM
DERE MEDICA OPVS,
PRAEFATIO.

*
*Pauli laborem nosce me, qui plurimas
Inuisit orbis terras, Aegina satus.*



NON EQVIDEM opus hoc, quasi ve-
teres aliqua arti necessaria prætermiserint,
componere sum aggressus, sed totam vt di-
sciplinam in compendium redigerem. Et
contrario enim illi rectè quidem omnia &
integrè elaborauerunt: recentiores autem
præter quam quòd illos ne legere quidem
curant, etià loquacitatis adhuc coarguunt.
Qua ratione impulsus volumen istud elucubraui, quod illis san-
tè, qui ipsum, vt verisimile est, habere velint, eorū quæ legerunt
commentarius, mihi verò exerciti; loco erit. Absurdum nanque
fuerit rhetoras quidem compendiosis vt libellis iudicialibus, &
ad circumferendum accommodis, in quibus legum capita conti-
nentur, vt dum vsus postulat, in promptu habeant, nos verò, nul-
lam eorum habere rationem: quum illis non paucò tantum, sed
iam longo etiam tempore, legibus inspiciendis immorari, ac dif-
ferre iudicium liceat, nobis neutiquam, aut certe rarò ea facultas
concedatur. Etenim necessitas in quibusdam morbis frequenter
nullam ferens dilationem, subitam concertationem opemq; po-
stulat. ob quòd rectè Hippocrates occasiue dixit, præcipitem.
Illos præterea in solis ferè vrbibus rerum vtilitas incitat, & vbi
libri nequaquam desiderantur: medicis autem non tantum in vr-
bibus, aut agris, aut etiam locis desertis, verum iam quoque per
mare frequenter in ipsis nauibus subita morborum necessitas in-
gruit, in quibus dilatio mortem, aut omnino extremum adfert
discrimen. Quoniam igitur vniuersas medendi rationes, aut par-
ticularem omnem materiam memoria tenere vel difficillimè,
vel nequaquam aliquis possit, compendium hoc ex veteribus col-

P R A E F A T I O.

legi. Nulla enim de meo inferui, nisi paucula quædam in artis operibus mihi & visa & comperta. Nam in pluribus egregijs authoribus, magis quæ in Oribasio versatus, qui & ipse librum totum, quo vniuersam de tuenda valetudine rationem comprehendit, aliunde collegit: utpote Galeno posterior, adeo quæ recentior adhuc, optima quæque ex ipsis selegi, nullum quatenus licuit, ex morbis prætergressus. Etenim Oribasij ipsius volumen, à septuaginta libris quos continet Hebdomēcontabiblon appellatum, quod totam in se artis materiam complectitur, non omnes, quod grandius sit comparare sibi possunt. In huius autem Epitome ad Eustatium scripta, præterquam quod plerique morbi non attingantur, etiam imperfectam reliquorum præceptionem uideas, partim causarum, partim signorum, nonnunquam & curatio integra desideratur, ceu alia in memoriam venerint.

P R A E S E N S autem commentarius notas, causas, & curationem omnium morborum continet, simularium, instrumentarium, & eorum quæ ad unitatis diuortium pertinent: idque non summam, sed quatenus licet ample & diffuse. Ante hæc autem omnem victus rationem quæ sanitati tuendæ facit, exposuimus. Postremum autem librum de simplicibus compositis quæ medicamentis conscripsimus.

Quid singuli septem totius operis libri, nam totidem habentur, contineant.

P R I M V S omnem sanitatis tuendæ rationem tradit. item quomodo morbi peculiare ætatibus, anni temporibus, temperaturis, alijsque nonnullis, caueantur, emendentur quæ. Præterea ciborum omnium vires & usus habet, ut in capitibus comprehensum est.

S E C V N D V S febris vniuersas enumerat, ita ut præponantur ipsis, quæ eò conferunt, exempli gratia, notæ ex recrementis, diebus decretorijs, & id genus aliæ. Subiunguntur autem casus qui febribus superueniunt.

T E R T I V S affectus declarat, qui singulis corporis partibus obueniunt, sic ut à summo capite ad imos pedes, adeo quæ ungueis descendat.

Q U A R T V S agit de exterioribus, & veluti in aperto contractis vitijs, quorum non certæ sedes assignari possunt, sed pluribus particulis infestant. In quo & de tineis & dracunculis tractatur.

P R A E F A T I O.

QVINTVS de animalibus ictu; morfu ve uenenum relin-
quentibus differit, vbi & de rabiosi canis morfu, & metu aquæ,
adhæc de non rabidi canis morfu hominisq; agitur. Inibi de ve-
nenis eorumq; remedijs disputatur.

SEXTVS chirurgicam omnem exponit, tum quæ carnis
vita curat, vbi & teli extrahendi ratio comprehenditur, tum
quæ ossium fracturas, luxationesq; artuum complectitur.

SEPTIMVS omnium medicamentorum vireis continet,
primum quidem simplicium, deinde & compositorum, eorumq;
potius quæ in sex aliorum librorum di cursu commemini, præ-
fertim maiorum & nominatarum compositionum. Scio enim il-
lic non omneis diffusè explicari, ne disciplina, tedium afferat:
tum, vt querens aliquis vnam, aut etiam plureis nobilibus confe-
cturas, facillè inueniat. In fine adduntur nonnulla ad medicamen-
torum compositiones vtilia. Item de alternantibus inuicem re-
medijs agitur, vt totus liber in disciplinam de ponderibus & mē-
suris desinat. Incipiemus itaq; primum volumen.

PRIMVS totius operis hic liber est, in quo omnia sanita-
tis tuendæ præcepta tradidimus, quemadmodum iam in præfa-
tione dictum est. dicenturq; iterum capita, vbi tantum hoc præ-
libauerimus, quòd in primo, & secundo volumine plurima ex
Oribasio mutuati sumus. Non enim peculiarem volumus con-
stituere opinionem, sed ex omnibus vtilitatem indipisci. In reli-
quis quinque libris paucissima tantum ex illius commentarijs
huc transfuli.

CAPITA PRIMI LIBRI.



V AE grauidis superueniant, & quæ victus ratio conducat.	cap. 1
De nutrice.	cap. 2
De lacte nutricis.	cap. 3
Quomodo lac viciatum corrigatur	cap. 4
Educatio pueri.	cap. 5
De pustulis puero obortis quæ exanthemata dicuntur	cap. 6
De tussi & grauedine pueri.	cap. 7
De pruritu gingivarum.	cap. 8
De dentium ortu.	cap. 9
De oris vlceribus, quæ aphthæ dicuntur.	cap. 10
Ad femorum intertrigines.	cap. 11
Ad aures humentes.	cap. 12
De Syriasi.	cap. 13
Ratio victus infantium, iatq; reliquarum deinceps ætatu ad vsq; declinantes.	cap. 14
De frictione præparatoria q̄ parasceuaſtice dicitur	ca. 15
De exercitatione.	cap. 16
De exercitationum generibus.	cap. 17
De generibus frictionum.	cap. 18
De vocis exercitatione.	cap. 19
De laſſitudinibus ob exercitationem.	cap. 20
De cute aſtricta.	cap. 21
De ſpontaneis laſſitudinibus.	cap. 22
Ratio victus ſenum.	cap. 23
De rugoſo corpore.	cap. 24
Qua ratione corpus ſuauiſſime oleat.	cap. 25
Quomodo habitus recaleſcat.	cap. 26
Quomodo color malus emendetur.	cap. 27
Ad liuores.	cap. 28
Quomodo dentes ab iniuria aſſerantur.	cap. 29
Quomodo grauis auditus corrigatur.	cap. 30

CAPITULA LIBRI

Ad oculorum caligines.	cap. 31
De repletionē.	cap. 32
De ebrietate.	cap. 33
Quibus cibi corrumpuntur.	cap. 34
De Venere.	cap. 35
Adeos qui venerem exercere nequeunt.	cap. 36
De iis qui immodicē coierint.	cap. 37
Si semen genitale redundet.	cap. 38
Si perfrictio nocuit.	cap. 39
Si insolatus aduſsit.	cap. 40
De pituita in superiore ventriculo redundante.	cap. 41
Quomodo facillē quis vomat.	cap. 42
Quæ ſanis alluū ſubducant, & quæ vrinā moueāt.	cap. 43
De clyſteribus.	cap. 44
De glandibus.	cap. 45
De iis quæ per os, & nareis caput euacuant: quæq; eiſdem partibus delinuntur.	cap. 46
Quæ menſes ducunt.	cap. 47
Quæ ſudorem mouent.	cap. 48
De aere	cap. 49
De aquis.	cap. 50
De lauacris.	cap. 51
De balneis naturalibus.	cap. 52
Quæ victus ratio quolibet anni tempore ſit vtilis.	cap. 53
Victus eorum qui in laboribus vitam agunt.	cap. 54
Proſciſcentium victus ratio.	cap. 55
Nauigantium victus.	cap. 56
Quomodo extenuetur corpus.	cap. 57
Quomodo tenues impleantur.	cap. 58
De partium attenuatarum curatione.	cap. 59
Optimi temperamenti notæ.	cap. 60
Intemperatorum corporum notæ.	cap. 61
De capitis formatione.	cap. 62
Temperaturæ cerebri notæ.	cap. 63
Ventriculi temperaturæ notæ.	cap. 64
Pulmonis notæ.	cap. 65
Cordis notæ.	cap. 66
Iecinoris temperaturæ notæ.	cap. 67

CAPITULA LIBRI

Testiculorum temperatura nota.	cap. 68
Quæ prætermiffa sunt.	cap. 69
Quomodo calida intemperis corrigatur.	cap. 70
Quomodo frigida intemperies emendetur.	cap. 71
Quomodo sicca intemperies in ventriculo veluti ex plo, deinde & aliæ corrigantur.	cap. 72
De alimentorum facultatibus.	cap. 73
De oleribus.	cap. 74
De asparagis.	cap. 75
De radicibus quæ cibi rationem obtinent.	cap. 76
De tuberibus & fungis.	cap. 77
De frumentaceis.	cap. 78
De leguminibus.	cap. 79
De fugacibus fructibus.	cap. 80
De arborum fructibus.	cap. 81
De animalibus, & primo de volatilibus.	cap. 82
De ouis.	cap. 83
De terrestribus animalibus.	cap. 84
De partibus animalium.	cap. 85
De lacte, & terrestrium sanguine.	cap. 86
De lactis potione.	cap. 87
De lacte scissili.	cap. 88
De caseo.	cap. 89
De piscibus.	cap. 90
De testaceis.	cap. 91
De malaciis.	cap. 92
De cartilagineis.	cap. 93
De cetaceis.	cap. 94
De vini viribus.	cap. 95
De melle & mulsa.	cap. 96
De somno.	cap. 97
De vigilia.	cap. 98
De sopore.	cap. 99
Dioclis epistola, ad valetudinem tuendam conscripta.	
cap. 100	

FINIS.

INDEX EORVM

QVAE HOC OPERE

CONTINENTVR.



Baptismus instru- mentum	189	Acetum scillites	249 quibus uti- le	249
Abdominis inte- rioris membrang		Achores quid	49 unde oriantur	
ulnra quomodo		ibidē quomodo curētur	ibidem	
manu curent.	166	Achras		209
Abdominis suendi ratio	167	Acidorum vires		203
Abies	228	Acinos herba		205
Abrasa quomodo curanda	125	Acini mali punici		232
Abrasa ab inflammatione quid tueatur	ibid.	Aconitum		205
Abrotanum	203	Aconiti poti notæ	155 Remedia ibidem	
Abscessibus corporis exteriori- bus cōueniētia medicamēta	126	Acopa unde dicantur	101 275 & 283	
In abscessibus qualia corpora inue- niri soleant	126	Acopa calefacientia quibus con- stent	275 eorum usus	ibidem
Abscessui quomodo manu scalpel- loq; sit medendum	167	Acopa emollientia quibus conue- niant		ibidem
Abscessum in pus transiisse quomo- do depræhendendum	ibid.	Acopa quam spissitudinē habere debeant		ibidem
Abscessus medicamentorum	167	Acopon a' uarietate poecilōn dī- ctum		275
Abscessus quid	127	Acopon azanitæ		ibidem
Abscessus rumpentia	126	Acopon barbaricum dīa euphor- biu, ad coxēdicū dolores, & alia		
Abscessuum generatio	127	pleraque		276
Notæ	ibidem	Acopon Basilij		ibidem
Abscessuum neruicorum medica- menta	127	Acopon bromion		275
Abfinthium	209	Acopon cui nomen est pyxis		276
Acacalis	205	Acopon dysodes ex Gal.	276 aliud	
Acacia	ibid.	ibidem		
Acalyphe	205	Acopon ex abiete Gal.		277
Acantha Aegyptia uel arabica	205	Acopon ex atramento librario, cu- tis ruborē peculiariter inducens,		
Acantha leuce	ibid.	idq; potissimū in ijs quibus alte- ra capitis pars dolet, ex commen- tarijs Alexandri		277
Acanthium	ibid.	Acopon ex nigra populo.		276
Acanthobolon	167	Acopon lysiponium		276
Acanthus	205	Acoron		205
Aceratos emplastrum Gal.	269	Acopus nostra		276
Acetabulum	221 & 286			
Aceti fæx	238			
Acetum	228			

INDEX.

AGORUS ueterum	ibidem	quadraginta sex usq; ad uergilia	
Acridēs	205	rum ortum	ibidem
Acrium uires	203	Aequinoctium autumnale quid in	
Acrochordon	101	homine efficiat	24
Acroteriasmos	185	Aequinoctio autumnali quid facie	
Acron acraganthus	38	dum	ibidem
Acte	205	Ab equinoctio autumnali dies sunt	
Aculeos extrahentia medicamen-		quadraginta sex ad occasum uer-	
ta	140	giliarum	ibidem
Acutus morbus exacte non exacte		Aera lolium	205
315		Aereg aquae quibus conferunt	11
Acutus morbus	ibidem	Aerem morborū causam esse quo-	
Acutus ex decedentia	315	modo cognoscatur	38
Adarce tantum acrimoniae & ca-		Aereolus	285
loris habet ut extrinsecus cū alijs		Aer intemperatus contrariis tem-	
imposita urat.	204	periei confert	10
Adeps animalium 21 & 235 suil-		Aeris flos mixtus collyrijs palpe-	
lus ibidem caprillus ibidem anse-		brarū & asperitates & flicus ex-	
rinus ibidem. gallorum, gallinarū		terit. 239 quō coqui debeat	282
ibidem. leoninus ibidem. bubu-		Aer optimus. 10 semper prodest	
lus ibidē. urfinus, uulpinus ibidē		ibidem	
uiperinus ibidem		Aer temperatus temperatis corpo-	
Adeps marium calidior et sicior		ribus utilis	ibidem
quam foeminarum	ibidem	Aer uitiosus ibidem. semper nocet	
Adeps uetustate calidior redditur		ibidē. quomodo emendandus	38
235		Aerugo 216 quomodo coquenda	
Adglutinamenta	260	282	
Adianthum	204	Aes combustum ad cicatricem ul-	
Adolescentia etas	291	ceribus obducendam in ficciori-	
Aedon	204	bus corporibus prestantissimum	
Aegilops	204	est. 239 quomodo coquendū	282
Aegilops morbus quid. 65 & 164		Aestate quae uictus ratio conueniat	
curatio ibidem		11	
Aegirinum oleum	278	Aetatum omnium uictus ratio	3
Aegiros	204	Aethale	204
Aegyptia artaba	286	Aethiopica olea	213
Aegyptia, pessus	281	Aethiopis	204
Aegyptia spina sanguinem & alias		Aetius Cappadox	119
fluxiones retinet.	205	Aetonychon	204
Aegyptia stomatica	259	Agallochum	203
Aegyptia terra	211	Agapeti cōpositio ad podagram	
Aema	204	Agaricum	203
Aequinoctium uernum quid in ho-		Agarici nigri damnum corpori af-	
minibus efficiat	24	ferentis remedia	158
Aequinoctio uerno quid faciendū		Agarici uires 242 Dandi modus &	
ibidem		pondus. ibidem. Quale deligen-	
Aequinoctium uernum dies habet		dū ibidem	

INDEX.

Ageraton	203	ferant	46
Ageratus	224	Alos achne	206
Agglutinamenta	260 & 261	Alos anthos	ibidem
Agglutinamenta oculorum qui de fluxionibus infestantur	264	Alphitidon	183
Agnus	204	Alphorum generatio 123 curatio	ibidem
Agninus sanguis	204	Alphi albi unde ducant originem	ibidem
Agrestis	204	Alphi nigri unde generentur ibidem	ibidem
Agriofcordon	234	Als	205
Aima	204	Alfine	206 & 227
Aiznon	204	Altercum	238
Alabastrites	224	Alterci assumpti notæ 155 Reme-	ibidem
Alana terra	211	dia	ibidem
Al equomodo adurantur	171	Althæa	205
Alauda	221	Alumen 235 quomodo coquen-	282
Albus cygnus	261	dum	11
Albugines oculorum quomodo curen-	67	Aluminatæ aquæ ad quid conducant	6
Album diarodon	263	Aluus quomodo subducenda	24
Alcea	205	Aluus pueris quomodo cienda	24
Alcibiadion	214	Aluus quomodo emollienda	32 uide deiectione.
Alcibiadios anchusa	204	Alut deiectiones quid præfagiant	meden-
Alcyonium	205	Aluo astrictæ quomodo	93
Alexandri cyphoides	252	dum	9
Alexandri purgatio ex Rhodome lite confecta	243	Aluus quomodo subducenda fanis	9
Alexandri acopon ex atramento librario	277	Alui fluxionibus maxime biliosis medetur lac coctum in quod demissi sunt igniti marini calculi 21 & intestinorum torminibus 21	44
Alica	19	Alui astrictæ citæ & cruentæ in febribus causæ & curatio	206
Alimenta quæ laudatiss.	17	Alypon	242
Alimentorum facultates	ibidem	Alypi seminis uires, quantitas. & dandi modus	206
Alimon	205	Alysson	242
Allium	18 & 234	Alyssi uires & utendi modus	242
Allium sylvestre	ibidem	Amantium notæ 58 curatio ibidem	279
Alme	205	Amaracinum oleum	206
Aloe	ibidem	Amaracus	206
Aloe quibus danda	241	Amarantus	206 & 213
Aloes dosis	241	Amarorum uires	203
Aloen exhibendi tempus & modus	ibidem	Amaurosis oculorum	68
Aloe quomodo coquenda	283		
Aloe sola inter medicamenta purgantia stomacho conducit	241		
Alopex	206		
Alopecia unde dicta	46		
Alopecie remedia	47		
Alopecia et ophialis quomodo diff-			

INDEX.

Ammanitæ fungi	19	Andrachne	207
Amazonum pastillus	255	Andronis pastillus	255
Ambrosia ad febres arcendas apta		Androsæmon	207
275		Androsarces	ibidem
Ambrosia	206	Anemomæ	ibidem
Ambustorum medicamenta	124	Anethine malagma	275
Ambustis quomodo pili renascan-		Anethinum oleum	273
tur	125	Anethum	207
Ami	206	Anethum olea incoctum, dolorem	
Amiantum	ibidem	lenit & somniferum est	40
Amithæonis empl.	267	Aneurisma quid	169
Ammos	206	Eius causæ	
Ammoniacum quomodo coquen-		169 Notæ ibidem curatio	ibidem
dum,	283	Angina eiusq; species, & curatio	
Ammoniacum thymiana	206	75	
Ammoniacum fustimen	ibidem	Anguis senectæ	211
Ammoniaci gutta	ibidem	Anicetos empl.	269
Ammoniaci iustiminis, pondus, mo-		Ani inflammationis curatio	102
dus utendi, atque vires	243	Ani erylipelata quomodo curetur	
Amomum	207	ibidem.	
Amores	53	Ani dolorem m'igantia	102
Ampelos melæna	206	Ani excrecentiæ quomodo curan-	
Ampelos leuce	ibidem	dæ ibidem. &	103
Ampelos agria	ibidem	Ani ulcera pascendo serpentiæ quo-	
Ampelos hemeros	ibidem	modo curanda	101
Ampelo, radum	206	Ani rimas curantia ibidem. &	
Ampelitis terra	211	102	
Amphisbontæ morsus curatio	150	Ani condylomata quomodo curan-	
Amygdalinum oleum	273	da	102
Amygdalinum meropion	ibidem	Ani condylomata, tubercula &	
Amygdala, dulcia, amara 20 et 206		rimæ quomodo manu curentur	
Amylum	19	184	
Amylon	206	Ani fistularum curatio manu admi-	
Amurca	ibidem	nistrata	183
Anagallis	207	Ani in perforati curatio	184
Anagyris	ibidem	Ani ulcera humida quomodo cu-	
Anarrhinon	207	randa	101
Ancylolis quid et quomodo curan-		Ani ulcera citra inflammationem	
da.	142	oborta quomodo curanda ibidem	
Anaphorici	77	Ani procidentis curatio	103
Anas	20	Ani ulcera sicca recentia quomo-	
Anatis sanguis	205	do curanda	101
Anchilops eiusque curatio	65	Animi relaxatio ad probam corpo-	
Anchusæ quatuor	201	ris educationem plurimum avertit	
Ancylolis	ibidem	momenti	3
Ancylon	165	Animæ defectus causæ & reme-	
Ancylotossion	ibidem	dia	45 & deinceps
		Animalia pedestria	20

INDEX.

Animalia fera ficcius, quàm dome- stica, alimentum exhibent, minus	254	Aphros	209
que excrementicium	21	Aphras curantia 3 &	74
Animalia uolarilia	20	Apiastrum	226
Animalium partes	21	Aptos	207
Animalium pedestrium carnes ibi- dem		Apium	233
Anisum	207	Apium grande	216
Anodynnon medicamentum ad abra- sa, flagris caesa, & articulorum contusiones	125	Apium ictus notæ 148 Remedia ibidem	
Anodynnon collyrium liquidum	63	Apium montanum	229
Anonis	207	Apium sylvestre	235
Anorexia	84	Apium dimidij quod ad radicem est utendi modus	243
Anseres	20	Apium quas uires possideat	13
Anserinus adeps	235	Apochnyma	207
Anseris sanguis	205	Apochnymatis coctio	282
Anserum oua	20	Apocynon	207
Anthemis	240	Apollinaris herba	238
Antheron	257	Apomeli	260
Anthyllis	207	Apomeli, ex commentarijs phila- grij	260
Antidas curantia	75	Apoplexia quid	59
Antidotum quid	247	Apoplexia cui ætati & tempera- mento potissimum accidat	59
Antidotum dia hematon ex sangui- nibus	205	Apoplexiæ signa	ibidem
Antidotorum differentia	245	Apoplexiæ causa	ibidem
Antidotum Mirridatis, diastincu	248	Apoplexiæ curatio	59
Antidotum philonis	249	Aposyrmata quomodo curanda	125
Antidotum, Sotera	250	Apothrapia	4 & 5
Antidotum Satyriacum	253	Apothraulis	188
Antidotum theodoretum	49	Appetentia canina quomodo curan- da	43
Antidotum theriace quomodo pa- retur 247 Eius ulus	248	Apri iecur	215
Antirrhinon	207	Aqua 238 nitrosa, bituminosa, ibi- dem, pluuialis, ibidem, marina	
Antiochi hiera	245		
Antilium	274	Aqua hydropicis quomodo emit- tatur	172
Antifalis	191	Aqua inter cutem. Vide hydrops.	
Aparinæ	207	Aquæ aluminatæ ad quid condu- cant 11 nitrosæ, & salis ibidem	
Apechema	189	sulfuratæ ibidem. bituminatæ ibi- dem, ferreæ ibidem.	
Aphace	209	Aqua in qua ferrum extinctum est	233
Aphrodes papauer	226		
Aphronitrum	209	Aqua frigida quando assumenda	22
Aphroselenes lapis	224		
Aphroditarium	257		
Aphrodisiasticon clidion pastilius			

INDEX

10		Aranæ ictus notæ 148 remedia	
Aquam eductia 243 quibus con-		ibidem	
ueniant	ibidem	Arbutus	220
Aquæ rosatæ quam hydrosatum		Aceuthos	207
dicunt, compositio	260	Archigenis hiera	245
Aquosorum uis	203	Archigenis medicamentum ad ui-	
Aquosum ramicem curantia	99	perarum morsus	150
Aqua frigida quando cum fiducia		Archigenis medicamentum ad ero-	
propinanda in febribus	36	lionem mamillarum cum maligni-	
Aquam elicientia quibus exhiben-		tate	83
da	243	Archigenis medicamentum ad car-	
Aquæ bituminatæ quibus confe-		cinode & cacoethe ulcera	132
rant	11	Arena	206
Aquarum naturalium differentie		Algemon	66
ibidem		Argemone	207
Aquæ sulfuratæ quibus conferant		Argæi montis Cappadociæ lapi-	
ibidem.		des	224
Aqua uitiosa quomodo emendan-		Argentum uiuum	238
da	10	Argenti spuma 224 quomodo co-	
Aquæ falsæ & nitrosæ quibus con-		quenda	281
ferant	11	Argenti uiui assumpti notæ & re-	
Aquæ ferreæ quibus conferant ibi-		media	158
dem		Argenti recrementum	213
Aquæ uitiosæ notæ	10	Arida medicamenta eorumque ua-	
Aquæ frigidæ potu coercendi phre-		riæ differentie	257
nitici	52	Aridum ad xerophthalmiam &c.	
Aquam eductia	95	264	
Aquam uitiosam sumpturus quæ		Aridum collyrium Gal. quod ocu-	
præmittere debeat	10	los tuetur	264
Aquosorum uires	203	Aridum dia crocu	264
Aqua marina	215	Aridorum mensura	286
Aquarum naturalium uis	11	Arietum testicul	21
Aqua frigida in febribus putridis		Ariobarzani emplastrum	266
quando tuto exhibeatur	34	Arisarum	207
Aqua quæ optima 10 eius notæ		Aristolochia	ibidem
ibidem.		Aristolochiæ clematidis pondus,	
Aquæ æreæ quibus conferant	11	modus exhibendi & uires	
Aquæ frigide subito ac cumulati-		242	
potæ remedia	158	Aristophanium emplastr.	267
Aqua uitiosa 10 quomodo corri-		Armenia	20
genda	10	Armenia emplastr.	269
Aquarum sponte prouenientium		Armenia terra	212
differentie 11 uires	ibidem	Armeniacus lapis	224
Arabica spina	205	Armeniacum	207
Arabicus lapis	224	Armenia mala	20
Arachne	207	Arnabo	208
Aranæus	ibidem	Arnoglossum	208

INDEX.

Aron	208	ibidem	
Arquatus	98	Articulorum doloribus contractis	
Arsenicum	208	intenso frigore aut humoribus in	
Artaba ægyptia	206	ter ossa articulorum impactis	115
Artemisig	208	Articulorum topi quomodo cu-	
Arteriace ad abscissum uocis fo-		randi	115
num & eius claritatem faciens		Articulorum tophos quid coale-	
77		scere impedit	114
Arteriace, hypoglossis appellata,		Articulorum intortorum & con-	
ad abscissionem uocis, raucitatē		tusorum remedia	132
& ægre reiicientes	ibidem	Articulorum contractio seu ligatio	
Arteriæ quid	27	quæ ancylosis dicitur, quomodo	
Arteriarum usus	ibidem	curanda	142
Arteriarum origo	ibidem	Articulorum contusionum medica-	
Arteriæ omnes eodem pulsandi mo-		menta	125
do inter se & cum corde conue-		Articulorum morbis quomodo &	
niunt	ibidem	quæ, medicamenta adhibenda	
Arteriæ quæ tangendæ pulsus digno-			114
scendi causa	28	Articulorum ulcerum curatio	140
Arteriæ post aures in quibus pas-		Artos	208
sionibus incidendæ	159	Artus sanguine infestati quomodo	
Arteriæ quomodo diuidantur ibi-		curentur	115
dem		Asarum	208
Arteriæ asperæ tumor qui broncho-		Asbole	208
cele dicitur 169 eius differentia		Ascalabotes	ibidem
duplex ibidem curatio	169	Ascarides lumbrici	145
Arteriam humidiorē quæ red-		nerentur ibidem, causæ & cura-	
dant	31	tio.	145
Arteria aspera quomodo incidi de-		Ascyrrhon	207 & 208
beat	167	Ascyrrhoides	207
ἀστυρίαν	76	Asclepias	208
Arteriotomia	159	Asclepion chironium	229
Arthritis quid 112 signa	ibidem	Asclepion panaces	ibidem
Arthritidis causæ	112	Asclepios smegma aridum	258
Arthritis a podagra quid differat.		Aselli	200
112		Asie petre flos	224
Arthritidis ex sanguineo humore		Asini	223
curatio	114	Asinum lac	210
Arthriticis non sanguineis solum,		Asinum tecur	215
sed pituitosis etiam & melanco-		Aspaltus	208
lis in morbi initio sanguis mitti		Aspalatus	208
debet.	ibidem	Asparagus	208
Arthritidis ex bile curatio	113	Asparagorum differentia & uires	
Articularius morbus uide arthritis.			208
Articulorum dolor uehemens quo		Asphodelus	18
modo leniendus	ibidem	Aspera arteria quomodo incidi de-	
Articulorum relaxatorum curatio		beat	167

aa iiii

INDEX

Aspidis morsus notæ 151 cura- tio.	151	Auellana	28
Aspidis tria genera	151	Auena	19 & 210
Aspidis exuuium	211	Auenæ decoctio	19
Asplenon	208	Aues	20
Astaphis	ibidem	Aures animalium	21
Aster atticus	ibidem	Auricula muris	206
Aster magni	263	Aurium sordes extrahentia	70
Aster pallidus	254	Aurium dolor quas causas habeat & quomodo curari debeat.	69
Astragalus	208	& deinde per totum caput.	
Asthmatici 78 eorum curatio ibi- dem		Auribus incidentia quomodo ex- trahantur.	71
Astringentium vires	203	Auribus incidentia quomodo ex- trahantur.	165
Astringentium ante & post cibum sumptorum facultas	20	Aurium sonitus quomodo curan- dus	71
Atactos compositio ad podagram 253		Aurium uermes quomodo curandi	70
Attagena	20	Aurium cruorem fundentium re- media	ibidem
Athanasia Oribasij	249	Aurium ulcera diuturna quæ sa- nent.	ibidem
Athens emplastrum	268	Aurium tinnitus quomodo emen- dandus	71
Athera	204	Aurium humiditates desiccantia 3	
Atheroma quid 133 curatio ibi- dem. & 168		Auris contusæ curatio	191
Atracton	187	Aurium pus curantia	70
Atractylis	209	Aurium caro excreescens quomo- do arcenda	70
Atractylis vires	18	Aurium ulceribus cum inflamma- tione quid faciendum	ibidem
Atrabilis duplici modo generatur 242		Aurium curta quomodo farienda	165
Atram bilem uacuantia medicamē- ta simplicia	242	Aurium contusio quomodo curan- da	71
Atram bilem purgantia medica- menta quibus & quando exhibē- da	242	Auripigmenti assumpti notæ 157	
Atramentum indicum	225	remedia	ibidem
Atramentum scriptorium	225	Auripigmentum 208 quomodo co- quendum	282
Atramentum futorium 239 quo- modo coquendum	282	Autumno quæ uictus ratio conue- niat	11
Atriplex	209	Auulforum remedia	88
Atrophia oculorum	68	B	
Attenuantium alimentorum vires	17	Accæ prunorum syluestrium	220
Auditum grauem corrigentia	6	Baccharis	209
Auditum grauem curantia	70	Baion malagma	275
Auditus grauis quomodo curan- dus	71		
Auditorij meatus nō perforati cau- sa & curatio	164		

I N D E X.

Balaninon oleum	279	Bilis atra duplici modo generatur	
Balanus myreplica	209	Bilis uomitioni quomodo occurrē	44
Balaustium	ibidem	Bilem atram uacuantia medicamē-	242
Baleng	22	ta simplicita	242
Ballote	209	Bilem atram purgantia medicamē	242
Balnea aluminosa quibus confe-	10	ta quibus & quando exhibenda	ibidem
rant		Bilem flauam educentia, quando et	242
Balnea grea quibus conferant ibi-	ibidem	quibus exhibenda	242
dem		Bilem flauam purgantia medica-	242
Balnea bituminata quibus confe-	ibidem	menta simplicia 241 & sequen-	242
rant		tibus	
Balnea ferrea quibus conferant ibi-	ibidem	Biliosis alui fluxionibus medetur	
dem		lac coctum in quod calculi mari-	
Balnea salsa & nitrosa quibus con-	11	ni igniti decocti sunt 21 & inte-	
ferant		stinorum torminibus	ibidem
Balnea sulfurata quibus conferant	ibidem	Bithynus pastillus	255
ibidem		Bituminatae aquae quibus confe-	
Balnei aquae dulcis calidi utilita-	ibidem	rant	11
tes		Bitumen quomodo coquendum	242
Balneorum naturalium differentiae	ibidem	Blatta quae in pistrinis inuenitur	234
ibidem		Blepharoxiston	65
Balneorum sordēs	211	Blitum	210
Balsamum	209	Bliti uires	18
Barbara, emplastrum	260	Boleti	19
Barbaricum acopon, dia euphor-	276	Βομβύλια	54
biu		Botanicum emplastrum	265
Barbe alopecij efficacius remedium	65	Botryon	66
Basilisci morsus notae	151	Borrys	210
Basilicum tetrapharmacum	265	Bouis femora cremata	229
Basilij acopon	276	Brachialis luxatio quomodo cure-	199
Bassi hygra ad hypopios	67	tur	199
Barina mora	259	Brachij contrafacti curatio	192
Batrachi	209	Brassicae marinae facultates	18
Bdellium	ibidem	Brassica marina	207
Bdellij pondus, & modus utendi	243	Brassicae facultates	18
		Brathy	210
Bdellium quomodo coquendum	283	Brion	210
Bechicon	77	Britannica	ibidem
Bechicon ex styrace ad tussim	250	Bromion acopon	275
Bechium	210	Bromus	210
Belulcum	187	Bronchion	79
Befasa	227	Bronchus	76
Beta	236		
Betae uires	18		
Betonica	209		

INDEX.

Bronchocele	169	Calx	237
Eryonia	210	Calcis assumptæ notæ	157 remedia
Eryon thalassion	ibidem	dia	ibidem
Eubonium	210	Calculorum in renibus notæ	90
Bubo quid 129 Curatio	ibid.	Calculi ne creentur	91
Βουβοκοκλή	99 & 179	Calculorum materia	90
Bubulum lac	210	Calculi tussi eie cti	76
Bubula caro	20	Calculorum causæ	90
Bubulum stercus	214	Calculi in uesica notæ	176
Bubulum stercus	221	Calculorum in renibus curatio	90
Bubulus talus	229	Calculi uesicæ quomodo excin-	
Bubulus adeps	235	dendi	176
Bucellatus purgans	243	Calculus quibus excinditur, qui fa-	
Buccina	22 & 219	cile curationem recipiant ibidem	
Buglossum	210	Calculos quatuor aut quinque as-	
Bulbus	210	peros tribulorum modo, ad ma-	
Bulbus agrestis	156	gnitudinem filiquarum trium, aut	
Bulbi	18	quatuor expuit quidam	79
Bulimos quomodo curetur	4	Calculus per anum in teneismo ex-	
Bunium	210	cretus	86
Buphthalmon	ibidem	Calculi in sanguinis reiectione ex-	
Buprestis assumptæ notæ	154. Cu-	creti	76
ratio	ibidem	Calida intemperies quomodo cor-	
Buprestis	210	rigatur.	16
Buryrum	210	Calidi & sicci temperamenti notæ	
C			
Cacalia	217	Calidioris temperaturæ notæ ibi-	
Cachexia quid 95 eius cura-	ibidem	dem	
rio	ibidem	Calidi & humidi temperamenti	
Castus arbor	235	notæ	13
Cacoethe ulcera	137	Caliginem oculorum prohibentia	
Cactos	158		6
Cadmia 217 quomodo coquenda		Callus quid	183
282		Callos excindentia	139
Cæcitas nocturna quid & quo-		Calvaria fractæ curatio	189
modo curetur	68	Caluitum unde fiat	46
Cefi flagris quomodo curandi 12;		Caluiti curatio	46 & 47
& 126		Camarolis	183
Calamagrostis	217	Cameli cerebrum	213
Calamus	ibidem	Campe	217
Calaminta	217	Cancamum	217
Calcanei ex longo decubitu attri-		Cancanus	ibidem
tus quomodo curandi	117	Cancer in quibus corporis parti-	
Calcaneorum & plani pedum scis-		bus oriri soleat 131 Cause ibide	
suræ quomodo curandæ ibidem		signa 131 Curatio	131
Calcamentorum ueterum cocta		Cancer in foeminarum mammis	
212			

INDEX.

cur potissimum accidat	131	dem	
Cancer latens	171	Capitis dolorẽ ex bilioso humo-	
Cancer unde appelletur	131	re curantia	50
Cancer cur plane non confanescat		Caput confortij lege indolescens	
ibidem		quomodo curetur	ibidem
Cancer quid 119 Incurabilis ibi-		Capitis dolor ex uino quomodo	
dem.		curetur	51
Cancer quomodo precauendus*		Capitis dolor ex icu quomodo cu-	
131		retur	ibidem
Cancer quibus partibus corporis		Capitis psydracia quomodo cure-	
accidat	171	tur	48
Cancer quid 171 unde dicatur,		Capitis dolorem ex calida intem-	
ibidem. Eius curatio manu adhi-		perie curantia	50
bita	ibidem	Capitis dolor unde oriatur ibidem	
Cancer	218	Capitis ulcuscula densa, rubraque	
Canis non rabiosi morsus remedia		quomodo curanda	49
148		Capita 219. Menarum ibidem. Sma-	
Canis qui momordit rabiosus sit		ridis ibid. Muris ibid. Milui ibi-	
an non, qua ratione cognoscas		dem. Lacerie	ibidem
147		Capitis quantitas & figura quẽ bo-	
Canis rabidi morsuum symptoma-		na, quẽ mala	13
ta	147	Capitis morbos quẽ signa prece-	
Caninus appetitus quomodo cu-		dant	23
randus	43	Capitis ulcera manantia unde fiant	
Canis rabidi iecur	215	49 quomodo curentur ibidem,	
Canis rabidi signa	147	& 49	
Canum stercus	220	Capitis exanthemata quomodo cu-	
Canes rabiunt plerumq; in æstu ue-		rentur	49
hementiore	147	Capitis morborum signis neglectis	
Canis rabiosi morsuum remedia		quẽ egritudines sequant	23 24
147		Capitis morborum signa ubi appa-	
Cannabis	217	ruerint quid faciendum ibidem	
Canopus	243	Capitis faui unde nascantur & quo	
Canopon	217	modo curentur	49
Cantharidis assumptæ signa 153 cu-		Capitis formatio	13
ratio	ibidem	Capitis pediculi quomodo abigen-	
Cantharides	217	di	49
Capillus qua ratione aureus redda-		Capito piscis	21 & 22
tur	48	Capnistos pastillus	78
Capitis dolor ex insolatu contra-		Capnion	217
ctus quibus notis dignoscatur		Capnos	ibidem
50		Capparis	18 & 217
Capitis dolor ex insolatu con-		Caprarum sanguis	204
tractus quomodo curetur ibi-		Caprarum syluestrium sanguis ibi-	
dem		dem	
Capitis dolorem ex frigida intem-		Caprillus simus	114
perie notantia, & curantia ibi-		Caprillum stercus	221

I N D E X.

Caprillus adeps	235	Cafeus	21 & 238
Caprilla caro	20	Cafeus laudatior	21
Caprillum lac	21	Cafeus acris	ibidem
Caprillum cornu	218	Cafeus pessimus	ibidem
Caprillum iecur	215	Cafeus oxygalactinus	238
Caput adurendi modus	158	Ceseofum lactis	210
Caput quomodo aduratur in lippi-		Cassamum	218
tibus ægre spirantibus, & ele-		Cassia	ibidem
phanticis	158	Castaneg	20
Caput per os & nares quibus me-		Castorium	218
dicamentis euacuandum	9	Catagmatice Oribasij	271 ex com
Carbunculus quid	130	mentarijs Heracleti	ibid.
Notæ ibidem. Curatio	ibidem	Cataleplis	54
Carbunculus	130	Cataphora quid	31
Carbunculus oculorum	67	Cataphorę curatio	40
Carcinoma oculorum	ibidem	Cataphora quid	23. Cause ibidem.
Cardamine	234	Curatio	ibidem
Cardamomum	218	Cataplasma quod oras uulneris la-	
Cardamm	217	tas in rabidi canis morfu seruat	
Cardiogmos	55		147
Carduus	234	Cataplasma ad sacrum ignem, her-	
Cari radix	18	petas, abscessus, parotidas, & am-	
Caricæ	19	busta	129
Caris	218	Cataplasmata	257
Caries lignorum	233	Cataporia ex aloe	243 modus uten
Carnes optime quę	20	di atq; pondus	ibidem
Carnes uolatiliū quomodo disse-		Cataporia ex lapide armenico, ar-	
rant	20	thriticis	244
Carnem generantia medicamenta		Cataporia ad tussim ueterem ac-	
	309	commodata	77
Carnis contuse curatio	132	Cataporia ex xylomacere, dysen-	
Caro bubula	20	tericis utilia	253
Caro ceruina	ibidem	Cataporia ad destillationem in fau-	
Caro hircina	ibidem	ces & tussim	77
Caro humana	ibidem	Cataporia Desithei ad iecur inscri-	
Caro leporina	ibidem	pta	252
Caro ouilla	ibidem	Catheter	93
Caro suilla	ibidem	Cathererismus	176
Caro thymi salfi	236	Catochos	52 & 54
Caros	53	Catochi cause ibid. Signa ibid. Cu-	
Caros a lethargo quid differat	53	ratio	54 & 55
Carpelium	218	Catochi uel catochomeni unde di-	
Carpesig liquoris poti note	155 re	cti	54
media	ibidem	Caucalis	218
Carya	218	Cauda equina	216
Caryinum oleum	279	Causos febris	35
Caryophyllon	218	Caustica	66

INDEX

Cecis	219	Cercosis quid 180 quomodo fit e-	
Cedrea	219	2mendanda	ibidem
Cedrus arbor	ibidem	Cerebrum 213 Leporis	ibidem
Cedrus frutex	ibidem	Galli ibidem. Cameli ibidem. Mu-	
Cele, Vide ramex		stelæ ibidem Hirundinum ibidē	
Cenchros	ibidem	Ovillum	ibidem
Cenchri morsus notæ	151	Cerebri mēbranæ inflammationis	
Curatio	ibid.	notæ, causæ & curatio	190
Centaurium	218	Cerebri uulnerati notæ	187
Centaurij minoris uires 242 Pon-		Cerebri membranæ conuulneratæ	
dus ibidem. Exhibendi modus		signa	ibidem
ibidem		Cerebri membrana nigrescens quo	
Centunculus	211	modo curetur	190
Cepa	18 222	Cerebri erysipelatis signa & cu-	
Cepæa	219	ratio	53
Cephalgam curans apophlegmati-		Cerebri temperaturarum notæ	13
mus	52	Cerebrum animalium	21
Cephalææ	219	Cerebri inflammationis signa &	
Cephalææ curatio	51	curatio	53
Cephalgam curans epithema. ibidē		Cerion quid 183 eius curatio ibid.	
Cephalgam curans unguentum	52	Cervicis tumorum curatio	169
Cephalga	51	Cervi cornu	218
Cephalgam curantia medicamenta		Cervi masculi pudendum	204
uaria	52	Cervina caro	2
Cephalalgia unde oriatur	50	Cerussæ assumptæ signa 157 reme-	
Cephalicus pulvis, capiti conue-		dia	ibidem
niens	257	Cerusa 240 quomodo coquenda	
Cera	219	282	
Ceræ cum oleo qui modus esse de-		Ceryces	219
beat in cōsticendis unguentis	283	Cheræfolium	ibidem
Cera quomodo coquenda	282	Chalbanæ	239
Ceras	218	Chalazion & eius curatio	65
Ceramium	286	Chalcanthion	23
Ceramium Italicum	ibid.	Chalcitis	ibidem
Cerasia	20	Chalcitis quomodo coqui debeat	
Cerasia 219 dulcia, austera ibidem		282	
acida	ibidem	Chalcidica lacerta	233
Cerasi arboris gummi	ibidem	Chalcos	239
Cerastis morsus notæ 151 Curatio		Chalcus	285
151		Chalcuanthos	239
Ceratium	286	Chalazium quid 163 curatio ibidē	
Ceratonia arbor	219	Chamæ	22
Ceratoides membrana	66	Chamæactæ	205
Ceratum thaidis quo facies rube-		Chamædrops	240
scat	73	Chamædrys	239
Ceratū dia turpene ad podagram		Chameleon	ibidem
dolorem leniens mirabiliter	271	Camægæ poudus et modus admini-	

I N D E X.

Strandi 242 uires ibidem		do, curandum	43
Chamelea	240	Cicade	236
Chameleuce	239	Cicatrix ulceri quō inducenda	137
Chameleontis nigri assumpti notę		Cicatrices oculorum quomodo cu- rentur	67
154 curatio ibidem		Cicatrices nigre quomodo tollēde	138
Chameleontis sanguis	204	Cicatrices quomodo tingantur	67
Chamæmelon	240	Cicer	19
Chamæmelinon oleum	278	Cicer	214
Chamæpityos pondus & utendi modus	243	Cichorium	220
Chamæpitys	240	Cici	219
Chamæraphanon	243	Cicinum oleum	278
Chamælyce	240	Ciconiarum stercus	221
Chelidones	ibidem	Cicuta	223
Chelidonia aspidis genus	151	Cicutę potę notę 155 remedia ibi.	
Chelidonium	240	Cimolia terra	211
Chema	285	Cinara quomodo preparanda	19
Chemosis quid, & quomodo cure- tur	64	Cinerula	235
Chersæa aspidis genus	151	Cinis	237
Chezananze	246	Cinnabaris	219
Chia terra	211	Cinnamomum	ibidem
Chiacum collyrium	261	Cinaræ uires	19
Chirurgicæ partes duæ	158	Cinocrambe	207
Chœnix	286	Circeæ	219
Chole	24	Circuncisorum curatio	175
Cholera quid 85 eius curatio ibi- dem		Cirfocele	178
Chondrilla	240	Cissaros	219
Chondrus	240	Cisseris	219
Chondri coctio	19	Cissos	219
Constantini sapo	258	Cisthos	ibidem
Chorion	182	Cissimum emplastrum	266
Chrysanthos	213	Cittę causa	11
Chryse emplastrum	271	Citta grauidarum symptoma unde nomen acceperit	1
Chryfocolla	240	Citreum malum	20
Chryfocome	240	Citrei mali tres partes	ibidem
Chrylitis	240	Citrium	219
Chryfos, pessus emolliens	281	Citrium malagma	274
Cibis in uentre corruptis, quid fa- ciendum	7	Claudiacum dia smyrnon	262
Cibi fastidium prohibentia	1	Clauius quid 117 curatio	ibidem
Cibi fastidium eiusque causę signa & curatio	83 & 84	Clauius quid & unde dicatur	186
Cibi qui laudatissimi	17	curatio	ibidem
Cibi uarij assumi non debent	18	Clauiulę luxatę curatio	197
Cibi fastidium in febribus quomo-		Clauiulę confractę curatio	192
		Clematis	220
		Clematis altera	ibidem

I N D E X.

Cleonis collyrium	263	mune, quid proprium	90
Cleopatæ mors	151	Colliquamenta corporis quomodo	
Clidion aphrodisiasticon, pastillus	254	curanda 40 & sequentibus	
Clidion oribasilij ad dysentericos et	ibidem	Color urinæ aquosus rufus & bi-	
cœliacos	220	liosus mediocriter, pallidus quid	
Clinopodion	176	significet	3
Clystere uellicæ	9 &	Color malus corporis quomodo	6
Clysteribus qui uti debeant	ibidem	emendandus	6
qualibus	243	Colpos quid 138 curatio	ibidem
Cneoron quas uires obtineat	220	Columbarum sanguis	204
Cnicus	220	Columbinus pullus	20
Cnici seminis pondus & sumendi	221	Columbarum syluestrium stercus	
modus	243		
Coagulum 232 leporinum	ibidem	Columella 166 curatio	ibidem
equinum ibidem. Phocæ ibidem		Columellæ inflammatio quomodo	
Coccos cnidios	220	curanda	75
Cocci gnidij uires, pondus, & su-	243	Collyrium anodynon	63
mendi modus	220	Collyrium malabathrinum	262
Coccos baphicos	ibidem	Colymbades	20
Coccyamelæa	221	Collyria	260
Cochlea	22	Collyrium ex succo fœniculi	263
Cochleæ	ibidem	Collyrium ex opobalsamo ibidem	
Cochleæ terrestres	220	Collyrium ex aloe	263
Cœlia	86	Collyriū ex succo fœnugræci	263
Cœliacus affectus	156	Collyrium cleonis	ibidem
Colchicon unde dicatur	174	Collyrium crassius ex uino	264
Colis glans contecta quomodo ape-		Collyriū ex duobus lapidibus ad	
riatur	89	asperitudinem	264
Colicus dolor in Italia uictus ratio	220	Collyrium aridum Gal. quod ocu-	
ne temeraria curatus a quodam	88	los tuetur	ibidem
medico	165	Collyrium chiacum	261
Colla	220	Collyrium ex oleo turionū succo	
Colon quid	88	tenerum	262
Colobomata	220	Collyrium ex decoctis	261
Colocyntha	ibidem	Collyrium ex cornu Galeni	263
Colocynthis	242	Collyrium monohemeron	261
Colocynthis effectus	ibidem	Collyriū dia hydras repellēs	261
ibidem. exhibendi modus ibidē	94	Collyrium liquidum ex caualide	
quibus exhibenda	174	264	
Colicorum remedium	88	Collyrium dia crocu	ibidem
Colis glans nuda quomodo conte-	262	Collyrium ilambonis	262
genda	263	Collyrium e iure.	263
Colicus morbus quid 88 causæ ibi-	52	Coma	52
dem signa ibidem curatio 88 &	52	Coma uigilans	52
deinceps	ibid. cir a. o. ibidem	Comatis uigilantis causæ 54 signa	
Colico & renum dolori quid com-	220	Comares	

INDEX.

Comitialis morbi notę	55	Copton ad duritiem stomachi &c	
Comitialis morbi causę	ibidem	iccinoris malagma	254
Comitialis morbi curatio	56 &	Coracon emplastrum	267
deinceps		Coria calceamentorum ueterũ	212
Comitialis morbus cui, fere etati		Corallium	221
accidat	55	Corium	ibidem
Comitialis morbus trifariam gi-		Coris herba	ibidem
gnitur	ibidem	Cordis affectus quomodo curandi	
Comitiales quomodo coarguendi		82	
56		Cor animalium	221
Comum	223	Coriandrum	221
Commĩ	220	Cordis palpitatio	82
Compositio Procli, podagrę & co		Coris animal	221
xendicum doloribus accommo-		Coriandri assumpti notę	155 cura-
data	1273	tio	ibidem
Compositio dia hermodactylu ad		Corianum	221
podagram	244	Cordis temperaturę notę	15
Compositio dia citriu, quod est ex		Cornu 218, Caprillum, hircinum	
malo medico, stomacho utilis	243	ibidem: cerui ibidem. Taurinum	
Compositio dia coronopodiu	244	ibidem	
Compositio rhodostacti	260	Cornea membrana oculi	66
Compositio Agapeti ad podagram		Coronopos	221
253		Corpus hominis in quatuor partes	
Compositio atactos ad podagram		diducitur	23
ibidem		Corpus ut bene oleat quomodo ef-	
Compositio pęonia	252	ficiendum	6
Conchulę Indicę	228	Corporis liuores prohibentia ibi-	
Conchylia	220	Corpus crassum quomodo extenu-	
Concoctionis signa nunquam lini-		andum	12
stre apparent	26	Corporis habitus quomodo recal-	
Conditũ calculos confringens	252	faciendus	6
Condylomata locorum muliebriũ		Corpus tenue quomodo impleatur	
180 quomodo excidenda ibidem		12	
Condylomatum ani curatio manu		Corporum intemperatorũ notę	13
administrata	184	Corporis temperatissimi notę	12
Confectio Rhoeris	260	Corpus pletoricum	27
Confectio maluchę	281	Corpus quomodo erugandum	6
Congius	286	Corporis malus color quomodo	
Conuulsionones unde oriantur	61	emendandus	ibidem
Conuulsionibus puerorum meden-		Corporis colliquamentorum re-	
tia	2	media	40
Conuulsionones ex inanitione origi-		Cortex piceę	230
nem ducant an ex repletionē quo-		Corydallus	221
modo cognoscendum	61	Corydos	ibidem
Conuulsiuum curatio	ibid.	Coryza	76
Conyza	220	Cos olearia	224
Copros	ibidem	Costarum rupturę & contusionis	
		notę	

INDEX.

notę & curatio	192	Crocodylus terreſtris	234
Coſtus	221	Crocodylion	222
Cotis noxię detrimentum	224	Crocus	ibidem
Cotyla	286	Crocomagmatiſ confectura	290
Cotyledon	221	Crocomagma quomodo paretur	
Coxarum dolor ab articulari mor	255	Crommyon	222
bo quid differat	111	Crotones	249
Coxarum doloris cauſę ibidē. No-	ibidem	Crudiſ humoribus abundantes	
te ibidem curatio	ibidem	quam curandi rationem deſyde-	
Coxarum fracturę, differentię, no-	193	rent	39
tę, & curatio	200	Cruenti ſputi cauſę ſigna	79
Coxę luxatę curatio	200	Cruentum ſputum quomodo cure-	
Coxendices quomodo adurantur	182	tur	79
Crania	221	Crus quomodo reponi debeat	195
Crambe	221	Cruſta generantia medicamenta	
Crapulam quid diſcutiat	22		141
Cratęgonos	222	Cryſtalloides humor oculi	68
Cremaſteres	177	Cubiti fractura quomodo curanda	
Creta ſutoria	225		194
Cretica terra	211	Cubiti luxatio quot modis fiat &	
Crethmon	221	quomodo curetur	199
Crinaton ſuffimen	230	Cucumer	19
Crimnon	221	Cucumis	233
Crinon	ibidem	Cucumis ſylueſtris	ibidem
Crines	237	Cucumeriſ ſylueſtriſ radicis torti-	
Criſiſ inſtans quomodo agnoſcen-	26	cis pondus	243
da	ibidem	Cucurbitulas admouendi modus	
Criſiſ futura quomodo pręnoſcen-	ibidem	170 & deinceps	
da	27	Cucurbita ſylueſtriſ	220
Criſiſ optima peracta quomodo	27	Cucurbita	19
agnoſcenda	26 & ſequentibus	Cucurbita	220
Criſiſ qualis futura ſit, quomodo	26	Cucurbitularum uſus	170
diſcernoſcenda	26	Cucurbitula leuiſ quid efficiat	170
Crithe	221	Cucurbitula cum ſcarificatione ad	
Crithe quid eiufq; curatio	65	quid preſtet	170
Critoniſ ſmegma	258	Cuminum	222
Crocinum dia rhodon	263	Cupreſſus	222
Crocinum oleum	280	Cura quid	58
Crocides peſſus	231	Curei malagma	274
Crocides paſtillus	254	Cutiſ aſtriſtio 5 Eiuſ cauſę ibidem	
Crocodyli terreſtriſ ſanguis	204	Notę ibidem, curatio	5
Crocodylorum terreſtriſ ſtercuſ	221	Cuti ſenili teneręq; conuenientia	
	221	medicamenta	125
Crocodylorum fluuiatilium ſtercuſ	221	Cyamoſ	222
	221	Cyanoſ	ibidem
Crocodyli morſuſ remedia	152	Cyclaminuſ	222

INDEX.

Cyclamini radices pondus & mo- dus utendi	286	Deiectio oleosa, pinguisq; ibidem	
Cyclisti	189	Deiectio uiscosa ibidem	
Cygnarium	261	Deiectio nimis foetida ibidem	
Cygnus albus	ibidem	Deiectio omnium de terrima et pe- stifera	32
Cygnus rubens	ibidem	Delphini	22
Cymium	222	Dentes quomodo eximantur	165
Cynosbatos	ibidem	Dentes exesi quomodo eximendi ibidem	
Cyphi 280 Eius materia ibidem. usus ibidem.		Dentes superflui quomodo tollen- di	ibidem
Cyphi magnum quod uocant sola- re ex rebus triginta sex confe- ctum	280	Dens confractus quomodo curan- dus	ibidem
Cyphi, quod rebus uiginti octo co- stat, lunare appellatum	280	Dentes ab interitu uindictantia	6
Cyparissus	222	Dentium dolorem sedantia	73
Cyperus	ibidem	Dentes quo tempore oriantur pue- ris	2
Cyphoides Alexandri	252	Dentes attritos curantia	74
Cyphoides medicamentum ad ieco- rosos & pectoris uitia	252	Dentium candorem facientia ibid.	
Cypros	222	Dentium stuporem tollentia ibid.	
Cytinus	232	Dentium inflammationem curan- tia	ibidem
Cyprinum oleum ex commentarijs Posidonij	279	Dentes mobiles stabilientia	74
Cyprinum aliud	ibidem	Dentifricum	74
Cytisus	223	Dentientibus pueris superantia	2
		Dentium smegma	74
		Derma	212
		Destillatio	76
Damascena	20	Destillationis curat.	ibidem
Damascena	220	Destillationis acris tenuisq; cura- tio	77
Damascene	212	Denterion	182
Damasonium	ibidem	Dia aloes medicamentum	257
Daphne	ibidem	Dia anacardion	251
Daphne herba	ibidem	Dia alicacabu pastillus	256
Daphnoides	220	Diabrosis	79
Darti	177	Dia bacanu medicamentum hepa- ti accommodatum	252
Daucus	212	Diabetes quid 93 eius signa ibi- dem. curatio	ibidem
Dauci radix	18	Dia calaminthes	251
Decretoria signa i morborum princi- pio praua sunt 26 sed ubi morbus inclinauerit, bona sunt	ibidem	Diacodion, ex papaueris capitibus & melle	249
Decamyron malagma	275	Dia coralliu pastillus	254
Deiectio que optima	32	Diacodion compositum	249
Deiectio cruda	ibidem	Dia citriu medicamentum, tarde concoquentibus efficac	251
Deiectio mere ruffa	ibidem		
Deiectio uiridis	ibidem		
Deiectio nigra	ibidem		
Deiectio liuida	ibidem		

INDEX.

Diacodion, ex papaveris capitibus & sapa.	249	Dia caryon compositum	ibidem
Dia chartiu pastillus	255	Dia gyreos emplastrum	265
Dia citrii compositio stomacho utilis	243	Dia gleucous	259
Dia chartu	258	Dia besafa	ibidem
Dia coronopodiu compositio	244	Dia rhodon album	263
Dia ægylos, acopon	276	Dia smyrnon ad & rhiadas & egi- lopas	262
Dia eron emplastr.	269	Dia gurgurton, malagma	274
Dia cadmias emplastrum	267	Dia stactes emplastrum	270
Dia dictamnii empla.	263	Dia chilon emplastrum	265
Dia erigerontos empla.	266	Dia asphodelu emplastrum	265
Dia euphorbiu, acopon	276	Dia ceratos collirium	Galenus 263
Dia coralliu medicamentum, po- dagricis idoneum	253	Dia elcismatos	266
Dia electru pastillus	254	Dia melitos emplastrum	265
Diarrhæa	86	Dia aloes collirium	262
Dia hæmaton antidotum	248	Dia libanu collirium	263
Dia hermodactilu compositio ad podagram	244	Dia scoridon emplastrum	266
Dia libanu	257	Dia rhodon Crocinum	263
Dia cœnelæu pastillus	256	Dia piranu emplastrum	266
Dia ostreon	257	Dia hidrias collirium	261
Dia oxynyrhines	258	Dia zomaton collirium	261
Dia phellon pastillus	255	Dia crocu aridon	264
Dia physalidon	255	Dia rhodon Nili	263
Dia rhoden pastillus	254	Dia pternes emplastrum	270
Dia stole pulsus	27	Dia leptocaron emplastrum	271
Dia cincin	288	Dia turpenes ceratum	271
Dia spermaton pastillus	254	Dia halon emplastr.	270
Dia sphenes, hoc est, ex facie conbusta, Manethonis	257	Dia samplicu malagma	264
Dia cinnabareos empla.	270	Dichromon emplastr.	269
Dia ireon empl.	268	Dictamnium	212
Dia meliloton malagma	272	Dies decretorij	26
Dia spermaton malagma	274	Dies speculatorij	26
Dia strutiū emplastrum	265	Digereitia medicamenta	53
Dia rhodon, quæ septuaginta duas uncias pendunt	263	Digiti in manu ubi adnascantur	171
Dia taltas cellyrium	262	Digitorum adnatorum differentia	ibidem
Dia thalias, ruffum	ibidem	Digiti adnati quomodo præciden- di.	ibidem
Dia smyrnon, claudiacum	ibidem	Digitorum luxatio quomodo cu- retur	199
Dia moron simplex	259	Digitorum pterigia putrida quo- modo curanda	118
Dia moron compositum	ibidem	Digitorum pedis luxatorum cura- tio	202
Dia moron ex moris baruis, quæ rubi fructibus sunt	259	Digitos puerorum, dentibus uulne	
Dia caryon simplex	ibidem		

bb ij

INDEX.

ratos quid sanet	2	Dulcium uires	208
Digitorum contusionis & confracti- onis curatio	195	Duracina	20
Dioclis epistola Antigono regi scripta ad ualitudinem tuendam	23	Dysenteria quid 87 species ibide. causæ ibid. signa ibidem. curatio ibidem. & sequentibus	
Dionysias	212	Dysenteria cruenta ibidem. Iecora ria ibidem.	
Diospolites	251	Dysentericis utilia, catapotia ex xylo macere	253
Diphryges quomodo coqui de- beat	282	Dysodes acopon ex Gal. 276 aliud ibidem	
Diphryges	212	Dysodes malagma	274
Dipsacos	ibidem	E	
Dipsas unde dictus.	150	E Benus	213
Dipsadis morsus notæ ibidem cu- ratio	ibidem	Ebrietatem præcauentia	22
ἰσχυρία quid 160 Eius causæ ibidem curatio ibidem		Ebrietatis curatio	7
Dolichon	19	Ebulus	205
Doloris species & causæ 39 & 40 remedia	ibidem	Ebur	213
Doloris capitis in febribus cura- tio	41	Eccope	188
Doloris in febribus causæ 39 re- media	ibidem	Echini	22
Dorias	214	Echinus herba	214
Dorycinon	212	Echinus	ibidem
Dorycnij poti notæ 156 remedia ibidem		Echinon	ibidem
Dosithei catapotia ad iecur inscri- pta	252	Ecchymona quid 132 curatio ibi- dem	
Dothiene emplastrum	265	Echidna	214
Dracunculus	212	Eclegma ex marrubio compo- situm	250
Dracunculi 145 ubi generentur ibi- dem. curatio ibidem		Eclegma ad tussim	77
Dracunculi curatio	185	Eclegma ex marrubio simplex	250
Draconis marini ictus cura	15	Ecpiesmus oculi	69
Dracuntium	212	Ecpiesma	188
Dropax Gallus Oribasij	276	Ectropion, eiusq; curatio	65
Dropacis duplex præparatio	275	Ectropion 162 Eius causæ ibidem curatio	ibidem
usus	ibidem	Educentia spicula aculeos, arundi- nes, spinas & confimilia	140
Druppæ oliug	20	Eis onycha	188
Drys	212	Elate	213
Dryini morsuum signa 150 reime- dia	150	Elatine	ibidem
Dryinus pessimus serpens	150	Elaterij noxæ quomodo remouen- dæ	158
Dryopteris	212	Elaterij effectus 242 quale deli- gendum. ibidem. Exhibendi mo- dus & pondus ibidem	
Dulcis radícula	211	Elaphoboscus	212

INDEX.

Elaterium	ibidem	tinus uulneribus inijcitur, & fra-	
Elæa	212	cturarum callos firmat	268
Elæon	ibidem	Empl. ex salicibus, glutinans cruen-	
Elæa gthiopica	ibidem	ta excreantibus, & purulentis ef-	
Elæomeli	ibidem	ficax, thoraci impositum	268
Elephantia quid	119	Empla. Galeni aceros, glutinat,	
Elephantia incurabilis quare ibi-		concoquit, ulcera ad suppuratione-	
dem		nem perducit	269
Elephantia duplex ibidē. Quæ mi-		Empla. ex oxelgo	267
nus maligna ibidem. Quæ mali-		Empl. ex achate, discutiens emol-	
gnior	ibidem	liensq;	ibidem
Elephantie minus maligne curatio		Empl. ex plumbagine ad calidas	
ibidem		affectiones	ibidem
Elephantia laborantium spiran-		Empla. coracon ex oxymelite, ad	
di difficultas quomodo curanda		naturalium uitia & nomas accom-	
120		modatum	ibidem
Elephantie causæ	119	Emplastrum Icesios ad strumas, ab-	
Elephantie uictus ratio conue-		scellus, lienem, articulos, & co-	
niens	119	xendicum doctores	268
Elleborine	213	Empl. Neronis, ad ictus omnemq;	
Eleoselinon	213	particularum carnosarum dolo-	
Elelisphacus	ibidem	rem	268
Elestrum	215	Empla. ex cerusa uel ouï	267
Elos	66	Emplastrum parygron Oribasij	
Elymus	214	ibidem	
Empetron	214	Emplastrum ariobarzanion	266
Emphysema quid	64	Emplastrum ex dracunculo ibidē	
Emphysematis cura	ibidem	Emplastrum Aristophanum emol-	
Empiema 30 causæ 30 signa ibi-		liens	267
dem. curatio ibidem		Emplastrum ex althea, podagricis	
Emplastrum similion ad abscessus		alijsque duricijs accommodatum	266
266		Emplastrum cissonum ad neruorū	
Emplastrum diascorodon ad rum-		uulnera, punctus, & maxime	
pendum	ibidem	diuturna	ibidem
Emplastrum dia apyranu ad discu-		Emplastrum botanicum	265
tiendum	ibidem	Emplastrum ex polline farinaceo	
Emplastrum dia struthiu, strumas		265	
diicutiens	ibidem	Emplastrorum materia, præpara-	
Emplastrum pelarion ex scoria ar-		tio & differentia	264
genti	266	Emplastrum pyrine, ad duritias	
Emplastrum e fermento abscessus		scirrhus	266
rumpens	265	Emplastrum tetrpharmacum	265
Emplastrum dothiene	ibidem	Emplastrum dia chylon	265
Emplastrum ex succo lini, seminis		Emplastrum dia asphodelu	ibid.
discutiens detergensq;	265	Emplastrū oxera multiplicis usus	
Emplastrum ex melle	ibidem	269	
Empl. barbara quod cruentis pro-			

INDEX.

Empla. ex ochra, inflammationem arceat tum sponte, tum in iudicio tortis idoneum	270	Emplastrum entaticon	ibidem
Emplastr. ex cedria, glutinat di- scutit, abstergitque ibidem Aliud molliens	ibidem	Emplastrum ex cinnabari ad to- phos aliosque omnigenos tumo- res induratos, dicitur pamplethes	270
Emplastrum ex pumice, ad cicatri- cem ducendam	270	Empla. uiride simplex 270 aliud uiride, ad humida uitia, & carnis excrecentias	ibidem
Emplastr. paula, strumis & bubo- nibus efficax	ibidem	Emplastrum peganera ad pleuriti- cos	ibidem
Emplastrum palmulatum	267	Emplastrum athena, ad ulcera for- dida, impacta, nervorum uulnera	268
Empla. ex metallicis	269	Emplastrum, dia dictamnu, gluti- nans, ad canum morsus, & omni- gena ulcera	ibidem
Emplastrum armenia fracturis ac- commodata	ibidem	Emplastr. e nitro ad abscessus, scyr- rhus, ad tumores	270
Emplastrum ex anchusa, ambustis efficax	267	Empl. conglutinans ad ulcera quæ serpendo depascunt, & sanguinis sputum	269
Emplastrum ex pampholige ibid.		Emplastr. ex cinere aspidū, discutit strumas & podagras	ibidem
Emplastrum leæna, noxia educit in superficiem, humoresq; eua- cuat	269	Emplastr. legna, siccata discutitq; ibi.	
Emplastrum Macedonicum ibi- dem		Emplastrum ex nitro ad carbuncu- los	270
Empla. chryse, cruentis uulneribus accommodatum	271	Emplastrum ex anemone ibidem	
Emplastrum anicetos glutinat di- scutit, squamas separat, & ad ar- ticulos recentī cicatrice contra- ctos ualet	269	Empla utride Macherionis, ad co- xendicum cruciatus, articulos in- farcitos, & abscessus	ibidem
Emplastrum Serapionis Melæne ibi- dem		Emplastr. ingredientia medicamēta quomodo coqui debeant	281
Emplastrum ex lolio	269	Emplastr. philocoryche, dolorem leniens, ad sedem utilis	267
Emplastrum lsis, cruentis accom- modata, ad glutinandum, carnem inducendum, & purgandum	268	Emplastr. Amithaonis, ad articulos recenti cicatrice contractos, con- uulsosq; ad extrahendum etiam efficax	267
Emplastrum ex urina muli, poda- gricis utile	271	Emplastrum ex perna tophos sol- uit	270
Emplastr. ex lapidis asij flore, phi- lagrij ad scyrrhos ibid. ex eodem Galeni	ibidem	Empla. ex lixiuio, coxendicum do- loribus, articularijs et tumoribus eodem referentibus utile	270
Emplastrum ex salis flore, articu- larijs indeclinacione accomoda- tum	271	Emplastr. ex auellanis, ad articulo- rum tophos probatum	271
Emplastr. quod nutriendæ ulcerum carni est	ibidem	Empla. sphærtien ad ardores	270
Emplastr. italicum ad purgandum fordida, inducendumque carnem	271	Emplastrum Nicolai ad recentia	

INDEX.

vulnera, & finus glutinandos ap- tam	268	modus	242
Empla ex liquore sycamino	269	Epithymbri vires	ibidem
Emplastrum dichromon. ibidem		Epithymum	214
Emplastrum dia cadmias, cicatri- cem inducens	267	Epomphalium medicamentū quod umbilico illinitur ad aluum sub- ducendam	246
Emplastrū Mnasei discutiens	266	Epithematū differentia et usus	272
Emplast. melanchlorum	266	Epulis Eius curatio	ibidem
Emplast. ex senetione	266	Epulis quid & quomodo curetur	74
Emplastrum phtacium	ibidem	Equarum sanguis	204
Emprothotonos	61	Erasistrati panchrestos hygra	262
Encanthis quid eiusq; cura	66	Erethrias terra	212
Encephalos	213	Eria	214
Engisoma	188	Erice	ibidem
Entaticon emplast.	271	Erigerum	215
Enterocoele	179	Eriaceus	214
Enthensici	57	Erimon	214
Epheldem curantia	73	Eruum	229
Ephemeron	214	Eruca	214
Ephemeris assumpti notæ	156	Erucae picearum	230
dia	ibidem	Erucae facultates	18
Ephialtes unde dicatur	58	Erucae pinorum assumptæ signa	154
Ephialtes quomodo cognoscatur	ibidem.	Curatio	ibidem
Ephialtes quomodo curandus ibi.		Erucae olerum	217
Epicaunia ulcus oculi	66	Eryngium	215
Epilepsia trifariam gignitur	55	Erysipelas inflammatorium	42
Epilepsiæ curatio 56 & sequent.		Erysipelas quid	125
Ephialtes unde constituatur	58	Erysipelata capitis periculosa	42
Epilepsi causæ	55	eorum curatio	ibidem
Epilepsia cui ferè ætati accidat	ibidem	Erysipelas quid ibid. Curatio ibid.	
Epilepsiæ note	ibidem	Erysipelatis cerebri signa & cura- tio	53
Epileptici quomodo coarguendi 56		Erythrodanon	214
Epimedium	214	Erythroides tunica	177
Epimyctides quid 124 signa cura- tio ibidem & 124		Erythrum	274
Epimelis	214	Eupatorium	214
Epiphora oculorum quomodo cu- retur.	63 & 64	Euphorbium	214
Epiploenterocoele	179	Euphorbij pondus, vires, et modus utendi	242
Epipactis	214	Eunuchi quomodo fiant	180
Epiplocele	179	Eunuchismus	ibidem
Epistola Dioclis Antigono regi scripta ad valetudinem tuendam	23	Euodes, a' grato odore dictum, ma- lagma	273
Epithymi vires, pondus, & utendi modo curanda		Euzomon	214
		Exanthemata puero oborta quo- modo curanda	2

bb iij

INDEX.

Exanthemata flicosa capitis et men ti quomodo curanda	49	& curatio	36
Exanthematum capitis p[re]sid.	49	Fex	237
Exarthroma	197	Febrium putridarum agnitio	34
Exercitationum genera	4	Febrium tertianarum agnitio	34
Exercitatio ualida seu uiolenta	3	Febris tertiana	34
Exercitatio celeris	4	Febris tertiana exacta	ibidem
Exercitatio composita	ibidem	Febris tertiana extensa	ibidem
Exercitatio quando finienda	4	Febrium putridarum curatio	34
Exercitatione finita quid facien- dum	4	Febris tertianæ uictus	34
Exercitatio quid	ibidem	Febris tertianæ curatio	ibidem
Exercitationis commoda	3	Febris tertianæ nocte curatio	35
Exercitationis tempus idoneum, urinarum color indicat	ibidem	Febrium quartanarum agnitio ibi- dem	
Exercitatio uocis qualis esse de- beat & quæ eius sint commoda	4	Febrium quartanarum differen- tiæ	ibidem
Exomphalon	173	Febrium quartanarum curatio ibi,	
F		Febrium quotidianarum agnitio	35
Faba	222	Febrium quotidianarum curatio	ibidem
Fabe	19	Febris quartana quo fere anni tem- pore incipiat	35
Faba Aegyptia	ibidem	Febris hepialis signa, causæ & cu- ratio	35
Facies ut rubefeat quomodo effi- ciendum	73	Febris hepialis unde dicatur ibid.	
Faciem à rugis asserentia	72	Febrium ardentium agnitio	36
Faciei pillos tollentia	73	Febrium ardentium curatio ibidem	
Faciei nigritias tollentia	ibidem	Febrium quibus ex affectu erysi- pelle origo est notæ ibid. eorun- dem curatio	ibidem
Faciei uaros tollentia	ibidem	Febrium heclicarum agnitio	37
Faciei aspretudinem tollentia ibi- dem		Febrium heclicarum duæ species ibidem	
Faciei uicta quomodo curentur	72	Febrium heclicarum curat. ibidem	
Facultates alimentorum	17	Febrium diariarum causæ	33
Fames grandis, in febribus quomo- do curetur	43	Febris diarta qua ratione dignosca- tur	ibidem
Farinaceus pollen	212	Febri diariæ qui opportuni	ibid.
Fastidium cibi	84	Febri diariæ curandi ratio	ibidem
Fastidium cibi in febribus quomo- do curandum	43	Febri diarta laborantium uictus	33
Fastidium cibi prohibentia	1	Febrium putridarum nocte ibidem	
Fatuitatis causa	55	Febrium putridarum curat.	34
Faustini pastillus	255	Febris semiterrianæ nocte, eiusque ge- neratio duplex	37
Fauus quid 183; curatio	ibidem	Febris semiterrianæ curatio it idē	
Fauus quid 134 quomodo cure- tur	ibidem	Febres continentes	36
Fauis capitis unde nascantur, & quomodo curentur	49	Febris continens quid	ibidem
Febrium continuarum origo nocte			

INDEX.

Febres curaturus quot & quæ per quirere debeat 25	& 125
Fel 240 Suillum 240 Ouillum ibi- dem. Caprillum, Vrsorum, Boum, Taurinum ibidem, Hyenæ, Callio- nymi piscis ibid. Scorpionis ibi- maxime Hirundinis, Capræ syl- uestris, ibid. Gallorum, Perdicum, Accipitrum, Aquilarum ibidem.	Flatus uentriculi unde generentur 85 quomodo curentur ibidem Flauum medicamentum 257 Fluxionibus alui biliosis maxime medetur lac coctum in quod cal- culi marini igniti demissi sunt 21 & intestinorum torminibus ibi- dem
Fel uolucrum acrius & sicando uehementius, quàm quadrupedū ibidem	Foeniculum 229 Foenugræcum 19 Foenugrecum 237 Fœtum educentia 104 Folium 239
Felis morsus notæ 149 curatio ibi- dem	Fracturis idoneum medicamētum Oribali 271 Ex commentarijs Heracleti ibidem
Femora bouis cremata 229	Fractura ossis quid 183 Fractura in capite quid ibidem Fracturarum differentiæ ibidem Fracturarum capitis differentiæ ibi- dem
Femorum intertrigines curantia 3	Fracturæ capitis species quomodo deprehendenda 189 Fracturæ capitis curatio 189 Fracturæ cum uulnere curat 196 Fracturæ callo non firmatæ quomo- do curandæ 197 Fracturæ immodico callo obductæ quomodo curentur 196 Fraxinus 226
Femoris fracturæ quomodo curen- tur 195	Frictionum genera 4 Frictionum nouæ coniugationes 4 Frictio dura 4 Frictio mollis ibidem Frictio mediocris ibidem Frictio multa & dura ibidem Frictio modica & mollis ibidem Frictio apothérapeutica ibidem Frictio præparatoria 3 Frigida lauatio quibus conueniat 10 Frigida intemperies quomodo cor- rigatur 16 Frigus cui nocuit, quid facere de- beat 8 Frigidi & siccit temperamenti no-
Foeniculum grande 216	
Fermentum 215	
Ferreg aquæ quibus conferant 11	
Ferrum 233	
Ferula 227	
Ficus 19	
Ficus 236	
Ficus arbor 236	
Ficus humilis 240	
Ficus capitis morbus quomodo cu- randus 49	
Ficosa capitis & menti exanthema quomodo curanda ibidem	
Filicula 212	
Filicula 231	
Filix 232	
Fistula quid 182	
Fistula quid 139 coratio ibidem	
Fistulæ insanabiles 183	
Fistulæ egrè cōsanescentes ibidem	
Fistularum ani curatio quæ manu peragitur ibidem	
Fistularum differentiæ 182	
Fistulæ quomodo manu curandæ ibidem	
Fistularum ani latentium notæ 183	
Fistularum ani manifestarum notæ 183	
Flagris cæsi quomodo curandi 124	

I N D E X.

træ	13	Genista	235
Frigidi & humidi temperamenti		Genitali exulcerato conueniēs me	
notæ	13	dicamentum	116
Frigidi temperamenti notæ	13	Gentiana	211
Frons quomodo incidatur & qui-		Geni articulus luxatus quomodo	
bus	160	reponatur	202
Fructus temporarij	19	Geranium	211
Fructus arborum	ibidem	Geras	211
Fruentaceorum uires	19	Ges entera	ibidem
Fucus	239	Gigarta	ibidem
Fuligo	224	Gingidion	18
Fuligo	204	Gingidium	211
Fumaria	217	Gingiuas corrosas curantia	74
Fungorū assumptorū remedia	157	Glandes	20
Furunculus quid 130 curat. ibidem		Glans unguentaria	209
Fuca purgans & stomacho grata		Glans penis cōtacta quomodo; ape	
244		riri possit	175
G		Glandes ad quid conueniant	9
Agates	224	Glandes unde conficiantur	ibidem
Gala	210	Glans colis nuda quomodo conte-	
Galactites	224	genda	174
Galbanum	283	Glandulæ animalium	21
Galbanū quomodo coquendū	283	Glastum	216
Galenī collyrium ex cornu	263	Glaux	211
Galenium malagma	274	Glaucium	ibidem
Galenī picra	251	Glaucoma quid eiusq; remedia	63
Galerita	221	Glechon	211
Galion	210	Gloeos	ibidem
Galliopsis	ibidem	Gluten piscium	217
Galla	219	Glutinum	270
Galli cerebrum	213	Glutinum bubulum	213
Gallina	20	Glycea quomodo curentur	72
Gallarum stercus	221	Glycyrriza	211
Gallarum uentris interior mem-		Gnaphalium	ibidem
brana	220	Gone pessus	231
Gallus dropax, Oribasij	276	Gongylis	212
Gallarum cohortalium sanguis		Gordylon	ibidem
204		Gramma oboli	282
Galopsis	210	Gramen	204
Gammari	22	Gramen arundinaceum	217
Ganglion quid 169 Eius notæ ibi-		Grandines tussiendo eieci	76
dem. Curatio	ibidem	Granum gnidium	220
Ganglū quid 125 curatio ibid.		Granum tinctorium	ibidem
Gangræna quid 127 curatio 127		Crallum corpus quomodo extenu	
Gangrenarum remedia	128	andum	12
Garum	210	Grauedo	176
Ge	ibidem	Grauedin's curatio	ibidem

I N D E X.

Grauedinis puerorum curatio	2	Hemicraniae curatio	51
Grauidarum Symptomata, eorum- que remedia	1	Hemina	296
Grosfi	228	Hemionitis	215
Grues	20	Hemiplagia quid.	59
Gummi	220	Hepar	215 Vide Iecur
Gummi cerasi arboris	219	Hepar quomodo uratur	172
Gurgulio	166	Hepatis temperaturae notae	15
Gutturis aspredinem curantia	77	Hepialus febris	35
Gutturi spinae quo eximantur	167	Hepiali curatio	ibidem
Gypsum	212	Hepsema	214
Gypsi poti notae & remedia	157	Heraclion	224
Gyrgathon	58	Heraclius lapis	ibidem
Gyris	212	Herba lactaria	237
		Herba apollinaris	238
H		Herbae quomodo coquendae	283
Habitus corporis quomodo re- calfaciendus	6	Hermaphroditi unde appellati	180
Haematites	224	Eorum quatuor differentiae, in uiris tres, in mulierib. una	ibidem
Hemorrhoides caecae curatu diffici- les existunt 102 quomodo aperi- endae	ibidem	curatio	ibidem
Hemorrhoidum fluxus superfluus quomodo sistendus	ibidem	Hermodyctylus stomacho nocet	14
Hemorrhoides quid, & cur sic di- cantur	ibidem	Herpes quid	125
Hemorrhoides muliebrium loco- rum quomodo excludendae	180	Herpes exedens	128
Hemorrhoides ani quomodo ma- nu curandae	184	Herpes miliaris	ibidem
Halasia, quasi dicas ex sale confe- cta, purgatio	244	Herpyllum	214
Halmi uires	18	Hidros	216
Harmation	264	Hieracitis	224
Hastula regia	209	Hiera Antiochi	245
Hedera	219	Hiera Archigenis	246
Hedera terrestris	239	Hiera Galeni	245
Hedychroi confectio	247	Hiera Iusti	ibidem
Hediosmus	215	Hiera Rufi	245
Hedysarum	ibidem	Hippocampus	216
Helcysma	213	Hippolapathum	ibidem
Helleborus	ibidem	Hippomarathon	ibidem
Helechryson	ibidem	Hippopotami	216
Helenium	ibidem	Hippopotamus	216
Heliocis medicamentum	257	Hipposelinon	ibidem
Helxine	214	Hipposelinon	235
Hemerocalles	215	Hipposelini uires	18
Hemicrania	51	Hippuris	216
		Hircina caro	20
		Hircinum iecur	215
		Hircinum cornu	218
		Hirundines	240
		Hirundinum cerebrum	213
		Hirundinaria herba	240

INDEX.

Hirudinum deuorata rum dignotio		Hypophelton	238
154 curatio	ibidem	Hyposphatissinus	160
Hyslopi liquidi medicamenti præ-		Hypospadæon	175
paratio	271	Hyposphagma quid eiusq; curatio	64
Hædi sanguis	205		
Hominis temperatiss notæ	12	Hyrorum sanguis	204
Hominis morsus remedia	152	Hyslopum	238
Hordeum	222		
Humana caro	20	I	
Humerus summus quid	197	I Aspis	224
Humeri luxati curatio	198	Ichores	78
Humiditates aurium desiccantia	3	Ichthyocolia	217
Humidi temperamenti notæ	13	Icterus quid	98
Hyalos	238	Icterus niger	97
Hyacinthus	238	Ictericorum remedium	94
Hydatis quid 162 notæ ibidem cu		Icterus ratione iudicationis in fe-	51
ratio	ibidem	bribus facile curatur	98
Hydnon	238	Icteri ex calida intemperie iocino	98
Hydor	ibidem	ris notæ ibidem curatio	98
Hydrargyros	ibidem	Icteri ex calida intemperie solida	98
Hydros	151	rum partium generatio 98 notæ	
Hydrocele	99	98 curatio	ibidem
Hydrocephalon quid 159	Eius	Ictericis quæ uena secanda ibidem	
causæ ibidem. notæ ibidem. cu		Idæa radix	216
ratio	ibidem	Iecur 215 Canis rabidi ibidem ca	
Hydromalum uinosum	259	prillum ibidem. Hircinum ibidē	
Hydrops leucophlegmatias, hypo		Iacertæ ibidem. Lupinum ibidē.	
farcidos, uel anasarca, eiusque si		Asininum, Apri ibidem, Mergi ibi	
gna & causæ 96 eiusdem cura		dem	
ratio ibidem. & 96		Iecur animalium	21
Hydropeperi	238	Iecur suillum	ibidem
Hydropicis aqua quomodo emitta		Iecur quomodo uratur	172
tur	172	Iambonis collyrium	262
Hydrophobia	147	Ileos quid	90
Hyemi quæ uictus ratio conueniat		Ilex	231
24		Incrassantium alimentorum disse	
Hygra ex caualide	264	rentiæ & uires	17
Hygidion Ammonij	262	Incubo uel Incubus unde dicatur	
Hyoscyamus	238	58	
Hypericum	ibidem	Indicus lapis	224
Hypericon	221	Infans recens natus quomodo nu	
Hypecoon	238	triendus	2
Hypocistis	ibidem	Infantium uictus ratio	3
Hypoglosson	ibidem	Inflammatiō proprie quid 125 cu	
Hypoglottides medicamen.	77	ratio	126
Hypopyi	163	Inflammatiō erysipelacea	42
Hypopij	67	Inguinalis herba	128
		Inguinibus conueniens medicamē	

INDEX.

tum	127	Iuncus palustris	ibidem
Intemperies frigida quomodo cor	127	Iuniperus	207
Trigatur	16	Ixos	216
Intemperatorum corporū notæ	13	Ixiæ signa 155 remedia	ibidem
Intertrigines femorum curantia	3	κακοχυμία quid	11
Intertrigines curantia	125	καρωτικά medicamenta	93
Intestina terre	211	L	
Intestini procidentia quomodo cu	174	Labriferam uitam agentium ui-	
ran.	21	ctus ratio	11
Intestina animalium	220	Labrum ueneris	212
Intybus syluestris	18	Lac	210
Intybi facultates	93	Lac recens multum	21
Iocinoris affectus	15	Lac bubulum 210 Muliebre ibid.	
Iocinorosi qui	93	Caprillum, Asininum, Ouilum,	
Iocinoris temperaturę notę	15	Vaccinum ibidem.	
Iocinoris imbecillitas	93	Lac coctum	21
Iocinoris frigida intemperieri no	94	Lac nutricis uiciatum quomodo	
tæ ibidem curatio	94	corrigitur	1
Iocinoris caua pars per aluum gib-	95	Lac ouilum	21
ba per urinas expurgatur	94	Lac scissile	21
Iocinoris sicca intemperiei notæ	94	Lac humidius	21
humide notę ibidem		Lac caprillum	ibidem
Iocinoris inflammationis signa ibi.		Lactis probatio	2
eiusque curatio	95	Lac crassius	21
Iocinoris inflammatio a pleuritide	94	Lac coquendi modus	ibidem
quomodo discernenda	94	Lac statim a partu redditum	21
Iocinoris inflammationum in gib-		Lac nutricis quot modis uiciet	2
ba eius parte, notę	ibidem	Lactaria herba	237
Iocinoris uenarum obstructionis		Lacerta	233
notę ibidem curat	94	Lacerta	233
Ion	216	Lacertæ iecur	215
Ios	ibidem	Lactuca	216
Iris	216	Lactuce facultates	18
Isatis	216	Ladanon	223
Isis emplastr.	268	Lagopus	223
Isoyron	217	Lanæ	214
Isotheon collyrium	264	Lanæ pinguitudo	228
Itea	217	Lapathum	223
Иtea	53	Lapides	224
Iudicium futurum quomodo præ-		Lapides quomodo coquendi	282
noscendum	26	Lapides argæi montis cappado-	
Iudicium instans quomodo agno-		ciæ	224
scendum	27	Lapis specularis	235
Iuglans	20	Lapsana	224
Iuguli confracti curatio	192	Larinx	75
Iuncus angulosus	222	Larix	232
Iunci odorati & rotundi flos	236	Laserpitium	234

I N D E X.

Lassitudinum ob exercitationem		Lienis obstructionis notæ	97
quatuor species earumque remedia	4 & 5	Lienis expultricis facultatis imbecillitas quomodo cognoscenda	
Lateralis dolor quid §1 notæ ibi.		ibidem	
causæ ibidem curatio	ibidem	Lienis intemperies quomodo curatur	ibidem
Lathyris	223	Lienteria quid, eius species, causæ, notæ, & curatio	86
Laurus arbor	212	Lignys	224
Laurus Alexandrina	212	Lignorum caries	233
Laurinum oleum	279	Ligusticum	224
Legna empl.	269	Lilium	222
Legumina	19	Liliaceum oleum	278
Lemæ quid	52	Lingæ animalium	21
Lemonium	223	Lingæ morbus	74
Lemnia terra	211	Lingæ scabrities quomodo curanda	44
Lentes	238	Lin semen	224
Lenticula	19	Linospermon	ibidem
Lenticula palestris	239	Linozostis	ibidem
Lenticulas curantia	73	Liosporon	224
Lentiscus	236	Lipasmata	60
Lentiscinum oleum	279	Lippitudinis causa 63 curatio ibidem	
Leontoperalon	223	Liquidorum mensuræ	286
Lepidion	ibidem	Liquidum coly. ex caucalide	264
Lepidoile ossa	258	Liquor 229 Cyrenacius, Medicus, Syriacus	ibidem
Lepis	223	Linum suffimen	230
Leporina caro	20	Lyiponium acopon	276
Leporis cerebrum	213	Lithargyros	224
Lepra quid 121 causæ ibidē signa		Lithi	ibidem
ibidem curatio	121	Lithospermon	224
Lethargi causæ 53 signa ibid. curatio	54	Litrum	224
Lethargus à caro quid differat	53	Lioures corporis prohibentia	6
Leucacanthum	223	Locustæ	22
Leucas	ibidem	Loligines	ibidem
Leuce	ibidem	Lolium	205
Leuce quid 122 causæ ibidem curatio	ibidem	Lonchitis	225
Leucus pastillus	256	Lonchitidis seminis pondus & modus utendi	243
Libanius pessus	281	Lotus herba	225
Libanotides	224	Lotus arbor	225
Libanotos	ibidem	Lumbricorum origo	143
Libanum	263	Lumbrici rotundi infantibus peculiare	143
Libellæ	22	Lunare cyphi	230
Libra	286		
Lichen herba	223		
Lichenes equorum	ibidem		
Lien animalium	21		
Lien quomodo aduratur	272		

INDEX.

Lupinum	216	Malagma euodes	273
Lupinum	19	Malagma ex fertula campana	272
Lupinum iecur	215	Malagma citrinum	274
Luporum stercus	220	Malagmatum differentia & usus	
Lupus, piscis	22		
Luxatio quid	197	Malagma dia sampsychu	274
Luxationis duę species	ibidem	Malagma ex uinaceis	ibidem
Luxatio cum fractura quomodo		Malagma decamyron	273
curetur	202	Malagma ex œnanthe	274
Luxatio cum ulcere quomodo cu-		Malagma polyarchion ex Galeno	
retur	202	272 aliter	ibidem
Lycaonis signa & curatio	ibidem	Malua	225
Lychnis	225	Maluę uires	18
Lychnidis seminis pondus & mo-		Malicorium	232
dus utendi	242	Malus armeniaca	226
Lycium	225	Malum citreum	20
Lycostinon	205	Malum medicum	219
Lycopsis	225	Malus persica	226
Lycoplis	204	Malum punicū 232 Eius acini ibi.	
Lygis	ibidem	Malum terrę	207
Lyncus ad claritatem oculorū	263	Mamillarum affectus curantia	82
Lypyrig febres	36	Mamiras	225
Lylimachium	225	Mammarum inflammationes quo-	
		modo curandę	131
M		Mammis medicamentum conue-	
Acherionis empl. uiride	270	niens	122
Macedonicum empla.	269	Mandragora	225
Madarosis quid et eius curatio	65	Manethonis dia sphedes	257
Magnes	224	Manus summe contusionis curatio	
Magni aster	263	195	
Mala	226	Manna thuris	225
Mala dulcia ibidem austera, acida,		Manna thuris quomodo coquenda	
assa, elixa	ibidem	283	
Mala punica	20	Marathron	225
Malabathrum collyrium	264	Marasmos	37
Malobathron	225	Marcellius thronus pastillus	255
Malacia piscis	22	Marciatum malagma	272
Malacia grauidarum Symptoma	1	Marina aqua	215
Malache	225	Marrubium	231
Mala costrata	22	Marrubium nigrum	209
Malagma ad capitis dolorem	51	Masaphion confectio	281
Malagma anethine	275	Massaloti medicamentum	258
Malagma ex baccis lauri	274	Mastiche	225
Malagma ex seminibus	ibidem	Maxillę confractę curatio	191
Malagma erythrium	274	Maxillarum luxatio quomodo cu-	
Malagma mendesium	272	randa	197
Malagma marciatum	272	Maza	19
Malagmapentamyron	273		

INDEX

Mecon	226	Medicamentum dia trion pspe-	
Medicamentum ex thure	257	reon	251
Medicamentum uomitum citans	246	Medicamentum ex succo mali pu-	
Medicamentum ex ostreis	257	nici	259
Medicamentum ex duplici pipere	249	Medicamentum ex succis maloru	
Medicamentum ex charta, ad no-		ad appetitiam abolitam et egram	
mas oris potissimum & natura-		concoctionem probatum	251
lium ulcera	258	Medicamentum fracturis idoneum	
Medicamenta purgantia compo-		Oribasij 271 Ex commentarijs	
ta	243	Heracleti	ibidem
Medicamentum heliocæ, adu-		Medicamentum ex sanguine hirci	
rens,	257	no	252
Medicamenta atram bilem pur-		Medicamentum nephriticum ex	
gantia quibus & quando exhibenda	242	cicadis	253
Medicamenta simplicia bilem fla-		Medicamentum ex cruvis	250
uam purgantia	28	Medicamentum ex malorum coto-	
Medicamentum dia besafa ex ru-		neorum carnibus	250
ta sylvestri	259	Medicamenta liquida que illinum	
Medicamentum ex sylvestris ma-		tur ad oris uiria, ac guttur accom-	
lug semine	253	modata	258
Medicamenti hyssopi liquidi pre-		Medicamenta purgantia stomacho	
paratio	272	aduersantur, excepta aloe	241
Medicamentum philoxeni, puru-		Medicamentum a murino colore	
lenti & longa defluxione infe-		psaron dictum	257
statis idoneum	250	Medicamentorum emplastra in-	
Medicamentum e musto	259	gredientium differentia eorumq;	
Medicamentum dodecatheon	250	coctio	264
Medicamentum dia citriu, tarde		Medicamentum ex lupino iecore	
concoquentibus efficax	251	præstantissimum	251
Medicamentum massalioti	258	Medicamentum xanthon	257
Medicamentum quod umbilico illi		Medicum malum	219
nitur epomphalum dictum, ad al-		Medimnus	286
uum subducendam	246	Medion	226
Medicamentum ex myrto sylue-		Medimnus atticus	286
stri	258	Medulla animalium	21
Medicamentum dia coralliu poda-		Melan	225
gricis idoneum	253	Mel	22
Medicamentum dia calaminthes	251	Mel coctum	ibidem
Medicamentum dia bacanu, hepa-		Mel non coctum	ibidem
ti accommodatum	252	Mel sachar	226
Medicamentum zopyrios ibidem		Mel uino quanto ponderosius	286
Medicamentum Galeni e stilla co-		Mel oleo quanto grauius	286
mitialibus potissimum efficax	249	Mela	226
		Melancholia quid	57
		Melancholiæ causæ	ibidem
		Melancholiæ signa	ibidem
		Melancholiæ curatio	ibidem
		Melancholia	

INDEX.

Melancholia hypochondriaca	57	curatio. ibidem	
Melanthion	225	Menses uulneribus quando fluere	
Meli	ibidem	incipiant 102 quande desinant 103	
Melanchloron emplastrum	266	Mensium tempus	ibidem
Melanchlorus pastillus	256	Menses moratos prouocantia ibi.	
Melanteria	225	Mensuræ	285
Melaplacontium quomodo pare-		Mensurarum notæ	ibidem
tur	251	Mensuræ aridorum ibid. &	286
Melenæ serapionis emplastrum		Mensuræ liquidorum 285 &	286
269		Menta	215
Melea	226	Meon	226
Melia	226	Mercurialis herba	224
Melitera Or'basij	257	Mergi uenter	220
Meliceris quid 168 eius notæ ibi-		Mergi iecur	215
dem curatio ibidem		Merule	20
Meliceris quid 133 curatio ibid.		Mespila	226
Melilotus	226	Mespila	20
Meline	214	Metopion	278
Melinum oleum	278	Milax	226
Melittites	224	Millefolium	227
Melon	66	Milium	218
Melopepon	19	Milium	19
Memecylos	226	Milphosis quid & eius curatio 65	
Membrum distortum callo firma		Mina	286
tum quomodo curetur	196	Mina egyptia	ibidem
Membrorum attenuatorum cura-		Mina atrica	ibidem
tio	12	Mina Romana	ibidem
Mēbrana cerebri si nigruerit quo-		Minium quomodo coquendū	282
modo curanda	190	Minium rubricum	211
Memorignoxa quomodo accidat		Misy	226
55 quomodo cognoscatur ibidē		Misy quomodo coquatur	282
quomodo curetur	55	Mitridatis antidotum dia scincu-	
Menses cientia medicamenta	103	248	
Menses mouentia	9	Mnasçi emplastrum discutiens	266
Mensū immoderatus fluxus quas		Modius	286
causas habeat 104 quomodo cu-		Modius ægyptius	286
randus	ibidem	Modius Italicus	ibidem
Mensium suppressio complures af-		Mola quid 107 notæ ibidem cura-	
fectus & longos procreare solet		tio	108
103		Molæ & aque inter cutem diffe-	
Mensium suppressio ob interanea-		rentia	65
rum partium aliquam primario		Moly	227
affectam quomodo curari de-		Molybdos	226
beant	ibidem	Molibdena	ibidem
Mensium suppressionis causæ qui-		Monohemeron collirium	261
bus notis deprehendantur ibidem		Mora	19
Mensium suppressorum causæ ibi.		Moræa	227

I N D E X.

Morbi principium quod	25	Myagros	ibidem
Morbus comitialis trifariam gi-		Myaron	ibidem
gnitur	55	Mycetes	ibidem
Morbi publice grassantes	37	Mydriasis oculorum	68
Morbi publice grassantes unde o-		Myelos	227
riantur	ibidem	Myocephalon	66
Morbi ex aeris statu futuri quo-		Myop. & qui	69
modo presagiendi & prohibendi	38	Myopialis	ibidem
Morbi letalis notæ	25	Myosote	227
Morbi non letalis signa	ibidem	Myrica	ibidem
Moroxus	224	Myriophyllon	227
Morus	227	Myrmecia	101
Motus mediocris ualitudini tuen-		Myrmecia quid 186 unde sic uo-	
dæ summum affert præsidium	18	cetur 186 curatio	ibidem
Muliebri lac	210	Myrrha	235
Mulier ægre pariens superstes ne		Myrrha	227
futura sit an minus quomodo co-		Myrrha quomodo coquenda	283
gnoscendum	182	Myrrhis	227
Muliebris fluor 104 eius species		Myrrhine	ibidem
& causæ ibidem. notæ ibidem.		Myrsinatum emplastrum	267
curatio ibidem		Myrsine	227
Muliebres loci, uide uulua &		Myrtinoides	220
uterus		Myrtus	227
Muliebrium locorū clausuræ caus-		Mystrum	286
se 190 incommoda ibidem cura-		Mystrum magnum	ibidem
tio ibidem		Mystrum paruum	286
Muliebrium locorum thymi cōdy-		Mytuli	227
lomata & hæmorrhoides quomo-		Myurus unde dicatur	29
do excindantur	ibidem	Myxa	227
Mullus	237	N	
Mullus piscis	22	Napus	18
Mulsa	22	Napy	227
Mulsæ preparatio	ibidem	Narce	227
Multipedæ	228	Narcissus	ibidem
Muria	205	Narcoticorum largior usus quæ in	
Mureng morsus curatio	151	commoda afferat	113
Muris aranei ictus notæ	141 cu-	Nardinum	262
ratio	ibidem	Nardostachys	227
Muris auricula	227	Nardus cizicine iniectio prima	
Murium stercus	221	273 altera iniectio ibidem. tertia	
Mulsæ pastillus	255	iniectio ibidem	
Mustela	210	Nardus gallica	227
Mustelæ uenter	220	Nardus montana	ibidem
Mustelæ cerebrum	213	Nares fractæ & contusæ quomo-	
Muscus	210	do curentur	191
Muscus marinus	ibidem	Narium uitia 71 & deinde per to-	
Myaces	227	tum caput	

INDEX.

Narium sanguinis fluxus quomodo sistendus	72	Neruicorum abscessuum medicamenta	127
Narium ulcera quomodo curantur	72	Neuras	228
Narium fœdus odor quomodo curatur	ibidem	Nigellę incōmoda quomodo amolenda	158
Narium uitia quomodo emendantur	72	Nili diā rhodon	26;
Nartex	227	Nili malagma ad lienem omnemq; duritiem	274
Nascanthon	227	Nitrum	224
Nascaphthon	ibidem	Nitrū quomodo coqui debeat	232
Nasturtium	217	Nitri spuma	209
Nasturtij uires	18	Nitrosę & falsę aquę quibus conferant	11
Natricis moriūs note	151	Noctug sanguis	204
curatio	ibidem	Nuces	218
Naturalia. Vide pudenda		Nuces	20
Naturalium inflammationes quomodo curandę	131	Nuces uirides, aridę	ibidem
Naturalium ulcera citra inflammationem oborta quomodo curanda	101	Nuclei acinorum uue	211
Naturalium particularum conseruatio	99	Nutrix qualis esset debeat	1
Naturalium aquarum uis	10	Nutrici quę sint uitanda	ibidem
Naturalium aquarum differentię	ibidem	Nutricis lac laudatissimum	ibid.
Naturalium balnearum differentię	ibidem	Nutricijs lac quot modis uicteť	2
Naturalium thymi	175	Nutricis lac uitiatū quomodo corrigatur	ibidem
Nauigantium uicūs	12	Nyctalops quid & quomodo curatur	68
Nausea quomodo curanda	44	Nymphęa	228
Naxię cotis detrimentum	224	Nymphe quid 133. Quomodo excindenda	ibidem
Nephritici	90	Nymphodoti pastillus	266
Nephriticum medicamentum ex bellarijs uelicę & renum exulcerationi idoneum	253	O	
Nephriticum medicamentum ex cicadis	252	Obolus	286
Nepita	217	Oboli gramma	286
Nerion	228	Ochra	271
Nerui testium	177	Ochron	19
Neruus præcisus quomodp; curandus	142	Ocimum	241
Neruis uulneratis aut punctis que accidunt	141	Ocimoides	ibidem
Neruorū uulneratorū curatio	ibid	Oculorum caliginē prohibentia	6
Neruorum contusorū curatio	142	Oculorū expressiōis curatio	69
		Ocularium medicamentorum differentia atq; usus	260
		Oculorum suffusio 163, unde fiat	
		ibidem. notę ibidem. curatio	164
		Oculorum qui defluxionibus instantur agglutinamenta	264
		Oculorum carcinomati quid fieri debeat	67

INDEX.

Oculi procidentia quomodo curan	66	Odora	203
da	66	Oe	223
Oculi humor crystalloides	63	Oedema quid	131
Oculorum obscuritas	69	Oedema quid 131 causæ	ibidem.
Oculorum suppurationem curan	67	curatio	ibidem
tia	67	Oedema aliorum morborum acci	dens nonnunquam 131 quomodo
Oculi procidentia	66	curandum	ibidem
Oculorum hebetudo	67	Oedemata pedum discutientia	1
Oculorum confusio quomodo cu	69	Oenanthe	223
randa	69	Oenantharia	230
Oculi purulenti quomodo curandi	66	Oenanthini confectio	ibidem
66	69	Alia	230
Oculorum suffusio quid, eiusq; cu	69	Oenos	223
ratio	69	Oesypus	ibidem
Oculi si cute non obtegantur, cura	161	Oesypos	214
tio	161	Olea	236
Oculi purulenti quomodo curandi	163	Olea	213
163	63	Oleæ radicis, corticis pondus &	utendi modus 242
Oculi dolorum causæ	63	Olea digerentia	39
Oculorum epiphora, id est, deflu	63	Oleum	213
xionis impetus quomodo cure	63	Oleum amaracinum	279
tur	63	Oleum amygdalinum	278
Oculorum unguis 163 curatio	163	Olea Aethiopica	213
ibidem	163	Oleum ægirinum	278
Oculorum phthysis eiusq; curatio	63	Oleum anethinum	278
63	69	Oleum balaninum	279
Oculorum atrophia eiusque cura	69	Oleum caryinum	ibidem
tio	69	Oleum chamæmelinum	278
Oculorum hebetudinē curantia	67	Oleum cicinum	278
Oculorum albugines quomodo cu	67	Oleum cyprinum posidoni j	279
rentur	67	Aliud	ibidem
Oculorum unguis qui pterygion	ibidem	Olei cum cera qui modus esse de	beat in conficiendis unguentis
græcis dicitur, quid, eiusq; cura	ibidem	&c. 283	
tio	ibidem	Oleum crocinum	230
Oculorum ulcera eorumq; curatio	66	Oleum dulce 213 omotribes ibid.	
66	63	elotum ibidem. Vetus ibidem. Te	
Oculorum inflammationis curatio	63	nue ibidem. Sabinum ibidem Ex	
63	67	agrestis olea ibidem. Ricinū ibi	
Oculorum cicatrices quomodo cu	67	dem, Sesaminum, Raphaninum	
rentur	67	ibidem	
Oculi membrana cornea	66	Oleum irinum	279
Oculorum carbunculo quid facien	66	Oleum laurinum	279
dum	67	Oleum liliaceum	278
Oculi tunica ξαροειδής	66	Oleum lentiscinum	279
Oculi dolorum curatio	63		
Oculorum mydriasis	68		
Ocimum	18		

I N D E X .

Oleum maffichinum	279	magis	Ononis	228
uarium	ibidem		Onothere	ibidem
Oleum fycionium simplex	279		Onothuris	ibidem
compositum	ibidem	aliud effica-	Onyches	228
cus	ibidem		Oon	241
Oleum melinum	278		Ophialis unde dicta	46
Oleum picinum	230		Ophites	224
Oleum raphaninum	278		Ophthalmia unde fiat	63
Oleum ricinum	ibidem		Opisthocranon	158
Olei rosacei confectio	278		Opisthotonos	62
Oleum sesamipum	278		Opisthotonicis potio accommoda	62
Oleum sulinum	ibidem		Opopanax quomodo coqui de-	283
Oleum uiolaceum	228		beat	283
Oleum melle quanto leuius	236		Opos 229 Cyrenaicis, medicus,	ibidem
Oleum uino quanto leuius	ibidem		syriacus	ibidem
Oleum quomodo coquendum	282		Orchis herba	229
Olei diuersa genera quomodo con-	277		Ordeum	19
ficiantur	203		Oreoselinum	229
Oleosorum uires	224		Oribasij clidion	254
Olearia cos	19		Oribasij dropax Gallus	276
Olera syluestria uitiosos humores	19		Oribasij melitera	257
gignunt	ibidem		Oribasij parygrum emplastrum	267
Olerum facultates	18		Origanum	229
Olera cruda peiores succos po-	18		Oriogenes pastillus	256
creant quam cocta	ibidem		Oris affectus	63
Olera condita muria uel oxalme	ibidem		Oris uentriculi inflammationes quo	modo curentur
quas facultates habeant	ibidem		Oryza	19
Olfactus uitia 71 & deinde per to-	55		Orminum	229
tum caput	20		Orobanchæ	229
ὀλιγοφύρον uinum	228		Orobos	ibidem
Oliuæ	262		Orthopnoea	78
Olostium	228		Oryza	229
Olympos seu olympiacum	228		Ossa	229
Olynthi	174		Ostra	ibidem
Omenti procidentia quomodo cu-	75		Ostheon	177
randa	228		Ostraca	229
ὀμὴ λυσίς	260		Ostracoderma	22
Omphacium	229		Ostracites	224
Omphacomelitis preparatio	228		Ostrea	22
Onagra	204		Ostrea	229
Onobrychis	ibidem		Osyris	229
Onochelos	228		Orthoma	228
Onoclea	ibidem		Orium summum uoletudini maxi-	me obest
Onoma	207		Oua puncta 20 Fricta	23
Ononis	228			
Ononisa				
ὄνως				

INDEX.

Ouilla caro	20	Curatio	ibidem
Ouillum cerebrum	213	Papyrus	230
Outum stercus	221	Paracynanche	75
Ouillum lac	210	Paralytis quid	59
Ouina pellis	212	Pararthrema	197
Ouron	229	Parastaræ	177
Ouum	241	Pardalianches	205
Oui candidum	ibidem	Parefis curatio	59
Oui luteum	ibidem	Parieraria	213
Ouum aceto incoctum uentris fluxiones desiccant	ibidem	Paronychia	230
Oxera emplastr.	268	Paronychia	117
Oxos	228	Paroris quid	71
Oxyacanthos	ibidem	Partes animalium	21
Oxybaphus	286	Particularum naturalium conseruatio	99
Oxymeli simplex	249	Particularum principalium uulnerum agnitio	187
Oxymeli iuliani 243	Pondus 243	Partium attenuatarum curatio	12
Vires	ibidem	Partium extremarum præcisio quomodo administranda	135
Oxymeli splenicum	252	Parthenium	213
Oxymeli scillinum	249	Parthenij uires, & utendi modus	
Oxænas curantia	72		
P			
Pæonia	211		
Pæonia compositio	252	Partus difficilis causæ 110 curatio	110
Paguri	22		
Paliuron	229	Partus ex utero qua ratione excutitur excindaturq; 181 & deinde per totum caput	
Palma	239	Parulis 165 Eius curatio	ibidem
Palpebrarum pili oculum irritantes quomodo curandi	65	Parulis quid & quomodo curetur	
Palpebrarum uisionem ex urente medicamento factam ueteres omnes damnarunt	161		
Palpebræ superioris sutura quomodo administranda	161	Parygrum emplastr. Oribasij	267
Palpebrarum pediculi quomodo ar- cendi	65	Passer troglodytes	238
Palpitatio cordis	82	Passeres exigui	20
Palumbus	20	Pastillus Oribasij clidion	254
Palumbi sanguis	204	Pastillus dia spermaton	254
Palumbi uenter	220	Pastillus purgans	244
Panaces Herculeum	229	Pastillus ex spina Aegyptia	254
Pancration	229	Pastillus dia castorij, colicis esticax	256
Panicum	214	Pastilli scillini quomodo præparantur	247
Panis	208	Pastillus dia rhodon	254
Panis syncomistos	19	Pastillos faustini	255
Papauer	226	Pastillus leucus	256
Papaueris liquoris epoti notæ 155		Pastillus cui nomen est thronus Marcellius	255

INDEX.

Pastill. ex erica, lieni dicatus	255	Peponatum smegma	253
Pastillus neræ ex Heræ commen-		perdix	20
tarijs	255	Periclymenon	230
Pastillus trigonus	254	Periphymosis	175
Pastillus nymphodoti	256	Peripneumonia quid	73
Pastillus capnistos ad tussim con-		Periscyphismus	160
tinuam	73	Peritonæi uulnera quomodo man-	
Pastillus criogenes	256	curanda	173
Pastillus musæ	255	Perniones quid 116 eorum cura-	
Pastillus ad capitis dolorem ex in-		tio	ibidem
temperie calida	50	Persæa	230
Pastilli 254 eorum differentia ibi-		Perturbationis oculi causa	63
dem. V. sus	ibidem	Pessi	281
Pastillus asfer dictus	254	Pellus quid	103
Pastillus dia coralliu	254	Pellorum differentie	281
Pastinaca	235	Pellus titianus	282
Pastinaca marina	237	Pellorum aperientiu materia	281
Pastinacæ radix	18	V. sus	ibidem
Pastinacæ	22	Pellus Aegyptia	281
Patella	195	Pestilentia quomodo præcauenda	
Patellæ fractæ curatio	ibidem	38	
Panicum	19	Pestilentie note	38
Pauo	20	Pestilentiam arcentia	38
Pectoris rupturæ, impressionis, cõ-		Petalites	230
fractionis note & curatio	192	Peuce	230
Pediculi capit. s. quõ abigendi	49	Peucedanum	ibidem
Pedis ossa fracta quomodo curen-		Phaci	233
tur	195	Phacos	ibidem
Pedis digitorum luxationum cura-		Phæon ad oculos sanguine suffusos,	
tio	202	& magnos affectus	261
Pedũ rimæ quomodo curand	117	Phagedenæ remedia	136
Pedum oedemata discurrentia	1	Phalangites	239
Peganera emplastrum	270	Phalangiorum morsus note, & cu-	
Peganum	230	ratio	143
Pelagij pisces	21	Phalaris	239
Pelation ad ulcera	261	Pharicis poti signa 156 remedia	
Pelation ex scoria argenti	266	ibidem	
Pelecinos	215	Pharynx	75
Pelles calceamëtorum ueterũ	212	Phaselum	19
Penis glans nuda quomodo conte-		Phasganion	218
gatur	175	Phasianus	20
Pentamyron malagma	273	Phasiolum	217
Pentaphyllon	230	Phellos	239
Peperi	ibidem	Philagrianum malagma	273
Peplion	ibidem	Philocotyche emplastrum	267
Peplon herba	ibidem	Philonis antidotum	249
Pepon	19	Philyras	239

ce iij

INDEX.

Phlegmone quid	125	Pisces cetacei	22
Phlomis	228	Pisces omnium deterrimi	21
Phlomos	29	Pisces molles cute	22
Phlyctæna	66	Pisces pelagij	21
Phlyctænæ quomodo curandæ	124	Piscium ius	215
Phoenicine emplastrum	267	Pissa	230
Phoenix herba	239	Pisselæon	230
φόνιγμα	54	Pistacia	20
Phormion	239	Pisum	19
Phrenes	52	Piruita in uentriculo redundans,	8
Phrenitis quid	52	quomodo uacuanda	230
Phrenitidos causæ ibid. & signa	52	Pytyides	ibidem
ibidem. Curatio	52	Pityocampæ	ibidem
Phrygius	224	Pityos phlæos	48
Phrynion	231	Pityriasis	ibidem
Phthysis oculorum	68	Pityriaseos curatio	231
Phthysis quomodo curetur	81	Pityusa	236
Phu	239	Pix	116
Phusta, ad cōterendū calculos	252	Plantæ sordida ulcera quomodo cu	231
Phycos	129	randa	27
Phygethlon	239	Platanus	11
Phylites	239	Plethoricum corpus	226
Phyllon	239	Πλεθώρα quid	282
Phyma quid	129	Plumbago	226
Piceæ cortex	ibidem	Plumbago quomodo coquenda	226
Picis flos	ibidem	Plumbum	158
Picinum oleum	251	Plumbi scobis potæ signa	ibidem
Picra Galeni	47	mediæ	231
Pilos argentia	47	Pneumon	53
Pilos extenuantia	47	Pnigalion	112
Pili palpebrarum oculum irritan-	65	Podagra quid	253
tes quomodo curandi	47	Podagræ causæ	112
Pilos nutrientia	230	Podagrica remedia	112
Pinafter	211	Podagra ab arthride quid differat	112
Pingitis terra	21	Podagra quomodo præcaueri pos	116
Pinguedo animalium	232	sit	275
Pinguia quomodo coquenda	20	Pœcilon acopon	212
Pini resina	230	Pollen farinaceus	231
Pini nucleus	230	Polycnemon	ibidem
Pinus	238	Polygalon	ibidem
Piper	209	Polygonon	220
Piper aquaticum	207	Polygonoides	255
Pappi quid	21	Polyidæ sphragis	22
158		Polypus quid	165
Pirum agreste		unde dicatur	ibidem
Pirus		ibidem curatio	ibidem
Pisces			Polypodas

I N D E X.

Polypodas curantia	72	Pforophthalmia quid eiusque cu-	
Polypodion	231	ratio	64
Polypodij radicis uires & modus		Pfydracia capitis	49
exhibendi	242	Pfyllium	240
Pomorum omnium facultates	19	Pfyllij assumpti notæ	155 remedia
Pompholyx	231	ibidem	
Pompholygeron emplastrum	267	Ptarmicæ	231
Pondera	285	Ptelea	ibidem
Ponderum notæ	ibidem	Pteris	ibidem
Populus nigra	204	Pterygion quid	163 curatio ibid.
Porrigo capitis	48	Pterygion oculorum quid eiusque	
Porphyreæ	231	curatio	67
Porium	18	Ptyas aspidis genus	151
Porrum agreste	206	Pudendum masculi cerui	204
Portulaca	207	Pudendorum ulcera quomodo cu-	
Potamogeton	231	randa	116 & 118
Poterion	231	Pudendorum rimas curantia	101
Praefion	231	Puerorum stercus	220
Praefoides	214	Puerorum aphthæ quomodo cu-	
Præcocia	20	rentur	3
Præster unde dictus	150	Pueris quomodo cieda aluus 2 et 2	
Priapismus quid 101 causæ ibid.		Puerorum tussis quomodo curan-	
curatio ibidem.		da	2
Principium morbi quod	24	Puerorum morbi & symptomata	
Prinos	231	ibidem	
Proficiscientium uictus	11	Pueri quo tempore dentiant	ibid.
Propolis	231	Pulegium	211
Propolis quō coqui debeat	283	Pulegij uires, pondus & sumendi	
Prosechij stacticum	262	modus	242
Prosphylis	177	Pulicatis herba	240
Protelus ad claritatem oculorum,		Pullus columbinus	20
cicatricesq; extenuat	263	Pulmo animalium	21
Prunus	220	Pulmonis temperaturæ notæ	14
Prunus	ibidem	Puls ad purgandum	244
Pruni fructus	ibidem	Pulsus quid	27
Pruna damascena	ibidem	Pulsus usus duplex	ibidem
Pruritus gingiuarum puerorum		Pulsus duri & uehementis di. cri-	
curantia	2	men	31
Pfaron medicamentum	257	Pulsuum genera & differentie re-	
Pseudodictamnion	240	cententur & explicantur 28, &	
Pfilothrum	258	deinceps	
Pfilothra medicamenta quæ	99	Pulsuum causæ & præfagia 30 &	
Psimmythion	240	sequentibus	
Pstacium emplastrum	267	Puluis cephalicus, capiti conue-	
Pfora quid 121 causæ ibidem si-		niens	257
gna ibidem curatio	ibidem	Puluis pilos abolens, ad podagram	
Pforicon	240	258	

I N D E X.

Pulvis ex aloë	257	Radices quomodo coquendæ	283
Pumex	219	Radij fractura quomodo curanda	194
Pumex quō coqui debeat	282	Ratæ	22
Purgans puls	244	Ramicum genera	99
Purgantia medicamenta non simplicia quodam temperamento, sed totius substantiæ proprietate purgant	241	Ramex intestinorum rupto peritongo difficiliter curatur, quam qui ob raritatem illius contingit ibidem	179
Purgantes oliuæ	243	Ramex omenti	179
Purgatio ex Rhodomelite Alexandri	243	Ramices pueri frequentius patiuntur & quare	99
Purgationibus quos uti conueniat	241	Ramex uaricosus	178
Purgationis tempus	ibidem	ibidem curatio	178
Purgans fusca, & stomacho grata	244	Ramex tophaceus	178
Purgantia medicamenta composita	243	Ramex uentosus ibid. curatio	178
Purgans pastillus	244	Ramicis curatio	99
Purgans uinum in hydropicis ibi.	243	Rang	209
Purgans bucellatus	243	Rang rubetæ haufiæ signa	152
Purgatio halaria	244	ratio	ibidem
Purgatione modū excedente quid fieri debeat	245	Ranarum sanguis	204
Purpure	231	Rapa	18
Purulentum quomodo adurendi	171	Raphanis	ibidem
Purulentorum curatio	80	Raphanidon	188
Putredini quamlibet partē occupanti accommodata medicamenta	136	Raphanus	232
Pycnocomon	232	Raphano quando & quomodo utendum	18
Pyrethrum	232	Raphaninum oleum	278
Pyrethri pondus & utendi modus	242	Rapum	212
Pyrgitæ	20	Ratiocinationis offensa quomodo contingat, dignoscatur & curetur	55
Pyrene emplastrum	266	Raucitas	75
Pyritis	227	Recrementum	234
Pyros	232	Refractio	188
Pytia	232	Remedia	189
Pyxis acopon	276	Renēs animalium	21
Q			
Quantitatis quæ mensuratur tres differentię	238	Renum affectus quomodo dignoscendi & curandi	90
Quercus	212	Renum calculi causse, notę & curatio ibidem & deinceps	7
Quinque folium	20	Repletionis curatio	232
R			
Radicula	19	Resolutionis curatio	59
Radicula dulcis	211	Rha	232
		Rhacos	ibidem
		Rhagadeani & pudendorum quo-	

I N D E X.

modo sanandæ	101	Ruta siluestris	227
Rhamnus	232	Ruta ueneris ardorem obtundit	7
Rheon	232	S	
Rhetinæ	232	Sabina	210
Rhinarium	262	Sachar	226
Rhoda	232	Sagapenum	233
Rhodia radix	232	Sagapenum quomodo coquendum	283
Rhodia ad supprimendum sangui-		Sal	205
nem ulcera depa. centia, & excre		Sal quomodo coqui debeat	282
scantias	257	Salis flos	206
Rhodomalum	260	Salamandra	23
Rhoe	232	Salamandræ assumptæ signa	154
Rhœa	ibidem	curatio	ibidem
Rho. tis confectio	260	Sales theriaci	248
Rhogme	188	Salix	217
Rhu	232	Salsamentum thimi	236
Rhyas quid, etuq; curatio	66	Salte & nitrosæ aque quibus con-	
Rhypos	232	ferant	10
Rhythmus quid	28	Salforum uires	203
Rhythmi differentia	ibidem	Salvia	213
Rhythmus in pulsu quid	ibidem	Sambucus	205
Ricinum	219	Sambuci corticis radicis pondus,	
Ricinum oleum	278	uires, & modus utendi	243
Ricini pondus, utendi modus, &		Samia terra	211
uires	243	Sandaracha	233
Ricinorum sanguis	204	Sandaracha quomodo coquenda	282
Rigoris in febribus curatio	41	Sandix	233
Rimæ ani quomodo manu curandæ		Sanguis	204
184		Sanguinem e naribus profluentem	
Rimæ digitorum totorumq; pedu		in febribus quomodo listere oportet	45
quomodo curandæ	117	Sanguinis e naribus profluuium se-	
Rhododaphne	228	dantia	72
Rosæ	232	Sanguinem commouentia	103
Rosacei confectio	278	Sanguis bubulus 21 leporinus ibi.	
Rosmarinus	223	porci iuuenis ibid. caprillus ibid.	
Rostra animalium	21	Sanguis ex uena, arteria uel nari-	
Rubra	214	bus profluens quomodo sisten-	
Rubra tinctorum	ibidem	du	140
Rubus	209	Sanguinem uena ne an arteria pro-	
Rubus caninus	222	fundat quomodo dignoscatur	140
Rubens cygnus	261	Sanguinis renum profluuij curatio	92
Rufi potio contra pestem	28	Sanguinis profluuium curans medi-	
Rumex	223	camentum	92
Rumex grandis	216	Sanguinis ex ore profluuium quo-	
Ruporum remedia	132		
Rupris a quibus abstinendum	99		
Ruta	230		

INDEX.

modo fistendum	75	Scroti inflammationis notæ	100
Sanguis animalium	21	Scrupulus	286
Sanguinaria	231	Scylla	234
Saporum species	203	Scytales morsus cura.	150
Sapphyrus	224	Secundæ relicte quomodo manu	
Saprotes	233	educendæ	182
Sarcocolla	ibidem	Sedes, uide anus	
Sarcomata curantia	72	Sedi illita quæ purgent	245
Sardonîa herba	156	Sedis tuberosa ulcera quomodo	
Sardonîæ herbæ potæ signa ibid.		curanda	131
Satureia	216	Selache	22
Satyriasis quid eiusq; causæ	100	Selemusia terra	211
quæ symptomata eam consequan		Selinon	233
tur	ibidem	Semen redundans quomodo immi	
Satyriacum antidotum	253	nucndum	8
Satyrium	233	Semina quomodo coquenda	283
Saura	233	Seminis redundantis noxa	8
Saxifraga	ibidem	Seminaria uasa	15
Saxiphages	ibidem	Semperuium	204
Scammonia	234	Senescio herba	215
Scandix	18 & 234	Senecta anguis	211
Scapularum compressionis, ruptu		Senum habitus quomodo recalfa	
ræ, refractionis notæ & curatio		ciendus	6
	192	Senum uictus ratio 5 & sequenti	
Schidacidon	188	bus	
Schinos	236	Sepiæ	22
Schistos	224	Sepiæ testa	233
Scillini, pastilli quomodo præpa		Seps	ibidem
rentur	247	Serapionis melene emplast.	269
Scingos	234	Serapias	229
Scirrhus quid 132 eius differentia		Seris	233
ibidem. qui sit insanabilis ibi. caus		Seriphum	ibidem
sa ibidem. curatio ibidem & 133		Serpillum	214
Sclerophthalmia quid eiusq; cura		Sertula campana	226
tio	64	Serum lactis quomodo a caseo di	
Scolopendra marina	234	scernatur	21
Scolopendræ morsus notæ	149 cu	Sesamoides	233
ratio	ibidem	Sesaminum oleum	278
Scolopomacherion	160	Sextarius	658 & deinceps
Scolymon	234	Sicci temperamenti notæ	13
Scolymos quas uires habeat	18	Sicyos	233
Scordion	234	Sicyos agrios	ibidem
Scordon	ibidem	Sicyonium oleum simplex	279 cō
Scordoprason	234	positum ibidem. aliud efficacius	
Scorpioides	234	ibidem	
Scorpius	277	Sideratio quid 127 uide sphacilos	
Serotum	277	Sideritis	233

INDEX.

Sideros	ibidem	hominibus	24
Sidion	232	Solstitium hyemale quid in corpo	
Signa decretoria in morborū prin		ribus humanis efficiat	24
cipio prava sunt	26	Somnus quid	22
Signa concoctionis nunquam fini-		Sommi uehementis causſæ 23 cu-	
ſtre apparent	ibidem	ratio	ibidem
Signa decretoria ubi morbus in-		Sonchus	235
clinauerit, bona sunt	ibidem	Soporis uehementis cauſſæ	ibidem
Siliqua	286	curatio	ibidem
Siliquæ	20	Soporis noxiꝝ curatio	40
Silphe	234	Sorba	20
Silphium	ibidem	Sordes	232
Silurus	ibidem	Sordes balneorum	211
Silibon	ibidem	Sori	236
Sinapi	227	Sparganium	235
Sinapiſmi uſus	275	Sparros	ibidem
Sinciput quibus ſecetur 160 et quo		ſpectarium	235
modo	ibidem	ſpecularis lapis	ibidem
Singultus cauſſæ	44	Sphacelos quid 127 Curatio	127
Sion	234	Sphæriſion emplaſt. ad ardores	270
Ston quas habeat uires	18	Sphincter	83
Siræon	214	Σφίγκτης	145
Siricum	233	Sphongion malagma	274
Sifarum	234	Sphragis polyidæ	255
ſiſer	ibidem	Spica nardi 227 Indica, Syriaca	
ſiſymbrium	ibidem	ibidem	
Sion	ibidem	Spina alba	205
ſitis in febris curatio	43	Spina Aegyptia uel Arabica	ibid.
Smegmata	257	Spinæ gutturi quomodo extiman-	
Smegma dentium	74	tur	167
Smegma peponatum	258	Spirandi difficultas	78
Smilax	235	Splen, uide Lien	
Smilacis potæ ſigna 156 remedia		Spodium	235
156		Spondylion	236
Smilion ad abſceſſus	266	Spondyli	22
Smyris	224	Spongia	234
Smyrna	235	Spongus	ibidem
Smyrnion	ibidem	Spongitarum lapides	224
Smyrniꝝ uires	18	Spontanearum laſitudinum tres	
Stœchas	235	ſpecies, earum curatio 5 & de-	
Solſi quem exuſſerit, quid facien-		inceps.	
dum	8	Spuma n. tri	209
Solani furioſi poti ſigna 156 re-		Spumę argenti potę ſigna 157 re-	
media	ibidem	media	ibidem
Solanum	235	Sputi notę	33
Solare cypni	280	Sputum cruentum curantia	77
Solſtitium gſtium quid efficiat in		Squama	225

I N D E X.

Squamę Cyprię pōdus & modus utendi	243	Struma quid 179 Vnde dicatur ibi- dem . ubi oriatur ibidem . cura - tio	ibidem
Squaring	22	Strumę quomodo curandę	130
Squille	ibidem	Strutiochameli	20
Stachys	235	Strychnon	235
Stacticum profechij	262	Stulticia unde fiat	55
Staphiloma	66	Sturnorum stercus	221
Staphyloma quid 163 curatio ibi- dem		Stypteria	235
Staphylinus	235	Styrax	ibidem
Steara	235	Styracis albi pondus, et utendi mo- dus	242
Stearoma quid 133 Curatio ibidem		Suber	239
Stegnosia	5	Succidanea inuicem medicamenta	283 & deinde per totum cap .
Stellio transmarinus	149	Succinum	215
Stellionis transmarini morsus re- media	ibidem	Sudor	216
Stercus 220 Canum ibidem. Puero- rum ibid. Luporum ibid. Capril- lum ibidem. Bubulum	ibidem	Sudorem elicentia	10
Stercus caprillum	114	Sudori in febribus quid adhiben- dum	41
Sterilitatis remouendę ratio	109	Suffimenta	280
& deinceps		Suffimen rosatum	ibidem
Sternutamenta quę citent	72	Suffocatorum curatio	75
Sternutamenta in febribus quomo- do curentur	42	Suffusio	163
Stigmata quomodo curanda	123	Sugillata quomodo curentur	73
Stimmi	235	Suilla caro	20
Stœbe	ibidem	Suillus talus	229
Stomachus quomodo aduraf	172	Sulfur quomodo coqui debeat	282
Stomachus arabile uitiosus quo- modo curandus	84	Sulfuratę aquę quibus conferan- tur	11
Stomachi exundationem impedi- entia	1	Sulphur	215
Stomacho in febribus quę cura ad- hibenda	41	Suppurationem oculorum curan- tia	67
Stomachi dolores conuulsorij quo- modo curandi	85	Surditatis remedia	71
Stomachi affectus curantia	83	Sulinum compositum	278
Stomachi rotionem emendantia	1	Sulinum oleum	ibidem
Stomatia Aegyptia	259	Suspiriosi qui 73 Eorum curatio	ibidem
Stomatia medicamenta	258	Syca	236
Strabismus quid , & quomodo cu- retur	69	Sycamina	19
Strangulatorum curatio	75	Syce	236
Stratiotes	235	Sycomorę	20
Strobilina resina	232	Sycomorus	236
Strobilus	20	Sycosis quid eiusq; curatio	65
		Symphytum petręum	236
		Symptomata & morbi puerorum dentientium 2 eorum curatio ibi	

INDEX.

sem & sequentibus

Synanche	75	tempus	9
Synopes in febribus causæ 39 re-		Terminthos	236
media	ibidem	Testæ	229
Syntex s	21	Testes aphthæ ulcere pressi quo-	
Syntexes quō curari debeant	40	modo curandi	100
Synialis quid	3	Testiculorū caro excrecens quo-	
Syriaci succurrentia	ibidem	modo amouenda	ibidem
Syrca	20	Testiculi inflammationis notæ	100
Syrmaismi	24	curatio	100
Syitole pulsus	27	Testiculus quid	177
		Testiculi animalium	21
T		Testiculorum inflammationes quo-	
Tabes quomodo citretur	81	modo curandæ	131
Tail articulus luxatus quomo-		Testiculorum tēperaturę notæ	15
do reponendus	202	Testium conseruatio	100
Talus bubulus	229	Testudinis marinę sanguis quomo-	
Tamarix	227	do preparetur 152 Eius usus ibi.	
Tarichos	236	Tetrapharmacum emplastr	265
Taurocola	ibidem	Tettiges	236
Taurinum cornu	219	Teucrion	237
Taurorum sanguis	204	Teutlon	ibidem
Tauri recens oculi sanguinis	157	Thalassion hydor	215
notæ 157 remedia	156 & 235	Thalasseros	264
Taxus	224	Thaliotrum	215
Tecolithos	186	Thapsia	215
Tela e corpore quomodo extra-		Thapsia quomodo coquenda	283
henda	237	Thapsia quæ pericula nonnunquam	
Telephion	ibidem	afferat 153 eorundem remedia	
Telis	236	ibidem	
Telling		Theion	215
Temperamentorum ordines &		Thelypteron	ibidem
interualla	20;	Theodotion minus	263
Temperamenti optimi notæ	12	Theriace antidorum quomodo pa-	
Tenebris quid, unde oriatur, &		retur 247 Eius usus	247
quomodo curetur	86	Theriaci pastilli quomodo fiant	
Teaue corpus quomodo implea-			247
tur	12	Thermarum differentię & uires	
Tephra	237	11 & deinceps.	
Terra	211	Thermos	216
Terra quomodo coquenda	282	Thialis	198
Terrę intestina	211	Thlasia aurium	71
Terrę tuber	238	Thlaspi	215
Terebinthus quid, eius causę notæ		Thoracis morbos quę signa præce-	
& curatio	130	dant	24
Terebinthina resina	232	Thridax	216
Ter binthine ad aluum subducen-		Thronus Marcellius pastillus	255
dam quantitas & ex bitonis		Thus	224

I N D E X.

Thuris lachryma quomodo coque	233	Triphyllos quæ curent	65
da	233	Trichismus	198
Thuris manna	225	Trifolium	233
Thylacitis	227	Trigle	237
Thymbra	216	Trigonus pastillus	254
Thymus	216	Triorchis	229
Thymus	101	Triphyllon	233
Thymus locorū muliebrum	180	Tripoltum	237
quomodo excindendus ibidem		Triticum	19 & 232
Thymnaturalium quid	175	Trixago palustris	234
differentia ibid. curatio ibidem.		Troglodytes passer	238
Thynni prægrandes	22	Tryglion	286
Tibix fracturæ quomodo curan		Trygon	237
dæ	195	Tryx	ibidem
Tilia	239	Tuberum facultates	19
Tiphodes febres	36	Tubercula ani quomodo manu cu	
Titanus	237	randa	184
Tithymalus 237 Eius septem spe		Turdi	20
cies	ibidem	Turtur	ibidem
Titianus pestus	281	Turturis sanguis	204
Tonfillæ 166 Eius causæ ibid. Cu		Tusis	76
ratio	166	Tussim continuam pastillus curans	
Tonfillarum inflammationi resi		78	
stentia	74	Tussi in febribus quomodo occur	
Tophos in artubus quid coalescere		rendum	42
impediat	114	Tussi grandines & calculi ex pe	
Tophi articularum quomodo cu		ctoreeducti	76
randi	115 & 116	Tussilago	210
Tophorum commune	116	Tussiculæ puerorum curatio	2
Tormina quomodo curentur	87	Tylosis	65
Torpedines	22		
Torpedo marina	227		
Toxicum unde dictum	156		
Toxici poti notæ ibid. Remedia			
ibidem			
Trachoma quid, eius curatio	65		
Tragacantha	237		
Tragium	ibidem		
Tragoriganum	ibidem		
Tragofitodes	ibidem		
Tragus frumentaceus	ibidem		
Terebinthus	236		
Tremoris origo	62		
Triblimum	292		
Tribolos	237		
Tribulus	ibidem		
Triches	237		

INDEX.

12	ibidem	Vicius ratio omnium ætatum 3 & deinceps	
Ventriculi affectus curantia	83	Vicius ratio infantum	ibidem
Ventris morborum signis apparen		Vicius ratio in laboribus uitam	
tibus quid faciendum	24	agentium	11
Ventriculus animalium	21	Vicius ratio senum 5 & sequenti-	
Ventriculi temperaturæ notæ	14	bus	
Ventriculi flatus unde generentur,		Vicius ratio quolibet anni tempo-	
& quomodo curentur	85	re quæ seruanda	11
Ventriculi intemperies quomodo		Vigiliæ quomodo arceantur	23
corriganur	16	Vigiliarum varieg causæ	ibidem
Veneris ardorem obtundit ruta	7	Vigilijs in febribus quomodo resi-	
Veneris comoda	ibidem	stendum 40 & sequentibus	
Veneris impotentia 101 causæ		Vinum album	22
ibidem. Curatio	ibidem	Vinum dulce	22
Veratrum	185	Vinum meracioris copiosi assum-	
Veratri albi assumpti noxæ quo-		pti remedia	158
modo curandæ	158	Vini moderate sumpti comoda	22
Veratrum quibus conueniat	241	Vini immoderati sumpti incommo-	
Veratrum quomodo exhibeatur		da	ibidem
246		Vinum omne nutrit	22
Verbascum	239	Vini potio in febribus quando con-	
Verbenaca	230	ueniat	34
Vergiliarum exortus quid efficiat		Vinum purgans in hydropicis	244
in hominibus	24	Vinum rubens & crassum	21
Veri quæ uictus ratio cõueniat	11	Vini vires	ibidem
Vermes terreni	211	Viola	216
Vertebrarum cõtusionis, & fractu		Viola alba	223
ræ notæ, & curatio	193	Violaceum oleum	278
Vertiginis curatio	54	Vipera	214
Verruca quid 186 unde sic nomi-		Viperæ tum maris tum fœminæ	
netur ibidem. Curatio	ibidem	morsus notæ 149 Curatio	ibidem
Verruca penilis	101	Vires quæ dissoluant	31
Vesicæ affectus quomodo digno-		Viride emplast. Macherionis	270
scendi, & curandi	90	Virulentorum præcautiones	146
Vesicæ calculi signa	176	Viscum	216
Vesicæ clystere	176	Vitis nigra 206 Satia	ibidem
Vesicæ exulceratæ signa 91 Cura-		Vtrum	238
tio	ibidem	Vituli marini	22
Vesicæ morbos quæ signa præce-		Vlcus simplex quid 134 Quomo-	
dant	24	do curandum	ibidem
Vesicæ morborum signis neglectis		Vlcus canum quomodo implendū	
quæ ægritudines sequantur ibid.		135	
Vesicæ resolutio	93	Vlcera sordida quomodo purgan-	
Vesicæ resolutionē comitantia ibi.		da	135
Vespertilionum sanguis	204	Vlceri cicatriæ quomodo inducen-	
Vestis attritæ fragmentum	232	da	137
Vicius nauigantium	12		

INDEX.

Vlcera carcinode quomodo curen- tur	131	Vomitu qui uti debeant, et quomo- do 24 & sequentibus	24
Vlcera chyronia quomodo curan- da	130	Vomitibus que comod. prestat	8
Vlcera capitis manantia unde fi- ant 49 quomodo curentur ibid. & 49		Vomitioni bilis quomodo occurrē- dum	4
Vlcerum uermes quomodo arcen- di	135	Vranium	263
Vlcera oculorum eorumq; curatio	66	Vreteres	91
Vlcera cacoethe	137	Vrina 229 Humana ibidem. Pueri uenerem non experti ibidem. Mu- lorum ibidem. Caprarum, Chame- lorum	ibidem
Vlcera chyronia, telephia ibidem		Vrinam clementia	24
Vlcera uetera quomodo cur. 130		Vrinarum color aquosus, rufus, & biliosus, mediocriter pallidus quid significet	3
Vlcera articularum quomodo cu- rentur	140	Vrinæ difficultas quomodo cu. 93	
Vlcerum disruptorum curatio	139	Vrinæ difficultatem indicantia ibi- dem	
Vlcus circa os sacrum unde proue- niat	46	Vrinæ incontinentia unde oriatur	93
Vlophonos	155	Vrinam quæ moueant	9
Vmbilico illita quæ purgent	245	Vrinam mouentia	96
Vmbilici prominentis causæ 173 notæ ibidem. Curat. ibidem		Vrinarum notæ	32
Vmbilici prominentis curatio	98	Vrinæ retentionis causæ	176
Vncia	286	Vrforum sanguis	204
Vnedon	214	Vrtica	ibidem
Vnguenta quomodo coquant. 282		Vteri abscessus notæ 105 Curatio ibidem	103
Vnguentum zolimi ad tremulos ce- lebratum	276	Vteri affectus	103
Vngues	22	Vteri callus quomodo curand. 110	
Vngues qui laborauerint, ut abscē- dant	118	Vteri cancerorum species 106 notæ ibidem. Curatio	ibidem
Vnguis oculorum, quid eiusq; cura- tio	67	Vteri clausuræ, quam phinō appel- lant causæ 109 Curatio	ibidem
Vnguim petrygium quid 185 causæ ibidem. Curatio	ibidem	Vteri duricies quomodo curanda	107
Vngues cruenti quomodo curan- di	118	Vteri hæmorrhoides quomodo de- prehendendæ 110 Curatio ibidem	
Vngues contusi quomodo curandi ibidem		Vteri inflammationis causæ 1105 Signa ibidem Curatio	ibidem
Vnguim reduuix quid 117 cura- tio	ibidem	Vteri fluor, uide Muliebris fluor.	
Vocis exercitatio qualis esse de- beat, & quæ eius sint commoda 4		Vteri a naturali sede declinantis ca- ratio	105
Volatilia	20	Vteri mola	107
Vomentum quid obseruandum	9	Vteri ulcera pascendo serpētia quo- modo curanda	106
Vomitibus quomodo prouocandus	24	Vua 166 Curatio	ibidem

INDEX.

Vuē	19	tio	64
Vuē inflammatio quomodo curan		Xestēs	296
da	75	Xiphion	228
Vua passa	208	Xyris	ibidem
Vulpes	206	Xyraphium medicamētum aduer-	
Vulua uide Muliebres loci		sus capitis & menti sicosa exan-	
Vulvæ abscessus quomodo manu		themata	49
curandus	131	Xyris	228
Vulua animalium	21	Xyster	262
Vulvæ fluor 104 Eius species, &			
causæ ibidem. notæ ibidem. Cu-		Z	
ratio	ibidem	Zea	215
Vulvæ ostij phymus quomodo cu-		Zingiber	ibidem
retur	181	Zomos	215
		Zopyrtos medicamentum	252
X		Zolimi unguentum	276
Xanthion	228	Zyme	215
Xanthon medicamentum	257	Zythus	ibidem
Xerophthalmia quid eiusq; cura-			

FINIS INDICIS.

PAULI AEGINETAE

LIBER PRIMVS,

IOANNE GVINTERIO

ANDERNACO MEDICO

INTERPRETE,

*

Quæ grauidis superueniant, & quæ uictus rationis conducat.
Cap. i.



QVANDO QV IDEM inter eaque grauidis superueniunt, hæc potissimum infestare solent, stomachi exundatio, cōtinuæ uomitiones, sputa crebra, oris ventriculi rosio, & cibi fastidium, non alienum fuit remedia quibus ab eis vindicentur, præscribere. Pro sunt itaq; obambulationes, cibi non nimium dulces, uina fulua, odora, maxime quinquena, & moderata potio. Hæc enim omnia ne mulier stomachi exundationem experiatur vomatq; impediunt. At medicamenti nomine, vincit polygonium herbam aqua elixam bibere, item anetum, & ponticam radicem, quæ indigeti vocabulo rhacnucupatur, hæc tum ante, tum post cibum licet assumere. Extrinsecus præcordia adiuuari debent cataplasmate ex oenanthe balauustio. † cytisi smyrniacq; coma, & sceniculi semine, siue per se, siue quomodocunq; uoles miscere, cū palmulis & uino veteri. Aduersus stomachi rophones confert, calidam aquam bibere, quiete inambulare, præcordia contegere lana molli. At eas quæ cibum fastidiunt, variis & ad uoluptatē quæsitis cibis amyloq; sicco sollicitabis, magis autem hoc ob tuleris iis quæ terram edere concupiscunt, ut in malacia, quod uicium Cræcis Citta dicitur, accidere consuevit. id tertio a conceptu mense potissimum contrahitur. Nam tunc id quod in utero est, quicquid ratione alimenti ad ipsum fertur, tanquam imbecillius, nequit consumere, unde fit, ut quum varia ex eo recrementa in stomacho grauidæ redundant, varia, & naturæ aliena appetat, exempli gratia, carbonēs extinctos, cretam Cimoliam, aliaq; complura. Hanc enim ob causam appellationē huiusmodi affectus accepit, uel a picae uarietate, uel quod eadem subinde hoc malo corripitur, tam

Hæc Aristoteli testatur. vii. de animalibus.

oenanthe species uitis agrestis. ita uocat Plinius. est et a uicula quædam. scilicet dum in primis animi medella pcedere debere corporis medicationē. nā

Pauli Aeginetæ.

A

PAULI AEGINETAE

ab ani-
mi pas-
sionibus
morbos
corporis
esse Stoi-
ci asserunt
& Ga. as-
sentit. sed
medela
animi est
uelex phi-
losophia
vel ex
beneacta
nita opti-
moq; &
moderata
a quiete.
nutrici-
bus &
pueris ui-
num mi-
nime p-
desse tel.
Arist. est
in libro
de sono
& vigi-
lia. Ideo
q; sibi de-
stinatur
in potu
vini mo-
dicum et
aquosum
Sapiens
græcia
fœminas
puerosq;
uino ar-
cebat
Athen.

labor, & longior peregrinatio etiam stomachum ad cibos excitat.
Quæ vero mulier citra labores agere consuevit, ea si utrum gerat,
haud commode repentinas subibit motiones. Verum acria quan-
doq; gustare præsertimq; sinapi, cibum fastidienti nō fuerit alienum.
Cæterum eximios pedum tumores, quos œdemata Græci dicunt,
anthyllis quæ in aceto maduerit, foliaq; brassicæ inlatum super de-
ligata discutiunt. Item Cimolia creta ex aceto illita, similiter alu-
men cum aceto proficit. Recte etiam pedes malorum medicorum,
quæ Citria alias dicuntur, in aqua decoctorum inre lauantur.

† Hic locus sic legitur in veteribus libris manuscriptis, *ἐξ ὧθεν δε-
δοκάνθη, καὶ βαλαντίω, καὶ κυτίνω, καὶ σμυρνίου κόμην, καὶ μαράσθρου
σπέρματι, κοινῇ τε καὶ ὡς ἂν μίογεν ἐδέλης μετὰ φοινίκων, καὶ οἶνου
παλαιοῦ καταπλατῆς, &c.* Quæ lectio magis probatur, quod cyti-
nus accommodatior sit huic medicamento, quam cytissus.

De Nutrice.

Cap. ii.

DEligi nutrix debet, nulli morbo obnoxia, ætate nec vetul-
tate nimium, nec adeo adoleseens, ita ut iunior quinque & viginti an-
nos compleuerit, grandior quinque & triginta non excedat, pecto-
re sit amplo mammis magnis, papillis, neque conniuentibus, neque
auerfis, reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili.
Præterea magnum est infanti commodum, si nutrix non multo an-
te pepererit, maiusque, si masculum. Vitanda ei sunt, admodum sic-
cantia, salsa, acria, acerbæ, acida, amara, & valide calefactentia. Item
odores tum foedi, tum suauis præter modum, condimenta, aliqua acria
nocent. Ad hæc venere nutrix abstineat, manus humerosque molē-
do texendoque exerceat, puerum vlnis gestet, treis iam menses quæ-
tuorue natum.

De lacte Nutricis

Cap. iii.

LAudatissimum lac est, moderatum spissitudine, copia, colore, &
gustu. Commendatur & quod in vnguem pollicis instillatum,
eo inclinato ad lucem, neque subito neque tarde videtur defluere.
Iam vero in hunc modum probari potest, infuso lacti in vas vitreum
coaguli exiguum admiscetur, digitisq; agitur. In quo postquam cō-
creuerit, inspicietur, num casei portio minor quam serum fuerit. Hoc
enim lac inutile est, contrarium huic, concoctu contumax, probatissi-
mum quod vtrique habet mediocria.

Quomodo lac vitiatum corrigatur.

Cap. iiii.

LAc vitiatum hoc modo corrigi debet, si crassius fuerit, pituita
vomitu elicietur, qui optime oxymelite potocitur, laboribus
etiam cibum præcedentibus eadem extenuabitur. Tunc nimirum in

eibo conducunt. origanum, hyssopum, satureia, scandix, & thymus, ite raphani momentum, vetusque fassamentum cum oxymelite. At si acius tenuiusque lac euaserit, multis quidē tunc laboribus nutricem leuare, sorbitionibus autem & carnibus suillis, sapæque & vini dulcis potu reficere conuenit. Si lac fuerit imminutum, sorbitionibus & pleniori modo sustentanda est, vinum dulce potui dabitur, pectus & mamillas perfricare oportet. Isdem cucurbitula quoque defixa abunde præstitit. Medicamenta vero etsi lacti generando proficere quidem aliquid sciam, non tamen frequenter ipsis vti præceperim, ut quæ violentius consumant. est autem fœniculi radix, & semen. ptisanæ incocta, item citisi folia ex vino nigro aut ptisana, melanthium in passo & anethum, pastinacæ radix atque semen, quæ calida prius irroratis admoenda sunt. Omni vero lacte vitioso siue crassum, siue acre fuerit & foetidum, prius emulcto, puer mamillis admonendus est. Lac autem acre nunquam ieiuno adhiberi debet, fœtorē eius vinum odoratum & cibi dulces emendare possunt. Porro de cascato lacte tertio volumine in capite de mamillis tractabimus.

Educatio pueri.

Cap. v.

Primum infans recens natus melle nutriri debet. mox lacte, idque bis die, aut plurimum ter, cum autem prompte & alacriter puer assumit, ac spes est eum posse quod oblatum est concoquere, tunc iam & cibus solidior recte datur qui non ipsum repleat. At si forte imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior autem statim & torpidus magis euadat, venter intumescat, infleturque, & vrinæ aquosiores reddantur, quæ repletionis notæ sunt, nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumpserit. Abunde autem fuerit, duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi.

De pustulis puero obortis quæ Exanthemata dicuntur.

Cap. vi.

Pustulis quæ quod puero per cutem veluti efflorescunt, Græci *ἐξανθήματα* nominant, primum sane nullum facessere negotium oportet, vbi vero probe ad summa eruperint, tunc iam curare tentabimus, balneis, quibus iniiciantur myrtum, aut lentiscum, aut rosa. deinde rosaceo aut lentiscino vtendum, ceratoque cum cerussa, adhæc nitro abstergere lenius expedit, nam valentiora nō sustinebit. Optimum vero est nutricem dulciori victu vti. Laudatur autem maxime si puer etiam ipse neque plenior, neque nimis tenui cibo alatur. At si venter ipsius non respondeat, tunc mel cibo infusum simul coquere oportet, si ne sic quidē descēderit, terebenthinæ instar ciceris iniicies. Humectata aluo, milium potissimum offerre conducit.

A H

lacte alē
dus ifās
vt tutus
fit a spal
mis A-
rist. vii.
animal.
mara.
thriadis
lacte in
caseum
cōcreto
educatio
prima
omniū
vt apud
Xeno.
indictis
Socratis
αὐτὸ ἡ τροφή
πρῶτον πάντων.
&
Arist. vi
Polit.
ostendit
educatio
nem op
timam
primam
q̄ esse
tuendus
a spal
mis puer
est ante
omnia.
ἐξανθή-
ματα
floreslac
tis appel
lantur

PAULI AEGINETAE

De tusſi, & grauedine pueri.

Cap. vii.

Coryza **Q**uod ſi quandoq; tuſſicula aut grauedo puerum affligat, molitiſ
quaſi lac mi dicti adhiberi debent. Conuenit igitur puero liberaliore
tea p os aqua calida loto caput ipſius melle copioſo calido illinere, deinde
emiffa cū digito linguam leniter premere, multum enim hoc pacto pituita
pituita vomitu egeret.

† De gingiuarum pruritu.

Cap. viii.

Vomit **P**urientibus gingiuis fomento vtendum eſt & liberali vnctio-
phlegma ne ex oleo diſcocto, in quo ceræ momentum eliquatum ſit.
multum In margine alterius exemplaris manu ſcripti hæc verba leguntur
ὁ δ' αὖτις ἐστὶ περιττὴ τις σὰρξ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐπιφωμένη εἰσὶν αὖ
ὁ δ' οὐσι. Id eſt, odaxysmus eſt ſuperuacanea quædam caro adnata
gingiuis, ſimilis dentibus.

De dentium ortu.

Cap. ix.

Hoc idē **D**entiunt ſeptimo quidem menſe pueri, experiuntur autem tunc
et habet inflammationes gingiuarum, maxillarum, & tendinum, ali-
Aristot. quando etiam conuulſiones. Tunc igitur puero nihil dandum, quod
viii. ani. mandi poſtulet. digito autem in lauacro gingiue continenter con-
tractari, & gallinaceo adipe vel leporis cerebello emolliri debent.
Vbi iam dentes prodierint, ceruix, caput, & maxillæ delicatis la-
Habēda nis puris contegentur, oleoq; dulci & calido fouebuntur, idemq;
eſt cura meatibus auditoriis inſtillabitur. Cæterum plenius infantem tunc a-
potis- lere, & calida lauare oportet, & ſi alui profluuium experiatur, ten-
mū breg tabimus eam epithematis quæ præcipue ſiſtunt, contrahere, inſpergē
matis in do lanæ cuminum, aut anethum, aut apium. Salutare eſt etiam ſe-
ſummo men reſarum admiscere, & ſummatim ꝑ calide deſiccare. At ſi ven-
vertice ter nihil reddit, melle in glandis figuram coacto inferius leniter ir-
capitis ritabitur, aut nepita detrita cum melle iſſinetur. Porro conuulſioni-
& curā bus puerorum optime uidetur auxiliari heliotropium in aqua eli-
dum eſt xum, ſi puer in hac lauetur. confert & irino aut cyprino, & ſycio-
ut pueri nio perungere, & vniuerſum calefacere. Cum autem ex ortis denti-
dormiāt bus digitos mordet uulneratq;, benefaciet radicem iridis deſaſam,
rata mē nec admodum ſiccā ore continere. Hoc remedium vlceribus quo-
ſura, qđ que opitulatur, butyrumq; cum melle illitum adiuuat. Gingiuarum
natura ꝑ autem pruritus, ueteris ſaſſamenti caro lenit.

In ueteri codice hoc loco duplex eſt ſcriptura, prior enim καὶ
tis ſom- ὁ λωὸς θερμαίνεν καὶ ξηραίνεν. Poſterior καὶ θερμὸν ξηραίνεν, calido
num de- deſiccare.

De oris Vlceribus quæ Aphthæ dicuntur.

Cap. x.

LIBER I.

Oboritur puero etiam vlcus quod aphtha vocatur, nunc subalbidum, nunc subrubrum, alias crustæ modo nigrescens, quod omnium periculosissimum & lethale est. Remedio erit, iris cū mel le, & sicca inspirata. Item rosarum folia contusa, earumq; flos, crocum, myrrhæ exiguum, galla, lachryma thuris & cortex eiusdem & simul & priuatim singula melle tincta, adhæc mulsa, & mali punicæ dulcis succus proficit.

Ad femorum intertrigines.

Cap. xi.

Femorum intertrigines myrtus arida iuncus angulosus, & rosæ inspersæ iuuant.

Ad aures humentes.

Cap. xii.

Aurium humiditates lana ex alumine imposita, aut mulsum, aut vinum vetus instillatum, aut crocum ex vino detritum, deficcant.

De Syriasi.

Cap. xiii.

Syraps, est inflammatio partium circa cerebrum eiusq; membranas, concavum in ea sit finciput, concavi itidem cū pallore oculi. accedit & corporis totius siccitas. Succurrit huic malo vitellus oui fincipiti cum rosaceo, tomenti modo impositus, sic tamen, vt continue renouetur.

Aliud ad Syriasi.

† Oportet eidem loco imponere folia herbæ quam Græci heliotopion, latini solarem nuncupant, cucurbitæ ramenta, cucumeris, quem peponem dicunt, cutem carni adiacentem, aut hortensis solani succum cum rosaceo.

† In ueteri codice hic locus sic legitur κατὰ τοῦ βρέγματος ἐπιτιθεῖναι χρὴ ἡλιοτρόπιον καὶ ῥοῦ καλουμένου. sed legendum suspicamur ut apud Aetium ἡλιοτρόπιον σκορπιούρου καλουμένου. Id est, heliotropi quod scorpiuron uel scorpiones dicuntur.

Ratio uictus infantium atque reliquarum deinceps ætarum, ad usque declinante s.

Cap. xiiii.

Postea quam lacte nutrirī infantes desierint, liberiore eis modo & suo ingenio hilariter viuere permittemus, exercitia autē & alimenta leuiora. Ab anno sexto & septimo, tum pueri, tum puellæ, literatoribus blandis humanisque tradentur, tales enim cum animi remissione & gratia docent. Animi autem relaxatio ad probam corporis educationem plurimum adfert momenti. Duo decimum annum egressi, ad grammaticos iam & geometras mittendi sunt, corpusq; eorum exercere oportet. A quartodecimo uero

humore affluente, q; caput petit. ne que somniat ætas illa obnium ex cibo calorem. Cyperū.

per hoc disciplinæ ætateq; gradus Galenus itidem que

A iii

PAULI AEGINETAE

filij græ que ad primum & vigesimum, mathematicis disciplinis & sapien-
tia ad tiam studio incumbunt, exercitiis pluribus propter corporis robur cre-
sapiencia dentur, vt & animo & corpore laborantes, a libidinis impetu co-
peruene- erceantur, his etiam vinum circuncidendum est. Aetate florentibus
runt. vino educatio absoluta tum animi, tum corporis congruit, eoqne exerci-
quoq; ul tiis omnibus, presertim quibus quisque assuevit, vtendum cibo ple-
q; ad cer niore & valenti. Declinantibus autem remissa competit & animi
ta æta tē & corporis educatio. Exercitia enim qualiacunque fuerint, pro ho-
carebāt. rum ratione imminuere oportet, alimento detrahendum, vt quorum
Persæ do habitus iam frigesce incipiat.

De frictione præparatoria, que parasceua fice
dicitur Cap. xv.

Ante exercitationē, corpus mediocriter calefacere oportet frictio-
ne līteis adhibita, deinde nudis manibus oleo intinctis perfricare
Xeno. vsque dum bene incalescat emolliaturque, colore viuido rubescat, &
primo c in tumorem attollatur.

De exercitatione.

Cap. xvi.

Exercitatio motus est vehemens, vehementiæ autem finis est re-
spiratio crebra. Id vero commodi præstat, quod parteis instru-
mentarias morbis non opportunas efficit, & functionibus obeundis
validas, præterea vt alimenta fortius attrahant, promptius immutēt,
pus et ani & liberalius reficiantur, caloris beneficio quem illa excitauit. adde
mus. qd quod meatus expurget, recrementa, propter validam spiritus motio-
nem expellat. Quoniam igitur alimentorum per corpus mem-
bratim digestionem adiuuat, non debet crudi incoctique siue cibi
siue humoris copia, in ventre, aut vasis cōtineri, periculum enim est,
ne priusquam probe fuerint concocti, in vniuersas animantis par-
ticulas distrahantur. Vnde manifesto liquet exercitationem ci-
borat, oti bum præcedere oportere. Notæ autem quæ opportunitatem labo-
um sol- ris subeundi ostendant, ex vrinarum colore petuntur, etenim aquosa
uit. & nondum coctum humorem, qui ex ventre distributus est, significat.
exercen- rusa autem & biliosa, iam pridem elaboratum esse notat, mediocri-
ti labore ter pallida, concoctionem modo factam indicat. Tunc igitur ad
nōopus ē exercitia veniendum est depositis prius recrementis, tum quæ in ve-
gymna- fica, tum quæ in alio continentur.

† Veterum librorum alter habet hanc scripturam δὲ μίτε πλήθος
ἁμῶν καὶ ἀπέπτων, μίτε σιτίων, μίτε περιττωμάτων, μίτε χυμῶν,
M. Var &c. Id est non debet cruorum & incoctorum neque ciborum, ne
roue au- que excrementorum, neque humorum copia &c. Quam lectionem
tore li. meliorem esse facile quiuis ex secundo libro, περὶ ὑγιεινῶν. intelligere
ii. de re potest.

De exercitationum generibus.

Cap.

xvii.

rustica

Omnis exercitationis commune est, quod animali ex ipso caloris augmentum excitat. Singulæ autem exercitationes proprium habent officium, valida scilicet, hoc est, violenta musculis & nervis robur præstaret, cuius generis est quum quis fodit, & maximo onere sublato aut eodem loco manet, aut paululum procedit, item acclivis ambulatio huius quoque generis existit, præterea per funem manibus apprehensum scandere, aliæque plurima consimilia. Celeris autem exercitatio citra robur violentiamque peragitur, id genus sunt cursus umbratilis, armorum meditatio, aut quum duo summis manibus concertant, tum quæ per coricum & parvam pilam fit exercitatio. Composita autem ex valida & celeri, quando quas validas diximus iis omnibus ut vehementibus uti licet, motus modo celeritatem adjicias. Præterea per alias exercitationes lumbi magis quam brachia cruraue laborant, per alias spina tota, aut thorax tantum, aut pulmo. Exerceri vero oportet, quousque corpus in tumorem attollatur & rubescat, motus prompte æquabiliter & concinne ædat. Inter hæc autem sudorem cum calido vapore mixtum cernes. Pausandum vero ab exercitatione tunc primum est, quum aliud quod horum fuerit immutatum, nempe si contractior corporis moles videbitur, ilico desistendum est, similiter quum coloris gratia deperit, cessare oportet. Quinetiam quum motus remittere quippiam cernitur, protinus desinere conveniet. Itidem si in sudore vlla qualitatis eius, aut quantitatis mutatio accadat, quum enim is aut minor, aut frigidior factus intelligitur, tunc desistendum scias. oleo mox corpori superfuso, apothera pia uti deinceps oportebit, inde frictionem apothera pteuticam adhibere, ut pædotribæ factitare solent.

De generibus frictionum.

Cap.

xviii.

Inter frictiones, dura ligare corpus potest, mollis, solvere. qua propter quæ supra modum resoluta sunt, duriter perfricare oportet, quæ autem astricta, molliter. At si mediocri quis corpore præditus sit, neque molliter neque duriter fricandum id esse constat, sed quatenus licet, uterque excessus vitari debet. Siquidem multa & dura frictio, corporis molem deprimit, modica vero, & mollis, e contrario implet. Porro tres quantitatis frictionum differentias, si tribus quæ a qualitate ducuntur, iunxeris, novem coniugationes effeceris, ut subiectum est. Etenim vna iuxta qualitatem, nempe multa si tribus quæ a qualitate sumuntur, duræ dico, mollis, & mediocri, adiungatur, treis secundum duritiem differentias efficit, modica rursus si eisdem tribus addat, treis alias procreat. At mediocri qualitate eisdem tribus iuncta, alias treis progignit, ut in formula subiecta videre licet.

A iij

præcipi
turq;
post ex-
ercitatio
nem sta-
ti non ef-
se capien-
dum ci-
bū potū
ue. ex-
quo ut a
libi Pau-
lus ha-
bet, sudā
ti atq; e
la bore
redeunti
uium
maxime
dulce po-
tui datū
esse uene-
nū.
cauendū
in pri-
mis, ne
ob nimi-
am exet-
citatio-
nē febris
oriatur.
reliqua
mibi ex
omnibus
est exer-
citatio,
dictū re-
gis idia-
apud
phil.

PAULI AEGINETAE

QVANTITAS

Multa }
 Multa }
 Multa }
 Pauca }
 Pauca }
 Pauca }
 Mediocris }
 Mediocris }
 Mediocris }

&

&

&

QVALITAS

Dura }
 Mollis }
 Mediocris }
 Dura }
 Mollis }
 Mediocris }
 Dura }
 Mollis }
 Mediocris }

De uocis exercitatione

Cap. xix.

Vocis exercitatio tanti laboris ē ut Arist. author sit Doc- tores. q̄ uiua vo- ce semi- nant do- ctrinam, uel gram- maticos, et eiusce- modinul- la alia e- gere exer- citatiōe.

Inter uocis exercitationes suauis lenisq̄ modulatio nihil ad- sanitatem tuendam proficit, grauioris autem uocis sonus uti- lis habetur, eoque exercere eum oportet. Ita enim aer copiosissi- mus inspiratu in corpus attractus, thoracem, ventrem & meatus to- tius corporis diducit, dilatat, aperitq̄. Quapropter ipsa lectione hu- miditates quæ redundant, excernit, fortius igitur legentibus, magis & per sudores, leuius autem, per latentem totius corporis perspi- ratum. Accidit enim propter extenuationem multa recremēta, nem- pe sputa, mucos & pituitam, per secretum excerni consumiq̄. Iis vero qui propter frigiditatem excalescere desiderant, quodnam aliud præsentius remedium esse potuerit, quam unctio quæ respiratione peragitur? Consilium igitur est, hos frequenter legere, ut toto cor- pore relaxato, fusaq̄ carne, arteriam & alios spiritus transitus stu- diose rare facientes, per grauiiores uocis actiones modulentur. Vti autem oportet uocis officio neq̄ temere, neque inconsiderate, sed- quum nec uitiolis corruptisq̄ humoribus repleti sunt, neq̄ magnæ & euidentes stomachi cruditates apparent, ad uocis exercitatio- nem accedendum est, ne corrupti vapores per corpus largius di- stribuantur.

De lassitudinibus ob exercitationem.

Cap. xx.

Lassitu- tudinem ex nimia exercita- tione uer- gere ī fe- bre dictū est anti- quorum

Vlcerosa lassitudo ab excremētorum tenuium simul & acrium copia contrahitur. Tensoria nullum quidem excremētū, cuius ratio aliqua sit habenda, in corpore contineri indicat, sed in muscu- lis neruisq̄ affectus quidam quo tendi videntur, residet. Ea vero quæ inflammationis speciem præ se fert, in qua nimirum ceu contu- sas, aut inflammatione obsessas parteis sentimus, tunc solet incidere, quum musculi impendio excalescenti, aliquid ex circumfusis sibi re- crementis attraxerunt. Est & alia quædam præter has quarta affe- ctio, quæ oritur, quum musculi supra quam par est, siccantur, ita ut

LIBER I.

vestibus exutis squalēs corpus contractumq; appareat, atq; ad motus pigrum. Remedium vlcerosæ lasitudinis est, si quæ redundant, euapores frictione multa molliq; cum oleo copiosiore, quod omnis astrictio sit expers. Altera lasitudo in qua tētio sentitur, hoc pro curatione desiderat, vt relaxetur. sane relaxatur quod distentū est, pauca & molli frictione, eaq; ex oleo dulci atq; egelido, item intermissione omnino, quiete, balneis temperatis atq; in calida, mora longiori, adeo si bis ter ve ipsum laues, plus profeceris. Tertiæ lasitudinis inflammatorix curationis consilium, ad tria dirigitur, nempe, superuacanei euacuationē, extenti remissionem & inflammatio- nis refrigerium. itaq; & oleum copiosum tepidumq; & frictiones mollissimæ, & lenta intemperatis aquis, mora, eiusmodi lasitudi- nes persanāt. pari modo & multa quies vnctiones assiduæ. Quar- ta affectio nihil sane a priori consuetudine immutari postulat, nisi calidiorem aquam quæ sensim contrahat, altero die, apothera- piæ exercitationem. protinus autem in lauacra frigidi soli exiliant.

medico-
rum

κράματος
φυσα
πυρετώ
δυσ

† Omnes autem qui lasitudinibus laborant, cibo boni succi refi- ci debent.

† Vetus codex hanc, scripturum habet, ἐν νύκτι δὲ ἐκβαίντες οἱ κεκοπῶ- μένοι δὲ οὐκ ὄνται τροφῆς. Id est simul atque balneo excesserint cibo ind- gēt. Quā lectionē Copus sequitur sed scriptura qnam Orosius resti- tuit ἐν χύμῳ δὲ ἅπαντες οἱ κεκοπῶ μένοι δὲ οὐκ ὄνται τροφῆς, melior est.

De cute astricta

Cap. xxi.

Astrictio, quam Græci stegnosin vocant, accidit, aut obstructis aut desatis meatibus. obstructio quidē ex copiosis crassiq; hu- moribus crudis concoctionemq; non expertis, oritur densatio autē, ab iis quæ refrigerāt, aut astringūt, aut desiccāt. Ac deprehēdit sane iam dictus affectus, statim, vbi se exuerint, ex colore albo & cutis tum duritie, tum densitate, tum quod in ipsa exercitatione vix in- calecant. Succurrit huic affectioni calefactio, quæ valentiore exer- citio, balneisq; calidioribus petenda est. Mora vero in frigido so- lio diuturna non sit, imo nec ipsa aqua nimium sit frigida. Vbi ve- stes sunt induturi, vngentur aliquo, quod mediocriter calfaciat, oleo dulci ac tenui. Cutis autem densitatem abunde etiam sanat oleum anethinum, præsertim si viride fuerit anethum, oleumq; ex populo nigra confectum.

De spontaneis lasitudinibus.

Cap. xxii.

Quoniam vlcerosa lasitudo ex acrium recremētorum vitio cō- trahitur, siquidem paucus omnino vitiosus humor fuerit, apo- therapia exercitatione suffecerit. si copiosior & altius in corpore re- dundarit, eiusmodi malo obnoxiiis, nec exercitatione m, nec vllum

PAULI AEGINETAE,

omnino motum iniungemus, sed quiete, somnoque recreatos abstinere cibo totum diem cogemus, deinde vesperti pinguiter vinctis, temperatoque balneo lautatis, cibum boni succi & sordilem modicum dabimus non tamen a vino eos arcetes. hoc enim semicrudos humores, si aliquid aliud, concoquit. Si ergo his peractis symptoma conquieuerit, ad consuetam munia paulatim reducendi sunt, sin in posterum etiam dei remaneat, de valentiore iam remedio considerandum est. Si enim vires consent, duorum alterum, aut sanguis mittendus est, aut purgatio exhibenda. sed ita ut discernamus, utrum magis expediat. Quod si vires inuolidae sint, sanguinem dimittere haud quam oportet, sed deiectionem mediocrem tentare. At si crudi humores omnino fuerint, neque sanguinis detractio, neque purgatio, neque exercitium ex usu est, imo ne mouere quidem in totum, aut lauare expedit. Tales igitur in quiete omni seruandi sunt, cibis, potionibusque, & medicamentis quae extenuent, inciduntque sine manifesto calore, reficiendi. Pro cibo igitur oximel, modicum ptisanæ, nonnunquam, & mulsæ exhibebitur. Quoniam vero præcordia eiusmodi omnibus turgida, inflataque sunt, ac facile quicquid assumpserint, in flatum conuertitur, satius fuerit cum cibo piperis aliquid offerre. Vt illius autem erit, & medicamento quod diospolites dicuntur uti, item dia trion pepereon, simplici, vtilissimumque ipsis est oximel. Potius sument apomel, præsertim ubi coacuit, vinaque leuiter aciescentia. cibus erunt, qui sine calore attenuent, cuiusmodi est capparitis si ex oximelite, aut oxelæo assumatur. Porro tensionis lassitudo quæ sine exercitiis oboritur, copiam innuit solidas corporis partis distendentem. Constat autem omnibus, optimum esse presidium quum sanguinis copia subest, aut venam incidere, aut malleolos scarificatu sauciare. Quæ vero inflammationem representat lassitudo spontanea, ea ne paucis quidem horis, nedum duobus, tribusue diebus eodem tenore consistit, sed protinus febrem accendit vehementissimam, nisi sanguinis detractio malo prius occurreris. Præstiterit autem si fieri queat, bis eodem die sanguinem detrachere, ac primum quidem ita mittere conuenit, ne animi defectu homo periclitetur, secundo autem ne defectio quidem ipsa formidari debet. At qui sic affecti sanguinem non dimiserint, hi ut periculum euadant seruenturque, bonæ fortunæ beneficio opus habent.

Victus senum ratto.

Cap. xxiii.

Senectus quum sicca, frigidaque exisat, per calefacientia, humectandaque corrigi debet. Frictio itaque adhibenda est, citra lassitudinem, imbeciliores ter die cibo refici debent, ad tertiam quidem horam, panis exiguo cum melle attico, septima vero hora ubi frictio-

nem, exercitationesque ipsis congruas, & balneum fuerint experti, primū sane quæ aluū emolliunt, assument, deinde pisces, aut auiculas, hinc in cœna ea quæ optimi succi sunt, & ægre corūpūnt. Non prohibeo item vinis ex melle præparatis vtī, præcipue quibus de calculo in renibus creato, aut etiam podagra suspitio est, quando petroselinum vino recte iniicitur. At si quando putuita in ventriculo contracta, necessitas est aliqua quæ eā incidant, deligere, protinus ad humectantem victus rationem digrediendum est, ac fici maturæ ante alium cibum ipsis exhibentur, per hyemem vero caricæ, si nullum in dextra præcordiorum parte symptoma accidere sentiant. At quia serosa pituitosaque in senili corpore excrementa colliguntur, urinam quotidie promouere consilium est, & aluum subducere, præsertim oleo quod ante cibum absorbeant. Clarum vero est, omnia olera ante cibum ex oleo, garoque sumi oportere, item oliuas muria seruatas quas halmadas dicunt, & damascena. Quod si venter magis astrictus nihil deiecerit, & mercurialis herba, & enicum abunde sunt. benefacit etiam resina terebinthina, interim vnius auellanæ, interim duarum triumue magnitudine sumpta. Iam oleum quibus aluus contracta est, per clisterem vtilissime infunditur.

De rugoso corpore.

Cap. xxiii.

ERugat corpus erui, farina viti albæ mista.

Aliud smegma quo continue corpus abstergitur.

Flci pingues simul cum bryonia contusæ, farina erui, combusta sepiæ testa cum mellis momento affuso.

Quomodo corpus suauiter oleat.

Cap. xxv.

VT corpus bene oleat, eidem unctiōi cupressi comam aridam cōtusam admisceto, aut picæ corticem. Meminisse uero debes, ut mane postquam corpus uestimentis munierint, pauxillum casicæ aut sabinæ herbæ degustent.

Quomodo habitus recalescat.

Cap. xxvi.

QVandoquidem uero habitui senum succurrere oportet, utatur dū lauat, puluere calefacienti, aquæ iudito, qui constat, nepita, samfucho, hisopo, baccis lauri, rore marino, lapide pyrite, sale, fæce cōbusta, nitro, pumice, p cuiusq; rōne, itē sinapis, herbæ pediculariæ, cocci gnidii momēto. a balneo, acopo qđ calefaciat vtat. Vinū fuluū uetus potet, iumatque ppoma ex mulso pipere, ruta, & cōsimilibus.

cum mel
lis. destil
lantis
momen
to.

sabinæ
herbæ
βεῖλανος

ruta.
πίπυρον

Quomodo color malus emendetur.

Cap. xxvii.

COrpus decoloratū pallidumue uita læta & cibus gratus emēdat, miscetur autem huic radícula, porrū, et uiride cicer, lā mali punici dulcis succus sorbitionis modo sumptus, bonum colorem

PAULI AEGINETAE

efficit. Proficit etiam oleum cui bryoniae radix diutius sit incocta. idem & corporis cutem intendit, erugatq;. Iis autem, qui corpori nitorem conciliant, miscere cōuenit pastillos, qui fiunt ex cuiusdam abstergentis farina, bulbo, narcisso, & bryoniae radice. bene colorāt si copia datur, tum radix, tum semen amaræ amygdalæ in aqua elixa, qua pro lauacro vtitur.

Ad liuores.

xxviii.

Luescere senum corpora prohibemus, si cutem ipsorum crassam, & iniuriis haud facile opportunam, habitumq; calidiorem reddiderimus. Vt autem celerius id assequamur, sale in balneis, super partem quæ nigrucrit, vti conueniet eandemq; fomentis per spongas decocto raphani aut absinthii immerfas. adiuuare.

Quomodo dentes ab iniuria asserantur. Cap. xxix.

Dentes ab interitu vindicabis, si primum caueas, ne cibi quos ingereris, corruptionem experiantur, adhæc ne continue vomas, deinde escas dentibus incommodas, nempe ficus aridas, mel coctum quod durum nimis sit, palmulas vix fragiles, adhæc omnia glutinosa, quæq; adeo frangi contumacia sunt, vt denteis commoueant. insuper vitare oportet, quæ dentes stupefaciunt. per frigida cuncta & putrida. Conducit itidem secundum cibum denteis purgare.

Quomodo grauis auditus corrigatur. Cap. xxx.

Ad grauem auditum corrigendum, vincit primum meatus per quos audiendi facultas est, sordibus expurgare, per interualla autem linteum dropaci intinctum ipsis demittere, atq; prius expressum retrahere. summe enim meatus purgat, & simul auditu auribus reddit. deinde aliquo erui instar inserto, meatum ad diem obturabis. postea ipso exēpto, quotidie oleo amigdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut pingui anserino, cum exiguo fellis bubuli perunges. Rursus diebus aliquot interpositis, sinapi, & ficis contritis factum penicillum ad horas duas imponis, inde hoc exēpto infundis oleū, quod in asphodeli radice excauata efferbuerit.

De oculorum caligine.

Cap. xxxi.

Quidā
& dicunt
ut vertendum,
ne a legē
do quidē
tum defi
itas.

NE caligine oculi corrumpantur, quum in aquam frigidam te mergis illos diu in eadem apertos esse conueniet. Hinc enim robur visui adiicitur. Lectiōe vero non te fatigabis, vino crasso & dulci abstinebis. similiter cibus qui in superiore ventre diu remorantur, concoctu difficiles, & qui humores lentos, crassosq; generant, item cauebis erucam, porrum, & omnia, quorum acrimonia sursum effertur. Vitare etiam oportet supinum incubitum diuturnum, frigus ventos contra oculos flantes, fumum, & puluerē. iam vero aquā oculis instillare quotidie ad mensem totum, iuuat, quæ in hunc mo-

dum præparatur, fœniculum viride fictili vasi extrinsecus picato, et aqua coelesti dimittitur: deinde exempto fœniculo quod reliquum est repones.

De repletione.

Cap. xxxii.

Purimum noxæ ciborum repletio conciliat, quamuis enim probe quippiam ventriculus concoquat, venæ tamen nimium repletæ, laborant, distenduntur, rumpuntur, obstruuntur, flatu implentur, & valde grauantur. deterrimum autem habetur in morbis, venas esse repletas. at ventris repletio si vrget, interim vomitu quod redundat, interim per aluum excernitur: in totum inuolidior hæc, ea est quæ venis accidit, non tamen & ipsa admitti debet, sed si quis impendio plura assumpserit, statim eum vomere oportet. periculum etenim est, ne obita concoctione venæ repleantur. magisq; si intemperantius cibis continue assumptis, nullam deinde vacuationem experiatur. vomitu igitur sollicitare debet prius, quam cibi corumpantur. At si aliquid eum impendiat, aluus soluta frequenter succurrit. sin minus illa fluxerit, certe diutius dormire & potui aquam calidam frequenter sumere consilium est. Vbi iam abunde concoxerit, præsertim aluo largiter fusa, lauacris fomenti sq; adiuuare, salsamenti parum ac potionem dilutam exhibere oportet. At si neque descenderit aluus, neque celeriter obita est concoctio, sed corpus vniuersum graue, ad motus pigrum, & somnolentum fuerit, mens præter rationem quodam modo torpescat, venarum repletionem esse cognoscas. Qui vero præter hæc lassitudine premuntur, eos coquiescere dum ventriculus ingesta concoquat, deinde laboribus inanire expedire.

De ebrietate.

Cap. xxxiii.

Ebrietatem vomitus repente obortus discutit, item aquam et multam liberalius superbibere vincit, atq; sic vomere, vsq; dum plurima reiecerint, ac stomachi vellicatus obtundatur. a vomitu solum ingressi copiose videntur, reliquo tempore conquiescent, & accurate cooperti dutissime dormient, quousque temulentia discutitur.

Quibus cibi corrumpuntur.

Cap. xxxiiii.

Cibis in ventre viciatis, si quæ corrupta sunt desiciuntur, maximum ad sanitatem est cõpendium, sin minus, his quæ leniter subducunt, aluus irritanda est. Huiusmodi autem malo affectis vomitus ante cibum, vini dulcis potu excitatus conducit. Nullum præterea cibum vel nidorosum, vel graueolentem, vel in totum corruptioni opportunum assumere ipsos consuluerim, sed ea quæ boni succi sunt deligere. iam per interualla temporis mediocria aluum subducere, exitis quæ mediocriter purgant, ita affectis confert.

Plures
interficiet
crapula
quã gla
dius.

Testatur
& com.
vt edo-
miam
hoc vius

PAULI AEGINETAE

De Venere.

Cap. xxxv.

Hoc p̄ci
pit The
tis apud
homerū
Achilli
m̄erenti
obpatro
clu iterē
ptum, vt
venere
vtatur.
idonea,

si vis plu
rima ge
nitalis
humoris
abūdat,
ipsam
crebro p
venerem
ēfici pro
deste tan
tū ad bñ
valēdū.
cāterum
ad forti
tudinem
& ad ge
nerandū
non pro
dest. ex
Arist.
multi tñ
a cibo cō
cubitū ac
cūsāt, &
matuti
num ma
gis lau
dant.

Veneris hęc sunt commoda, repletos inanit, corpus agile prae
stat: in augmentum promouet, & utile magis efficit. Quantū
vero ad animum spectat, impeditam intelligentiæ uim dissoluit, ira
tos mitigat, eoq; melancholicis coitus, si quid aliud, remedium est ac
comadatisissimum. item alio modo insanientibus integritatem sen
suū restituit. Iam ex pituita morbis uenit est utilisissima. cāterum
aliq; etiā cibum respuentes, eius cupiditatem hinc recuperant, aliq; cō
tinuis per somnum ueneris imaginibus liberati sunt. Porro natura
ueneri, est calida, & humida, vt quæ reliquis salacior sit. Minime
vero coitum excitat victus qui siccat refrigeratq; ætas senilis, tem
pus autumnale. Qua propter victus ratio humida calidaq; adhibe
ri debet, mediocritas & laborum & ciborum. Quemadmodum ve
ro moderati labores, ita etiam concubitus ipse mediocris conuenit.
Nam & ad opus incitat, & facilitatem quandam consuetudini
præbet. Requirit autem libido, si quid aliud, alimenti exuberantiam,
eoq; cibi potissimum ualentis materiæ utiles sunt, ex piscibus au
tē polypodes, vt qui alioquin etiā, ad uenerem incitare credātur, his
adduntur, molli cute præditi, ex oleribus autem, orminum, erysimum,
eruca, & rapum, quæ in medicamentorum vicem dantur. ex legu
minibus profunt, faba, cicer, ochri, & dolichi, & pisæ, quæ præterq;
quod largiter corpus alunt, flatibus etiam replent. Ruta igitur quia
flatus discutit aboletq;, ideo etiam ueneris ardorem obtundit. ma
gnifice autem probo uuas, ut quæ humectent, & spiritu, sangui
nem repleant, qui in uenerem proritat. Quum igitur concubitu
rus es, nimiam facietatem, cruditatem, lassitudinem cauebis, item ne
vomitus: aut purgatio præcesserit, similiter repentinum alui proflu
uium, inueteratum enim fluorem uenus deficcat. At uehementis coe
undi cupiditates non laudo, sed potius resistere eis consulo, præser
tim iis quos morbus aliquis infestat. Saluberrimum igitur post exer
citationem, balneum, moderatumq; cibum, uenerem exercere: ita .n.
uiribus conducit, & frigus abortum minus efficitur. Tempus autē
concubendi opportunum est secundum cibum, ut supra dixi, antequā
somnia inuadat, lassitudo siquidem ex coitu contracta, obdormien
ti statim remittitur. Id uero, tempus etiam liberis procreandis accom
modū est, tum aliis de causis, tum quod, mulier consopita, genituram
facilius retinet.

4 Hic locus sic legitur in antiquis codicibus. καὶ πνύματ' ἐμπί
πλατι τὸ σῶμα, ὅδ' ἡ ἐξορμὰ πρὸς ἀφροδίτῃ. Id est, corpus flatibus
implent, qui ad libidinem excitat. Qui sensus simplicior est.

Ad eos, qui venerem exercere nequeunt.

Cap.

xxxvi.

Naturalia continue pingui vngentur, cui adiectum sit narcissi radicis momentum, aut coccignidii, aut pyrethri, aut herbae pediculariae, aut seminis vrticæ, aut viticis. Præbiberem autem ante venerem oportet piper, aut satyrion, aut erucam, aut cnicum, aut simul omnia. cōfert esse ante cibū bulbos tostos, rubentes ac exiguos, cum sale & oleo, aut scillæ marcidæ modicum, item compositis adversus hoc vitium inscriptis remediis vtendum est, item subinde lasciua legere competit.

De ijs qui immodice coierint.

Cap.

xxxvii.

Quoniam ex immoderata venere corpus rarius, frigidius, siccus, & imbecillius euadit, ratio est admouere nimirū, quæ densent, calefaciant, humectent, confirmentq;. Qui igitur immodico concubitu exhausti sunt, vestimentis calidis operiti cōquiescent, somnoq; satis indulgebunt, donec corporis contentio subsidat, & illi ab imbecillitate sese recollerint.

Si semen genitale redundet.

Cap.

xxxviii.

Nonnulli semine copioso & calido collecto, in venerem proueniunt, quod cum in coitu egresserint, corpus inualidum & stomachum machum resolutum obtinent, extenuantur siccanturq;, ob quā causam si rursus a concubitu abstinerint, capite grauātur, & anxii fiūt. deinde statim veneris insomnia experti eodem modo afficiuntur. Nihil igitur his quod semini augēdo efficax est, sed potius & cibi & medicamenta quæ id corrūpant, offerri debent, a balneo libos oleo rosaceo, melino, & omphacino perūgere oportet. Satius autē est oleum cera addita, ne defluat, crassius efficere, miscereq; succum aliquē refrigerantē, nempe semperuiui, solani, cotyledonis & psillii, ac horū quidē per æstatem, reliquis aut anni tēporibus, tum aliorū, tum lactucæ succū, item lini semen quod aqua fuerit incoctum. nam hoc quoq; refrigeratē succum exhibet. Ad hæc lamina plumbea lumbis subiecta, veneris insomnia cohibet. Iam herbae refrigerante vi præditæ si cum ruta substernātur, & teneris vitricis furculis, idē præstant. Præterea semen viticis & rutæ in cibo sumptum. Cauendum vero est, ne lumbis vehementer refrigeratis, renes offendantur.

Si perfrictio nocuit.

Cap.

xxxix.

Qui frigori nimio patuerunt, locis calidioribus decumbent, cyprino aut irino peruncti. postea vbi modice incaluerint, piper, myrrham cum vino dulci odorato & veteri assument, aut liquorem cyrenaicum cum vino vel aceto, aut pyrethrum castorium. Ve ex aceto, cibo autem calidiore recreandi sunt.

quia tūc bene concoctus ē cibus & valētius est corpus, & superfluum cibi semen est.

mace-
scentes
quoque
fœminas
melius
concipere
dicuntur.

Perraro
uti rebus
ueneris
tum ad
salutē tū
ad ualē-
tudinem
et ad pro-
creādos
liberos
prodesse.

Sēper ui-
ui solāni
ἀεὶ ῥα νο-
σφύχου

PAULI AEGINETAE

Si insolatus aduſſit

Cap. xxxx.

In calido, frigidum est, perfundendaque frigida, facies, manus, & crura, si siti do, sicco conficiuntur, frigidam aquam qui assuerunt, bibent. atque haec paula & humido, p- tim, & non vna vice ac, subito facere expedir. cibum assument mo- ut ipla se + solidiorem.

habēt, ui + Vetus scriptura hoc loco habet σκληροτέρων, id est duriores, ta, mors ἀντὶ τοῦ παχυτέρου καὶ σφραγισμένου, quibus nominibus medici cibū morbus, solidior em significant. uix unquam inuenitur σιτισθῆναι in hac iuuētus, significatione.

& senec De pituita in superiore uentriculo redundante Cap. xxxxi. tus con- Quid si in aliquem interdū incidas fastidientem, qui quidem sistunt. cibos valētis materię auerſetur, & si assumere cōpellas, nau

Aris. ij. sea afficiatur, sola vero acria appetat, & hīs quidem oblectetur, sed de part. ventris inflationem experiatur, nauſcetq, ac paululum ructibus solis anima. leuetur, interim vero & ipsi cibi quos assumpsit, praesertim in acorē ga haec conuerſi, vitientur, omnino intelligendum tibi venit summam cura- princi- tionis existere, vt pituitam a uentriculo abstergas. Ego quandoque pia sunt ita affectum noui, qui raphanis ex oxymelite sumptis, incredibili natura- crassioris pituitae copia vomitu egesta, integræ statim sanitati resti- lium ele- tutus fit.

mētorū. + Hic locus sic descriptus, est in uetereibus libris. Εἰ τι περὶ τετύχη καὶ σποτὲ τὰς ἄλλων τροφίμων σιτίων προσφορὰς ἀποσφραγισμένω, Multi quoque tis materię auerſetur, atque non alatur, πόσις enim uidetur posi- animan- tum ἀντὶ τοῦ ἀπρόφου.

tes ha- Quomodo facile quis uomat. Cap. xxxxi.

bēt a na- Voniam valide vomentibus multa solent absurda superuenire, tura da- Quomodo fuerit quomodo quis facile uomat, exponere. Et tū vt her enim vomitus pituitam inanit, caput leuat, & ne qui audius non- ba, qua- nunquam cibum ingesserint cruditate laborent, item ne qui vinum dam gu liberalius sumpserint, offendantur prohibet. At quæ offerentur, ne flata e- que acerbæ, neque sicca erunt, sed partim dulciora, humidioraq, par- uomāt, tim acriora. Commendatur ad hæc raphanus, eruca, fassamentum Aristo. vetus, origanum viride, cepæ momentum, & porri. Promouet vo- ix. de mitus etiam ex leguminibus ptisana, cui mellis aliquid additum fit, anima. ferculum ex fabis fressis confectum, magisq, carnes ipsarum. verum non solum cremores ipsarum, sed ipsas quoque integras deglutire oportet, eoq, vomiturus non diu mandendis ipsis immorabitur. om- nia vero per coctionem mollia, flaccidaq, erunt. Iam constat, vi- na dul-

na dulciora deligi oportere, vt quæ in stomacho magis supernatent atq; eam potionem tepidiorem assumi. Confert etiam amygdalas melli intinctas comedere, ac placentas gustare, item peponis & cucumeris semen maceratum detritumq; cum melle assumere, radicēq; cucumeris contritam ex melle. At qui valentioribus vti volūt, narciſsi bulbo aquæ incocto, vinum temperant. Mouet autem vomitiones irinum quoq; vnguentum, si digitis eo perunctis, irrites. Porro vomentis inereſt, ne ceſſet vel intermittat, uſq; dum omnia eiecerit, a vomitu os colluat, faciemq; poſca aut aqua abſtergat, id namque dentibus conducit, & caput releuat.

Quæ ſanis aluum ſubducant, & quæ vrinam moueant.

Cap.

xliii.

Veterum uonnullis ſatis eſſe ad ſecundam valetudinem tuendam viſum eſt, ſi alluiſ quotidie & vrina pro ingeſtorum tum cibi, tum potus copia, ſine vitio & abunde reſpenderet. ac quum vacuatio iuxta aſſumptorum proportionem accidebat, commendabant, ſi minus, promoueabant, vrinam quidem ſcandice, a pio, aſparago petroſelino, aniſo, nepita, origano, abſinthio, graminis carduiq; radice, cytiſo, adiantho, omnibus in aqua elixis, quorum decoctum cum vino potui exhibebant. hæc enim per vrinam ſanguinem reſpurgant, vnde non parum vtilitatis percipitur. Aluum adiuuabant terebinthina, ex qua oliuæ magnitudinem dormituri deglutiendâ offerebant. At quum magis ſubducere eam cogitamus, rheu momentum amiſcebimus. A commodatâ deiectioni ſunt, oua ſorbilia, ex oleribus, beta, malua. item cochlearum ius, atq; hæc forte abunde erunt. Efficacior eſt herba mercurialis, in aqua cum ſale elixa comestaq; cuiuſq; decoctum potui datum, ſimiliter folia ſambuci. idem præſtat polypodii radix duarum drachmarum pondere, ſaſamento inſperſa, aut etiâ in ptifana ſorpta, adhæc ſeruum lactis cum ſale aut melle, ad treis heminas quatuorve aſſumptum, veteris quoque gallinacei ius, tum per ſe, tum cum cnicidarchmis duabus. nonnumquam & aloetrium cicerum inſtar ſecundum cœnâ rectæ aſſumitur. Præſtantisſimum vero eſt epithimum in vino poſt mediocrē cœnam potum, qui vehmentius vacuare deſideret, mane epithimi drachmam ex oximelite, verno tempore ebibat.

De cliſteribus.

Cap.

xliiii.

In quibus venter ægre deſcendit, & ſtomachus imbecillis medicamenta ad ſubducendum efficacia non ſuſtinet, cliſteribus vtendum eſt, quum pituita quidem in inteſtino reſidet, iis quæ ſiunt decocto caricarum, bete, niſtri, ſylueſtris cucumeris radicis, melle, oleo chamæmelino, aut anethino, quum ſiccitas magis vrget, iis quæ

hoc eſt
liquamē
vel iuru
lendum
aliquod
miſcebi
mus, q̄a
ius ſub
ducit vē
trem.

B

PAULI AEGINETAE,

constant althæa, fœnum græco, chamæmelis, oleo, mellis exiguo. interim etiam oleum per se dimidiæ heminæ mensura iniectū abunde proficit. non tamen continue id faciendum est, ne natura his irritata, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

De glandibus.

Cap.

xlv.

Vtimur etiam glandibus subinde stercoris excernendi gratia, & in quibus id quod per clisterem inditum est, non egeritur. Funguntur autem glandes ex sale tosto, melle, & nitro, item thymus discocto melli additur. Fiunt etiam ex resina terebinthina, & nitro, interdum & cocco gnidio modico. Sed quia vellicatus mouet, partibus ipsas oleo delinere conuenit. præterea pyrethrū aut piper admiscetur, conuenitque resolutionē experiri, & iis qui ex perfrictione inflationes contraxerunt. Insuper centaurium pici & ceræ commiscetur, ac naturalium relaxationibus aptum est præsidium. Infantibus aut etiam salis grumus ano imponit. Fit quoque glans ex ficuū nitro

Deiis quæ per os & nares caput euacuant, quæque eisdem partibus delinuntur.

Cap.

xlvi.

Hvmores in capite residentes per sputa uacuamus. quod si modice facere uoluerimus piper cum mastiche temperabimus. si largius uacuare libet pyrethrum aut herbam pediculariam mandicipiemus. item anemonæ omnis radix mansa pituitam prouocat capitisque radicis cortex. Itaque huiusmodi remedia serosum excrementū vacuāt. crassam uero lentamque pituitā, sinapi cum oxymelite gargarizati, aut sapa in qua origanū, aut hyslopū sit decoctū. Ego autē sapa, cum sinapi et oxymelite misceo. At si cerebrū mucō purgari desiderat, acerbis eū remediis, quorū nōnulla est starnutamēta mouēt, euocabimus. Itaque anagallidis utriusque et anemonæ cuiusuis, et betæ succus per nares purgat, itē cucumeris syluestris foliorum succus naribus ipse & per se et cum betarum decocto succo ut infunditur. starnutamētum uero crudis humoribus qui in thorace, pulmone, & capite continentur, non expedit. Quod autem ori illinetur tale est, sapa cum betæ succo palati regionibus & colunellæ delitus bene facit. idem etiam per nares purgat, melanthio uero quod facile paratur, ad narium illitione subinde usus sum, interim aceto acri pridie macerans, deinde postmodum cum aceto rursus leuigans infundens. quoniam naribus. Nōnūquā oleo ueteri idē melanthiū detritum, similiter illeui. Sic igitur et morbus Archigenes eo in narium obstructiōe usus est, priori autē, ex acetoregius, to in morbo regio uti solebat.

morbus

regius,

ictericus

hoc &

Que menses ducunt

Cap.

xlvii.

Quæcunue urinae ciendæ sunt, eadem omnia menses ducunt, nempe brasicæ radicis decoctum potum, persicæ radix, ruta,

chrysanthemon, dictamnium, & erucæ semen, item quæ ori vulnere subiiciuntur, mensis commouent, vt ruta cum melle trita, aut porri succus, aut allium tritum subiectum, aut myrrha cum vino læuigata, aut leporis coagulum.

Quæ sudorem mouent.

Cap. xlviii.

Sudorem eliciunt chamæmelum aridum tritumque, oleo inspersum, si summæ cuti valide infricetur seseli, pyrethrum, cachry, anysum, similiter oleo inspersa. item nitrum tostum non nimis tenue, cū oleo efficax est, adhæc salis flos oleo temperatus, & liquor cyrenæicus aqua dilutus corpori infricatus epotusque ciceris magnitudine, Pari modo nepita & pota cum mulla, & extrinsecus cum oleo infricata proficit.

De aere.

Cap.

xliv.

Ardatissimus aer est, qui exacte purus, is autem nimirū erit qui non ex stagnorum, aut paludum vapore turbidus exurgit, neque ex profundo quodam specu pestilentem auram exhalante prouenit ita qui ex cloaca quadam magnam ciuitatem expurgante turbidus exit, vitiosus est. Quin etiam nebulosus similiter sanitati nō facit, quemadmodum item qui in cauo loco altis vndique montibus inclusus, nullam auram recipit. Hoc igitur modo vitiosus aer omni æquo ætati nocet, omniq; temperaturæ, sicut optimus prodest. At qualitate varians aer calore dico, frigiditate, siccitate, & humiditate, non similiter vniuersos afficit. Etenim temperatis corporibus aer temperatus utilis, intemperatis, qui contrariam temperiem habuerit, confert.

De aquis

Cap. I.

Quarum præterea & virtutes et vitia cognita habere expedit, vt quæ ex multiplici ipsarū vsu magis fere quam omnia alia ad quamlibet uictus rationem requirantur. Ea igitur optima aqua censenda est, quæ nullam aut gustu, aut odore qualitatem repræsentat, sed protinus bibenti suavis est, & visu pura limpidaque, quum vero etiā a præcordiis statim descendit, melior alia querenda non est. Nam quæ in præcordiis residet diutius, ventrem ferit, inflat, grauatque, vitiosa censetur, huiusmodi aqua neque cito calefit neque refrigeratur, sed quæ in ipsa elixantur, tardissime peiusque decoquuntur. Præstat itaque talem aquam experimento discernere. Qui vero notis quoque eam vult agnoscere, iis quæ dicuntur attendat. quæ enim ad septentrionem spectat, a sole auersa, tarde per meat, ægræ cōcoctionis lente calefit & refrigerat, quæ autē ad oriētē erupit, ac permeatū quendā, aut terrā colat puram, eadēq; citissime calefit, iterūq; refrigerat protinus, hanc optimā esse existimādū est. Probatur itē quæ æstate frigidior, hyeme calidior est, Nonnulli & pondere a-

cōueniēf
nostrætē
peraturæ
aer quæ
rēdus. is
.n. Dēor
appella
batur ab
antiquis
quasi nu
mē salu
tis. a cu
ius varia
naturadi
uersitatē
quoq;
morum
proueni
re tradit
& ipse
Pol. iii.
historia
tū et Ar.
iii. de ge
ner. ani
.iiii. eius
dē disci
plinæ.

PAULI AEGINETAE

quam examinant, leuem præstare credentes, hoc igitur si aliis a me
comemoratis accidit, comendatur, verum sola hæc bonæ aquæ nota
non sufficit. At imbriū aqua autore Hippocrate leuissima est dulcis
putrescit
iā, quia
a dupli-
ci gene-
ratione
aqua ē.
gelidam
ac lim-
pidā lau-
dat sæpe
Home-
rus. nem-
pe quæ
ex circū
stātia ca-
lorem ī
corpo-
re auget,
sed li-
ber me-
reorū se-
cundus
ad hæc
utilis.

simā, limpidissima, tenuissimaq; eo quod sol leuissimū & tenuissi-
mum attrahat, ac id nō ex alia aqua solū, verum ex mari quoq; &
corporibus, quapropter etiā omnium promptissime cōputrescit, vt
quæ diuersis ex qualitatibus sit, conflata. Nemo aut aquam putrefa-
ctioni opportunā deterrimam esse existimet. nā mutationis facili-
tas virtuti potius, quā vitio tribuitur. Quæ igitur aqua optimæ no-
tas habet, si prompte etiā putrescat, ea cā cenlebitur saluberrima, &
si quum mutari incipit, occasione raucedinis, tusficule, & grauita-
tis vocis iis qui biberunt, præbeat. At inter imbrium aquas, æstiuā
quæ tonitru decidit præstantior est, quā que nimbis demissa est. Ex
glacie & niuib; aqua, insaluberrima est. Nam ea congelascente, to-
ta pars tenuior exprimitur. Porro palustrem foetidq; odoris & ab-
surdas recipientem qualitates, recte decoques atq; ita meliorem red-
ditam potui dabis vino temperatā, si adstringit, dulciori, aliam ve-
ro, acerbiori. Nonnullas percolare expedit, nempe limosas salsas, et
bitumen referentes. At frigida nimium a cibo assumi debēt, non ta-
men subito ac vna vice. Non desunt qui cibos & potiones adner-
sus aquarū vitia inuenerint, ac alii cicerū decoctiones præbunt,
vel eadem quoq; edunt, alii caualidē similiter cum pisciculo quo-
dam elixam, item foeniculum, reliqui betam & cucurbitam sale cō-
spersam cum vino dilutiore præsumunt.

De lauacris.

Cap.

li.

Apollo-
nius ty-
anæus
vt refert
Phil. ba-
linea sē-
per frigi-
da ini-
bat. dice-
batque
balineū
esse sene-
ctutē ho-

Rigidam lauationē ita quidē laudo, vt nō iis qui nullo victus
delectu agunt, ex vsum esse dicā, verū solis illis qui accuratē vi-
uunt, & laboribus, & cibis sicut expedit, vtentes. Porro multis
qui amplius interdū refrigerari desiderant, abūde est natare per æsta-
tem, si iuuenes sint carnosī, & frictioibus ante excafacti. Sint autē
qui aqua ingrediētur, neq; venere, neq; alio quodā modo lasi, neq;
eruditatem sentiant, neq; vomitu, aut aluo inaniti, neq; vigilis de-
fatigati. Periculosum. n. si quis ita affectus frigida lauacro vtatur.
Calidū vero balneū & optimū & tutissimū est, lassitudinē soluit,
humorū repletionē per habitū digerit itē excafacit, mitigat, emol-
lit, status vbicunq; decubuerint, diffundit, somnum conciliat, carne
replet. Est autem aptissimum omnibus, & viro & mulieri, & pue-
ro, & senī, & priuato.

De balineis naturalibus.

Cap.

lii.

Naturalium balnearum alia nitrum, alia salem, alia alumē, alia
sulfur, alia bitumen, alia æs, alia ferrum repræsentant, nonnulla

composita ex his omnibus reperiuntur. Itaque aquarum naturalium vis est, quæ desiccet & calefaciat ampliter, ac humidis frigidisque affectibus maxime conducit. Iam vero quæ uitrum & salem obtinent, capiti, thoraci fluxtione tentato stomacho humentiori, aquæ inter cutem, tumoribus laxis, oedemata Græci vocant, qui ex morbis proueniunt, & pituitosis sunt accommodatæ. Aluminatæ sanguinis reiectioni, stomacho vomitioni opportuno, immoderatis mulierum purgationibus, continuisque abortibus, vtilis existunt. Sulfuratæ neruos emolliunt calefaciuntque, & dolores mitigant, stomachum vero eneruant evertuntque. Bituminatæ caput replent, instrumenta sensibus distribuendis dicata, offendunt, calefaciunt autem continue, & temporis processu emolliunt. Quæ æris naturam occupant, ori, tonsillis, vix, et oculis præcipue conferunt. Ferri virtutem sortitæ, stomacho & heni sunt vtilis. Oportet autem in aqua sine tumultu, & lente descendere, quo virtus corpori relaxato accedens immergatur.

Quæ victus ratio quolibet anni tempore sit utilis

Cap.

lii.

Non alienum est, pro singulis quoque anni temporibus victum instituere. Ac hyeme quidem pluribus vti laboribus plus esse conuenit præsertim diebus aquiloniis. Nam austrinis laborare quidem similiter, sed minus cibi & potus assumere oportet. Summatim humido tempore corpus omnino siccum reddere, quæ admodum in frigido, calidius, carnes calidas comedere & olera, plus vix bibere oportet. Vere autem ineunte, alius vomitu, alius per aluum euacuari debet, alius sanguinis demissione, prout cuiusque consuetudo & voluntas fuerit. Per æstatem a laboribus conquiescendum, ciboque demendum est, qui recte frigidioris erit naturæ potione largiore vtendum, ac omnia fieri debent, quæ ad refrigerationem humiditatemque cōferunt. At in autumno, quoniā prorsus inæqualis inordinatusque est, & omnigenos morbos inuehit, magna victus habenda sollicitudo est, frigus vitare, concubitu & frigida potu prorsus abstinere expedit. itē frigidus aurora aer, meridianusque ardor recte cauebitur, poma affatim assumere noxium est, vt quæ non copia tantum obsint, verum etiam vitiosos procreent humores, & inflationes. Etenim præstantissima ipsorum, nempe ficus & vix, flatus pariunt corrumpuntque cibos, nisi ante alios præsumantur, ita vero neque corrumpunt. Vbi aer frigidior euadit, corpus pro frigoris ratione calefacere, omniaque peragere oportet ceu hyeme aduentante. Nihil mali autem fuerit post æquinoctium vacuationem ex commemoratorum aliquo tentare, ne aliquid superfluum.

B iii

minu. rā
est, quia
balneum
eneruat
vires. vt
ex vefē
αλας.
inquit
Aristo-
phanes.
balneo
rum ue-
ro usum
eē anti-
quis-
simum do-
cet apud
callima-
chū pal-
las ī Si-
cilia ap-
parans
Hercu-
li bali-
neū. itē-
que ho-
merus fa-
cit non
prius ad
cænā ho-
spites ad-
mitti, q̄
balinea
ingredia-
tur.

commemoratorum aliquo tentare, ne aliquid superfluum in corpore retentum hyeme facessat negocium.

Victus eorum qui in laboribus vitam agunt. Capi. liiii.

Siquis in laboribus vitam transigit, considerandum est, priusne is a labore desiste, an nullo exercitio se credens, mediocriter et eiusmodi consuetudinem ferat, ita ut non morbo implicetur, continue facili praeditus perspiratu meatuum, eiusmodi enim corporis naturam ad aliam consuetudinem traducere non oportet, imo nec eos qui ex longiore temporis intervallo aegrotant. At si assidue quis morbo conflictari videtur, in humorum quidem redundantia *πληθὺς αἷμα* graeci appellant, eo per totam salubrem victus rationem, consilium diriges, ut humorum mediocris sit et copia, in eorum vero prauitate, *κακοχρῆμα* graecis dicitur, ut optimos efficaces. Qui igitur humorum redundantia laborant, in balneum deduci, deinde siccationem adhibere, et paululum dimoueri prius debent. Qui vero eiusmodi facere antea sunt agres, his haec eadem paululum augere, cibo autem detrahare, eumque imbecillis materiae ingerere consulemus. At qui prauos humores colligunt, non vno consilio tractantur, quoniam neque vna vitiosi humoris species est. Nonnulli si quidem frigiditatem magisque pituitosam colligunt, alii calidiorē biliosiorēque, quae ad modum alii melancholicam magis accumulans. Quapropter singuli, cibo potuque abstinebunt, quae collectam ipsis humorum colluuiem solent generare. In omnibus autem his commune est praesidium, alui subductio.

+ Vetus scriptura est *ῥαπτός*, id est, facile, non *μετρίως*.

+ Ante hoc verbum in manu scripto est vox *αἷμα*, id est, semper quae omissa videtur a librariis.

Proficiscentium victus ratio.

Cap. lv.

Facillime quis profectionem inibit, si in unctus sit, et non fortiter incedat, Praeterea ad proficiscendi facilitatem conducit per aetatem fascia mollis digitos sex aut septem lata, quinque aut cubitos non minus oblonga, lumbos ad ilia usque complexa. Item baculus ad iter utilis habetur. Etenim per decliua praemissus, corpus, quod praiceps ruit, ceu conto cuidam innixum retinet. quum ascendendum est, ipsi innitentes facilius in accliuia corpus promouemus. Porro cum in itinere cessamus, unctio et paucillum cibi cuiusdam aestiui, portioque modica eo tempore conuenit, a prandio ante quam iter arripimus, conquiescendum est. Si vero necessitas abundis fuerit, et sitis urgeat, tenuis polenta ex aqua cum salis momento bibetur, aestus ardorque solis cauere debet, cui nec corpus nudum exponere sed contactum esse oportet, ne ex itinere siccescans, indurescat,

Hac enim ratione, & minus lassatur, & nullum ex prædictis affectibus similiter percipit. Hyeme quum frigus vrit, antequam itineri te accingas ventre subducto, & vntione adhibita hyemaleis cibos copiose assumes, potionem modicam. Cæterum fascia longiore non solum lumbos sed spinam quoque & pectus recte inuolues. Requiesce ti autem, si interea vehemens frigus vrat, neque vngi, neque cibum potum ve assumere præstat, neque alio quodam modo refici debes, si ibi mansurus es. At secundum longas profectiones, aliosque validos labores, etsi lassitudinem quis non sentiat, non aliter quam lassus curabitur. minus enim sic periculis erit opportunus.

Nauiantium victus.

Cap. lvi.

Vomitionibus quibus nauigantes premuntur, primum oborientibus nec facile, nec vtiliter succurimus, ut quæ omnino magna ex parte præsidio esse soleant. A vomitu autem cibi non copiosi, nec quilibet offerri debent, sed aut lenticula uti sicca, decoctaque, cui pulegiæ modicum sit adiectum, aut panem ex vino aquoso, & odorato maceratum ingerere oportet, potionem uti modicam, eaque vel ex vino prorsus aquoso, vel aceto mulso. Lenticulam incoqui dum emolle scat, conueniet, mox in tenuem puluerem redigere, inde ficcare, postea in vas fictile condere. At si diutius crebriusque vomitus vrgeat, cibo magis subtrahendum est, eademque potionem modicam utendum, vel aceto mulso cum aqua, in quo thymum aut pulegium commaduerit, item aqua cum polentæ polline aut vino odorato, eoque aquoso cum illius polline similiter, recreatio tentabitur. Ad graueis autem nauium odores, aut mala cotonea naribus admouentur, aut thymus, aut pulegium. Mare nequaquam aspiciendum est, usque dum in nauibus versari assuescas. Aquis porro cura adhibenda est, ne turbidæ, foedi odoris, ac salæ existant.

Quomodo extenuetur corpus.

Cap. lvij.

Quam immodice corpus plenum est, extenuare id atque imminuere oportet. Quia ergo calidior temperatura & siccior graue corpus reddere demonstrata est, crassis eam, si mediocres reddere voluerimus, inducimus. Didicisti autem citas exercitationes, victum extenuantem, similiaque medicamenta, & animi curas, temperamentum siccius & calidius eoque corpus gracilius efficere. Quæ igitur victus ratio extenuet, nulli non cognita est, medicamenta vero vehementiora hæc sunt, rutæ semen, præsertim syluestris, cum ipsis corymbis, aristolochia rotunda, tenue centaurium, gentiana, polium, quæque ad urinam ciendam valentiora sunt, uti petroselinum, singula namque hæc, et per se, et cum alijs omnia, humores abunde extenuant, inaniuntque corpus. Quinetiâ sales ex crematis viperis largiter ex-

cōsuefa-
cere na-
tura iua-
lescere
absq̃ me-
dicamen-
tis.
cogno-
scei vli-
ses erro-
res ex

Hom. et
Apollō.
peregrin-
ationē
ex Phi.

polenta.
potio li-
qda nō
durefcēs
ex flore
farinæ.
ex vche-
mētiori
tū exer-
citatiōe
plures
magis
pingue-
scere an-
notatū ē.

B iiii

PAULI AEGINETAE

theria - tenuare solēt, ipsaq; adeo theriace. digerit autem, extenuatq; oleū,
ce etiam cui radix solutici cucumeris, hibisci, gētianæ, panacis, & aristolo
quæ ex chix sit incocta, si illinatur, sic polium & centauriū. At cibus non
pluribus statim a balneo dari debet, sed prius somnus est indicendus. Præsta
herbis p- ret ēt aquam balnei ex iis esse quæ digerant, si quidem spē sua sca
stantissi- turientem habeamus, qualis est Mitylenæ, sin minus, salis florem
mis cōfi- aquæ marinæ commiscebimus. Vino vtemur tenui & albo. Cæte
citur, vt rum frictio sicca linteis crassioribus durisq; adhibita, idem abunde
Alex. in efficit. Adhæc oportet cibi minus quam p- exercitiorum ratione
quit i p- ipsos assumere, iuuat etiam obæfos insolatus. p- bibere autem non
ble. debent, sed epulas semel tantu die sumere, magis expedit. item cor-
non solu- pus nitro & sale asperiore infricare. In balneis copiosum nitru ex
ex serpc- tenuat, modicum vero probam corporis nutritionem excitat. Po-
tibus, stremo extenuat & medicamentum, quod recipit piperis & petro
selini duas portiones, assari & anisi dimidiam. Hoc & vrinæ &
aluo promouendæ efficax est.

Quomodo tenues impleantur. Cap. lvi.

QUum extenuatos implere volumus, vinum quidē crassum, ei
bus autē crassi succi, exercitatio modica, frictio mediocris, et
vt summatim dicam, omnia prædictis contraria expediunt. Com
modum est iisdem & pice diebus tribus quatuorve interpositis, ob
lini. Si ieiunus aliquis lauetur, ante balneum linteis corpus donec
rubescat, infricare debet, deinde frictione dura non tamen multa cu
tem cogere, quo densa duraq; euadat. Expedit igitur iis qui palli
do sunt colore præditi, nec alimentum sentiunt, iram animiq; mo
tus excitare.

De partium attenuatarum curatione. Cap. lxi.

EXtenuantur plerunq; partes nōnullæ, vel diuturna ipsarū q̄te
vel deligaturæ modo, quo cōfracta fasciantur. Itaq; virtus partis
extenuatæ firmari, sanguisq; ad eam elici debet copiosus, fri
ctione moderata, aptoq; motu, & calenti aquæ mediocri superfu
sione. Hæc sane tantisper facienda sunt, dū rubescens corpus attolla
tur. cessandum vero prius quā, collabatur. Iam & picationem præ
dictis membris adhibere congruit. Quum aut frigidiorē partem
senferis, linteis ipsam confricare, ac calefacienti quodam medica
mine oportet. V sussum aliquando & thapsia, nunc cum melle, nūc
cum cerato illinens.

Negat Optimi temperamenti notæ. Cap. lxi.

Temperatissimus homo est, cuius corporis compositio omniū
extremorum exacte medium occupat, nempe gracilitatis, cras
sitiei, mollitudinis, duritiæ, caloris, frigiditatis, humiditatis, & sic

gitatis, in vniuersum naturæ ac animi functiones habet inculpata
medius quoque est glabri & hirsuti nigri & albi, pilos in pueritia ru-
fos magis quam nigros habet. in vigore, e contrario.

Intemperatorum corporum notæ. Cap. Ixi.

Corpora moderato calidiora citius dētiēt, increscētque simili-
ter, tāgētibus aut calidiora, minusque pīguia apparēt, colore sunt
rubido, pilis nigris, mediocriter hispidis, & latis venis. At si quis
simul & pinguis, & crassus latiores venas habeat, is ob cōsuetudī-
nē, nō natura pinguis euasit. Frigidioris tēperaturæ nota est, si ad ta-
ctū frigidius apparet corpus, glabriusque sit et pingue, color vna cum
capillis rufus, si multa inest frigiditas, liuens quodāmodo & plum-
beus, venæ angustiores, si gracilis est eo tēperamēto præditus, neque
is necessario talis, sed ex cōsuetudine factus ē. Sicca aut tēperies du-
rior est, graciliorque tēperata, atque hirsuta, durities igitur a sicca tem-
perie oīno separari nequit, gracilitas aut non modo naturales tem-
peraturas, sed et ex longa cōsuetudine acquisitas comitatur, Indi-
cium siccitatis est, si corpus ægre mouetur, siccū, & squalidū a sicca
tibus euadat. Humida tēperies, cætera quidē tēperatæ similis est, sed
mollior, corpulentiorque, ac ab hac separari nequit mollities, quæ ad
modū & crassitudo, nō insitū modo tēperamentū comitatur, sed et
ex longa quadā cōsuetudine cōstituitur, peculiare vero humidita-
tis signum est, corpus maxime hirsutum, facilis pilorum capitis p-
uentus, iique nigri sunt, & per iuuentutē copiosi, processū tēporis
caluitiū sequitur, venæ latæ sunt, sicuti & arterice grandes, simulque
vehementissime pulsant, præterea totū corpus validū, articulatum,
musculosum, pinguedinis expers apparet, cutis dura & nigrior.
Frigidā humidāque temperaturā testatur thorax angustus. sicut et
totum corpus glabrū, cutis tenera & alba, capilli subrui, præsertim
in iuuentute, hac præditi in senio non caluescunt, verū statim timidi
pusillanimes, pigri, venis latentibus, crassi pinguesque, & femori-
bus, & musculis indistincti, inarticulati, blefi que fiunt. At si humidi-
tas frigiditasque magis fuerit adaucta, color vna cum pilis rufus vide-
tur, si plurimū increuerit, liuescit. Porro calidum ac humidū tēpera-
mentum mollius carnosiusque, optima tēperie existit, auctū amplis-
sime, putridis affectibus opportunū est. Quum aut paulo quidem
humidius, multo autem calidius fuerit, eo donati molliores pau-
lo, corpulentioresque temperatis existunt, non paulo vero hispidio-
res, imo et ad tactum calidiores apparent, nigri ipsis pili existunt,
et caro pinguitudinis expers. Quod si paulo quidem fuerit calidius,
multo aut humidius, mollis his caro, multa que existit, et color ex ru-
bro, & albo commistus, tangentibusque paulo calidiores apparent.

nus ho-
minem
ita tēpe-
rati. ideā
quasi, tā-
tū in ani-
mo ha-
bere me-
dicū o-
portet, q̄
tēperies
hominū
metiat.

a calido
et frigi-
do, sicco
& humi-
do cæte-
ra corpo-
ris tra-
ctabiles
differen-
tiæ pro-
ficiscun-
tur.

PAULI AEGINETAE

At si frigiditas pariter cum siccitate ex æquo augeat, corpus erit durum, gracile, album, non masculosum nec articulatum, pilisque vacuum tangentibus frigidum deprehenditur pinguendo tamen, graciles licet eiusmodi existant, per carnem dispersa est, color autem & capilli frigiditati proportionem respondent. Quod ad animi mores pertinet pusillanimes, timidos & tristes eiusmodi temperamentum efficit. Ac, ut semel expediam, in coniugatis temperaturis semper eum centis qualitatibus notæ superare solent.

De capitis formatione.

Cap. lxii.

de hoc vide Hippo. quō facis lin teolisq; forma bant capita puerorū aut tiqui. vinciebant. n. ne ind formē latitudinē adoleſcent. ad tēperamenta ptiū cognoscenta vtilis disciplinā Aris. ē de par tib. aīa- lum.

EXiguū sane caput prauam cerebri structuram proprie notat, magnum vero non necessario bonam testatur. Si nanque tale in sitæ virtutis, materiam probam, multamq; efformantis robore factū est, bonum est indicium, si ex solius materię copia, non item. Verum distinguere ea conuenit figura, & iis quæ ex illo processerint. Figura quidem, si concinna, aptaq; fuerit, hæc enim semper bona est constructio, iis autem quæ ex illo procedunt, si optime sit disposita, & si neruosum genus ipsi integrum, bene habitum, valens, siq; oculi acriter cernant. In acutum fastigiata capita, deficientem in fronte, vel occipite habent eminentiam, aut magis quam decens est, auctā. Plerunque igitur, ut magnam, ita has quoque deprauatas comperiemus sit tamen, sed raro ut nonnullæ ex his bonæ proueniant, cum formans scilicet vis non inualida fuerit.

Temperaturæ cerebri notæ.

Cap. lxiii.

Cerebrum temperatū moderatas habet, & animi functiones, et excrementa, minimeq; ab omnibus exteris offenditur. Talium pili capitis in infantia subrubi, pueritia subflauī apparent, ubi adoleuerint flauescunt, mediū quodammodo inter crispōs exacte ac simplices, nec tamen facile caluescunt. Si vero calidius temperato extiterit, omnia quæ circa caput existunt, & calidiora & rubicundiora apparent, oculorum venæ sensibiliter apparent, capilli his in lucem æditis protinus in capite oriuntur. Iis autem qui multo sunt calidiores, nigri, validi, & crispī, qui non multo iis flauī primum, deinde nigri proueniunt, procedente ætate caluescunt, interim his recrementata sunt exigua, & inculcata fruuntur valetudine, capite vero a calē facientibus cibis, potu, odoribus, & foris accedentibus implentur grauanturque, modicus somnus in huiusmodi temperaturis sufficit, neque is profundus admodum. Frigidius autem quam conuenit cerebrum fatentur, excrementa copiosiora per meatus ei peculiareis manantia, capilli recti, rufi, firmi, & facile a frigidioribus causis læduntur, destillationibus, & grauedinibus continue infestantur, oculorum venæ latent, somno maxime premuntur. Siccioris cerebri nota est,

LIBER I.

si nihil excrementi emanat, sensuum acrimonia, vigilæ, capilli sunt robustissimi, statim ab ortu, ac iis crispi magis, verum ex facili calu-
 uent. Humidioris autem, capilli simplices planique, & nequaquam
 caluitium experiuntur, sensus turbulenti, excrementorū copia, som-
 nus multus & profundus. Calido, & sicco cerebro præditi, recremē-
 tis carent, exactos sensus obtinent, vigilantissimi sunt, facile caluēt,
 primum vero capilli celerrime ipsis proueniunt, & optime habiti,
 plenissimiq; nigri, calidi ad tactum capitis, rubriq; vsque ad vigo-
 rem apparent. At si calori humiditas accesserit, ita vt vtraque paulu-
 lum excedant mediocritatem, colorati calidiq; sunt, venæ oculorū
 grandes, excrementa pleniora, mediocriter concocta, capilli recti,
 subflauī, caluitium haud facile experiuntur, verum capita ipsorum ca-
 lescentibus, humectantibusq; implentur, grauanturq;. Vbi vero hu-
 miditas, caliditasq; accreuerit, caput morbidum euadit, facileq; ex ca-
 lidis & humectantibus noxam contrahit. eiusmodi temperamento
 præditi, vigilare diu nequeunt, dormientes autem imaginibus per-
 insomnia torquentur, oculi caligant, non exactos sensus obtinent.
 Frigida vero simul & sicca temperamenta cerebri, frigidum deco-
 lorq; caput efficiunt, oculorum venæ non extant, a frigidis causis
 prompte offenduntur, eoq; inæquali valetudine feruntur, sensibus p-
 adolescentiam exactis inculpatisq; processu temporis subito con-
 tabescunt, summarium circa omnes capitis partes cito consenescent,
 capilli a natali die vix erumpunt, exorti non aluntur, rufescuntque.
 Humidum frigidumque temperamentum cerebri reddit soporosos,
 somnolentos, sensibus vitiosos, ex cremēticiis, frigori opportunos,
 capita habentes quæ facile repleantur, destillationi, grauedini obno-
 xios, non tamen hi caluitium experiuntur.

Ventriculi temperaturæ notæ.

Capit. Ixiiii.

Ventriculi natura siccioris indicium est, si confestim eo donati
 sitiant, & modico sint contenti potu, largiore grauentur, fluctua-
 tiones experintur, vel id quod redundat in ventriculo supernatet, ci-
 bisq; delectentur siccioribus. Humidiorem notant, si nulla sitis vr-
 get, & largior humor non molestat, cibiq; placent humidiores. Ca-
 lidior natura ventriculi melius sane concoquit, quam appetat, &
 dura potius, quæque difficulter possint immutari, calidis cibis, &
 potionibus oblectatur, neque a frigidis quicquam incommodi p-
 cipit, si modice vtať. Frigidior, appetēdo qdē valet, cōcoquendo mi-
 nus, præsertim si cōtumacia frigidaq; alimēta assumpserit, quæ facile
 in eo acescūt, frigidis qdē gaudet, sed imoderatius assumptis prōptē

hoc cere-
 brū aptis-
 simū in-
 genio et
 medita-
 tioni ē.

vsq; ad
 vigorē
 ætatis,
 quā cōst-
 stentiā q-
 dā vo-
 cāt. q dā
 tñ ipsam
 falso ne-
 gant A-
 rist. ip-
 sam ap-
 probau-
 te.

PAULI AEGINETAE

offenditur. At intemperies ex morbo contracta hac ratione ab infestis differunt, quod contraria sibi, non similia appetant. Strigitur venter probe concoctionem obit temperatus, si non concoquit, intemperatus est. Item si nidorosos edat ructus, immodicum est feruorem igneum fatetur, si acidus, contrarium. Rursus si rebelles concoctioni cibos probe concoquat, immodicum, si pisces concoquat, illos minus, imbecillum. quod num ex humore quodam aliunde influente accidat, considerare oportet. Etenim pituitosi, acidum, biliosi nidorosum graueolens. aliaque extraneas qualitates ructant. Cointer autem vtriusque nausea superuenit. verum si vitiosi humores in concauo ventriculi spatio supernatent, vomitu reiciuntur. qui aut corpore ventriculi contenti, tunicis eius adhærescunt, frustra eum obinam ad vomitum nauseam conturbant.

Pulmonis notæ.

Cap.

Ixv.

Non modo ventriculus sitim vel adfert, vel arceat, ac frigida calidæque potionis appetentiam facit, sed etiā quæ in thorace continentur viscera, cor, pulmo, & iecur. Verum qui ob horum caliditatem sitiunt, largius inspirant, expirantque longius, item sentiunt in thorace ardorem, non sicuti qui in ventriculo subter præcordia illum experiuntur. † Quinetiam si biberint, non statim sitire desinunt, ac frigida potio magis quā calida admodum sitim ipsorum restinguit, frigidus aut aer inspiratus refocillat, quum nihil ventriculi vitio sit ibudos soletur. Hac ratione qui e contrario affecti sunt, a frigido inspiratu sensibilem molestiam percipiunt, quod maximum pulmonum frigiditatis indicium est, adeoque pituitam creatu & cū tusi reijciunt. Sicci autem pulmones excrementis carent, & pituita, quæ admodum humidi excrementis sunt, & obsecram raucaque vocem efficiunt, ac recrementa ipsis interueniunt, vbi aut vehementius, aut acutius loqui studuerint.

αλαμπύς
φωνή πὸ
βῆν fulgi
da uox
dicatur,
quia co-
lorum no-
mina ad-
diuersa
quoque re-
rum ge-
nera qua-
drant, ut i-
probl. ē.

† Hæc verba ita leguntur in vetusto codice. καὶ μὲν δὴ καὶ πίνοντες, οὐκ αὐτίκα παύονται, καὶ τὸ ψυχρὸν ὀλίγον ποτὸν ἵσταν αὐτῶν, καλλόντ' ὀψις, ἢ περὶ τὸ πολὺ θερμὸν. Id est. Quinetiam si bibant, non statim sitire desinunt, ac frigida pauca potio magis quā multæ calidæ sitim ipsorum restinguit. Qui sensus huic loco magis conuenire videtur.

Cordis notæ.

Cap.

Ixvi.

Cordis calidioris notæ sunt, respiratio magna, pulsus velox & creber, itidem audacia, insanaque ferocitas, thorax ipsis hirsutus præsertim pectora existunt ac præcordiorum regio his vicina, magna vero ex parte totum quoque corpus calidum, nisi iecur valide renitatur. Quinetiam thoracis latitudo calorem notat, nisi &

hic cerebrum valde resistat. Porro cor frigidius, pulsus habet mediocribus minores, ac qui tale habent † timidi natura sunt & pusillanimes, negligentes pectore glabro. Cor siccus pulsus edit duros, Et præ-
iram excitat non proliuam, sed ferā & quæ non facile queat placari fertim
ri, magna vero ex parte vniuersum corpus reddit aridius, nisi iecur naturam
repugnet. Humidius cor testantur, pulsus molles, mores ad irā pro cordis
ni, sed quæ facile pacari possit, ac totum corpus humidius, nisi iecur tota ho-
resistat. Calidum & siccum cor ostendunt pulsus duri, magni, velot minus tē-
ces, & crebi, itē respiratio magna citata & frequēs. hoc donati cor peries et
de, maxime hirsutum pectus, nec non præcordia obtinent, impigri ingenij
tractandis negotijs, furibundi, temerarij, moribus tyrannicis. etenim differen-
ad irā procliuēs, quæ non facile conquiescat. Si autem humiditas cū tū con-
calore superauerit, tales minus hirsuti sunt, quā commemorati. pro- sequitur.
pti autem functionibus obeundis, neque tamen fero animo, sed ad Aristo.
iram pronoduntaxat existunt, pulsus in eis magni, molles, citati h. de par
& crebri. Humidioris frigidiorisq; pulsus quidem molles, mores, tibus
autem pusillanimes, timidi, & pigri, talium pectora pilis vacant. animal.
ac nequaquam irā retinent diu, quæ admodum neq; ad eandem pro-
cliuēs sunt. Frigidum & siccum cor, pulsus duriores & exiguos ef-
ficat. huiusmodi corde donati minime omnium iræ sunt obnoxij, sed
vbi semel eam conceperint, diu retinent, pectora ipsorum omnium
maxime pilis vacant.

† Auctor earum annotationum in Paul. Aeginetā, quas Cratæ-
derformis expressit anno. 1543. & Orosius locum hunc p-
uerterunt. Ita enim legendum putant, ἀτολμοὶ καὶ ἀμεληταί. cum
ex fide exemplaris vetustissimi artis parue Galeni (ex qua totus
hic locus desumptus est) quod Aldus sequutus est, legendum sit
μελληταί. μελλητής enim significat ὑπερθετικόν, id est, cunctatorē.
Et μέλλησις vel μελλησμός, id est, cunctatio propria eorum ē.
qui cor frigidum habent vt scribit Gal. lib. 2. περὶ κρῶσεων. Quod
autem Orosius ex Orbasio legendum putat καὶ ἀτολμοὶ εἰσι καὶ
ἀνδραγγοὶ καὶ ἀμεληταί, æque magnum vitium in ea scriptura.
Nam pro ἀνδραγγοὶ omnino legendum est ἀργοί, id est, pigri
Nam ἀνδραγγός affectus est cerebri potius quam signum, quo co-
gnoscas cordis frigidam intemperiem pro ἀμεληταί vero legen-
dum est μελληταί, vt iam ostendimus. Fere enim fit, vt curioli hi
διοςδωλαί, παρὰ διοςδωταί inueniantur.

Locinoris temperaturæ note.

Cap.

cxvii.

I Ecoris calidi notæ, venarum latitudo, flauæ bilis copia, per æta-
tis aut vigorē, et atræ, sanguis calidior, corpus totum et corpus exi-
bit, nisi cor obstiterit, præcordia & veter pilis obfita sunt. Frigidior-

P A V L I A E G I N E T A E

ris indicium, venæ angustæ, pituita copiosior, sanguis, totusque corporis habitus frigidior, nisi a corde incalescat, p̄cordia & v̄ter pilis vacat. Siccus iecur testatur sanguis crassior minusque redudans venæ duriores, ac vniuersa corporis habitudo aridior. Humidioris notæ sunt, sanguis copiosus & humidus, venæ molliores, sic et totum corpus, nisi cor restiterit. Calidi simul & sicci indicia sunt, p̄cordia maxime hirsuta, sanguis crassior et simul paucior, amara bilis copiosissima, ac in ætatis vigore, atra, venarum latitudo duritiesque, pari modo & totum corpus calidum siccumque. Si quidem calor a corde p̄cedens, frigiditatem a iocinore puenientem potest euincere, quemadmodum & frigiditas caliditatem, siccitatem vero non potest cor humidius ad contrarium perducere. Constat autem quod si in idem utriusque principii temperamenta concurrerint, totum omnino corpus illorum ratione affici. At humidum simul & calidum iecur, minus quam calidum & siccum p̄cordia efficit hirsuta, plurimum vero sanguinis, venas grandes, habitum humidum & calidum, nisi cor obstitat. Quod si utraque qualitas longius a naturæ modo recesserit, morbis quæ ex putredine vitioque humorum habent originem, corripiuntur, idque magis, si plurimum humiditas, parum caloris creuerit, ac humoribus vitiosi fiunt. Cæterum humidius frigidiusque glabra habet p̄cordia, sanguinem magis pituitosum, nec non venas angustas, totumque corpus similiter afficit, nisi cor ad contrarium deducat. Frigidum simul & siccum iecur corpus efficit, modico sanguine, venisque angustis. Et frigidius, p̄cordia glabra, nisi & hic cor superauerit.

Quia
ἐκ συν
δρομῶν
τῶν τε
αἱμάτων
πρὸς τὴν
σοφίαν
δὴν ποί
οι τῶν
κράσιον
γίνεταί

ex con
cursione
quatuor
prima -
rum ele
mento -
rum qua
litatum
tempe -
ramen -
tum con
surgit,
in hoc
enim sa
nitas co
sistit.

Testiculorum temperaturæ notæ. Cap. lxxviii.
Alida testiculorum temperatura, ad libidinem p̄clius est, foecunda, & masculos p̄creat, parteis genitales celeriter hispidas efficit, ac vicinas et attingit. Frigida contra. Humida, copioso ac humecto semine abundat. Sicca pauci & crassi seminis efficax est. Calida & sicca temperies mediocriter crassum semen p̄gignit, estque foecundissima, ac celerrime ad libidinem iam inde ab initio animalis itat. Tales itaque testiculi hispida statim genitalia, eorumque viciniam efficiunt sursum, usque ad umbilici regionem, infra usque ad media femora, ac eiusmodi temperamentum abunde venerem commouet, sed celerrime satiatur, & si copellas, offendit. Porro si humiditas calori fuerit coniuncta, hispidos quidem minus tales reddit, copioso autem semine magis abundant, non tamen magis quam alii appetunt, minus autem frequentior concubitu læduntur, si aut utraque & humidum & calidum impense creuerint, non sine noxa a venere abstinere. At humidi frigidique temperamento testiculi, vicinas parteis glabras reddunt, ac tarde concubere incipiunt, neque ad actionem excitantur, et aquosum, tenue, & inuolidum semen, ac foeminae efficax proticiunt. Siccum frigidumque tem-

peramentum, aliaquidem similia prædicto, crassius autem semen & plane exiguum progignit.

† Scriptura vetus huius loci est, ὁ ἀπὸ τῶν δὲ καὶ λαπτὸν αὐτοῖς τὸ σπέρμα καὶ ἄγονόν ἐστι καὶ διηλύγονον, Semen ipsorum est aquosum tenueq; ac infecundum, quem locum ita legendum esse facile ex arte parua Gal. atque adeo ex re ipsa intelligi potest. Sed id erratum Orosius prius emendauit.

Quæ prætermissa sunt.

Cap. lxxix.

Singulæ corporis nostri partes peculiarem quandam & temperaturam & uim sortitæ sunt, omnium uero notas hoc loco exponere necessarium non esse duco, quum infinitæ propemodum sint. & nos compendium scribere proposuerimus. Porro de his egimus, quæ potissimum totum corpus consortii quadam lege afficiunt, de reliquis eadem ratione & uia considerare præcipimus, temperamta ipsorum tum ab excrementis, tum ex reliquis functionibus, tum iis quæ superueniunt dignoscentes. Tempestiuum igitur est, ut oratione, conuersa doceamus quomodo totius corporis intemperies corrigi debeat.

Quomodo calida intemperies corrigatur

Cap.

lxx.

Quam itaque in calida intemperie bilis superet, si per inferiora descendit, notum est omnibus, nullum oportere negotium facessere, si ad superiorem venter tendit, vomitu euacuare, qui post exercitationem ante cibum factam aquæ potu cietur. Vtilius autem exercitium ipsis est, quod non velox ac ualidum, sed remissius leniusque. Nonnulli vehementer calidi nequaquam exercitationem requirunt, verum obambulatio balneumq; ipsis sufficit, iidem lauacris quoque secundum cibum oblectantur. Quibus adiuncta est siccitas, hiratione victus humectante indigent, ex cibis humectis, balneis, & exercitiorum valentium & multorum abstinentia. Quare per æstatem citius lauare, & a cibo rursus debent. Frigida hos potius iuuat. Venus autem siccis temperamenti maxime est inimica, cauenda ipsis lassitudo, insolatus sollicitudo, & vigilie humidæ et calidæ natura intemperies in pueritia morbis patent reumaticis, plethoricisq; et præterea iis qui putredini feruntur accepti. Itaque pluribus egent exercitiis, exacta in ventris concoctione excretioneq; per vrinas, quæ præter si etiã ante cibum bis terve lauent, utantq; aquis natura calidis, magnū sentiūt præsidium. Porro defluxionibus prospiciendū est, lauacris, multa exercitatione etiã ante cibum, vrinæ, aluiq; excretionibus. Nihil autem prohibet, etiam apophlegmatismis nonnunquam uti, & purgationibus, cibis boni succi, & vino quod vrinam moueat.

quia et una q; pars nostri corporis & quodq; membrū quatuor hēt virtutes Gal. de temp. & Arist. id cōfirmat.

quia nō tute pueris phar-maca adhibentur

PAULI AEGINETAE
Quomodo frigida intemperies emendetur.

Cap.

LXXI.

INter frigidas intemperies, tres numerantur differentie, ex quibus sicca est deterrima, quod enim processu temporis senescentibus obuenit, id statim ab initio hos affligit. Itaque humectare eos & calefacere oportet, quod commodè fiet exercitiis mediocribus, cibo humido & calido, vini calidioris potu, somno pleniore, cura tamen adhibita, ut quæ in corpore recrementa quotidie procreantur, omnia euacuentur. Cæterum venus omnes ficiores, & præsertim qui præterea frigidi sunt, offendit, solis autem calidis humidisque tuta. Porro vitiosa quæque frigida temperamenta sunt, quæ humiditatem habent coniunctam, & hæc potissimum rheumaticis corripuntur morbis. prodest ipsis balneo abstinere, largius exerceri, victus tenuior, vñctiones mediocriter calidæ. Qui autem frigidioris natura sunt, mediocriter vero sicci humidique temperamento, horum calor suscitari firmarique debet, ac in humiditatis siccitatisque totius victus specie, media deligi debet.

Quomodo sicca intemperies in ventriculo, veluti exemplo, deinde & aliæ corrigantur. Cap. LXXII.

Intemperies sicca, alia est, ubi solida simularium partium substantia reddita est siccior, quæ nihil in medicina spei habet, alia cum substantia, quæ ex humore concreto constat, est colliquata, tertia præter has, cum propria humiditas, unde partes nutriuntur, omnino est absumpta, quæ continetur in omnibus animalis partibus, rorior modo eis inspersa. hanc igitur particularis sine nutrimento inferere, nulla ratione queas, ideoque difficillima est omnium eiusdemmodi affectuum curatio. At quæ in exilibus arteriis venisque consistit siccitas, curationem recipit, si singulas simularium partium, propria humiditate, humectantis alimentii auxilio repleas. Balneum igitur temperatum conuenit, in quo diutius versari hominem expedit, inde statim lac exhibere asininum, quod recens multum fuerit, & pauxillum mellis tepidi adiectum habeat, postea conuiuere ad secundam usque lauationem permittes, tum modice fricabis simul & pinguius, utique si lac quod sumpsit, iam omnino confecit, id quod tum ex ructu tum ventris mole licet conficere. modicum vero temporis inter primam & secundam lauationem, interuallum erit, ut quatuor, aut quinque æquinoctialium horarum spatium intersit, scilicet si tertio adhuc lauare paras, sin aliter, plurium. Quinetiam post vnamquamque lauationem, hominem, priusquam se vestiatur oleo perungemus, ac si quidem lacte oblectatur, post secundam quoque lauationem id exhibebis, sin aliter, ptisanam diligenter incoctam,

aut

Quia
balnea
extenu
ant ni
mis en
eruant
que.

ἡ δὲ ἐπὶ
παράδει
γματος
ad speciem
ideæ quā
dam.

LIBER I.

aut ilico ad coenam. Sit autem panis præparatus illi purus, & qui curiose in furno sit coctus. obsonium quoque ex saxatilibus piscibus aut ex albo iure asellus, & ut paucis alimenti summam complectar, concoctu sit facile. nutriendus, minimeque glutinosum & excrementitium. potus, vinum aquosum & album, purum, & quod minimam, si diluitur, aquæ mistionem sustinet, oligophoron Græci nominant, modicæ astrictionis particeps, atque hæc maximæ siccitatis curatio est. Modica vero non tam exacto victu indiget, & plenior cibum admittit. Proponatur autem & nunc siccitas priori similis, copuleturque ei frigiditas mediocris, in qua ad calefacientium materiam transeundum est, ac commemoratis modo adiciemus, in lactis quidem usu, mel copiosius, vinum autem minus aquosum prior dabimus. Quinetiam esculenta omnia calidiora, idque non naturalibus modo ipsorum temperamentis, verum recentibus etiam qualitatibus, exhiberi debent. Nardino præterea vnguento vngendus assidue venter est, aut mastichino. At vero si cum siccitatis intemperie multa sit frigiditas, primum ipsam difficillimam & vix emendabilem censeto, eisdem vero utere, & melle per se discocto desputatoque, vinum autem eliges antiquius. Optimum sane medicamentum talibus est, quo picatores assidue utuntur. & illinere eo ventrem conueniet, ac post auellere etiamnum calidum. Cæterum iuuat eos probe carnosus puellus vna sic accubans, ut semper abdomen contingat. Iam vero multæ siccitati moderata caliditas iuncta esto. In eiusmodi sane intemperie primum curationis modum seruabimus, ita ut mel prorsus non degustetur, vinum vero exhibeatur quod minime sit vetustum. Porro cibos tepidos, lactis modo offeremus, & ventriculum oleo tum crudo tum melino perungemus. Verum hos vehementer admodum refrigerare periculosum est, quandoquidem hæc affectio, febris quodammodo naturam, ubi calor superarit, imitatur. Fingamus itaque rursus calidam intemperiem præpollere, huic autem adiunctam esse humiditatem. talem, frigidæ aquæ potu curabimus. huc optime facit usus ciborum astringentium, sed qui citra calorem sint austeri. Quum humida sola intemperies est, siccitates cibi, ita ut non calefaciant, aut refrigerent valide, auxiliantur, adhæc consuetæ potionis penuria. Si cum frigiditate humida urget intemperies, optima remedia sunt, omnia acria. misceri autem his debent etiam quæ sine manifesto frigore astringunt. optima simul his est exigua potio, eaque yni valide calfacientis. Hoc igitur modo intemperies qualitatum curantur. Quoniam vero sæpe in ipso ventriculi sinu contentus humor, interim autem in ipsas ventriculi tunicas absorptus, intemperiem procreat, non alienum est de his dis-

Oleo quod perungi a balneo laudat Hom. καὶ ἐχέσεν λίην ἐλαίου. ut poros a balneo rare factos stipet oleum consolidatque suppremam corporis cutem. Ita a balneo redeunt et a gymnasiis oculum comitari docet et M. Varro ca. lv. mos quoque fuit Persarum regem foueri a duabus uirginibus.

PAULI AEGINETAE.

mitum facile conquiescit, si autem rursus ex alia quapiā aliisue partibus confluxerit, exactam requirit dignotionem, curatio vero statim subsequetur. Etenim vniuersam eam parti affectæ oportet accommodare, cura adhibita, iis quæ recipiunt, ne facile quæ confluunt, admittant. Fiet autem hoc astringentibus & iis quæ totum corpus ad bonam habitudinem perducunt. At vitiosos in ventriculi tunica humores, mediocriter purgantibus educemus, cuiusmodi est aloë et ex ea confectum medicamentum amarum quod hiera picra dicitur. Verum quibus læta simul pituita ventriculo impacta est, iis prius exhibenda sunt quæcunque hanc dissecant, deinde purgatio tentanda. Quod si ad vomitum sunt idonei, ex sumpta radícula vomant. Sin nec lentus humor sit nec crassus, utique abunde est a ptisanæ cremore vomuisse, item a mulsis, proficit & absinthii succum in mulsis bibere, reliquarum vero partium intemperies haud absimiliter curare oportet, ita ut humoribus idoneos effluxus inuenias. Nam si particula sensibilem, effluxum non habeat, redundantem in ea vel saniem vel humores, quemadmodum si id quod continetur, spiritus sit flatulentus, eua portatu discutere ac vacuare conuenit.

De alimentorum facultatibus.

Cap. lxxiii.

QUum de alimentorum facultatibus sermo, pars sit operis quod de sanitate tuenda præcipit proximum est ut iam dictis eum subnectamus, ubi prius quæ particulatim ipsa persequamur, paucula quædam prælibauerimus. Quippe alimentorum vireis, si quid aliud, preceptas habere conuenit. Quæ igitur attenuandi virtutem obtinent, meatus aperiunt, viscosa adhærescentia abstergunt, crassa incidunt extenuantque. Quod si diutius ea in cibo adhibeas, serosabiliusque contrahes recrementa, ac si vberius ingeras, sanguis atra bile vitiosus redditur. Quare continuus ipsorum usus præsertim biliosis temperamento vitari debet, conueniunt. n. solis iis, qui pituitam, humoremque crudum, lentum, & crassum collegerunt. Porro quæ incrassandi viribus constant, valentis admodum materiæ sunt, & si in ventriculo ac iocinore decenter fuerint concocta, boni succi sanguinem producant, sed lienem & iecur obstruunt. Ex his alia sunt crassi duntaxat succi, ut lenticula, alia viscosa, sicuti malux. quibusdam utraq; contingunt, nempe ut & crassi sint succi, & glutinosa, ut testaceo tegmine prædita. Itaque videtur extenuans ad sanitatem tuendam tutior quam qui incrassat, existit. Quum vero imbecillis sit materia non robur nec vireis corporibus suppeditat, ac oportet nonnunquam valentis materiæ cibum, quum inedia quædam præssit, mediocriter exhibere præferimus, verum

tra periculum assumunt qui se exercent, & quantum libet dormiunt. omnes autem quibus ante cibum exercitari non licet, crassi succi alimenta euitabunt. Imo neque in otio degentes eiusmodi cibos assumunt. Porro quemadmodum summum otium maxime valetudini tuendæ obest, ita mediocris motus summum adfert præsidium. Cæterum cibi inter eos qui incrassant & attenuant, medii, omnium sunt laudatissimi, ut qui mediocrem substantia sanguinem procreant. Talis itaque cibus corporibus nostris congruit, qui autem vitiosos humores gignit, noxius est, eoque semper cauere debet. Iam & varia ciborum genera assumere, cautio est, præsertim si ex diuersis constet facultaribus. ingesta enim concoctionem non, ut par est, fortiuntur.

De oleribus.

Cap. lxxliii.

LACTUCA manifesto & refrigerat et humectat, eoque somnum accersit. ut autem inter olera valenter nutrit, ita boni succi sanguinis efficax est. Intibum frigidi humidique temperamenti, sed minus quam lactuca existit. Malua refrigerat quidem, sed non euidenter, magis autem humectat, unde etiam aluum subducit, idque propter genuinam eius viscositatem. Beta ut absterforia ventrem subducit, eoque stomachum largius comesta erodit, iecoris lienisque meatus aperit. Brasica bis cocta si edatur, aluum cohibet, semel autem non tamen vehementer cocta cum oleo & garo, vel sale comesta, magis subducit quemadmodum succus ipsius etiam lenticulæ efficacius purgat. Hac magis adhuc marina brasica aluum emollit, manifesto salsa, & subamara, idem præstat halimon, amplioris autem salis qualitatibus particeps, aluum subducit, magis quam brasica stomacho conducit, seu astrictiois modicæ compos. lac, & semen producit. Blitum & atriplex humida quidem & ventrem solvunt, sed parum alimenti præstant. Omnia spinosa ut scolimos, attracti-
lis, eiusque generis alia stomacho præter cinaram conducunt, quæ cum dura euaserit, improbum succum præcreat, quapropter optimus est, in coctam cum oleo, garo, & coriandro assumere. Apium, hipposeelinum, si-
& smirnum, omnia urinae ciendæ sunt, sed smirnum aromaticum spirat, magis acre, urinae ducendæ proficit, et mulieribus mensis commouet, apia suauiora sunt, ideoque stomacho magis amica. Eruca calida est, & seminis efficax, ob quod libidinem & capitis dolorem, quam cephalæam dicunt, excitat. Nasturcium, ocimum, & sinapi, calida quidem & acris, sed maxime nasturcium, cooctu vero difficilia, stomacho inimica, et vitiosi succi. Vrtica extenuat, ventrem subducit modice, alit. ferere. Prior itaque affectio si semel radices egerit, purgatione per vo-

est dictum
sapietis-
simorum
hominum
cibi loco
ea esse
se debe-
re, quæ præ-
ter cibi
usum ali-
quam
quoque fa-
cultatem
medicam
haberent.
atriplex
ἀτρίπλεξ
ἔστι.

PAULI AEGINETAE

Gingidion simile est scandici, astringentis & non parum amarae qualitatis particeps. praeterea stomacho congruit, ut etiam cibum fastidientibus cum aceto assumptum, proficiat, parum vero alimenti corpori ministrat. Porro sylvestria dicta olera maxime vitiosos gignunt humores. Capparis cibi cupiditatem proritat, iecoris lenisque meatus aperit, pituitam subducit. Utendum vero ea est ante cibum alium, ex oxymelite aut oxelæo.

De asparagis.

Cap. lxxv.

BLiti, lactucæ, atriplices, maluæ et betæ, planta quidem humida est, asparagus autem siccus. Contra, raporum, sinapis, radiculae, nasturcij, pyrethri, brassicæ omniumque aliorum quæ calida sunt, planta quidem sicca, asparagus autem humidus est. At a spinosis stirpibus palustris & hortensis, asparagi, item qui a bryonia decerpuntur stomacho quidem utiles sunt, & urinam citant, sed inualide alunt. At si probe coquantur, magis quam si qui ex oleribus sumuntur nutriunt. Consimili modo & chamædaphnes asparagus agit.

De his quæ radices esculentas habent. Cap. lxxvi.

quia ex
aerea &
humida.
nam con
flat.

Napus & rapa si bis coquantur, nihilominus quam reliquæ stirpes alunt, continue autem assumpta, crassum succum procreant. Bulbi astringunt, abstergunt, cibi cupiditatem mouent, stomachum confirmant, & viscosos pectore humores eliciunt, bis incocti valentius quidem nutriunt, sed nihil emolliuntur, amara ipsorum qualitate sic abolita. praeterea semen genitale augent, libidinemque excitant si largius vtare. item inflationes & tormina, pariunt. Quod si ex aceto cum garo & oleo edantur, suauissimi sunt, flatu non generant, valenter alunt, concoctu faciles. Pastinacæ vero, dauci & cari radices quidem minus quam rapa nutriunt, calidæ autem aromaticæque manifeste sunt, & urinam cient, Si vero immoderatus vtatur aliquis, vitiosos humores gignunt & ægre concoquuntur communi radicum ratione. Nonnulli sylvestrem pastinacam daucum nominant, efficacior ad urinam ciendam virtute præditum. Radicula quæ græcis raphanis dicitur extenuandi calefaciendique vireis obtinet. sumitur recte ante cibum ex aceto & garo,alui ducendæ gratia, secundum cibum, nequaquam. Ceba, allium, porrum, & ampeloprassum acri virtute donata, corpus calefaciunt, extenuant, & crassos in eo humores incidunt, bis cocta, parum alunt, cruda, omnino nihil. Atqui allium magis meatu refert, humoresque discutit. Sunt autem porris ficciora ampeloprasa, utpote sylvestria. In totum omnia cruda olera, si edantur, peiores quam cocta succos procreant ac plus humoris excrementitij continent. Verum quæ condita vel muria vel oxalme reponuntur, stomacho prosunt & appetentiam

LIBER I.

excitant, crudos humores incidunt, sed ægre concoquuntur, & si abutare, vitiosos succos gignunt.

De tuberibus & fungis.

Cap. lxxvii.

Tuber humorem de se reddit qualitatis expertem, sed frigidiorē & crassi succi. Fungi vero frigidi pituitosi & mali succi sunt, in his ipsis minus nocentes boleti sunt, qualitatis expertes, si probe coquantur. Qui vero ammanitæ dicuntur, secundum ab his ordinem obtinent, aliis fungis abstinendum, plerique siquidem ipsorum lethales. Ac ipsi boleti nisi exactius decocti edantur, periculi occasionem frequenter præbent.

Si probe coquantur hoc est si expurgantur.

De frumentaceis.

Cap. lxxviii.

Ex iis quæ frumentacea nominantur, chondrus egregie nutrit, & glutinosos parit humores, verum elotus, prauus habetur, quoniam prompte crassescens, concoctionis expertus permanet. probatur magis cremor chondri, si totus probe ptisanæ modo fuerit decoctus. Alica in cæteris chondro quidem respondet, sed alium magis astringit. Triticum, elixum sane, concoctu difficile est, & inflationes creat, ubi vero concoctionem expertum est, alimentum præbet valentissimum. In panem autem coactum minus inflat, minusque ægre concoquitur, utpote fermenti & salis particeps. Inter panes firmissimus est siligineus, deinde ex simila, tertius a quo cribro nihil excussum est, Græci syncomiston quasi dicas confusaneum appellant. Sordidus panis minus quidem nutrit, sed magis per aluum deicitur. Amylum parum alimenti præstat, quemadmodum & panis elotus. Ordeum frigida facultatis est & absterforiæ ptisanæ modo incoctum, humectat, torrefactum, quemadmodum in polentis fit, desiccatur. Polenta per æstatem ante balneum cum aqua pota, fiti medetur. Panis ordeaceus fragilior est, & parum nutrit. Maza difficilius concoquitur, flatusque magis quam panis ordeaceus gignit, melle autem adiecto aluum citat. Avena & calida est, & imbecillis materiæ. Milium & panicum refrigerant, siccant, pauxillum nutriunt, & aluum cohibent. Omnino autem milium panico est præstantius. Oryza vix concoquitur parum nutrit & ventrem retinet. Porro ptisana in hunc modum coquitur, vni eius parti, aquæ quindecim et olei momentum adiiciuntur, ubi ebullierint, acetum quoque addes, quum iam exacte cocta fuerit, sal tenuis superiniicitur, in quibusdam porrum, & anethum ei miscant, Cæterum avena chondrusque in ptisanæ modum decoquuntur.

Sordidus panis minus nutrit, magis autem per aluum deimitur.

De leguminibus.

Cap. lxxix.

Ex leguminibus lenticula vitiosum succum, & melancholicum producit, imo etiam, præsertim bis cocta, aluum cohibet. deco-

C 3

PAULI AEGINETAE

a fabis
poiissi-
mū pi-
thago-
rici ab-
stinebāt
vnde et
quā pi-
tagori-
ca foemi-
na coa-
cta a ti-
rāno red-

dere cau-
sa, quare
nō ede-
ret fabā,
expuit
in os cu-
ius lin-
guā deli-
abscis-
sam.

cum vero ipsius cum oleo & garo potum aluum prorit. at quia inflationes mouet, satureia, vel pulegium admiscendum est. Fabæ leues sunt, inflant & abstergunt. Aegyptia autem faba humidior nostra est, & excrementicia. Pisum laxum quidem, non tamen ad o flatuqsum est. Cicer inflat, abstergit, genitale semen auget, libidinem incitat, & calculos confringit, frictum, minus quidem inflat, sed ægre cōcoquitur. Lupinum concoctioni rebelle, haud facile per aluum transmittitur, crudi humoris efficax. Fœnu græcum si ante cibum sumatur, calefacit, & aluum mouet. Ochron & phaselum macerata donec etiam radices succreuerint, ex garo ante cibum sumpta, aluum subducunt, ac plus quam fœnugræcum alimenti exhibent. At phaselum & dolichon integra cum filiquis viridia comesta, excrementicia magis redduntur.

De temporariis fructibus. Cap. lxxx.

Curbita refrigerat humectatque, & ventrem subducit, sed parum alit. Pepon totus vitiosi succi est, frigidus, humidus, & vomitioni dicatus, non coctus, bilem generat. semen eius urinam citat & calculos in renibus confringit, ac in totum, abstergit vehemēter. Melo pepon omnia quæ de pepone dicta sunt, inualidius efficit. Cucumer minus pepone frigidus, humidusque est, sed acrius cit urinā, difficilis concoctu & vitiosi succi, etiam si concoctus fuerit. Summatim omnia poma refrigerant humectantq, imbecilliter alunt, & vitiosum humorem progignunt.

De arborum fructibus. Cap. lxxxi.

Ficus & vuæ inter omnia poma principatum obtinent, ut quæ minus vitiosos humores generent, & magis nutrant. Inter hæc ipsa ficus probioris succi lunt, valentiorisque materiæ aluo, & urinæ ducendæ, renibus purgandis idoneæ, præsertim admodum maturæ. Idem præstant caricæ, quanquā inflationes & sanguinem non probum pariant, eoque frequentius vsurpatæ, pediculos procreant. Vuæ, si non descendunt, non quidem concoquuntur, verum etiam crudū humorē generant, sin aut deiciant, moderatiores sunt. Vuæ passæ aliis calidiores sunt, stomacho gratiores, valētius alūt, sed minus subducunt aluum. Mora quæ alias ficamina Græce appellatur, ipse se humectant, mediocriter refrigerant, ac ante alios plumpta, ventrē soluunt, non admodum ingrata stomacho, sed exigui alimenti. Ex cerasiis, dulciora quidē aluū subducunt, verū stomacho inimica, quibus inest astrictio minus quidem stomachum lædunt, sed non ventrem citant. Atque hæc ratio tum in viuis & moris, tum in alijs cōpluribus seruatur. In vniuersum, astringentia si prius ante alium ci-

bum aut eduntur, aut bibuntur, alium comprimunt. quibus autem ob imbecillitatem venter non respondet, ii molliendi virtute prædita, nempe olera aut pisces, aut id genus aliud præsumunt, deinde astringentia, quæ dum ipsum firmant, deorsum propellunt, & ad excretionem incitant. Pini nucleus, qui & strobilus dicitur, boni quidem succi est crassiq; & ad nutriendum valens, non tamen ex facili concoquitur. Persica pravi succi, acidiq; sunt, & facile corrumpuntur, eoq; primum exhiberi debent, quo protinus deiciantur, nullamq; in ventriculo diutius immorata, corruptionem sentiant, præcocia, duracina & armenia, persitis præstant, neque enim acefcunt, neque similiter corrumpuntur, ac sunt etiam gustu gratiora. Malorum, dulcia sane alijs calidiora sunt, & facile in corpus distribuuntur, præcipue vel assa, vel elixa, acida, magis refrigerant, & humores ventriculo impactos incidunt, atque his magis cotonea. Idem præstant pira grandia maturaq; præterea etiam valentius nutriunt. Mala punica frige faciunt, & parum alimenti præbent. Mespila sorbaque vehementius astringunt, eoque aluo fusæ accommodantur. Palmulæ, nisi admodum sint pingues, stomacho prosunt ventrem retinens, crassos, glutinososq; humores gignunt, capiti faciunt dolores. Ex oliuis, drupæ stomacho aduersantur crassi humoris efficaces, muria conditæ, & colymbades, si ante cibum sumantur, appetentiâ faciunt, et aluum subducunt, ac magis quæ ex aceto & oxymelite præparantur. Inter nuces, iuglans, auellana minus nutrit, stomacho gratior. Nux viridis humidior est, & ventrem citat, arida, si vbi in aqua commaduertit membrana ipsius interior adimatur, consimilem uiridi potestatem obtinet. Amygdala incidendi extenuandique viribus pollet, ideoque viscera & thoracem expurgant, idque efficacius amara. Similiter & pistacia, verum iecur efficacius obstructione liberat. Damascena ante cibum sumpta & cruda, & in mulla elixa ventrem soluunt. Syrica ægre coquuntur, stomacho noxia, modiciq; alimentum. Siliquæ ægre conficiuntur, aluum cohibent, et humores creant vitiosos. Sycomora manifesto et frigefaciunt & humectant. Citrei mali pars exterior acris & concoctioni rebellis est, caro valenter alit, & ipsa ad concoquendum contumax. interior pars siue acida, siue aquosa fuerit, abunde refrigerat. Glandes non minus quam frumenta cæa alunt, sed concoctu difficiles, crassi succi, & tarde permeant. Castaneæ omni ex parte his præcellunt.

De animalibus, & primo de volatilibus.

Cap. I lxxxii.

A Nimalia quæ volatu nituntur, minus quidem quam quæ pedibus fidunt, & præcipue quam sues, alunt, sed propius cōco-

oliuæ
druppæ
hoc est
crudæ
et ab ar
bore de
ciduæ

PAULI AEGINETAE,

Colubæ quuntur, magisq; perdix, attagena, pullus columbinus, gallina, & magis a phasianus. At turdi, merulæ, & exigui passerres, inter quos sunt et a turribus ubi nidificant pyrgitæ appellati, durius alimentum præstant, atque his magis adhuc turtur, palumbus, & anas, sed multo durius, concoctu difficilior, magisq; fibrosum pauo exhibet. Anserum vero & struthiocameli caro excrementicia, ægrius quam omnia commemorata concoquitur, si alæ excipiantur, quæ non minus quam aliarum avium probi succi existunt. Porro gruum caro fibrosum durumq; præbet alimentum. In totum iuniora veteribus humidiore sunt, promptius concoctioni parent, valentiorum cibum præstant, atque per aluum facile descendunt. Similiter elixa ab assis, & in sartagine frixis differunt. Iam quæ in siccis locis & montosis proveniunt, citius concoquuntur, minusq; excrementicia sunt, quam quæ in paludibus nutriuntur.

Ex ouis
i sole, sic
catis vi
vere qu
osdā po
pulos
Her, test.

De ouis.

Cap. lxxxiii.

OVa gallinarum, phasianorumq; omnibus præstant. Anserum & struthiocamelorum prava habentur. Ex omnibus autem recentia veteribus multo sunt præstantiora, ac tremula plus alimenti habent, sorbilia magis descendunt, ac faucium asperitates leuigant. Reliqua omnia ad concoquendum rebellia, tarde transeunt, & succum gignunt crassiorem, præter ea quæ pnieta dicuntur, hæc autem sunt si cruda immergantur in aquam calidam cum garo, vino, & oleo, & in vase mediocriter coagulentur. Huiusmodi enim coqui facilia & boni succi habentur. Omnia vero quæ sartagine friguntur deteriora sunt.

De pedestribus animalibus.

Cap. lxxxiiii.

INter animalium quæ pedibus fidunt, carnes, suilla maius quam alii cibi alimentum præbet, eo quod gustu & odore familiaritatē cum humanis corporibus sortita est, ut nonnulli qui imprudēter humanas carnes gustarunt, cognouerunt. Alimentum vero quod ex illis contrahitur, viscosum est, & non facile in membra potest distrahi. Ouilla excrementicia prauisq; succi est. Caprilla acris est, malumque succum efficit. Deterrima hircina, siue succi bonitatem, siue concoctionem respicias. Bubula melancholicum humorem facit. Leporina crassi succi est, sed minus quam ouilla & bubula. Ceruina dura est, & concoctioni rebellis. In totum, iuniora vetustis humidiora, mollioraq; & ad concoctionem faciliora sunt. Hoc modo etiā castrata non castratis, bene habita macris præstant.

LIBER I.

De partibus animalium & sanguine.

Cap. lxxxv.

Summæ corporis particulae nervosae sunt, citra pinguedinem, & sex carnes. eoque glutinosae, exigui alimenti, ac ad aluum mouendâ efficaces, si excipias quæ volatu nituntur, ob nimiam siccitatem.

Rostra & aures cartilaginosa, ad concoctionem sunt pertinaces. Lingua, est fungosa laxa ve, exanguis, parum alimenti habet.

Glandulae suaves sunt, & friabiles, sed mammarum, præcipue scropharum, quum lacte scatent, dulciores habentur, hæ autem non minus quam carnes alunt. Renes & testiculi gustu insuaues & concoqui difficiles. At saginatorum gallinaceorum testiculi & suaves sunt,

& probum corpori alimentum præstant, quemadmodum taurorum, hircorum, & arietum concoctioni resistunt, & vitiosos creant humores. Cerebrum pituitosum, crassi vitiosi que succi, lente transit, concoctioni aduersatur, stomachum lædit, & nauseam excitat, si autem probe coquatur plurimum exhibet alimentum. Medulla pinguis, & cerebro suauior est, in cæteris ei respondet. Pinguedo & adeps pauci alimenti sunt, & stomacho nocent. Cor & iecur crassi succi, ægre concoquuntur, & lente transeunt. At suillum iecur aliis præstat. Lien tum vitiosi succi est, tum melancholicum humorem efficit. Pulmo

facilius quidem, ut pote fungosus, concoquitur, sed leuiorem cibum præbet. pituitæ generandæ efficax. Ventriculus, vulua intestinaque, dura, concoctioni aduersantur, pituitæ efficacia. Summatim fera animalia sicciora quam domestica alimentum exhibent, minusque excrementicium. Sanguis quilibet, uix concoquitur, præsertim crassus, & melancholicus, qualis nimirum est bubulcus, leporinus, ut pote suauissimus commendatur. Ac multi ipsum cum iecore solent incoquere. quidam vero, & cum aliis visceribus. nonnulli & iuuenis porci sanguinem edunt. Caprillum vero nonnullos comedisse, etiam Homeros testatur.

De lacte.

Cap. lxxxvi.

Lac coctum probe nutrit gingiuis autem & dentibus nocet. quapropter ubi assumptum est, primum mulsa, deinde vino astringenti os colluere oportet. Item caput tentat, præcordia, ventremque inflat, calculos in renibus gignit. Ac humidius, minus quidem alimenti præbet. sed magis aluum proritat, crassius autem e contrario, magis alit, minus descendit. At caprillum lac, mediocri consistentia est, sicut ouillum, crassius, et quod statim a partu redditur tenuius est, procedente tempore crassius, deteriusque efficitur.

De lactis potione.

Cap. lxxxvii.

Qui lac potare voluerit, ab alijs abstinere cibis debet, donec concoctum fuerit, et inferius descenderit. Satiùs itaque est ma-

Quia o
mne mē
brū ali-
mētū ge-
nerat sui
simile.

Carnes
vero sa-
lubrio-
res quæ a
musculis
sunt la-
bore ma-
gis exer-
citis. Ga-
le. Aris-
t. p. p. mo-
tu & p.
saltus e-
xercita-
tionem.

PAULI AEGINETAE.

ne recens multum bibere, ac post id nihil assumere, nec non labores nimios deuitare, vt quod laborantibus necessario acelcat, sed lente obambulare satius est, & interea vigiles, conqueskere, hoc enim pacto quamprimum per aluum descendit: Vbi deiectum fuerit, aliud bibendum est, ac si hoc quoque descendat, aliud. Initio itaque purgatur vtiliter, non quidem copiosum ex reliqua corporis mole, sed quae in ventre continentur, mox venas ingreditur, ac optime nutrit, atque non amplius deiecitur. Porro in biliosis fluxionibus, & quum syntexes, hoc est colliquamenta corporis ad ventrem concurrunt, coctum lac exhiberi debet. Coquetur autem primum lente paulatimque, vt pars descendat, pars consumatur, deinde magis, ac magis incoquetur, cura adhibita, neu duratur, aut in caseum coalescat, quod optime fiet, si leuiter ipsum coquamus, et agitando id quod recesserit vndique abradamus. Agitabitur autem ferula leui & tenui, & si quid oris olae inferuecat, hoc quoque spongia adimere oportet, id enim subinde etiam reliquum lac corrumpit. Eo igitur modo quo dixi lac coquendum est, vsque dum aequabiliter crassius dulciusque crudo euaserit. Quod in eo tenue est & seorsum calculis marinis ignitis in id demissis, ebibitur consumiturque. Atque hoc alui fluxionibus, praesertim biliosis est accommodatum.

De lacte scisili.

Cap. lxxxviii.

Serosa lactis portio a caseo discernitur, si vehementius ad ignem. S largiorem citra fumum excoquatur, deinde colo, aut panniculo exacte traiciatur. Porro miscetur sero mellis momentum, aut oxymelitis aliorumue, daturque subducendi ventris gratia, aetate quidem florentibus ad duos sextarios, iunioribus, non minus sextario. Quod vero marinis calculis ignitis aut ferro candenti demisso lac ineraffatum est, intestinorum torminibus & alui profluuijs recte exhibetur.

De caseo.

Cap. lxxxix.

Omnis casus acris est, sitim facit, aegre concoquitur, vitiosos succos, calculosque generat. Laudatior est recens, laxis, mollis suavis, & modici salis particeps, qui secus habet, pessimus est.

De piscibus.

Cap. xc.

habēt pi
sces quo
que ana
lugiū a-
iobus.

Omnēs pisces frigidioris, humidiorisque temperamenti esse, nulli non constat. Omnium vero optimi sunt, saxatiles, ad concoquendum prompti, bonique succi, modice humectant, vbi non dum ram carnem occupauerint. Verum ex non saxatilibus, pelagii, multum ab iis variant, qui in limo nutriuntur, vel in fluuij ostio, sed omnium deterrimi qui vel in stagnis vel mari stagnante viuunt. Particulatim vero capito si pelagius fuerit, mediocriter suavis est, minus concoctioni rebellis, & boni succi, sanguinem vero gignit tenuio-

rem imbecilioremque. similia & lupus præstat. Mullus qui & ipse pelagius est, alijs piscibus durior est, fragilis, concoctu facilis, validæ ad alendum materiæ, suavis & pinguedinis expers.

De testaceis. Cap. xci.

Generatim pisces qui testa conteguntur, Græci vocant ostracoderma, falsum crudumque humorem producunt. Ex his ostrea molissimam carnem obtinent et facilius descendunt. Chamæ vero, purpuræ, vngues, spondili, buccina, cochleæ, atque huiusmodi alia dura. Ac quæ molli testa integuntur, malacostrata græcis nominantur, nempe gammarii, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, concoctioni repugnant, sed alimentum præbent & venter comprimunt, si in aqua dulci sæpius decoquantur. Omnibus vero crustatis inest succus, aliuo subducendæ utilis, eoque etiam terrestribus cochleis. Ac quum hæc duram carnem, concoctu difficilem, valentis materiæ & succis vitiosam sortiantur, nonnulli ius ipsorum cum oleo & garo conditum, ad aliuo subducendam adhibent. Echini modice frigefaciunt, exigui alimenti, & urinae ciendæ efficaces.

De mollibus, quæ malacia dicuntur.

Capit. xcii.

Molles cute pisces, utpote polipi, sepia, loligines, dura carne & concoqui difficiles sunt, præcipue polipi, falsum humorem modicum obtinent, concocti autem non parum alimenti corpori exhibent.

De cartilagineis. Cap. xciii.

Artilagineorum quæ selache Græci dicunt, torpedines, pa-
cstinacæ, mollem suavemque carnem occupant, quæ celeriter descendit, facile concoquitur, & probe alit. Raia, leuiraia, squatina, atque eius generis reliqua, duriora sunt, concoctioni reniuntur, & valentius nutriunt. In summa, quibus dura caro est, & ægre concoquuntur, & plenius alunt, ubi vero concocta fuerint, copiosum solidumque alimentum præbent.

De cetaceis.

Cap. xciiii.

Etacea, utpote balenæ, vituli marini, libellæ, delphini et præ-
cgrandes thinni, duram, concoctu difficilem & crassi succi carnem habent. Sale condita eiusmodi moderatiora efficiuntur, iam qui ex alijs piscibus humidiores habentur & magis excrementici, ad condituram magis sunt accommodi. Talis autem in condituris est differentia, qualis & piscium, unde conficiuntur.

capito, idest cephalus piscis.

q. ex putri nascitur.

sequitur ordinem Arist. in libr. de historia anim.

PAULI AEGINETAE

De vini viribus.

Cap. xcv.

πρὸς τοὺς
ἀσθενεῖς
ὁ νοσῶν
με. vi-
num au-
get mul-
tu vires.
Illud sci-
endū in
primis a
vino ful-
mine ge-
lato la-
cte, fru-
ctibus,
carnibus
animan-
tū fulmi-
ne ictis,
et ab vn-
guentis,
liquori-
busq; es-
culētisq;
i domo
fulmina-
ta sūt, eē
abstinen-
dū. iōq;
peste af-
ferūt &
demen-
tiā. Sca.

Qui sanitatis tuendæ curam susceperit, eū quoq; vini facultates cognitās habere expedit. In vniuersum itaque vinum omne nutrit, verum rubens & crassum, magis, boni autem succi non est efficax. Item dulce & ipsum quidem impense nutrit, sed stomacho nocet, Austerum stomacho quidem amicum est, verum ægre in corpus distribuitur, leuiusq; alit, hoc autem minus, album. Præstantissimum est colore fuluum. Porro vetustius nouo magis & calefacit et deficcāt. hæ igitur vini sunt facultates, veluti summatim expositæ. Cæterum vinum calorem genuinum refocillat, vnde concoctio melior, & sanguis probus euadit, cibum per omnia corporis membra, vt quod facile penetret, deducit. Quamobrē ex morbo emaciātos reficit, corpusq; ipsorum auget. Etenim cibi cupiditatem facit, pituitam extenuat, bilem per vrinam educit, & bonum colorem conciliat, animo læticiā, voluptatemq; parit, & robur adijcit. Harum itaque commoditatum moderata vini potio, immoderata vero contrariorum occasionem præbet, eoq; temulenti, animo turbantur, desipiunt, & graui somno quæ cataphora dicitur premuntur, qua de causa immodica vini potio diligenter vitanda est, quanquam longiore temporis spatio interposito liberaliter bibere conducat. ita nā que vrina largius & sudores promouentur. Vincit autem mox vomere, assumpta prius mulsa, quo ne paululum quidem ab eo noxæ percipiatur. Qui igitur potationi indulgebit, alio cibo non admodum repleti debet, sed inter potandum brassicam elixam esse, & bellaria præsertim amygdala assumere, vt quæ capitis dolores leuent, et vomentibus nihil adferant molestiæ. Præstaret autem absinthij dilutum ante potionem bibere, vt quod omnium maxime crapulæ discutiendæ sit efficax. At si quis rosionem a vino sentiat, frigidam bibet, insequenti die, absinthij rursus dilutum, obambulatione itidem, frictionibus, balneo, & exiguo cibo reficietur.

De melle & mulsa.

Cap. xcvi.

Mel coctum valentius nutrit, q̄ subducatur aluum, non coctū, e contrario, ac frigidis humidisque temperaturis conducit, calidis, in bilem vertitur. Mulsa vero non admodum biliosis utilis est, vt quæ in bilem degeneret. Itaque in eiusmodi naturis dilutior mulsa recte dabitur, iis qui viscera habēt affectibus opportuna, incommoda est. Cæterum hoc modo præparari mulsa debet. Octupla aquæ portio melli admiscetur, incoquiturq; donec spumare desinat. spumam vero continenter ab ea tollere, simul atque orta est oportet.

De somno.

Cap. cxvii.

Postea quam omnia quæ ad victus rationem spectāt, sumus ex-

cuti, superest vt de somno, eo quod omnium postremus magna ex parte initur, differamus. Itaq; somnus virium animalium (vt ita dicam) requies est, vtili humiditate cerebrū madefaciente proueniēs. Qui si recte ineatur, multa præstat commoda, cibum elaborat, humores excoquit, dolorem lenit, lassitudinem solatur, intenta laxat, animi vero ægritudines obliterat, rationem vitiatam corrigit. Porro tempus somni optimum est a cibo. sed diurnus haud omnibus est idoneus. Tempus enim quo obdormiscunt ad absolutam ciborum concoctionem non sufficit. interrupta enim ante horam suam concoctione a meridie resurgentes, subinde acidus ructus ædunt, & flatibus replentur. Nonnulli vero fluctuatione ventris infestantur, nisi vel ex consuetudine, vel sufficienti somno vsi, eiusmodi mala effugiant. Cæterum optimus somnus est nocturnus, quoniam nox naturali humiditate, silentioq; animum in somnum deducens, absolutam molitur concoctionem. Item post somnum nocturnum plurima parte ad excretionem recrementorum instigamur. Terminus autem somni esse debet perfecta ciborum concoctio, quæ tum ructibus, tum ventris contractione deprehenditur, secundum quam vigilantia non inutilis, vt quæ recrementorum ex cōcoctione deiectionem moliat. *De vigilijs.*

Cap. xcviii.

Vigilias quæ laborantes iam affligūt, ex dolore, aut febris, aut actiōe quodam casu oborientes, secundo libro de Febris perfequemur. quæ autem sanos infestant, hoc loco nobis exponendæ sunt. Si igitur aliquis ob moerorem, aut curam, aut quandam animi ægritudinem vigilauerit, primum id quod molestat, quatenus licet protinus amputabimus, deinde suauium sonorū auditu mens a sollicitudinibus abducenda est, id quod nonnulli leni aquæ murmure machinātur, qui enim sic permulcentur, somno facile capiuntur. Præterea balneis præsertimq; vespertinis quum bene concoxerint vtentur, ciboque humectanti vtpote lactuca & id genus alijs, nonnunquam nigri papaueris folia viridia obsonijs admiscebunt. Piscibus ad concoctionem promptis, vino largiore tenui & nō vetusto recreari debent. Dormituri rosaceo caput perungent, aut oleo in quo papaueris capita, aut mandragora sint incocta. item anethinum non vetus somnum accersit. Noui autem qui post lassitudinē quiete subito succedente, somno caperetur. Adhæc venus moderata idipsum præstat. Alii caput aut pedes refrigerantes, facile somno corripiuntur. At si ex cibi copia vitiove stomacho grauato vigilauerint (nam hoc etiam accidere nouimus) quemadmodum rursus alii præter cōsuetudinem inedia pressi, aut modico cibo sumpto, vigilijs sunt in-

Sōne pā
rens ho
minūq;
deumq;
Hom. di
xit, q; re
quies vi
detur cē
naturæ
viuētū.
grauita
tē capi
tis facit
nimius
somnus
Aris. ii.
de partib;
bus ani.

PAULI AEGINETAE

festati, considerare id ac causam succidere, oportet.

De sopore vehementi quæ cataphora græcis appellatur.

Cap.

xcix

AT si e contrario alti vehementesque somni, quæ cataphora dicitur, urgeant, ab assiduis lauacris & refrigerante vinctione abstinemus, medicamentis pituitam per os elicientibus utemur, atque in totum ad calidiorem victus rationem, sicciorem imbecilioremque ipsos traducemus, quandoquidem huiusmodi effectio a frigidiore, ut plurimum & humidior materia cerebrum imbuente, accidit.

Dioclis Epistola ad valetudinem tuendam conscripta.

Cap.

c.

DIOCLES ANTIGONO REGI.

QVoniam tibi omnium regum literatissimo esse contigit, & multum iam ætate prouecto, omnis philosophiæ disciplinarumque mathematicarum peritia excellere, existimaui eam philosophiæ partem quæ valetudinis tuendæ præcepta tradit, haud alienam a regia maiestate fore, eoque tibi perscripsi, unde morbi hominibus oriantur, & quibus signis præcedentibus, quomodoque ipsis succurrere conueniat. Quemadmodum enim in coelo nunquam tempestas ingruit, quam non indicia quædam præcedant, quibus nautæ cæteriisque probe periti homines certiores reddantur, ita humanam naturam nullus inuadit morbus, quem non signum aliquod denuntiarit. Tu itaque si his quæ a nobis picentur, animum attendas, exactam illorum cognitionem indipisceris. Hominis corpus in quatuor partibus dividimus, caput scilicet, thoracem, ventrem & vesicam. Igitur ubi caput morbo conflictaturum est, hæc plurimum notæ solent præcedere, uertigo, capitis dolor, superciliorum grauitas, aures sonant, tempora saluiunt, oculi mane illachrymant, caligantque, nares oppletæ odorem non sentiunt, dentium gingivæ attolluntur. Quum ergo ex his aliquod accidit, caput purgari oportet, nullo quidem medicamento, sed vel hyssope uel origani summitatibus tritis, quæ in ollula cum musto, aut sapæ heminæ dimidio deferbuerint, atque hoc absorbens ieiunus os colluet, & gargarizando humores ex alto deducet, eaque capitis affectuum curatione, nulla leuior est alia. Optime facit etiam si sinapi, mulla calida dilutum, ieiunus absorbens gargarizet, pituitamque ex capite eliciat. Cæterum caput operimentis prius calefacere oportet, quo pituita liquefacta, prompte effluxioni pareat. Si quis hæc signa neglexerit, huiusmodi ægritudines solet experiri, lippitudinem, glaucomata, aurium vomicas ac eruptiones, in ceruice strumas, cerebri cariem quem σφακελὸν græci vocant grauedinem, anginam, nyctilopa, teredines,

nam; capillorum defluxus, capitis vlcera, & dentium do-
lorem. Quum autem a thorace morbus nascetur, totum cor-
pus incipit iudare, thoraxque, lingua fit crassior, sputum salsum aut
amarum aut biliosum existit, dolor costas aut scapulas sine occasio-
ne inuadit, oscitatio frequens, vigilie, suffocatio, sitis ex somno, ani-
mus tristior, pectus frigidum, brachia & manus tremiscunt. Succur-
rendum est prudenter hoc modo, vomitus quam optime fieri potest
post cœnam sine repletionem, sineque medicamento citari debet, uti-
les sunt & vomitiones ante cibum, quas Græci firmalimos appel-
lant. Oportet autem eum qui sic vomet, radículas tenuis præsume-
re, nasturtium, erucam, sinapi & portulacam, mox aqua tepida su-
perbibita, vomere. At si huiusmodi indicia contemnuntur, hi morbi
solent obuenire, pleuritis, peripneumonia, melancholia, febres acu-
tæ, phrenitis, lethargus, febris ardens cum singultu. Quod si a ventre
morbus orietur, hæc erunt signa, venter prius cruciatur, turbaturque,
cibus & potio amara videntur, genua grauantur, lumbi nequeunt
flecti, totumque corpus etiam sine occasione laborat, crura torpent, fe-
briculæ exiguæ affligunt. His itaque cognitis, ventrem prius emol-
lire oportet, non medicamentis, sed victu. Tutius enim est uti iis qui-
bus nullus error committi potest, utpote betis mulsæ incoctis, alliis
elixis, maluis, lapathio, mercuriali herba, & ex melle confectio-
nibus. Omnia siquidem aluo subducendæ sunt. Si quod e signis inten-
datur, enici succum omnibus decocti admiscere oportet, ut quæ sua-
uiora & sine periculo sint. Iam & læuis brasica in aqua largiore
cocta, eiusque succus ad heminas quatuor potus cum melle & sa-
le, utilis est, vel ciceris aut erui decocti aquam eodem modo ieiunus
utiliter bibet. Qui nullam eiusmodi signorum rationem habent, in
his morbis tentari solent, alui profluuium, intestinorum torminibus,
eorumque læuitate, ilio, coxendice, febre tertiana, podagra, apople-
xia, hæmorrhoidibus morbo articulari. A uesica qui nascuntur mor-
bi, hæc dabunt signa, pleni ex cibo modico esse videntur inflationes
ventris urgent ructus, pallor totius corporis, somni graues, vrina li-
uida et vix erumpens, naturalia tument. Quum itaque huiusmodi no-
tæ apparuerint, odoratis, vrinam cientibus tutissime occurrere malo
oportet. Itaque foeniculi apiique radices, vino albo odorato madesa-
cito, atque huius diluti cyathos duos, mane ieiuno singulis diebus
propinabis cum aqua dauci, smirni, helenii, quodcumque horum ha-
bueris, nam omnia proficiunt, adhæc aqua ciceris macerati cum vi-
no idem efficit. Qui hæc signa negligunt, hos morbos expectent,
aquam intercutem, lienem magnum, iecoris dolores, calculos, renū
cruciatus, vrinæ stillicidium et ventris tumorem. In omnibus huius-

PAULI AEGINETAE

modi indicis infantes sane leuiori, adultos, acriore curatione tracta-
bimus. Cæterorum anni solstitia in quibus hæc solent ingruere silen-
tio prætermittenda non sunt, sed quæ in singulis alimenta cõueniât,
paucis exequemur, auspiciati ab hyemali.

Solstitium hyemale.

Solstitium itaque hyemale vsque ad vernum æquinoctium auget
in hominibus destillationes humiditatesq; ac propterea calidiori-
bus vti cibis, parciori potu, sed meraciore, atque ex origano bibere
oportet, necnon veneri indulgere. Numerantur dies ad æquino-
ctium, nonaginta.

hoc tpe
græci.
quoque
conubia
celebra-
bāt ath.
et Aris.
in 5. de
anim.

Æquinoctium vernum.

Hoc tempore pituita in hominibus crescit, & dulcis sanies san-
guinis, vsque ad vergiliarum ortū, eoq; tunc maxime succosa acria
que assumi debent, corpus exerceri, & Venus. Sunt autem ad vsque
vergiliarum ortum dies sex & quadraginta.

Vergiliarum exortus.

HOC tempore bilis amara augetur, amaraq; sanies, vsque ad
æstium solstitium, dulcia omnia tunc, quæ aluum moueant, conue-
niunt, Venus quā parcissime exercenda, hinc ad solstitium æstium
dies quinque & quadraginta existunt.

Solstitium æstium.

HOC anni tempus atram bilem adusque æquinoctium autum-
nale promouet, quapropter aqua frigida atq; odoratis omnibus vtē-
dum est, Venus perniciofa, aut innocentius saltem quæ de ea præscri-
psimus adhibeto. Porro sunt ad æquinoctium autumnale, dies tres,
& nonaginta.

Æquinoctium autumnale.

HÆC anni pars pituitæ copiam generat, tenuesq; defluxio-
nes, donec vergiliæ occidant. Conuenit igitur tunc humores ex ca-
pite elicere, atque acerrima, maximeq; succosa assumere, vomitum
ratissime citare, exerceri, atque concubitum vitare. Numerantur ad
vergiliarum occasum dies sex & quadraginta.

Vergiliarum occasus.

HOC tempore pituita adusque solstitium hyemale in homini-
bus redundat, quam ob rem acerbissima quæque, vinum suauissi-
mum, assumere oportet, pinguibusq; vti & exercitari. Sunt autem
ad solstitium hyemale dies quinque & quadraginta.

LIBRI PRIMI FINIS IOANNE GVINTE-
RIO ANDERNACO INTERPRETE.

PAV-

PAULI AEGINETAE
LIBER SECVNDVS.

DE FEBRIBVS, IOANNE GVINTERIO

ANDERNACO MEDICO

INTERPRETE.



CAPVT I.



BSOLVTIS de valetudine tuenda præ dicitur a
ceptis, exequi aggrediemur, quomodo eos, pitissi-
qui morbis iam conflictantur, restituamus, a mis tot
similaribus vtpote simplicioribus morbis ex morbis
or si. quales nimirū sunt, quos febriles appel- laborare
lant. Rursus igitur nos Oribasii compedio, iumenta
quod ex Galeni sane potissimum, & alio- quot ho-
rum præterea compluriū commētarijs est ex minem.

cerptum, vtentes paucula quoq; ab illis omīssa adiungemus.

Quot & quæ principalia in morbis potissimum febrilibus
perquirenda. Cap. ii.

PRimum quidem perquirere conuenit, morbus salutemne promit-
tat, an mortem minetur. & si polliceatur salutem, vtrum acutus
sit, an longus. Hæc sane in alijs quoque magnis affectibus commo-
de quæruntur. Tertium quoque nunquid vna vice crīsim expertu-
rus, quod febribus potissimū peculiare est, an particulatim soluetur.

Ex Galeni commentarijs, quale morbi principium di-
camus. Cap. iii.

NEque enim capitis dolores & febris idem existunt, quemadmo-
dum neque vigilia, & cibi fastidium totiusq; corporis grauitas,
aut sensus lassitudinis, verum vnumquodq; harum licet a febre sit di-
uersum, ipsa tamen denuntiat. porro febris inuadens, præsertim acu-
ta, neq; nos potest, neque imperitum aliquem latere. Sed finge, si pla-
cet, etiam latere, miraculum tamē iudicauerim, si hora amplius ægrū
subter fugerit. Quamobrem illud tempus morbi esse principium di-
cemus, quo manifesto febricitare incipientes decumbant.

Vnde cognoscendum, morbusne fit sanabilis,
an perniciosus. Cap. iiii.

Illud ex
Plato in
Phæd.
tenendum
est, mor-
tale uul-
lū debe-
re e vita
excede-
re inuito
numine

D

PAULI AEGINETAE

ga ut ibi
explicat
Olymp.
erant, q
existima
bāt sicut
stoici
gñq; de
caulis
hoīem
excede-
re uita d
bere spō
te sua pri
mo ob
magnā
patriæ v
tilitatē .
Secūdo,
ne extre
ma dede
cora pa-
tiamur.
tertio, si
amētesu
mus. q̄r
to si asfi
duo mor
bo torq-
mur inu
tiles no-
bis et pa
triæ. quī
to & po
stremo
ob sum-
mā rerū
inopiā .

Lethales notæ sunt, facies cadauerosa, nares acutæ, oculi conca-
ui, reliquæ ab Hippocrate commemorata, si hæc neque ex
vigilia, neque euacuatione, neque inedia acciderint. Item in propin-
quo mors est, si ægri lumē r. fugiunt & illachrymant, non ex qua-
dam a foris accidente causa, neque tamen oculis peculiari vicio ob-
noxiiis. Adhæc si alter ex his minor appareat, quæque in iis alba
esse debent, rubescant, aut lueant, aut nigricēt. Aut si pituita ipsis in-
hærescat, perq; somnum alba oculorū appareāt palpebris extrorsum
non commisis, nisi ea larga vacuatio expresserit, aut ex consuetu-
dine ipsis hoc acciderit. Iam illa mortis sunt indicia, dentibus stride-
re, aut desipere, aut in veste floccos legere, aut festucas carpere. Attē
dendumq; est ad incubitum, nam si æger supinus cubat, & veluti re-
solutus, vel si etiam deorsum a lecto ad pedes delabatur, extremam
imbecillitatem fatetur. Multo adhuc peius est, frigidum spiritum ex
naribus, & ore elidere, item pulsus languidus creberque, & deficiēs,
item si æger ad animi deliquium sudore digeratur, perniciem præsa-
git. Si igitur omnia, quæ retulimus indicia, aut plura ex his appa-
reant, aut etiam pauciora, sed valida, nullumque salutis argumentum
affulserit, periculum mortis inuitabile signat. Contra spirandi facili-
tas, pulsus vegetior, mens sibi constans, bene erga cibum oblatum af-
fici, adhæc facies iacentisq; habitus, sani similis, bona indicia sunt, et
salutaria. In uniuersum quæ a naturali habitu maxime abhorrent, pe-
stifera sunt, quæ vero ipsi respondent, salutaria. Cæterū præfagia ex
vrinis, deiectione, & sputo paulo post exequemur.

† De signis longæ valetudinis. Cap. v.

Quatuor notis morbi dignoscuntur, ipsorum motu, ægrotantis
habitu, pulsu, febrium specie. Motu quidem in eum modum, si
quatuor particularis accessionis tempora, ocyus & breuissimo spa-
tio inuaserint, peracutus erit affectus, cuius extremus terminus est,
Septimana. magna vero ex parte, quarto die crīsim experitur. At si
longius quidem quam hic affligerit, sed duodecim horarum spaciū
non excedat, acutus prædicatur, qui intra quartumdecimum diem po-
tissimum iudicatur, si uero plures horas prorogetur, ut initium dun-
taxat, et incrementū longiore tū diei, tum noctis tempore absoluat,
talis morbus longus existit. at si particulares accessiones morbus nō
habeat, sed inde ab initio ad usq; finem continuet, tanquam vna sit ac-
cessio, veluti in continuis etiā hunc nimirū acutis adscribes. Aegro-
tantis habitu hoc pacto deprehenduntur. Si quidem facies, & totū
corpus reliquum collabatur, acutum morbū prælagire est. Si prorsus
nihil emacrescit, longus erit, quippe copia materiæ longiore spatio
concoquendæ signatur. Ex arteriarum motu ita diuineris. Magnus

pullus, vehemens, citatus, creber, acutum morbum indicabit, contrarius, longum. A febrium specie hunc in modum, quatenus calidæ et vrentes, acutum signant morbum, mitiores autem & veluti delitescentes, diuturnum.

† Hic titulus sic legitur in vetusto Cod. πῶς ἐξαγινώσκειν, ἢ ὅτι καὶ χροῖον νόσῃμα, id est, de signis acuti & longi morbi. Qui quidē titulus huic capiti maxime conuenit.

Quomodo præsciemus an morbus iudicium subiturus
soluendusue sit. Cap. vi.

Hoc quoque præscire licet ex iis quæ modo sunt nobis dicta, nēpe ex febrium specie, & tempore. Forſan autem totum ex febrium specie. Siquidem calidæ, & perurentes, breui finiuntur, & excretionibus solui ſolent. Mitiores leuioreſq; prorogantur diutius, et in abſceſſus magna ex parte erumpunt. Hinc liquido conſtat, non ſolum quando morbus ſoluetur, ſed etiam quo pacto, acuti enim potius per excreta iudicant, quæadmodū rursus lōgioreſ, per abſceſſus.

De diebus decretorijs.

Cap. vii.

Dierum decretoriorum alij de ægris frequenter, cum fide, ſalubriter, perfectē, manifeſto, & inſigniter iudicant, alij contrario hiſ modo. Tertius decimus medium quendam inter vtrunque dierū genus ordinē habere mōſtratus eſt. Ac ſunt ex ipſis, qui vel exiguum naturæ impetum naçti de morbo poſſunt decernere, quemadmodum ſeptimus, & quartus decimus, plerique vero, niſi in vehementibus naturæ motibus, morbos neutiquam poſſunt per criſim ſoluere. Verum nec vniuerſi boni, ſimili inter ſe modo boni ſunt nec omnes mali, pari ratione ſunt mali. item nec certo ordine bonitatem malignitatemue obtinent. Qui igitur primi ſunt ordinis, nempe bonorum numero comprehenſi, hunc in modum ſe habent. Præſtantiffimi omnium ſunt ſeptimus, & quartuſdecimus, mox nouus, vndecimus, & vigefimſ, deinde decimuſſeptimus, & quintus. hoſ ſequitur quartus, poſt hunc tertius, & decimuſoctauus. Hiſ contrarii, ad ſecundum ordinem referuntur, peſſimus, quique cum periculo, nec clare de morbis iudicat, ac veluti ex aduerſo ſeptimo diei opponit, ſextus eſt. Huic cōſimiles, octauus, & decimus, ſecundū quos duodecimſ, ſextiſdecimus, & decimuſnonus habentur. Mediuſ horū eſt, & tertiuſdecimus, nec ita repudiandus, ſicut ordini ſecundo aſcripti, nec tā feliciter morbū pōt ſoluere q̄ q̄ ad primā claſſem p̄tinent. Atq; hoc dignitatis ordine Galenuſ ē uſuſ. Numerorū vero ordine boni ſunt, tertiuſ, q̄rtuſ, q̄ntuſ, vndecimuſ, q̄rtuſdecimuſ, decimuſoctauus, vigefimuſ, mali autē ſextuſ, octauuſ, decimuſ, duodecimūſ,

aliter, et excretionibus iudicari a maret.

cū fide, q̄a non oēs certā fidem habent. plærūq; n. euenit vt ī diebus decretorijs ægri nō ſanent, & ī nō decreto rijs recte ſanentur, id q̄d ēt ari. i. v. de phyſi ca auſcultatio ne atinēgit.

D a

PAULI AEGINETAE

δεωφτι
κχιημε-
ποι

sextusdecimus,decimusnonus.inter hos medius consistit ,tertiusde-
cimus.Porro ex his decretoriis nonnulli quoque aliorum sunt indi-
ces,quos Hippocrates appellauit speculatorios, eo quod iudicia alio
die decretorio futura prænuntient contemplandaq; exhibeant, exē-
pli gratia, quartus, iudicium septimo die futurum præmonstrat, dum
videlicet sudores quosdam, aut madores, aut eiusmodi particulares
vacuationes molitur, aut significationes prius non factas, aut con-
coctionis notas repræsentat. Iam vero Galenus etiam sexti, licet nō
boni quartum esse indicem esserit. Vndecimus quartidecimi index
est, septimusdecimus autem, vigesimi. Itaq; ad quartumdecimū vsq;
diem valentissima de morbis fiunt iudicia. proxime succedunt, qui
vsque ad vigesimum habentur. Qui post hunc adusque quadagesi-
mum porriguntur, paulatim vehementiam remittunt. Primæ digni-
tatis sunt, vigesimusseptimus, trigesimusquartus, & quadagesimus.
Hos sequuntur, vigesimusquartus, trigesimusprimus, trigesimussepti-
mus. Qui vero dies reliqui a vigesimo adusque quadagesimum in-
tercedunt, omnes iudicij sunt expertes. Sicut qui post quadagesimū
habentur, omnes prorsus elanguescunt, concoctione potius & ab-
scellu, quam crisi morbum finientes. Atque alios quidem a quadra-
gesimo die Hippocrates omnino negligere videtur, sexagesimi ve-
ro, octuagesimi, centesimi, & ceteri vigesimi rationē habet. Ab
his deinde alios morbos septem mensibus, alios septem annis, alios,
vt uerisimile est, duobus & tribus annorū septenarijs iudicari tradit.

De decretoria iudicia in morborum principio esse pra-
ua. Cap. viii.

Propter
id, quod
supra at-
tigimus
si. n. me-
dia ars
ut uult
Alexā.
sciētiam
p se ha-
bet fert,
potiusq;
artē tū
materia
in defini-
tē se uti-
tio solu-
tione p
iudica-
tione, ne
forte qd
decipia-
tur.

Concoctionis signa nunquam sinistre apparent. quippe omnis
concoctio, naturæ uicinis opus est, eoq; semper securitatem
pollicetur. Decretoria vero signa aliquando incommode apparent,
propterea quod crisis ipsa ambigat, nunc bona, nunc mala contin-
gens, uti prius in capite de iudicatorijs diebus est comprehensum.
Neque igitur per initia, neque in augmento ipsa commode appare-
nt, sed ubi morbus inclinauerit, quo tempore natura morbo valen-
tior est.

Quemadmodum futurum iudicium prænoscendum sit
Cap. ix.

Si accessiones urgeant præueniantq; tempus consuetum & multo
fiant vehementiores ac tertio quoque die significationem sui p-
beant, tū concoctionis signa in urinis, aut deiectionibus, aut sputis.
cernantur, siue mora plane morbus iudicabitur. Sin accessiones len-
te moueantur, eademq; hora innadant, ac quotidie affligant, longio-
re tēporis spatio interposito morbi solutionem expectabis. Item qd

qui obrigores vehementer febricitant, fieri non pōt vt morbus ante soluatur, quā illi fuerint leniti. si enim rigor nihil remittat, haudquaquam morbus ad statum peruenerit, multoq; minus inclinatio ipsius speranda est.

Quomodo instans morborum iudicium agnoscat.

Cap. x.

ANte quamlibet iudicationem ægrotus grauiter excrucietur. Atque si interdiu illa contingit, noctu affligitur, si per noctē futura est, interdiu exagitur. Ac superueniunt symptomata, utpote capitis dolor, quem prius non sensit, præterea collum simul dolet, præcordia sursum conuelluntur, spirandi quædam difficultas repentina oritur, aliæq; graua accidentia, quæ superiori tempore non percipiebantur, apparent. Atque his obuenientibus, si pulsus non concidant, sed sublimius attollantur, vehemētiōresque fiant, adhæc si dies decreroriorius indicetur, isq; potissimum ex illorum ordine, qui probe decernunt, nō iudicium modo futurum salutiferum quoque expectato. Neque deterrere in his te debet, si ægrum delirantē, exilientēue conspicias. Etenim & hæ succorum ad superiora tendentiū notæ sunt, sicut e diuerso inferiora petētium, aliæ, puta imi ventris rosio, circa vmbilicum tormina, lumborum dolor, vētris murmuratio. Est cum alia quoque indicia consimilia deprehenduntur. Adhæc si p hæmorrhoidas vacuari laborans consuevit, etiam huius vacuationis circuitus una incidit, repetitq;. Pari modo in mensuris, si mulier est quæ laborat, + non absurdum fuerit per talem vacuationē morbi fieri iudicium. Iā sudores tum ex corporis madore qui præcessit, vt verissimile est, & præsertim in die contēplatorio erumpentes, tū ex meatuum adaptione prænoscenti sunt. Ac quæ p superna vacuationes futuræ sint, ex his maxime intelligas licet. Nam præter ea quæ iam nobis sunt exposita, etiā ægrotantis facies intuentia est. Item si qua partiū ipsius palpitet, aut venæ in tēporibus pullent, aut gena, aut nasus, aut oculus rubicundior appareat, maior spes vacuationis per superiora futuræ subest. Quod si etiam sine voluntate illa chymēt, aut splendorēs oculis obduci imaginentur, ac naribus veluti scabendi studio manus admoueant, tūc quidē nō amplius morari, sed iam adesse fluorem sanguinis videbis. Vbi enim semel ac iterum scaberint, erumpit. Rosio vero stomachi, & labri inferioris tremor, csifim per vomitiones futuram subinde nūntiarunt. Atque de his abunde est. Accedit ipsis, ægrotantis ætas & natura, quæ spem nostram confirment, præterea anni tempus, & præsens aeris status. Nam si æger adolescens est, aut alioquin naturæ calidæ, aut sanguinis copiosi cōpos, multo magis sperandū est. Quod si etiā antea, vel

quoni
am pe-
riodum
suā qsq;
sequitur
morbus
prorōne
substra-
tæ & de
nuo pul-
lulantis
materiæ
Alexā.
et Aris.
ī probl.
atque in
libr. de
hist. ani.
atq; hoc
ex eo ē,
q; uitia,
etin na-
tura se-
quuntur
ordinē
quēdam
haud se-
cus, q; ui-
ta gene-
ratioque
anima-
tis et ip-
sius ac-
tiōesam-
bituquo-
dā eunt
ac reuer-
tunt imi-
tatione
uniuersi
ut refert

D iii

PAULI AEGINETAE.

Arist. in
4. de ge
ne. aīal
et ī iiii.
de Phy
fica di
sciplina
æter mon
tibus oī
bus mo
derari
motum
vniuerſi
idolym.
quoq; ī
Alcibia
de testat
ex verſi
bus or
phei.

æger, vel ſanus, vt ſupra dictum eſt, vacuationem ſanguinis exper
tus fueri, hoc vel ſolum ad profundendi ſanguinis ſpem exhibendā
ſatis eſt. ſam vero ſi anni tempus æſtas eſt, aut ſi non æſtas, certe cali
dus aeris ſtatus, ac ſæpe illo tempore per ſanguinis profluuium cri
ſim ſuſtinuerunt, corpusq; ſanguine redundet, quod *πληθωρικόν* nomi
nant, & conſuetarū excretionū ſit retentio, hæc quoq; ſpem tibi au
xerint. Similis porro, & in reliquis vacuationibus ratio habenda
eſt. At ſi horū nih il apparuerit, ſed æger in aliquo decreteriorū, qui
poſt vigeſimū maxime ſunt, dierū grauiter morbū ferat, idq; cū con
ſiſtit, ac dolores quidā in articulos aliquos decumbant, aut iuxta aū
res, aliasve patticulas hæreāt, aut dolores quidē minime infeſſēt, ve
rū ſudores, particulares cōtinue ex particula quadā erūpāt, p abſceſ
ſum criſim excipere oportet. Ac in illa potiffimū particula abſceſ
ſus ſe pmet, quācūq; vel ſudores, vel dolores, vel tumores exerceāt.
† Hæc ita legunt *οὐδὲν ἀτοπὸν διαδὲ τοιαύτης κενώσεως πρὸς
δοκὴν γίνεσθαι τὴν κρίσιν*, ideſt, non abſurdum fuerit per talem va
cuationem expectare morbi ſolutionem, ſi d hæc leuia ſunt.

Quemadmodum optimum iudicium peractum agno
ſcamus. Cap. xi.

SI vacuatio cōpetens poſt cōcoctionē accidat, & febris criſim
experiunt ſoluatur, ægerq; aliis liberetur accidentibus, & co
loratio eualeſcit pro vacuationis ratione, pulſumq; v egetiorē acce
perit, ac tū inſurgendo, tum ſeſe erigendo fortior ſit redditus, quodq;
oīum ſecuris ſimū eſt, ſi ad morbū ferēdū facilitas ſubſecuta ſit, ea ſa
ne laudatiſſima iudicatio habetur. Quod ſi horum aliquo deficit,
tantum ab optima abeſt, quantum id valeat, quo deficit.

De pulſibus ex Galeni commentariis. Cap. xii.

PULſus motus eſt, quo cor & arteriæ attolluntur, ſubmittūturq;
Vſus ipſius duplex eſt. Etenim eleuatione Græci *διαστολήν* ap
pellant, qua arteria veluti explicatur, quodāmodo, ac pateſcit, frigi
dus aer ingreditur, vitale robur euentilans, recreansq; ex quo etiam
animalis ſpiritus habet originē. Submiſſiōe, *συστολή* Græcis voca
tur, qua arteriæ extrema ad mediū ſui conſidunt, conuiuentq; fuligi
noſa recrementa expelluntur. Cæterū hæ arteriæ, oblonga ſunt va
ſa, venarū modo cōcaua, ſed duplici tunica muniunt, tū prædicti mo
tus gratia, ū quod ſanguinē ſpiritūq; cōtinent. Originē trahunt ex
corde, ſed p totū corpus mēbratim diſtribuunt. Oēs igit, & eodē
pulſandi modo inter ſe, & cū corde conuieniunt. Quāobrē ex vna
ipſarū, oīum rōnē queas colligere, nō itē oīum ex æquo motū per
cipere. Sed earū q̄ excarnes corporis partes perreptant, promptius.
quæ carnoſis ſubſunt, obſcurius. Porro iis quæ per brachiale excur

rant omisfis, nullam, aut congruentius, aut vſu commodius attigeris. Primum pulſuum genus ex motus tempore ſumitur, vt quod eleuatione arteriarum, atque ſubmiſſione examinetur. Differentiæ ipſius ſunt, citatus pulſus, tardus, & mediocris, quoniam omne quod motui eſt accommodatum, aut celeriter, aut lēte, aut mediocriter pro temporis ratione mouetur. Citatus eſt, qui exiguo tempore multū ſpatii motu emetitur. Tardus, qui longo tempore paruum interuallum perficit. Mediocris, qui medium quendam motum inter citatum & tardum, peragit. Alterum genus diaſtoles quantitate conſtat. Quoniam enim quodlibet corpus tria fortitur interualla, longum, latum, profundum, arteria autem corpus etiam eſt, ipſam quoque tribus conſtare interuallis, neceſſum eſt. Verum in naturali animalis habitu, mediocriter ipſam vnde quaque eleuari reperies. Contra, cum animal præter naturam habuerit, nonnunquam in aliqua horum diſtantia deficit, aliquando excedit. In quo ſtatu, meminſſe conuenit, qualis pulſus naturalis fuerit. ſi latitudine maior inueniatur, latum vocabis. ſi longitudine, longum. ſi profunditate, ſublimem. Liquet autem contrarios quoque ipſis, & naturali minores, ad eum eſſe modum appellandos, arctum, breuem, & humilem. at inter eos qui omni diſtantia æqualiter in ſtatum naturæ contrarium vertuntur, quicumque hac ratione imminutus eſt, paruus, quicumque auctus, magnus nominatur. Tertium genus pulſuum, ad virtutis robur exigitur. Differentiæ ipſius tres ſunt, vehemens, languidus, & mediocris. Vehemens quidem eſt, qui tangentis manum valide percutit. Languidus, qui inualide, & imbecilliter. Mediocris, horum medio conſiſtit, quem nonnulli naturalem eſſe putauerunt. Nam ira & exercitiis vehementiorem fieri pulſum aſſerunt, qui a naturæ habitu recedit, quorum diſtis Galenus venit obuiam, non conſtanti inquiring, ſed promp- te mutari eum pulſum, qui ex cauſis non naturalibus (vehementior euadit. Pulſus igitur vehementior, qui non expedite mutatur, is nimirum naturalis, & moderatus fuerit. Quartum genus, instrumenti conſtitutione conſtat, dico autem arteriæ corporis ſtatu. differentiæ huius quoque tres ſunt. Vel enim instrumentum durius eſt, quam natura exigit, ac pulſus vocatur durus. Vel mollius, ac nominatur mollis. Vel mediocriter habet, ac moderatus inde nuncupatur. Quintum genus, ex quantitate humoris infuſi arteriæ pendet. Hæc habet diſcrimina. Plenus eſt, vacuus, & mediocris, quoniam totum vas, aut plenum eſt, aut vacuum, aut mediocriter repletum. Plenus itaque eſt pulſus, vt Archigenes definiit, qui arteriam pleniorē repræſen-

le. Hipp. Ad diſciplinā tamē de pulſibus cognoscendā p- ter ſcripta Gal. Aristo. quoq; & ſpiritu libellus totus eſt p- diſcendum. Cognitio de uſu pulſuum ignota apud antiquos videt̃ æt nō multū d- pulſibus Hipp. la- boraffe, attēdiſſe tñ ſignā p- excremēta neque Ho- me. ferūt de pulſibus di- xiſſe q- q- ve- nas ī il- liade po- nit p- ar- teriis.

PAULI AEGINETAE.

Corporis cibo
absum-
ptoque ac
de pasto
euētilan-
tur, & i
hoc ac-
tu pulsu
cōsurge-
re. Sunt
et qui di-
cūt, ulti-
mā, pfe-
ctā q̄ ci-
bi sum-
pti cōsu-
matio-
nē inte-
nuissi-
mas au-
ras spiri-
talestrā
mitti, a-
nimæ au-
tē mai-
statē p-
hosce spi-
ritus to-
ti Cor-
pori in-
teresse ip-
sam in
corde se-
dētē. Cu-
ius rei si-
gnū esse
q̄ obali-
qd̄ sym-
ptoma
a cursu
tat, & occursum eius humiditate plenum, vacuus quī aeris modo at-
teriam excitat, vt digitorū impressione loci inanitas occurrat. Hæc
igitur quinque pulsuū genera, vno arteriæ motu constant. quoniā ve-
ro caloris, qui in corde habetur qualitas, ex arteria quodāmodo ma-
gis euidenter apparet, dignati sunt quidam etiam hoc pulsuū genus
Sextum cōmemoratis annumerare. Ad reliqua vero genera, tum
quæ ex vno, tum quæ ex multis pulsibus sumunt, pertinet quod quie-
tis tempore cōstat, & quod rhythmo, & quod æqualitate, & inæ-
qualitate, insuper quod ordine & inordinatione cōstituitur. Quod
itaque quietis tempus spectet, Septimum a primo numeratum diuidi-
tur in frequentem, & rarum, & moderatū. Nā cū arteria duplici agi-
tetur motu, qui ex cōtrariis constat particulis necesse est vt duplex
quies cū ipso coincidat. Altera quæ post eleuationē, ante submissio-
nem est, altera quæ secundum submissione, eleuationem præcedit,
quæ etiā quies plerisque imperceptibilis esse videtur, vt inter duos mo-
tus quies aliqua media existat. Cui itaque longū quietis tempus est,
is rarus dicitur, cui breue, creber, cui mediū, moderatus. Octauū ge-
nus pulsum ad rhythmū pertinet. Est autē rhythmus summam q̄-
dem dispositio, aut temporis ad tempus proportio. In pulsu autē, se-
cundū nonnullorum sententiā sane, temporis motus, ad quietis tem-
pus, vt eleuationis & submissionis, ad aliquam quietem interpositā.
Secundū aliorum vero opinionem temporis motus, & quietis, ad
motus quietisq̄ tempus, aut motus ad motū, nempe eleuationis ad
submissione, aut quietis ad quietem, puta interioris ad exteriorem
proportio. Differentiæ rhythmī principes sunt, duæ pulsus boni rhyth-
mī, & nullius rhythmī. Porro vocatur pulsus nullius rhythmī, nō
qui nullū rhythmum obtinet, id enim fieri non potest, sed malo rhyth-
mo præditus, quemadmodum nullā habere vocem, nullam ceruicē,
eum dicimus qui malam ceruicem malamq̄ vocem sortitus est. Cæ-
terum pulsus cui nullus rhythmus adest, triplex differentia existit.
Alius siquidem est pararhythmus, mediocrē boni rhythmī peruer-
sionē obtinēs. Alius heterorhythmus, id est alterius rhythmī, qui lō-
gius a bono recessit. Alius eorhythmus, q̄ omnino bonitatē rhyth-
mī corrūpit. Veluti cum puer significatur, peculiaris quidē puerili
ætati secundū rhythmū pulsus eorhythmus appellatur, qui ad vigentē
ætate pertinet, heterorhythmus, qui nihil huius seruat, eorhythmus
dicitur. Nonum pulsum genus est, quod in omnibus prædictis inue-
nitur æqualitate & inæqualitate constans, quod vel in vno pulsu
spectatur, vel in pluribus id quod a collectione plurium, s. stemati-
cum quoque vocant. de quo prius tanquam manifestiore dicen-
dum erit. Aequalis itaque pulsus est, qui consequentia par est siue

magnitudine, siue robore, aut velocitate, aut reliquorum aliquo, aut etiam omnibus. Inæqualis, qui consequentia impar est. Si enim subsequentes vniuersi pares magnitudine qualicunque inciderint, eiusmodi pulsus æqualis vocatur. At si primus, secundus, & tertius pares fuerint, quartus autem impar, talis nimirum magnitudinis inæqualis dicitur. Huius generis sunt, & deficiens, & coincidens. Non solum enim post unum aut etiam plures magnos unus minor apparet, sed nonnunquam totus quoque motus omnino aboletur, & pulsus deficiens appellatur, sicut alter huic contrarius coincidens, cum expectata quiete in medio tanquam superuaceaneus aliquis pulsus inciderit. Sin autem secundus primo paulo minor factus sit, tertius secundo, & quartus tertio pari modo, idque deinceps longius, illiusmodi pulsus myurizontas & myuros nuncupant, nomen a figuris, quæ in mueronem desinunt transferentes. Qui quidem perpetuo ex ipsis immutuantur, ac nunquam decrescere cessant, in absolutam motus defectiorem finiunt, ac vocamus ipsos myuros deficientes. Qui vero cessant, duplici continentur differentia. Nonnulli siquidem ipsorum in qua primum desierant paruitate, hanc perpetuo conseruant. Quidam vero augescunt rursus, vel in partem priori magnitudinem redeunt, vel ad minorem, vel ad maiorem, si myuri recurrentes dicuntur. Iam vero et in unius pulsus inæqualitate myuri pulsus sunt, de quibus suo loco paulo post tractabit. Huiusmodi sane quedam est pulsuum inæqualitas, quæ systemata appellatur. Atque vno in pulsu deprehenditur, vel in vna arteriæ particula, vel in diuersis accidit, quemadmodum in motu, exempli gratia, in vna quidem particula arteriæ inæqualitas dicitur, cum aliter inceperit, ac aliter desierit moueri circa vnum digitum arteria, incipiens quidem citatior, desinens autem tardior, vel e contrario. Atque hoc triplici modo accidit, vel motus continue manet, vel intercidit, vel repetit, & veluti bis percutit. Si igitur manens continuus & non interitus, a celeritate ad tarditatem transierit, aut e contrario, impar citatus græce ἀνισορᾶχϋς eiusmodi pulsus, & est, & dicitur. Quod si quiescat, et quiete interpollata postmodum velocior appareat, Caprizans appellatur, ex capra animæ sumpta translatione, quæ saliendo ubi in aere consistit, et secundum quendam motum inopinatum priore citatior emouitur. Porro si ab eleuatione recurrerit, & ante submissionem absolutam, secundo manum tangentis ferierit, dictotus huiusmodi pulsus appellatur. Si simile quippiam in incudibus fieri cernas licet, quippe mallei, simulatque semel manu in ipsas incusseris, reciprocant, incudum renixu, et secundum rursus, vel et tertium feriunt. Atqui non solum inæqualitas quæ vno ictu in eadem arteriæ particula accidit in motu tempore, potest fieri, verum, & illa quæ virtutis robore constat, non autem ea quæ distanziarum

suo spiritus a-
uocati
totum cor-
pus om-
ni regi-
mine de-
stitutum
cere pa-
tiuntur.
anima
autem in
corde ad
huc mo-
rat. Er-
go spiritus
ritus om-
nis forme
vitalis
satelli-
tes qui-
dam mini-
stris sunt
animæ ue-
ro spiritus in-
nectato-
tum cor-
pus re-
gitet ad
mini-
strat. sic
& Pla-
tonici
existi-
mât. In-
æquali-
tatem autem
et inten-
sionem re-

PAULI AEGINETAE

nem'v'e quantitate comprehenditur: Nullo enim modo idem pulsus eadem
 pulsuum i in particula magnus & parvus queat effici, neq; in alio genere, sed
 corpora in diuersis particulis. porro in variis arteriae particulis vnoq; in pul-
 libus q- su duplex fit in aequalitas. nunc quidem cu motus manet continuus,
 bus dā af & arteria iuxta quosdam digitos citius mouetur, iuxta quosdā ve-
 sectibus ro tardius. nunc autē cu motus quoq; interciditur, vt nonnulli qui-
 et i aīe dem digiti motum apprehendant, nonnulli vero nō. Ac iuxta eleua-
 passioni tionis quantitatē in pluribus quidē particulis inaequalitas manife-
 bus vt i sta est. Ex quo genere sunt myuri vno in ictu inclinantes, quos Græ-
 metu, ci vocant ἐπιβεβηκότας, & περιβεβηκότας. Si nanq; interna digi-
 spe, gau ti parte magnus occurrit pulsus, & curuatus inde iuxta rationē mī-
 dio, ac nuntur, vt in exteriorē quæ ad ægrotantis pollicem spectat arteriæ
 moerore parte, minimus idem appareat, myurus vocatur ad muris caudæ fi-
 positam militudinem, vel meiurus quod caudæ modo imminuatur. At si iux-
 esse peri xta medios digitos magnus occurrat, curuatusq; vtrubiq; minua-
 patetici tur, minor apparens, hunc Archigenes βεβηκότα quasi dicas latine
 & Gal. inclinantem, & περιβεβηκότα appellauit, manifesto significare vo-
 arbitran lens eleuationis breuitatem, cum extremorū vtrorūq; veluti inclina-
 tur. Du tione. Non. n. vt abscisis vniuersim ac subito, vtrinq; partibus, sed
 bitatio veluti inflexis in arcū contractus est, vtpote myurus, hoc est immi-
 at est, q nutus magnitudine vtriusq; in partibus. Ac cum secundū magnitudi-
 Aristo. nē inaequalitas, id quod maturius est, aut tardius, assumpserit, tum vn-
 quoq; i dosi, tum vermiculantes, pulsus oriuntur. quod si id quod in situ est,
 v. Physi acceperint, conuulsorū & turbulenti, vt vocant, constituuntur. exor-
 cæ au- diendum igitur est ab vndosis, in quibus nō simul apparet in tali in-
 sculta- æqualitate arteria omnis eleuari, sed pars illius alia primum, mox
 tiōis at- alia, dein alia, postremo quarta, vt motus continuus maneat in mo-
 tingit, dum vndarum sese eleuantū. ac nonnulli vndam in rectum tenden-
 an spiri tem obtinent. quidā in latus inclinantē, & alii in breui longitudinis
 tus in ar distantia, altitudinē magnā habent, alii cōtra, aliqui latitudinē, ali-
 teriis ii- qui angustia. Similiter etiā celeritate & robore inæquales sunt. Vn-
 dē semp dosus totus in paruitatē cessans, vermiculans appellatur, vermīs grēf
 sint. ean sui assimilatus. Quemadmodū vero vndosum pulsum minorem fa-
 dēq; i to ctum vermiculans excipit, ita vermiculantē formicās, vbi motibus
 to cor- multis abolitis in vnū eundēq; per q̄ exiguū defierit. Vocatus hic
 pore va quoq; est a formicæ animantis similitudine, tū ob paruitatē, tum ob
 letudo, motus spēm. Est. n. formicans admodū exiguus, vt quo minor alius
 an alii nō extet. Pari modo languidissimus omniū creberrimus nō tamen
 & alii citatus, vt Archigenes existimauit. Huic cōfinis est Hecticus. quem
 spiritus admodū. n. febris, sic etiā pulsus Hecticus est, qui nullā magnā mu-
 tationē subit, sed perpetuo cōsimilis manet, trahitq; vt ab initio ince-

plē, & nunquam soluitur, toto habitu in morbum cōuerso. Porro cōuulsorii pulsus vtrinque ab extremis sursum retrahi, tendi, & conuelli videntur, cū chordæ cuiusdam tensæ sensum præbeant, at in turbulenti nihil tale reperitur. Sed maior in his eleuatio est, vt arteriæ particulæ quædam sursum ferantur, vno eodemque tēpore, ac motum ipsarū spiculis rectissime asstimulaueris, quæ validius emissa, celeriter feruntur vibrata. Serratus pulsus est cū alia pars arteriæ elata, alia minus, ob duritiē nimirū ipsius esse videtur. Cæterū pulsus hic etiā turbulenti quippiā possidet, ac citatus quidē est, creberque, non semper aut magnus. Decimū genus pulsum ex inæqualitate profectū cōmemoratis succedit, quod ordine, & in ordinatione cōstat. Nam ordinatus & inordinatus inæquali in circuituum paritatem, & prorsus imparitatem diuiso, ex vtraque sectione originem trahunt. Ex circuituum paritate ordinatus, ex absoluta vero imparitate inordinatus, etenim pulsus æqualis omnino est etiā ordinatus, siquidem subsequētia parem ipsum dicebamus, inæqualis aut nō oīno inordinatus est. Si nāque paritatem corrumpat, circuitū vero seruet aliquē, vt, in eleuationis quantitate, verbi gratia, si duo magni, & vnus paruus sit, deinde rursus duo magni, & vnus paruus, atque sic deinceps, vocabitur inæqualis quidē, sed ordinatus. At si præterquā quod paritatem corrumpat, ne ordinē quidē aliquem inæqualitatis conseruet, cū inæqualis tum inordinatus talis est, similiter in aliis quoque generibus se habet. Inordinatorū quidē, alii sunt ex toto inordinati, ne vel exiguum quendā circuitū conseruantes, alii vero secundum circuitus ordinati. Quatenus. n. continuā ordinationē nō habent, inordinati vocabuntur, quatenus autē diu circuitū quendā tuentur, secundum circuitus, ordinati vocari queant. Exempli gratia, si cōtingat duos magnos fieri, duos item paruos, deinde tres magnos, & tres exiguos, quatuor magnos, & pares exiguos, & rursus tanquam reflectentes duos magnos, & duos exiguos, tres magnos, & totidem exiguos, & deinceps similiter. scire vero cōuenit, inter alios quidē cōtrarios singulos, quēdā esse mediū. Aequalis aut & inæqualis mediū nullū, neque ordinati, neque inordinati, nisi voles secundū circuitus ordinatū mediū dicere ordinati & inordinati. Cæterū aliorū oīum in edii, secundū naturā sunt, præterquā vehemētis & languidi, vt a nobis ostēsum est. Inter hos aut æqualis solus secundū naturā est, reliqui præter naturā, inæqualis ordinatus & inordinatus. Hæc pulsuū genera vniuersa sunt, & generales ipsorum differentię. Nōnulli vero his etiam alia duo annumerarunt. Primum a situ arteriæ sumitur, quatenus sursum, deorsum, dextrorsum, sinistorsum deducta esse videatur. Alterum quo maturius, aut tardius, ex quorum numero vni-

ant, & alia aliaque valetudo. Ratio ēque habitus corporis & valetudo non idē semper subiectū habet. fluit. n. substantia absumpto cibo, & alia succedit. valetasque cibi est, diuersitas aeris aquæ, et regionū. Ergo mō fluminis labit sanitatis ipsius subiectum. alia igitur matutina valetudo et vespertina.

PAULI AEGINETAE.

dosos turbulentosq; pulsus esse diximus, ac nos cōpendii gratia simplices solū differētiās prodidimus. ex dictis autē si cōiugamus has, facile erit etiā cōpositas inuenire. † Porro opportunū erit deinceps, causas quoq; pulsibus cōuenientes exponere, quas comitat̃ etiā prae sagiū ab ipsis desumptū, ac initiū a magnitudine capiemus, quoniā hēc aliis est manifestior. Magnus igitur pulsus redditur, vel ppter vsum vrgentem, qui calor est in corde exuperans, externae appetēs refrigerationis, & veluti euentilationis, aut propter corporis gracilitatē, vt posterius ostenditur. Porro augetur calor, aut ex causis naturalibus, vtpote ætate florida, aut puerili, aut simpliciter calida, anni tēpore, regione, & tēperamento calidiore. Aut causis nō naturalibus, veluti aere qui nos ambit calidiore, balneis calidis, exercitiis, cibis, vino, medicamētis calfaciētibus. Aut causis naturae cōtrariis, puta intemperie calida, aut humorum putredine, aut ira, aut similibus. Discernes vniuscuiusque pulsus hoc discrimine, quod causae naturales magnitudinē ipsius faciunt stabile, & quae difficulter mutari queat. Reliquae vero, ex facili mutabile, vt etiā manu adhuc ad mota frequēter, aut certe paulopost subsidat. Iā vero pulsibus, qui sane ob balineas calentes magni sunt, mollities quoq; accedit, quemadmodum iis, qui ob calidā & praesertim cum siccitate intemperie magni existunt, durities. Exercitatis verō mediocriter, aut perfricatis, nec duri, nec molles sunt, medio statu praediti. Pectoris autē regio, multo calidior est, quod iā & iratis accidit. Ex cibo autē magis, aut vini vsu, aut ira, praeter magnitudinē etiā vehemētia inest. Qui vero occultare irā studet, aut aliud quid praeter medici permissionē factū, verbi gratia medicamē calidū sumptum, eundem medicum simulatq; manū attingat, interrogaatē celare volentes, iis praeter manifesta quoque oboritur inaequalitas. Ad hēc ægotantis mores & consuetudo nō mediocriter ad pulsus dignotionē faciunt. Consuetudo quidē, si medicaminū appetens sit si & rudis mores, si opinionis eximendae peritus & callidus sit. Ex humorū putredine magnus, ad magnitudinē adhuc submissionē magis citatā habet. Verum ad magnū pulsus efficiendum, non solū vsus abunde est, sed etiā virtutis ministeriū desiderantur, instrumentiq; cōmoderatio inter siccitatē & mollitiem. Aucto igitur cordis calore propter quamlibet causam ex cōmemoratis, primū quidē magnus pulsus efficitur, vbi vero magnitudo vsui nō suffecerit, statim etiā celeritas ipsi accidit. At si ne sic quidem satis fuerit, mox frequentiam assumit, parui autem, tardi & rari pulsus, itidem a contrariis fiunt. Sed quandocunque a magno citato & crebro ad contrarios sit mutatio, vsu nimirum postulante, nō amplius id quod in pulsu primum factum est, id etiā pri-

LIBER II.

mum cessat, verū quod postea acquisiuit, id primum abiecit, statim
 quidem rarus euadens deinde tardus, postea quoque exiguus. Sin au-
 tem tarditas paruitasque accreuerint, e contrario raritas in crebritudi-
 nem transmutatur, ut per eam ut per eam utcumque vsui fiat abunde.
 Hæ igitur magnitudinis, celeritatis, frequentiae, & contrariorum ip-
 sis pulsum causæ habentur. At iūgetur ipsis ea quoque pulsus iminu-
 tatio, quæ una solum distantia constat. Itaque latitudo sola augetur,
 dum humiditas porrisimum, vel secundum naturam, vel etiam ab
 exterioribus causis reducat, quemadmodum sublimitatis pulsus ob
 instrumenti mollitiæ virtute ad hoc opitulante, longitudo a siccita-
 te, & carniū circumpositarum emaciatu palam efficitur, reliquis
 lstantiis collapsis. Non enim arteria longior, quam postulat natura
 ieri potest, ac proprie magis pulsum huiusmodi gracilem appellaue-
 ris, quæadmodum ipsi contrariū secundum latitudinem solā, & profundū
 atem adauctū, amplū. Contrariis autem horum affectibus pulsus non-
 nunquam incidit, & in aliqua, aut aliquibus distantis prohibetur, hu-
 nilis, aut arctus, aut brevis apparēs, cum talis non sit, sed ob pinguedi-
 nis cuiusdā, aut carniū, aut membranarū oppositarum crassitiē appa-
 ens. interim, etiam totus parvus videtur, cum re vera parvus non sit, et
 languidus similiter. Quid opus est verbis, sæpe absoluta pulsus de-
 fectio quibusdam esse putatur in omnibus arteriis, cum vere non sit.
 & maxime iis qui negligentius ipsum tangunt, sed cum morus ob-
 carnium copiam delitescit, re vera obscurus existet. non enim ex-
 rema pulsus defectio homini potest accidere, quoad vita fruatur. quæ
 idmodum igitur rursus in locis ex carnibus, etiam parui pulsus, ma-
 gni esse videntur. Corpore itaque vehementer emaciato, arteria spi-
 ram perreptans, sæpe tangentibus abdomen, motum repræsentat,
 ic nonnulli etiam ex his, quæ prius in artubus non erant conspi-
 uæ. Quamobrem omnibus causis diligenter attendendum censeo,
 ne dignotio ipsorum nos lateat. Pulsus autem vehemens virtutis ro-
 pore efficitur, si nulla ex causis reliquis renitatur, utpote vsus disso-
 utus, aut instrumenti durities. Languidas autem pulsus, imbecil-
 æ virtutis & solius soboles est, aliud licet nullum adfuerit. Siqui-
 lem vehemens omnibus causis ad sui generationem indiget, langui-
 dum etiam sola imbecillitas efficit. Qui igitur per initia vehemēs
 est, ætates, anni tempora, regiones, & temperamenta moderata co-
 mitatur, languidus immoderata. Porro quia languore in vehe-
 mentiam incidit, virtute vindicata ab imbecillitate prius occupan-
 te efficitur. Vindicatur vero, aut ex his quæ in ipso corpore
 continētur, veluti humorum concoctione, vel excretionē vel ira,
 aut ab exterioribus, nempe vino, cibo, exercitiis, ac aliis quæ in-

quia ad
 bene or-
 dinandū
 pluribus
 rebus o-
 pus ē ad
 destruēdū
 una
 sat ē. A-
 rist.

PAULI AEGINETAE

aliis quæ intemperiem corrigunt. Vires dissoluunt, inedia, vigiliæ, vacationes immodicæ, tristitia, curæ & dolores, maxime animæ defectionē inferentes, ac oīa quæ intemperiem faciunt. Quidā vero ex rudibus ac inexercitatis, durum pulsum vehementē esse putauerunt, quod discrimen exercitatum, tum rōne, tum tactu, nunquā lauerit. Nā vehemens magna ex parte cum magnitudine in sublimitatem attollitur, tactum valide percutiens, durus magnitudinem nō recipit propter arteriæ contumaciā, fit igitur durus, ob instrumēti dritiem, quā refrigeratio immodica, aut ficcitas, aut tensio ab inflammatione profecta, aut conuulsio generat. Statim vero dritiē etiā paruitas, & celeritas nonnunquā, & frequentia magnitudinis loco propter vsum sequitur. Mollis pulsus, arteriæ humiditatis comes est, quā humidiorē reddunt ex iis quæ secundum naturam sunt, humectiores cibi, balnea frequentia, somnus multus, victus copiosior & animi oblectatio, ex his quæ præter naturā sunt, sopores, lethargi, aquæ subter eutem, & reliqua pituitæ vitia. Plenus pulsus, aut humorum copiam, aut ciborum aut vini potionis abundantiam indicat, quemadmodum vacuus contraria, aut enim inediam, aut vacationem. Vbi calidius arteriæ corpus occurrit, multā in corde caliditatem, reliquo corpore refrigerante, aut conuulsoriam quāpiā arteriarum violento motu incalescentium, dispositionem fatetur. Archigenes vero tradit arteriæ locum proprie in catochis calidiorem deprehendi, quemadmodum in iis, qui cōuulsionem cum graui animi in somnum delatione quā cataphorā appellāt. At rhythmus, de quo disputatum est, si par sit motu & quiete, probam totius corporis temperiem præ se fert, quantum ad se pertinet, vel non magnam a bona declinationē, sicut in ætate puerili, & corporibus alioquin temperatis. Ac si longius quietis tēpus fuerit eo quo motus peragitur, calorem præpollere notat, quemadmodum in ætate florentibus, & his proximis, veluti igitur in corporibus senilibus æquabiliter frigidis, diuturnius motionis tempus est quā quietis. Notare autē oportet rhythmī inæqualitatem mensuram esse eius quæ celeritate & frequentia consistit, hanc autē veluti materiæ rōnem ad rhythmū obtinere. Iam vero deficientes, coincidentesq; pulsus fiunt, viribus oppressis, & veluti aggrauatis, sed coincidentes minorē offensam, deficientes maiore significant, ac in vniuersum uirtus oppressa grauataq; pulsus mutat ad inæqualitatē inordinationēq; tum aliā quālibet, tū eā quæ vehementia & magnitudine constat. Ac ex myuris pulsibus genere duplicibus demonstratis (vel enim in systematica, vt vocāt, inæqualitate, vel in ea quæ vno fit ictu, deprehenduntur) deficientes quidē extremā virtutis internitionē notant, repetētes autem recur-

rentesq; & ipsi quidem imbecillem, sed repugnantem adhuc resistē-
temq; & renuentem indicant. in vno autem ictu myuri & inclinantes,
quos ἐπιβεβηκότας vel περιβεβηκότας appellamus, maxime
ais fiunt, qui paulatim contabuerunt, inflammationibus non solutis,
præterea plurimis quomodocunque tabescentibus, dum partes quæ
circa arterias habentur, emarcescunt. Porro inæqualiter citati & ca-
prizantes, febriles potissimum calores comitantur. verum si pulsus
elevationis principia dissoluens, extremum ipsius acceleret, & sub-
missionis initium, putredinem exuperantem notat, natura fuligino-
sis recrementis excernendis incumbente. Sin autem e contrario sub-
missionis initium dissoluerit, ad elevationem vero magis inflet, ca-
lorem præpollere scias, qui refrigerationē desideret. Comitatur hæc
in febre etiam crebritudo plurima ex parte, interdū magnitudo quo-
que, nisi virtutem instrumenti duritia impediat. Cum autem hæc in
arteria intenditur, & virtus non sit inualida, pulsus fit qui a bis ferien-
do Dicrotus appellatur. Porro vndosus humidiores potissimū affe-
ctus sequitur, atque his magis aquæ subtercutem genus, quod Ana-
sarca vocant, item lethargos, & peripneumoniam. At cum virtus
dissolui inceperit, sed paululum adhuc resistat, vndosus in vermicu-
lantem decidit, vbi extreme collapsa fuerit, etiam hunc formicans
excipit. Hecticus autem proprie contabescens & alioqui emar-
cescentes sequitur. Convulsorius fit, quum neruorum origo inflam-
matoria quadam affectione conflictatur, sicut in phreneticis & acu-
ta epilepsia correptis, quando etiam moriuntur, adhuc calentes, qui
hoc vitio sunt occupati, contrario his modo quos syncope inua-
dit. illi nanque vehementer etiam frigidi, adhuc viuunt. Turbulen-
tus autem pulsus efficitur, cum vsus magnam elevationem requirit,
ac vitale robur eam potest creare, solum vero arteriæ corpus prædu-
ritie in magnam attolli diastolen, vt in magnis inflammationibus,
obstructionibusq; diuturnis, impotens refragatur. Pulsus serratus in
totum index est inflammationis, & præsertim partium quarun-
dam neruofarum, quinetiam pleuritidi peculiaris est, remittens qui
dem, leni & ex facili concoquendæ, intensus autem difficili, &
concoctu perniciaci, quæ cum imbecilla quidem virtute, subito
in periculum præcipitat, cum valida autem longo tempore con-
coquetur. Vel enim in vomitam transiit subinde, vel marci-
da tabes ipsam exceperit. Iam vero sciendum venit, inordinatio-
nem comitari inæqualitates. raro siquidem inuenire est inæ-
qualem pulsum, ordinatum. Minores offensæ, inæquales pul-
sus & ordinatos, maiores, inæquales & inordinatos procreant.
Hæ igitur simplices pulsum causæ sunt & prælagia. Ex his

minime
vero
pleuriti-
di pro-
prius.
habere
Aldus
videt.

PAULI AEGINETAE.

etiam compositas, vt in sermone de differentiis ipsorum dicebamus
haud negotiosum est inuenire.

† Rectior est hæc scriptura quæ in vetusto codice est. εἴ τις δ' ἀν-
εἰλέγειν καὶ τὰ αἰτία τὰ τρεῖς ποντὰ τοῦς σφυγμοῦς. Porro opportunū
erit deinceps causas pulsus immutantes exponere, facile enim fuit
librario scribere πρὲς ποντὰ pro τρεῖς ποντὰ.

De deiectionibus.

Cap. iii

A Luus optima est, mollis, cohærens, & eodem tempore quo in
secunda valetudine assuevit, reddita. Talis nimirum est quæ le-
uiter ruffa est, simul & conuenienter spissa, non nimis foetida, quæ ra-
lis non est, mala censetur. Quæ igitur colore similis cibo ingesto
cernitur & tenuis, & non exuccata & celeriter descendens, cruda est.
At mære ruffa, initio quidem biliosiores morbum indicabit, sin au-
tem in declinatione talis excernatur, corpus probe expurgari denū-
tiat, viridis æruginosæ bilis nota est, nigra, vel atræ bilis, vel sangui-
nis cuiusdam indidem adusti. liuida, refrigerescere quodammodo, &
emori non parum interiora significat, oleosa pinguisque, corporis
pinguitudinem consumi innuit, quæ admodum rursus viscosa, pingui-
cum sit deterior, animantis particularum consumptionem præ se fe-
rit. Nimis foetida haud exiguum fatetur putrefactionem. Porro in o-
mnibus hisce, si alius qualitate cibo assumpto non respondeat eode-
iam modo affectio quoque considerabitur. Omnium deterrima &
pestifera, erit nigra, liuida, oleosa, celeriter transiens.

De vrinarum notis.

Cap. iiii.

Q Vemadmodum in deiectionibus, ita in vrinis quoque regula sa-
norum vsi, de ægrotis indicia sumemus. Vrina igitur pre-
stantissima est quæ sanis simillima. Talis nimirum est subrufa simul
& subflaua, nimirum vero hæc & crasfitiem moderatam habet.
At cum triplex turbidarum vrinarum sit differentia, (vel enim reddi-
tæ tales, paulopost subsidunt, vel consimiles perpetuo manent, vel
puræ excernuntur, deinde vero turbantur) praua quidem existit ter-
tia ordine dicta, moderata benignaque, prima, medio vtriusque con-
sistit secunda, summe cruda est, exacte aquosa, veluti desperatæ cōco-
ctionis venosi generis accidens. Quando autem celeriter descenderit,
diabetes, vt Græci appellant, efficitur verum hæc sane inter vrinas
crudas deterrima est succedit autem ipsi, tenui admodum & aquæ
modo exalbida. Huic vicina est alia vrina, quæ multis in morbis
apparet tenuis, admodum, & albæ propinqua. Subpallida vero hæc
sequitur, quæ pallida quidem modo erit, & subrufa, cōcoquitur autē
tam quantum ad colorem ipsius attinet. Tantum vero crasfitie ip-
sam ab aquosa recessisse oportet, si probe concoqui debeat quantum
etiam

hæc fufe
lateq;
apud
Hipp.
in pro
nost.
tradun-
tur.

na quæ
benc

etiam colore, sin autem hoc secundum naturam adamus sim seruato, subsidens album, leue, æquale, & copiosum reddit, exactæ nimirum concoctionis nota fuerit, largius autem crudum, humorem, expurgari signat. Iam vero si vrina crassa modice fuerit, habeatq; subsidēs ali quod, non cruda, iam ex toto erit. Si enim subsidentia parti farinæ crasiori, aut laminis similia, aut fursuri, aut nigra, aut liuida, aut viridia, aut foedi odoris, habeat, præterquam quod quæuis huiusmodi in cruditate est, etiam mortis periculum alias ostendit. Porro boni coloris vrinæ quæq; simul, vel subsidētia alba, leuia, & æqualia repræsentent, vel nebulas quasdam similes, vel suspensa, omnium vrinarum sunt laudatissimæ, & præcipuæ, quarum subsidens, tale extiterit. De inde commendatur vrina cuius suspensa huiusmodi cernuntur. Tertium bonitatis locum habet, cuius nebulæ tales apparēt. Ac, vt vno verbo expediam, quæ vrinis probe innatant, quanto inferius subsiderunt, tanto magis laudantur.

Desputi notis.

Cap. xv.

Sputum subflauum, subrufum, leuiter spumans, & tenue, solam cruditatem, malum vero nullum insignius denuntiat. At sincere flauum, rufum, spumofum, viride, glutinosum, rotundum, atq; his adhuc magis nigrum, prauum est. Etenim præter sanguinem, quisquis alius humor syncerus est, prauam ostendit affectionem, caloris flammei solem. Cruenta igitur sputa mediocria sunt, flauæ, aut nigræ bilis, difficilia. Cæterum quomodo ipsa ædantur, inspicere simul expedit. Nam si prompte excreentur, liquido constat talia quidem esse salubria. contraria vero periculum testari. absolutam itaque concoctionem fatetur sputū leue, albū, æquale, & substantia neq; liquidum, neque valde crassum. Summæ vero cruditatis nota est, si nihil prorsus expuit. At si expuat quidē, sed tenue, lāguidæ cōcoctionis argumētum est. Sin autem sincere rufum prodierit, aut flauum, nihil boni pollicetur. Si liuidum, aut æruginosum aut atrum, summā perniciem portendit.

De febribus diariis dignoscendis curandisq; Cap. xvi.

Diaras febres, vrinarum in primo die concoctio, calorisq; suauitas seu propria ipsarum & inseparabiles notæ testantur. Verum a prima febris solutione, certiore habiturus es earum cognitionem. Quippe arteriarum in hac motus ei qui in secunda valetudine fuit, ex toto respondet, cum nulla ex aliis febribus in naturalem statum reuertatur. iam vero quod facile morbum fert æger, maximū & id indicium est. Opportuni sunt id genus febribus, in quorū corpore quod defluit, halituosum non est, sed mordax & acre fumi, instar. Hi autem sunt calidi & sicci tēperamento, breuiter biliosi, quos

cōcoquuntur, crasse scere docet Philosophus. 4. Meteo.

Sputa, egestiones, vrinas, Symptomata maxime obseruabant antiqui, de pluribus parū solliciti erāt. Arist. tñ i libello de spiritu qdam tangit.

A nimia sollicitudine aī corporisq; la-

E

PAULI AEGINETAE

boribus
oriri ge
neratim
febris so
let.

Febrici
tantes
quoque
fomno
ti dicunt
esse.

πυροχολοὺς Græci vocant. qui igitur ob lassitudinē febricitarunt, pinguiter simul ac molliter fricandi sunt, in balneumq; ducendi. Quibus siccitas febrem intulit, fricandi hi quidem minus, sed lauandi sunt liberalius. Quos curæ mœrores, vigilæ & ira exercuerunt, lauare quidem non subinde oportet. verum oleo copiosiore tepido, cui minime astringens vis insit, tum paululum fricare, tum ex consuetudine lauare conuenit. Ab insolatu vsti, protinus ab initio refrigerationem desiderant, tum crebriorem lauationem, minime vero aut oleum largum, aut crebram frictionem. Sint autem quæ refrigerent & rosaceum & omphacinum sine sale confecta, eadem vero sincipiti vehementer refrigerata superfundere oportet, & vbi febris inclinauerit, in balneum æger ducendus est. Si quis ex frigoris iniuria febrem cepit, etiam is in remissione lauandus est. At si cum grauedine, & destillatione febriat, priusquam hæ concoquantur, lauationi non committetur. Porro qui ex æstu Solis febricitant, n̄, etiam cum hæc adsunt, lauandi sunt, qui autem ex frigore, iis quoque caput mediocriter calefacientibus perfundendum est, cuiusmodi irinum est, & nardinum vnguentum. Verum in quibus meatuum constipatio febrem exci. at, his conuenit ex aqua dulci, & temperata lautio, tum frictio, quæ rarefaciat, & exercitationes modicæ, victusque bonis procreandis succis idoneus. At cui propter inedia, febris contracta fuerit, ei opus est statim, vbi prima accessio remiserit, in balneum perduc, & tepente oleo largissime perfundi, tum molli manu perfricari, diutissime in calidi solis aqua immorari. Simulatque exierit, ac sese recollegerit, denuo balneum ingredi, postea aquam calidam potare, mox ptisanæ cremorem, deinde lactucam assumere, & aliquid piscium eorum qui molli sunt carne, ex albo iure. Omnium vero communis esto victus species, quæ & boni sit succi, & concoctu facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhæreat. Vinum propinetur & aspectu, & viribus aquosum. Oportet autem in primæ febrium accessionis insultu nonnunquam aliquos horum nutrire, in quibus corporis intemperies ad calidius, sicciusq; transiens, febres accendit. Qui ob bubonem hoc est inguinum inflammationem febrem conceperunt, ne medicum quidem interrogāt quid sit faciundum, sed vlceri, quod bubonis occasio fuit, prospicientes lauant, vbi accessio declinauerit. Cæterum a vino ipsi sunt arcendi, donec inflammationes inguinum fuerint solutæ, & tenuiore victu nutriendi.

De putridarum febrium agnitione. Cap. xvii,

Putridæ febres dignoscuntur eo quod nulla ipsas exterior causa præcedat, item quod a rigore incipiant, neque insolatu, neque ve

hementi frigore prægresso. id quoque peculiare est febrium putridarum indicium, sicut & pulsuum depressio. Nominant sic, cum incipiente accessione perexiguos quidem ipsos & inæquales obtinent, hoc enim singulariter huiusmodi febrium est proprium, maxima autem putridarum febrium nota est etiam qualitas caloris, qui fuliginosus adeo existit, ut manum erodat. Similiter ad ipsas proprie spectat etiam urinarum cruditas, & obscura concoctio. Magnum vero & notabile concoctionis indicium, in primis urinis nunquam eiusmodi febres repræsentant.

Curatio febrium putridarum.

Cap. xviii.

SI vires sint validæ ei qui ex putredine febricitat, sanguinem dimittes protinus, modo cruditas in ventre non existat. At si vires imbecillæ, aut ætas prohibeat, sanguinem non detrahes, a cuius vacuatione, putrida per urinas, aluum, & sudores expurgare convenit. Sin autem sponte sua nonnunquam impetum ad os ventriculi capeffant, etiam per vomitum, alioqui non oportet ea præter naturam irritare, cæterum deligi materiæ debent, quæ sine calefaciendo siccan- doque valenter, prædictas vacuationes moliri possunt, veluti ptisanæ cremor, aqua mulsa, oxymeli, & apomeli, apique radix in aqua potabili concocta. Cum alius nihil deiecit, ex aqua mulsa cum oleo clysteri ducenda est. verum totum corpus rarefacere prius non expedit, quam vacuatum fuerit, ubi vacuaveris, rarefacias utique licet, medicamento tepido calore prædito, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. in hoc tempore vinum aquosum potui datum, vniuersas promouet vacuationes, eiusdem facultatis est temperatum dulcis aquæ lauacrum. Quod si vero febris magnitudo obstiterit, neque vino utendum, neque lauacro, neque vñctionibus rarefaciendi virtute præditis, sed aqua frigida his in febribus comode bibitur, nisi quid & hanc prohibeat. Ergo si quidem & vires robustæ omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa plane euidentia, frigidam cum fiducia exhibebis. Præterea si bona corporis habitudine sit æger, tunc status cœli calidus ac siccus, etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haud quaquam lædetur, sin autem mediocris existat febris, & vires inualidæ, sed cum notis concoctionis, iis qui ita habent balneum prodest, & vini potio. Tum vero ex vñctionibus eæ quæ rarefaciunt.

De tertianarum agnitione.

Cap. xix.

TERTIANA febris cum sit flauæ bilis commotæ soboles, protinus ab initio rigorem, haud exiguum infert. hoc discrimine a quartanæ rigore variat, quod pungere videatur, & cutem conuulnerare. In quartanis autem, accessionis insultus vehementem perfrictionem

ga quo
natura
vergit
&c.

+ attēde
dū ī pri-
mis a me
dico dili-
gēter est,
q̄ sōnia
ægro-
tan-
tes vide-
rit. id. n.
atti pro-
dest plu-
rimum.

E 2

PAULI AEGINETAE.

de causis
aut perio
disq; fe
briu vi
de Gal. i
sua disci
plina. et
Alexā.
Aphr. in
probl. et
Proclū ī
Timæo.
ubi pla
netis ad
scribit
succos
ipsos &
eorū qua
litates.
sed res
cognitu
difficilli
ma est.
Dicit vo
ce oīum
inter ani
mātes &
caprā &
leonē eē
sine febrī
nunquā.

habet. Quotidianas vero nequaquam rigor præcedit, sed solum per
frigescunt. Cæterum tertiana etiam exactum pulsum ordinem ob
tinet. sitis vero vehemēti in statu affligit, & hominem perurit, ac pau
lo post consistit, calorq; æquabiliter per omnes corporis partes dif
funditur. Et si manum iniicis, primo quidem contactu, calor copio
sus & acris occurrit, veluti cum vapore, quodam erumpens, sed pau
lo post a manu remanente vincitur. Vbi potione æger fuerit recrea
tus, statim copia vaporis calidi per cutem emergit, sudorum nuntia.
Bilis vomitio superuenit, aut alius soluitur, perq; vrinam biliosa red
duntur. Præterea ad integritatem tertiana desinit, vbi accessionis tē
pus, horarum non plurium duodecim expedierit. Febrem igitur quæ
intra duodecim horas terminatur, exactam tertianam nominamus,
quæ vero diuturniorem accessionem habuerit, illam simplici voca
bulo tertianam nuncupamus. quæcunque autem longissime produ
ctam accessionem seruauerit, exiguum vero interuallum, hanc rur
sus extensam tertianam dicimus.

Curatio tertianæ.

Cap. xx.

EXquisitam tertianam, vt quā flauabilis procreet, humectare oportet ac refrigerare. & sane quod in ventriculum confluit, vomitio
nibus, & inferius elicere. Item per vrinas, & sudores deducere idip
sum conuenit. Alius itaq; mollibus clysteriis euocatur, vrina potio
nibus, in quibus apium, & anethum maduerunt, & si concoctionis
signa deprehenderis, magna iam confidentia etiam absinthium da
bis. Balnea vero ex aqua calida potulenta conueniunt, quibus neq;
nitrum, neque sal, neque sinapi adici, sed ægrum cleo quam maxi
me calido perfusum in solium descendere oportet. At qui balneis ad
modum gaudent, eos etiam sibi die laueris, haud peccabis. Vbi ve
ro concoctionis notas perceperis, tunc, vel si sæpius laueris, nihil of
fendes. Porro vinum priusquam morbus concoquatur, ex toto cir
cuncidendum est. simul atque vero concoqui inceperit, tenue, aquo
sum, modicum, primo die exhibendum. Cibi humectantes, refrigerā
tesq; vtiliter assumuntur. A melle abstinendum, sinapi, salsis & acri
bus omnibus, vinis autem admodum vetustis, & natura calidis. Cæ
terum nihil miri est, si in hominibus primū exercitis, inediaq; ex
pertis, nunc autem ordine conuerso otiosis ciboq; vsis pleniore, bilis
maxima ex parte mixta pituitæ reperiatur. Cuius rei gratia cōplu
res tertianæ, aut citra rigorem fiunt, aut perexiguus ipsis, oboritur,
vnde etiam animaduersionem propriam desiderant. Neque enim bal
neum, neque cibus aliquis liberalior tertianis spuris ante concoctio
nem conuenit, quoniam ne panis quidem micæ, oua, & consimilia.

Curatio tertianæ nothæ.

Cap. xxi.

L Auare in tertianis spuris per initia salubre non est, sed quando in concoctionis notæ apparent, neque cibum quotidie exhibere, sed alternis diebus abunde est. Quies autem & præcordiorum fatus ipsis conducit tum sorbitiones concoctu faciles & clysteres aluo inditi non admodum molles. Atque si sanguinem detrahare opus est neque hoc omittere oportet. Tota vero victus ratio erit non quæ refrigeret in totum humectetq; verum etiam modus aliquis qui magis incidat ac calefaciat adhibeatur. Maxime vero conduxerit ipsis pti sanæ cremor pipere iniecto. vel hyssopum quoque nonnunquam vel origanum vel spica nardi aquæ mulsæ admista incoctaque potui exhiberi & alia quæ vrinæ ciendæ sunt præterquam ea quæ vehementer calefaciunt exiccantque. Potissimum vero absinthium post septimum diē porrigi debet. Iam & oxymel epotum multis fuit auxilio. ad hæc nonnulla ex his quæ molliter ventrem subducūt. Porro vomitus secundum cibum iis quibus hæc febris in vetustatem incidit utilisissimus est.

Quartanarum cognitio.

Cap. xxii.

Quartana inuadit multa cum perfrictione vt quæ ex frigido humore atra bile originem trahat. Calorem vero feruoremq; febrilem tertianæ modo non obtinet, imo nec bilis vomitus eam comitatur. Ad hæc si vrinæ tenues albæ & aquosæ fuerint quartana erit febris. Eximia vero ipsius nota est pulsus exiguus & rarus. Cæterū in autumno potissimum incipit erraticis superueniens febribus ac nonnunquam in forma eius potissimum subsistit quæ quarto die reuertitur, aliquando etiam plurium dierum interuallo iuxta quosdam circuitus accessionem habet.

Curatio quartanarum.

Cap. xxiii.

Quartana laborantes leniter tractandi sunt neq; medicamento vlllo forti sollicitandi neque vacuatione, nisi forte sanguis vehementer exuperare videatur, cum venam dissecare conuenit. Victus eis offeretur optimus, qui non inflat, & venter his quibus vtī cōsueuit, emolliri debet. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus per initia quidem mollibus, deinde vero acribus vtendum est. A suilla carne prohibeantur ægri, atq; ab omnibus cibis qui glutinosi, ad exitū tardi sunt, tum qui refrigerant corpus, siccantq;. Vinum vtile est tenue, album & modice calidum. Item salsa & sinapi ex usu sunt, tum per dies aliquot assumptum medicamentum diatrion pipereon, idest quod triplici constat pipere, vel quod diospoliticon appellant. Iam & piper solum recte ex aqua quotidie sumitur. In morbi statu victus ægro tenuissimus præcipietur, statim vero etiam vt diu cōquiescat, iniungendum est, tum visceribus prospiciendum per ea quæ

P A V L I A E G I N E T A E .

φάρμα-
κον δι'
ἐχιδνῶν

emolliunt, relaxantq;. In securis diebus medicamenta conferunt, quæ urinam cient. atque si concoctionis notæ apparuerint, cum fiducia tunc quoque iis uti expedit, quæ atros humores vacuant, idq; non semel duntaxat, verum etiam sæpius. Porro secundum validam purgationem, & medicamentum quod viperis constat, exhibetur, & alia quæ ad eiusmodi febres commendantur, inter quæ est & nobis familiare, omnium probatissimum, quod succum cyrenaicum recipit.

Quotidianæ agnitio.

Cap. xxiii.

Quotidiana haudquaquam cum rigore primo statim die inuadit, sed procedente tempore perfrictio magis quam rigor oritur. Aegre vero incalescit, & diuturnum habet incrementum, imo neque adurit ægros, neque multum, & crebro spirare compellit, neque efflare, vel frigidam bibere. pituitosi autem vomitus hic accidunt, & quæ per aluum vacuantur, frigidiora, crudiora, aquosiora cernuntur, totum corpus crudis humoribus redundat, sudores minime primis diebus erumpunt, neque ad integritatē venit, cutis ægrotantibus albicat, urinae vel tenues sunt & exalbidæ, vel crassæ, turbidæ & rubræ.

Curatio quotidianæ.

Cap. xxv.

Quotidianam curantes, oxymelite primis diebus utimur, tum iis quæ urinam probe eliciunt, ac vniuersa victus species incisoria esto, circa statum vero ventriculi habenda est ratio, præsertim ipsius orificii, deinde ægris iubendum est, ut a radícula & cibis assumptis vomant. Itidem utantur iis quæ pituitam subducunt, idque tamdiu quam febris cessauerit.

De hepialo febris & rigore qui ægre potest excaliesci.

Cap. xxvi.

Si vitrea pituita, quæ omnium aliarum frigidissima est, nondum putrefacta toto in corpore exundauerit, rigorem qui ægre excaliesci potest, sine febris excitat. In febribus enim, quæ humoris vitio accenduntur, putrefactio maxime febrilem calorem suscitatur. At si tota hæc pituita putruerit, quod tamen raro fit, ob immensam frigiditatem quotidianæ febris causa redditur. Quando vero non tota æqualiter, sed ex dimidio ipsius putrida fuerit, aut aliquæ ipsius partes, nonnullæ vero non putruerint, hepialum febrem hanc facit, in qua simul & rigent, & febricitant. Particulæ quidem humoris eius necdum putredinem expertæ, omnibus venis, vel etiam reliquo corpori communicatæ & sparæ, rigorem creant, putrefactæ vero febrem accendunt. † Dicta est autem Hepialos per translationem a sale, dicto autem mari, quod tranquillum quidem apparet, in principio au-

tem difficile turbulentumque erat. Vel ab Hepios, quod est molliter & alexinin, quod signat cal elacere, quasi dicas, quoniam blande & leniter calefacit. At que hæc febris cum ex quotidianarum genere existat, ut pote ex pituita nascens, illarum curationi subiicitur specialij, nisi quod tanto commemorata quotidiana calidioribus magisque incidentibus presidiis indiget, quanto etiam pituita frigidior illa existat. Hepiali uero rigor multo magis calefactione requirit. Itaque medicamentum ex triplici confectum pipere, ex calaminthe præterea, & quod liquore cyrenaico constat, his sunt accommodata. Item ex castoreo. similibusque præparata remedia conueniunt. Latius autem diffusiusque explicatam curationem horum reperies in capite quadragesimo quinto de rigore & perfrictione. Insuper Lyprieæ & Tiphodes, quæque præter commemoratas febres dicuntur cum sint ex relatarum numero, etiam curationes, tum in illis expositas, tum exponendas postulant.

† Locus hic multo rectius in libris manuscriptis quam impressis, quos interpretes sequuntur, exaratus est. Sic enim legitur in antiquis cod. λέγεται δὲ ἡ πιάλῃ ἢ ἀπὸ μεταφοράς τῆς ἀλῆς λέγω δὲ θαλάσσης, ἡπτίας, ἢ φαινομένης, χαλεπῆς δὲ κατὰ τὰς τεραρχίας αὐτῇ ὑπαρχούσης non κατὰ τὰς ἀρχάς. quibus uerbis significatur mare esse molestum & difficile cum turbulentum est & agitur.

De febribus continentibus

Cap. xxvii.

Continentes finitimæ sunt singulis intermittentibus, tertianæ quidem exactæ ardens, quæ causos dicitur, quotidianæ, ea quæ singulis diebus accessionem habet, non autem ad integritatem definit. Sic etiam quartanæ, ea quæ quarto die accedit. Exactus nanque causos, cum omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruet, hoc solo differimine variat, quod non cum rigore inuadat, neque ad integritatem ueniat. Qui singulis diebus accessionem obtinet causos, omnes similiter exactis quotidianis notas præse fert, quod autem ad integritatem non peruenit, hac re a quotidiana specie consimili differt, ea ratione & quæ quarto quoque die accessionem habet, verum ad integritatem non cessat, finitima est quartanæ. Continens itaque febris est, quæ non ante ad integritatem terminatur, quam ex toto fuerit soluta. Quum autem ne declinatio quidem accidit, quæ sensibus queat percipi, hæc quoque ex ardentium genere habetur, sed acumine ab ipsis variat.

Agnitio febrium continuarum quas synochos græci vocant, & curatio

cap.

xxviii.

E

PAULI AEGINETAE

Continuarum febrium, synochos græci appellant, origo ex sanguine est, nunc efferuescente, nunc putrefacto propter obstructionem. Quapropter accessio ipsis ad usque finem una est. Indicia vero sunt, pulsus maximi vehementes, citati, crebri, æquabiles, non mordaces. Urinae non multum adeo a sanis recedunt. Curatio est, sanguinis quousque deficiat anima, dimissio. Qui si non fuerit detractus, febricitantes in summum veniunt discrimen. At si quid per venæ sectionem vacuare prohibuerit, alijs uti remedijs oportet, quæ meatus recludunt, copiam materiæ vacuant, & febrium feruorem leniunt. Cum autem euidentes humorum concoctionis notas in ipsis videris, neque in principe particula inflammatio quædam, aut tumor cedematis speciem representans, aut scirhus fuerit, neque particula aliqua adeo frigida, ut in hanc noxa procumbat, cum fiducia frigidam propinato, maxime si æger eius potioni assueuerit.

Ardentium agnitio.

Cap. xxix.

Ardentibus hæc superueniunt, arida lingua, aspera & nigra, venter rosio, deiectiones pallidæ, sitis vehemens, vigiliæ, nonnunquam etiam delirium.

Ardentium curatio.

Cap. xxx.

Horum alterutrum fieri necessarium est. si perfecte morbus solui debet, aut biliosos excerni humores, aut eosdem extinguere. Excernuntur itaque per sudores, vomitiones, & imum ventrem. Extinguuntur autem frigida potu, quo nos vrentes febres, causos appellant, ex toto curauimus. Sustinere eos qui his cruciantur, non aqua sola conuenit, neque mulla duntaxat, verum aquosa mulla exhibita. Nam qui huiusmodi morbis conflantur, sola potione sustentandi sunt. Porro balneum illis solum vsui est, qui citra tumorem inflammatorium, aut erysipelatum, ardenti febre laborant. Quod si vero concoctionis noctæ percipiuntur, multo magis ipsis conducet. Qui ex falso humore, febrem ardentem conceperunt, his est inutile. Verum iisdem ptisanæ etiam cremorem cibi loco offerre conuenit.

Febrium quibus ex affectu erysipelaceo origo est, curatio

& agnitio.

Cap. xxxi.

Febres quæ ex Erysipelaceo viscerum affectu procreantur, his notis agnosces. interna feruent immodice, dolor urget vehemens, præterea sitis excruciat, & ardor immoderatus. Summatim ex indicijs accerrimæ bilis cum paucio sanguine putrescentis deprehendes. Hunc in modum curabitur. A balneo in totum abstinere decet. Aqua frigida per morbi statum vehementi, hoc est frigidissima vten dum est, per initia non item. Extrinsecus vero refrigerantia imponentur, & nihil hæc promouerint, etiam intro eadem sumere ægri cogentur.

Maxime ipsis conueniunt lactucæ, & quæ parem his facultatem obtinent, a foris & ipse lactucæ succus idoneus est, adeoq; intybi & semperuiui, & reliqua refrigerandi virtute prædita, sed præstantissimo parte plurima vtimur. Nam liquorem refrigerantis alicuius expressum pilæ cum portulaca iniicimus, deinde contusa exprimimus. cum vsus exigit, modico polentæ mixto hæc in aqua frigida mersa, refrigeramus. Linteum vero duplicatum in ea intinctum extrinsecus, aut vbi calor sentitur, præcordiis obtendimus, non diu adhære re finentes, verum aliud frigidum eius loco applicantes. Iam vero & oleum omphacinum medicamini nonnunquam miscemus.

Hæcticarum febrium agnitio.

Cap. xxxii.

Hætica febris non in humoribus, & spiritu solum, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc absque dolore consistit, & qui ea detinentur, nequaquam febricitare se existimant, neque enim calorem percipiunt, cum vniuersæ ipsis particulæ æqualiter sint excoactæ. Duplex hæcticarum febrium species est, prima ardentibus magna ex parte superuenit quæ prorogantur adeo vt tempore corporis ipsius cordis madorem absument, vel etiam multo adhuc permanente. Quæ vero manente etiamnum humiditate fiunt cordis corpus occupantes, inde potissimum accenduntur, Vnam sane ipsius generationem prodidimus. Reliqua vero est cum statim ab initio inuadit, primam originem diariis similem, ex mœrore, ira, lassitudine maiore, vna cum exustione in sole, sortita. Hæc igitur non difficulter cedat remediis. Quæ vero ex ipsis in marcor em qui Græcis, dicitur *μαρasmus* deuenit, omnē respuit curationem. Atque hæc sane cognitu est facillima, oculi siquidem præter modum concaui eam testantur, & lemæ ipsis inhærescentes aridæ, tum dispositio quædam squallida, viuidi ipsorum coloris flos emarcuit, frons sicca est & intenta. Quinetiam conuiuent plurimum, hac occupati, quemadmodū dormituri. verum affectio, somnus non est, sed vigilandi impotentia, tempora collapsa sunt & quid enim aliud præter ossa & cutem solam habent? Nam si denudatis ipsis ventrem inspexeris, neque intestinum neque viscus vllum superesse tibi videbitur, præcordia sursum conuellantur, & cutis ipsis extrema resiccata est, pulsus gracilis, creber & durus. Caliditas autem primo occurso languida, paulo post acris & rodens erumpit. quousque igitur humiditatis aliquid reliquum est, hætica solum febris dicitur. Cum vero periclitatur, ne nihil amplius humoris supersit, absolutus iam marcor constituitur.

Hæcticarum febrium curatio.

Cap. xxxiii.

ah r.
Hæc igitur curare difficile est.

Quæ cōuellunt mēbra ad suū quodque principium Gale. & Hippo.

PAVLI AEGINETAE.

Hectica febre laborantes, statim ab initio nutriri desiderant, humorum rodentium gratia. Maximum vero remedium huius est, victus humectans. Conuenit igitur quam maxime ptisanæ cremoris halicæq; sorbitionibus, & pane præterea adiecto ægrum nutritum, moderato frigida potu curare, si neque inflammatio quædam, neque humorum putrefactio subest, at si magnam inde offensam fore coniecturaueris, frigida abstinere oportet, extrinsecus autē impositis, quæ refrigerant auxiliis, uti. Balnea vero hoc morbo obnoxiiis, quolibet tempore sunt idonea.

De semitertianis.

Cap. xxxiiii.

Quandoquidem tertiana cum rigore, quotidiana vero ci tra illum inuadit quæ ambarum mistura constat, horrorem inducit, quia minor quidem res est rigore, maior autem perfrictione. Quapropter cum horror æquali ab utrisque extremis intervallo, medium ambarum rigoris nimirum & frigoris occupet, quod contemperatis inuicem extremis accidit, non abs re nomen huiusmodi febris semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur. vel enim duæ accessiones in idem tempus concurrunt, vel statim ab initio ambæ inuicem iunguntur. Quando igitur tertiana præpollet, magis horrida febris efficitur, & rigoris etiam non nihil per accessionem assumit. Protinus autem talis calidior est & ardentior, tum vomitione quamdam bilis, aut deiectionem, aut madorem adfert. Quando altera pituitosa superat, perfrictiones quidem summa exercent, pauci vero horrores, neque tamen sitis, neque ardor in his affligit. Cum pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana continua, insultus quidem accessionis cum horrore accidit. At cum ex pituita proueniens febris præcelluerit, depressiones pulsum fiunt, & horrores. Si vero calidior præualeat, subito ac vna vice incalescunt. Talis sane est exacta semitertiana, ex æquivalente duarum febrium, puta tertianæ intermittens & quotidianæ continuæ temperatura proficiens. Non exquisita vero vel bilem largiorem, vel pituitam causatur, quæ iam magis etiam curationi renititur, cum modicus humor a copiosioris dominio artisq; auxilio expedite vinci possit. Si. n. pituita sit superior, præfidiis maxime utemur quæ in quotidiana exposuimus, si autem flaua bilis, iis quæ in tertiana comprehensa sunt. In totum ei quod vrget incumbentes, sed ita, ne alterum prorsus negligamus.

De morbis publice grassantibus.

Cap. xxxv.

Publice grassantes communesq; morbos nominant, qui multis simul obueniunt quorum ut generatio, sic etiam causa commu-

nis est. Cibiq; igitur communes prauis, illiusmodi morbos communes pariunt, item aquæ vitiatæ potio exercitia immoderata, labores quibus quisque assueuerat omisfi, inedia, repletio, idque dum fames grassatur, aut foecundus annonæ prouentus est. Item regionum naturæ, communes subinde morbos intulerunt, quæ nonnunquam palustres sunt, aliquando barathrum habent vicinum, quod vaporem exitiosum prauumq; exhalet. Hæc quidem non continue accidere consueuerunt. Aer vero nos ambiens, temperamenta corporum commutat, vel calidior impendio, vel frigidior, vel humidior euadens, siquidem in alias causas neq; omnes simul incidimus, neque eis toto die immoramur. aer autem quoniam omnibus circumfusus est, & per inspiratum attrahitur, vt animalium corpora, pro temperamenti ipsius immutationibus simul afficiat, necesse est. Qui igitur hæc intelligit, non solum morbos ex vnoquoque aeris statu futuros præfagiet, sed etiam ne fiant prohibebit, contrarium immoderatis circumflui aeris temperaturis victum accommodans. Itaque corpora morbo alicui ex propria intemperie vicina, hæc a simili circumdantis nos aeris temperamento deprehenduntur. Quæ contrariam cœlo temperiem obtinent, præterquam quod nullam offensam experiuntur, etiam meliora fiunt, dum repugnans aeris immoderatio temperamenti immoderationem punit. ac qui hoc nouit, secundam valetudinem tuebitur, contraria corporibus inducens, nunc refrigerantia scilicet, nunc calida, aqua quidem superinfusa refrigerans, itidem ocio, ciborum inedia, & potu largiore, calefaciens autem, operimento, laboribus, cibo liberaliore, & interdum parcior. Præterea lignorum acervatim constructorum incendio haud mediocriter aerem ad calidum & ficcum mutaueris, si tunc humidus fuerit, quo modo Acronem agrigentinum factitasse ferunt.

† In antiquo codice hæc aliquanto ex planatiora sunt in eo enim hæc verba ita leguntur. ὁ δὲ περιέχων ἡμᾶς αἷρ, τρέπει τὰς κράσεις, ἢ τοὶ θερμότεροι αἰθέρες, ἢ ψυχρότεροι, ἢ ξηρότεροι, ἢ ὑγρότεροι γινόμενοι, Idest, Aer qui nos circumstat vel calidior, vel frigidior, vel ficcior vel humidior temperamenta immutat. Quam huius loci veram esse scripturam vel ex iis quæ de eadem re scribit Aetius intelligi potest.

De pestilentia ex commentariis Ruffi.

Cap.

xxxvi.

Pestilentia grauisissima omnia superueniunt, nihilque in hac facit in aliis morbis singulis occultatum. Etenim delirium accidit,

aeri plū
mū attri
buit, ex
quo &
Græce
dicebat.

id quoq;
Hip. &
Gal. fece
rūt pestē
abigētes
et Empe
do. Hip.
artoxer
si, peste
laborāti
auxilia
ri noluit
se tradit

Pestilen
tia pi
sces ca
rent.

PAULI AEGINETAE.

& bilis vomitio, præcordiorum intentiones, labores, sudores largi,
 extrema algent, alui profluvia vrgent biliosa, tenuia & flatulenta,
 vrinæ cernuntur aquosæ, tenues, biliosæ, nigrae, mala habent substi-
 dentia, suspensa pessima, nares destillant, pectus ardet, lingua torrida
 est, siticulosa, remissa, torquent vigilæ, cōuulsiones uiolentæ, aliæq;
 multa praua. † At si quis pestem venturam prænoscet, ex maligno-
 rum anni temporum, & vitæ studiorum ad sanitatem haud condu-
 centium animaduersione, aliorumq; animalium præcedente interri-
 tu, his apud se consideratis, & illud præterea perpendito cuiusmodi
 sit præsens anni tempus, qualisque vniuersus annus. Inde si quidem
 qualis victus ratio esse debeat optime deprehendes, vtpote cum an-
 ni tempus, si quidē recte ortum est, ex sicco humidum nunc euaserit
 necessum est victus ratione desiccare, vt humor superfluous absuma-
 tur. item ventris quoque habenda est ratio. Quibus superior ventri-
 culus pituitam continet, vomitionibus sollicitare, quibus autem san-
 guis inundauerit, secare venam oportet. Iam per vrinæ purgatio,
 aliæq; & totius, corporis, proficiunt. Quod si etiam æger ardore æ-
 stuet, & flamma vsque ad pectus pertineat, haud abs re fuerit refri-
 geria pectori applicare, & potionem frigidam offerre, idq; non pau-
 latim nam magis hoc pacto incendit verum vna vice ac semel vt
 flammam extinguat. In quibus autem ardor interiora occupat sum-
 ma vero inalgescunt cutis in superficie frigida percipitur præcordia
 contrahuntur, venter colliquata partim supra partim inferius trans-
 mittit, vigilæ vrgent, mens desipit, lingua est aspera. hi calefacientia
 requirunt remedia ut calor per totum corpus distraharur † ac si alio
 quopiam modo ab internis foras potent elici. Iam vero & hæc po-
 tio vtiliter præsumitur. Aloes partes duæ guttæ ammoniaci partes
 duæ myrrhæ pars vna. Hæc in vino odorato contrita instar dimi-
 diæ fabæ exhibentur nimirum quotidie. Haud noui, inquit Rufus
 qui hoc potu pestem non superauerit. Hæc quidem Rufus memo-
 riæ prodidit. Galenus autem tradit ad pestilenciales putredines bo-
 lum armeniacum salubriter potari. Simili felicitate etiam Theria-
 cem ex viperis magnam prodesse. Etenim in pestilentia quæ Ro-
 mam internecino morbi genere depopulata est, omnes quos nullū
 ex his medicamentis adiuuit, interisse scriptum reliquit.

† Simplicior & meo quidem iudicio huius loci sensus verior est
 in exemplaribus manu scriptis. Sic enim habent. σωείδοι δ' ἂν τις
 μελλοντὰ ἤξεν τ' λοιμὸν προσέχων ταῖς τεωραῖς &c. id est cōficiet
 autem quispiam futuram pestilentiam si attente consideret tempo-
 rum &c.

† Quod est in impressis καὶ δεινὸν in manu scriptis magis expla-

natum est ἐκ τοῦ βάθους id est ex profundo.

De iis qui ex redundantia crudorum humorum syncope periclitantur. Cap. xxxvii.

Nonnulli febricitare incipiunt ubi magnam crudorum humorū copiam ore ventriculi simul offenso, congesserunt. His & prae cordia instantur & os ventriculi vastiore mole quam pro naturae modo cernitur, adhuc color ipsis ad albidius aquosiusque magis est mutatus quibusdam ad nigrius. Nulli talium sanguis mitti sine maximo dispendio solet etsi vacationem desiderent. Verum nec sanguinis dimissionem nec purgationem sustinet utpote quos etiam si ne his syncope subito adoriatur. Ratio igitur medendi talibus est quam frictione molimur. Incipere vero per initia statim morbi oportet ac primum a superiore crurum parte deorsum, idque linteis non admodum mollibus, sed modice asperis. Deinde tota brachia ab humeris usque, & superiore parte deorsum simili modo sunt fricanda. Vbi vero artus omnes abunde calidi videntur, & metus est, ne quis ex ampla frictione lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxante uteris, ab astringentibus autem abstinebis. per hyemem vero etiam digerentium usus erit, quod genus est sicionium, & chamæmelinum. Cum iam artus plurimum perfricueris, postea oleum detergetur, inde ad spinam dorsi transitus est, haecque tota perfricabitur similiter, ab hac rursus ad crura te conferes, & hinc ad brachia. exinde rursus ad spinam. ita toto die facies. Porro mulla in qua coctum hyssopum fuit his est aptissima, cauendumque, ne vel cibum, vel sorbitionem, vel aqua exhibeas, vel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mullam tribus primis diebus duntaxat, tuis ipse manibus, quas dixi partes ordine perfricans. Sin autem robore mediocri sit, et aluus sua sponte commode non dericiat, cum fiducia aliquid ab inferioribus partibus infundes, Quod si maior iusto recrementorum impetus ad aluum citetur, principio quidem percoquere mullam amplius oportebit, minus enim ea subducit. At si plenius superuacua descendant, ne sic quidem sistenda aluus, sed exhibendus pro aqua mulla ptisanæ cremor est. Si vero fluere pergant, chondri sorbitione nutries. Si ex pulsu vires col lapsas ob imbecillitatem didicerimus, panem ex vino diluto exhibere conueniet, utique si nec venter nec iecur inflammatione laboret quando si hac infestentur iam corpore crudis succis referto, nulla plane medicina periculo subtrahit. Sin autem quandoque crassi abunde humores deprehendantur, oxymeli pro mulla continue exhibebitur. Ergo si æstas sit, & æger calidi temperamenti frigidæque potioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis. sin hyems sit, calidum omnibus. Sane balneum his est aduersissimum. Porro iis quos syncope

æge-
tū viū
demētes
facit po-
tatores.

PAULI AEGINETAE.

iam premit, si partes modo commemoratae inflammatione vacent, panis exhibebitur modicus, usque ex vino quod celerem in corpus digestionem adiuuet, statimque ad frictionem veniendum est, quæ pro tradito quoque iam modo administrabitur, verum quibus ex flaua bili, quæ os ventriculi infestet, syncope incidit, is frigida offerenda potio est vinum tamen tenue, fuluum & vetus.

De his qui ob prætenues humores syncope opprimuntur. Cap. xxxviii.

quod vi
delicet
adeo
tenues
sunt, vt
citius pe
netrent.
Nam vi
na quo
que te
nuia ma
gis tem
lentiam
afferunt
q̄ gran
dia. Ex
eo est, q̄
celerius
penetrât
& spiri
tus itine
ra occu
pant.

Qui tenuium humorum vitio syncope premuntur, diuersam a supra dictis curandi rationem desiderant, vt quos dignoscendi nota illis contrariæ testentur. Nutrire hos oportet paulatim & continue. Porro ad exitum spectare existimandi sunt, si vel iecur ipso, vel ventriculum inflammatio obsedit, viribus iam languentibus. In eiusmodi affectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sane nutrire est necesse, sicut etiam corporis summa densare, non secus quam priorum rarefacere, & frigidum ipsis aerem accerfire. Vngendi sunt præterea astrictoriis vnguentis, tum cibi iis dandi, qui non admodum prompte diffuant, non aqua mulsa, non ptisanæ cremor, sed panis & sorbitio ex chondro, & fructus austeri, qui non facile corrumpantur, tum ipsi per se, tum vero & cum pane. Vinum iis aquosum necessarium inter initia est, sumptum post cibum.

De reliquis occasionibus, quibus syncope succedunt. Cap. xxxix.

Reliquæ occasiones, quæ syncopas concitant, quatuor sunt numero, dolor vehemens, vigiliæ, immodica inanitio, ac in iis qui aliena loquuntur, aliquando motus. Sed & quintam, si placet, addas, nempe principiorum intemperiem. Celerrime igitur cor affectum in perniciem præcipitatur, mox cerebrum, deinde breui iecur.

De dolore. Cap. xl.

Itaque dolor stupidus ex frigida oritur affectione. Pulsatilis autem dolor magnæ inflammationi peculiaris est. Sin autem tanquam a palo impacto, aut veluti a terebro forari putes, crassi intestini species doloris est. Punctorius autem, circa membranas constituitur. Pertundens vehementissimis non heterocraniis solum, sed cephalæis quoque accidit. Est autem pertundens dolor, cum a parte primario affecta, ceu a radice subito in vicinas perfertur. Porro distendentes vtrinque, neruorum dolores sunt, cum & laborant, & ad vtraque extrema tenduntur. minime vero in latitudinem porrectos nerui dolores percipiunt, at tenuiores, stupefacientesque dolores membrana quidē sub cute porrecta inducit, quæ vero inter carnem hærescit, tanquam diuellentes cruciatus excitat. multæ si quidē existunt inæqualiterque

inhærescunt, & ipsam carnem amplectuntur. Membranarum vero quæ ossibus circundantur, profundius sunt, ipsorumque ossium tãquam dolentium imaginem repræsentant. Quando igitur nulla extrinsecus doloris occasio fieri apparet, præcedens victus ratio venit inspicienda, fuerit ne præter consuetudinem otiosa, aut cibus homo usus sit largioribus, iisque ex valenti materia, vel solita excretio sit retenta. Nam si ex his aliquod, vel omnia quoque appareant, doloris causa est repletio, ac quam citissime homo vacuari debet. Sic enim licet tibi maxima cum securitate iis uti remediis, quæ fluxiones dolentibus particulis incumbentes repellant. Si igitur sanguinis sit copia, quod distendit, veluti in inflammatione oriri solet, protinus si vires patiuntur, sanguis dimittendus est, per magnam venam patienti particulæ propinquam. Vbi autem vitiosus humor duntaxat affligit, purgandus est. Si utraque coeant, ambabus utere vacationibus, sanguine prius emissio. Quod si his peractis dolor etiam remanet, constat profecto in ægrotante particula impactum esse, quod afficit. Patet vero curationem ipsam per digerentia quoque medicamenta esse moliendam. Pari ratione, & qui ex flatuoso spiritu dolores contrahuntur, curabimus, auxiliantes simul in his potius tum extenuationibus cibis, tum per sedem iniectionibus, item cataplasmatibus irrationibus atque fomentis ambiens ipsum corpus rarefacientes. Sin moles grauando, contundendo ve dolorem excitet, moli eidem est mendum. Sin rodens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant, & calefaciunt. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, & somniferum est, & viride sicco magis.

Ad syntexes, hoc est corporis colliquamenta.

Cap. xli.

QUum per ventrem aliquid non ex esculentis, poculentisque, verum ex ipsius corporis substantia excernitur, humore in aluum ipsam confluente, qui quidem fluxu bili continue per vomitum, & infra erumpenti consimilis est, odoris autem foeditate ab ipsa differt, tum quod deiectus rufus magis, & crassitie glutinosus, interim vero oleosus appareat, tunc nimirum caro pinguis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eliquescit. Malo inueterante, nonnihil etiam ex ipsis solidis partibus absumitur. In hac perniciosissima febre frigida potio utilis est, quæ ex fonte frigidissima petitur. Huiusmodi quoque esse conuenit cataplasmata, & epithemata, quæ refrigerent, thoraci, & præcordiis imposita. Item cibi refrigerantes, recte offeruntur.

De vigiliis in febribus.

Cap. xlii.

PAULI AEGINETAE

AT vero eorum, qui immodicis torquentur vigiliis, crura & brachia vincire, † quo tempore somnum captare solent, iubemus, et excitari. nonnunquam palpebras aperire, si conueniant cōpellimus, donec abunde fatigentur. Inde subito vincula soluimus, lucernamq; tollimus, & altam esse quietem iniungimus, si nihilominus vigiliae pertinaciter vrgent, vbi accessio remiserit, frons nigri papaueris albi cortex torrefactus, detritusq; & mandragoræ radice leuigatæ tantundem cum vino, & rosaceo malagmatis forma fronti applicetur, serpillioq; cum meliloto in passo decocto. Hoc etiam in accessionibus est vtendum, vel trita papaueris capita excipientes pane cum rosaceo, vel eiusdem cerato illinimus. Cibus quodammodo sit magis accuratus. Adiciatur autē sorbitionibus capitum papaueris albi seminis cochlearium trium instar. †oleribus commisceatur papaueris nigri, si quidem folia fuerint viridia, quantum tribus digitis potest comprehendi, sin minus, tria quatuorue papaueris capita sicca, si mul incocta deligantur. Si ne sic quidem somnus accesserit, papaueris lachryma, aut succo mandragoræ circumlinentur. Iam linctus ex papaueris capitibus compositus, & præsertim ex sapa, mensura cochlearii, vel vnus, vel dimidii potus, somnum frequenter accersit. In quibus autem caput non facile humoribus repletur, & vigiliae infestant. vtere in declinationibus etiam tali suffitu. folii amomi, costi, arnabo, singulorum vncia. carpobalsami drachma, syraxis, amomi, ammoniaci, bdellii scynthici, mandragoræ radice, lachrymæ papaueris, singulorum drachmis quatuor. Ex lignis cupressi accensis suffito.

† Hæc verba sic leguntur in veteri codice, ὑπερβαλλόντων δὲ ἀγρυπνούντων, σκέλη καὶ χεῖρας δεσμεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καὶ ὅγῳ ὡς τὸ ὑπνον εἰσάγει τρεπεῖσθαι κελεύομεν τὴν ἐγρηγορεῖν καὶ διοίγειν τε πολλάκις μῦσαι ἀναγκάζομεν τὰ βλέφαρα, id est, eorum vero qui multis vigiliis torquentur, crura & brachia iubemus, quo tempore somnum capere solent ligari, & excitari, palpebrasq; sæpe aperire & claudere cogimus donec &c. Qui sensus magis cōcinuus ē.

† Id sic legitur in antiq. lib. τοῖς δὲ λαχάνοῖς συνεξέειδω μήκας vos μελάνης, simul coquatur & ferueat cū oleribus papaueris nigri.

Curatio soporis noxii, qui cataphora Græcis dicitur. Cap. xliii.

FRons posca lactis modo tepenti abstergitur, & summa valide ligamentis excipiuntur. naribus admouentur quæ incisoriæ facultatem obtinent. In remissionibus etiam cucurbitulæ valenter dorso, & spinæ defiguntur. Si vero morbus his non cedit remediis, etiam

etiam quæ sternutamenta excitant, obiciuntur. Ciborum materia sit, quæ incidat, diuidatq; , veluti in præceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

Curatio doloris capitis in febribus.

Cap. xliiii.

SI capitis dolor in febribus affligit, post convenientem febrium vacationem in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, vel rosaceo, cui etiã aceti pauxillum sit admixtum, si æstas sit, & febris ardens, frigido, si hyems, neq; febris ardens, calido, aut tepido. Incoquatur nonnunquam oleo & serpilli polygoniq; succus, per æstatem etiam papaueris capita, vel ipsum papauer, quemadmodum hyeme peucedani momentum. Quod si vero dolor in fronte perseveret, sinciputq; pilis careat, hoc quoque obducendum est veteri polenta, & polygonio, vel modica myrto, vel serpillio. Quosdam & pulegium applicatum magis leuauit. Nonnullis etiam cum igneus sensus inest, psyllium polenta temperatum profuit, vel ipsum per se in viscum coctione redactum, & continue mutatum. Item coriandrum similiter cum polenta, & aloe cum aceto illinitur, myrrhaq; & ammoniacum pari modo, nec non crocomagma. Pulsatiles autem dolores ruta, mentaq; cum pane diffilat, rosaceo quoque superaddito. Atqui si dolor commemoratis auxilijs non eliditur, primum caput ad cutem attondere oportet, deinde pinguioribus asperginibus totum ipsum foueri, mox cucurbitulæ occipitio agglutinari, & summæ partes deligari debent, per mulceriq; . Iam vero hirudines recte affiguntur. Cæterum si defluxio quædam a capite, vel grauedo oborta capitis dolorem suscitauerit, iis vtendum est auxilijs, quæ aduersus hæc suo loco perscribentur. Sin autem a stomachi regionibus vapores sursum tendentes caput offenderint, etiã horū ratio habenda est, veluti præceptum a nobis est.

† Vera scriptura huius loci est, μετὰ τὴν προσήκουσαν τῶν περιττῶν κένωσιν, idest, post convenientem excrementorum vacationē, facilis enim fuit librarij lapsus.

Quomodo stomachi curam habere conueniat.

C A P. xlv.

SI stomachus imbecillis fuerit, corroborantibus oblinetur, quod genus palmulæ sunt, vinum, polenta, crocus, mastiche, & aloe. aspergique debet oleis ex absinthio, melino, mastichino, nardino, & vino. At si ardorem experiatur, miscendum aliquod ex refrigerantibus, puta cucurbitæ succus, lactucæ, portulacæ, solani, fereos, & et vix immaturæ. Sin autem inflammatorium quiddam in visceribus appareat, etiam relaxantia quædam adiungenda sunt, aspersioibus, oleū chamæmelinum, cyprinum, adipēs gallinæ, aut anseris, bdellium, vel

F

aliter,
q̄ sternu
tamenta
excitāt,
in remis
sione pa
roxysmi
obiiciun
tur.

PAULI AEGINETAE.

ammoniacum, & similia. cataplasmatibus autem, apii semen, foenugraecum, altheæ, chamæmelorum flos, & ut vno verbo expediam, compositam habeant facultatem, tum relaxantem subtilium partium, amarumque, tum astringentem.

† Hic locus integer est, in veteri exemplari, sic enim descriptus est, *ἔϊον κολοκύνθης τε τὸν χυλόν, καὶ δειδάκινης, καὶ τῆς ἀνδράχνης, καὶ τοῦ σφύχονος, καὶ τῆς σέρεος καὶ τοῦ ὀμφακός, οὗτος μὲν γὰρ οὐ ψύχει μόνον, ἀλλὰ καὶ σφύσει, id est, ut succus cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, solani, fereos, & vixæ immaturæ. Hic enim non solum refrigerat, sed etiam adstringit.*

De immodica perfrictione in febribus, & rigore. Cap. xlv.

Rigori, qui crisis ratione obuenit, remediis occurrere non oportet nec concertationem naturæ dissoluere. Quod ex sudore frigus, prouenit, prompte remittitur, ac nihil adfert molestiæ. In solo autem rigore, aut perfrictione (ex frigidioribus vero, copiosaque maxima pituita nascitur) primum quidem artus plurimis in locis costringendi sunt, mox oleo delinendi chamæmelino, aut cyprino, aut irino. Sin autem maiore auxilio tibi opus sit, etiâ piper oleo admiscebis, vel cachry, vel adarcen, vel castoreum. molliterque totum corpus infricabis. Porro ne facile oleosum istud præsidium defluat, haud fuerit absurdum & ceræ momentum colliquefacere. At si per hæc rigor non possit excalferi, valentioribus quoque ex his factis acopis, necnon dropacibus, & sinapismis uti consilium est, aliaque fomenta rite admoliri. Itē acriora ex iis quæ admoventur naribus, commodè faciunt, calaminthe, pulegium, & hyssopum. Potui dabitur ante accessionem mulsa, in qua piper, & ruta sit incocta, adhæc liquoris cyrenæici cocto melle formati instar milii duabus horis ante accessionem præstabimus. Similiter & liquoris silphii. Adhæc quod in quartanis ex liquore cyrenæico componitur, multis fuit auxilio. Iam vero in oleum largius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores pertinacissimos absterferunt, ut Archigenes memoriæ prodidit. Galenus autem ante accessionem, cutem abrotano infricandam præcipit, vel calamintha arida, vel cunilæ tum foliis tum floribus, vel costo, vel pyrethro, utroque horum cum oleo. unde fiet, ut vel nequaquam, vel certe minus rigeant.

De sudoribus.

Cap. xlvii.

Sudores, in crisi erumpentes excipere oportet, quandiu satis vacuatum fuerit, adiutareque calore mediocri, & quiete, adeo ut neque quæ natura se abstergantur, quoniam alius quoque alium elicit. item calido clystere in aluum dato, & sorbitione, & somno. At sudores in remissionibus

morbis apparentes idem quod in crisi prouenientes, administ-
rium capient. Itaq; præsidia quibus sudores euocantur, libro superio-
re, capite quadragesimo octauo abunde sunt comprehensa. Cum ve-
ro sudores largius eruperint, tunc abstergendo, leuandoq; operimen-
ta recreare conuenit. Etenim lassant, supra modum excident, ut in
syncopen frequenter ægros perduxerint. Tenui velamine madidoq;
debent esse coniecti, perflatus aeris frigidior accedat. his somnus ad-
iungatur, & euentilatio. Insuper myrtus nigra in pollinem coacta,
corpori inspergatur. Similiter galla, picæ cortex, electrum, & polē-
ta cum vino astringente, particulis sudores recipientibus imponan-
tur, faciesq; posca per spongiam aspergatur. Archigenes etiam cal-
cem non restinctam, & floces vini combustas, tum in his, tum in ri-
gore, quem nullus euincit calor, assumit. Ambæ siquidem inquit, re-
calescentes, siccantur. Media vero corporis loca delinenda succo plā-
taginis, vel coriandri, vel portulacæ, vel brasicæ præcipit, ut vndi-
que concreta, sudores reprimant. † Per somnum vero creta cimolia
aqua dissoluta, dorso, & thoraci subiecta proficit. Totum vero cor-
pus rosaceo perungitur, vel melino, vel myrteo, vel lentiscino, vel ce-
ratis quæ ex his coniunguntur. Nam magis sunt his idoneæ reuersiones,
quæ latentes meatus obstruendo, humidi exitum prohibeant. Patet
autem omnibus, quod cibus quoque ficcior his cōuenit, & vina me-
diocriter astringentia. Cæterum largiore potu, & præsertim humi-
diore, tum crebris per aluum iniectionibus abstineant. Si autem fieri
potest, gestatione corpus agitandum, in frigidioris aeris statu, & sum-
mæ his partes potissimum refrigerentur. Qui per validam expres-
sionem sudores fiunt, (hi autem vel ob dolores excitantur, vel con-
uulsiones) facile curantur, † si extrema deligentur, calfiant, & per la-
neos panniculos reficiantur.

† Scriptura quæ in veteri exēplari multo melior & sincerior est.
Sic enim habet. ἐν δὲ τοῖς ὑπνοῖς κίμολια ὑδατι διαλυθεῖσιν πιανό-
μενα ῥάκη ὑποβάλλεται μεταφρένω καὶ θώρακι. Idest, panni pingue
facti cimolia dissoluta aqua subiiciuntur dorso & thoraci. librarius
enim indoctus ex ῥάκη fecit ῥῆ καὶ.

† Concinnior sensus est in veteri codice, ita enim in eo scriptum
est. καὶ θάλλει τῶν ἀκρῶν καὶ ἀποψύξει διὰ ξακιδίων ἀραιῶν κού-
φως θεραπεύειν, idest, leuiter curare oportet extremorum deligatio-
ne totiq; ac exiccatione per pannos raros.

De tussi in febribus.

Cap. xlviii.

TVssi in febribus, præsertim cum rigore obuientibus, occurre-
re conuenit. Nam tussis intentione, febris quæ inclinabat vires

PAULI AEGINETAE.

aliter. resumit, ac redintegratur. Aduersus hanc formulæ medicamenti ex melle cocto coactoque, hypoglottia vocant, offeruntur. Linguae autem supposita, unde nomen habent, eliquescent, & quod spirandi impedit facilitatem, discutiunt, tempus ipsarum est in accessionum statu, & spatio quod paulum accessionem præcedit. datur etiam hydromeli discoctum. Quibus autem de nervoso genere metus non est, temporis processu exhibebis cum fiducia & oxymeli. sin minus, hyssopi decoctum, quod etiam rigentibus auxiliatur. Item castoreum cum febris ardens non est, nervoso quoque generi confert. Ad hæc linctus ex piceæ fructu, nucleis pineis, iride, semine, lini, amygdalis amaris, & vrticæ semine, plurima vero ex parte cibis quoque hæc simul adiungentur. Ac refina quoque terebintina in ovo exhibetur. Extrinsecus autem thoraci, & locis arteriæ vicinis, lana sulfure imbuta imponatur, ac pingue, oleum ve rutaceum esto, vel irinum, vel anethinum. Præterea deligatura valida in longum porrecta, tusim exacte cohibet, dico autem per medias partes extremasque. Non ratione caret, & vicia sylvestri quæ staphis agria dicitur, tusis gratia uti, simul cum domestica, aut cum mastiche mansa. summa debent infricari, permulceri, & ligaturis intercipi. deinde rursus soluenda est in contrarium retractio. At si propter ebris acrimoniam tusis concitatur, ut edum est gargarizationibus ex aqua tepida, necnon frigida subinde profuit, & ex posca, & palmularum decocto, vel rosarum, vel dulcis iradiculæ. Visceribus autem, vel etiam cordi ipsi iniiciuntur quæ modice refrigerant.

De sternutamento.

Cap. xlix.

ga exilit porros rare factos humor noxius, sicut per terram rariorem expiranturoculi status vectorum. Sternutamenta febribus sæpe incidentia, molestant. Et enim caput replent, & virtutem arguunt. Nonnullis sanguinem quoque eliciunt, & alia huiusmodi inferunt incommoda. Quare aduersus ipsa remediis pugnandum est. Cohibet itaque sternutamentum irruens, nasi, frontis & oculorum perfrictio, item oscitatio, studiosa palati, frictio, ructus, ilium intentio, capitis in altum eleuatio, inclinatioque ad latus, summarum partium mollis contréctatio, maxillæ musculo rum perunctio, calentis olei in aures infusio, puluinem calidum mento subiectum. Caueri debet repentina ex somno excitatio, fumus, puluis, acrior odoratus piperis, castorei, sinapis. Mentæ autem malorum, & polentæ odor conducit. obtundit enim sternutamēti elisum, Idem spongiæ ex mari vacuæ efficiunt. Vbi vero cupiditas sternutandi oborta fuerit, non autem sternutamentum erumpat, labii quies accommodetur, & continue acrium odorum experientia, & mentis remissio.

De cibi fastidio.

Cap. l.

Quibus vitiosi humores fastidium procrearint, iis illa & escu-
lenta & poculenta dare cōuenit, quæ huiusmodi succos vel ab-
stergendo per vomitiones, seu per aluum excernere soleant, vel at-
temperando, meliores reddant, quorum materiam libro superiore, q̃
totius operis primus est, comprehendimus. At si ob virtutis imbe-
cillitatem, cibum respuant, quoniam omnis facultas ex particularū
intemperie infirmatur, conuenit in temperamenti speciem, contrariis
medicari. Plura de fastidio, in stomachi vitiis libro tertio pertracta-
bimus. In febricitantibus autem, statim per initia cibi cupiditas, iis
quæ odorem mouent, recuperanda est. Potissimum vero polenta in
aquam mersa, vel posca, vel diluta vini potione. Aut cuiusdam odo-
rati pomi, & astringentis decocto, item perunctione odore grata, &
moderata totius corporis frictione, ac blanda contrectatione tum fa-
ciei collutione, aquæ sorbitione modicæ. Iam stomachus digito im-
misso turbatus, ad cibum assumendum quodammodo conuertitur,
præsertim, vbi biliosum quid, aut acidum sursum eiecerit. Secundum
primos dies, †cataplasmatibus quoq; a foris stomachus ad cibum solli-
citetur, ex palmulis, malis cotoneis, cœnanthe, absinthio & aloë cō-
fectis. Cibi autem præparentur plures simplicesq; & frumentacei, q̃
alterius quoq; generis varietatem quandam habeant non tamen ab
iis multum recedant, qui in febribus dantur, in quibus & poma con-
ueniunt, quæ non ex facili acescunt, neq; nimium dulcia sunt, sed ma-
tura, neq; ad satietatem exhibenda, verum solum quod ad aliorum
ciborum cupiditatem excitandam sufficit. Præsto autem sint ægris
dum alentur familiarissimi, qui tū corripere eos, tū inhortari queant.
Porro febribus solutis, si in virium recreatione perduret fastidiū, etiā
fisarum cum oxymelite coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis,
falsamentum, bulbi, & quicquid ad bonitatem stomachi facit, accom-
modetur. Necnon & illud ipsum in memoriam reducatur, quibus ci-
bis per sanitatem maxime vfi sint. item ambulationes, gestationes,
vociferationes, dropacismi, frictiones & exercitia adhibeant. Præ-
terea absinthii succi potio, vel aloes, aceti q; scillitis instar mystri ab-
sorptum, in id vehementer efficax est.

†Simplicior scriptura est, καὶ καταπλάσµασιν ἐξωθεν ὁ σῶµα-
χος ἰατρῶν ἐδῶ, idest, cataplasmatibus a foris stomachus curetur. Nā
quod est in exemplari typis expresso ἐπεσσεφέδω, omnino depra-
uatum est.

De grandi fame, quæ græcis bulimos dicitur. Cap. li.

Si vero in grandem famem, quam bulimon appellant Græci (di-
SCO autem cum minus quam par est, cibos corpora sentiunt) fasti-
dium deuenierit, hisce reficiemus, tum aliis, quæ naribus admouent,

F ;

hoc præ-
cipit di-
ligenter
Hippo-
crates
ἐπεσσεφέδω

PAULI AEGINETAE

tum suillis carnibus assis, & hœdinis. In summa omnibus, quæ nidorosum odorem repræsentant, sæuitia sane febrium præterita, extremæ partes deligari, ipsiq; excitari debent, maxillas pungendo, & crines, vel auriculas vellicando, recollectis autem, panis ex diluta vini portione, vel aliud quippiam distrubui facile exhibetur.

De canino appetitu.

Cap. lii.

Non aduenit tamen febribus, si hoc symptoma febribus non adeo superueniat, sed nonnunquam secundum ipsas, attamen gratia cognitionis, quam cum fastidio habet, nil fuerit mali, etiam de immodico appetitu, quum ambo naturæ modum excedant, sermonem instituere. Quoniam igitur a pituita potissimum acida constituitur affectus, is utendum est quæ hanc incidant, abstergeantq;. Talis autem sunt maxime, dulcia salsa & alioquin detergentia calida. Vinum igitur ipsis recte datur copiosum ex eorum numero, quæ impense calefaciunt, cuiusmodi habetur colore fulua aut rubra, astrictionis expertia. Verum dulciora potius propinantur, etiam non sitientibus. At cum ad prandium venerint, primum ipsis pingua, mox alia omnia ex oleo largiore præparata, quibus nihil austerum, aut astringens sic adiectum, offerentur. Hæc etenim, licet aduersus ipsam causam manifeste non pugnent, at tamen impotentem ad cibos animi impetum dissoluunt. Inedia vero spissitudinem pituitæ stomacho in hærentis absumit, minuitq;. Iam salsamenta ipsis commode exhibentur, ab his vina commemorata liberaliter assumpta profunt, quod ubi longiori tempore fecerint, caninus appetitus finitur.

+ Codex manuscriptis habet, καὶ ἄλλως τμητικὰ θερμαίνοντα. id est, & alioquin incidentia calida. qui sensus huic loco conuenit, quæquam τμητικὰ etiam recte legi potest.

De siti.

Cap. liii.

Sitim admodum longam fieri existimabis, ex ficcitate, aut caliditate particularum, per quas humor ex ore in ventrem deferitur, & ficcitatis quidem remedium est somnus, caliditatis autem uigilia. Nonnulli vero sitibundi ex vino, ciborumque caliditate fiunt, quibus medetur frigida potio. Prauas autem potiones appetunt, quemadmodum & cibos, præpolenti in eis humorum vitio respondentibus. Cæterum siti pressos inextinguibili quandoque vidimus, ex quo rum numero etiam mortem oppetierunt, tum qui viperas dipsadas deuorant, tum qui vino veteri sese inebriant, ad hæc qui in nauigio ob aquæ potabilis defectum, marinam bibere ausi fuerunt. Verum sitim in febribus placare solet, aspersio ex oleo frigidissimo, vel rosaceo cum impetu salientis modo super caput deturbata. Optime facit ad sitim nigræ lactucæ semen commanducatum, item glyc, ri-

za appellata. adhuc cucumeris semen in ore retentum. Datur etiā ad sitim hoc catapotium. cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthi drachmæ quatuor, tragacanthum soluitur ouorum crudorum recentium albumine. & cum fuerit dissolutum contritumq; cucumeris semini prius leuigato adiungitur. Postquam emollieris, pilulæ formantur, in umbrâq; ficcantur, ex his vna sub lingua tenenda exhibetur, humor paulatim saliuâ solutus deglutitur. Iam dilutum malorum cydoniorum, vel pirorum, vel mespilorum, vel pampinorum vitis, vel mali granati succus sorbitioni datur.

pāpino
rū tortu
multipli
cabili.

De linguæ scabritie.

Cap. liiii.

Humectanda est linguæ scabrities, lini seminis decocto ægris vt in ore teneant dato, melius autem facit myxion cum lini semine incocta, ac digito in hunc succum demerso lingua infricata, aqua puriore abluatur, vel spongia vndiquaque abstergitur, deinde rosaceo ilinitur. iam ipsum rosaceum melle temperatum, in id valde efficax est. & portulacæ succus in ore retentus. item rhu obsoniorū mulsa admistum bene facit. insuper Damascena, & myscelii (hoc autem est myxa) ossa ore retenta & linguæ circundata. His adde etiam lactucæ cauliculum. Archigenes autem tradit etiam salem indicum, colore quidem & substantia communi similem, gustu autem melleum, lenticulæ instar, vel plurimum ad fabæ magnitudinem deuoratum, vehementer posse humectare. Cæterum in latus decumbere prodest, nam supinus cubitus exiccat. item os conuiuere. hiatus enim madorem absorbit. Sternutamenta porro accersita, linguas quouis alio plenius humectant.

ga cibo
sumpta
humores
praui, q
ta
citi refi
debant,
ad os
stoma-
chi se cō
ferunt cī
bo cedē

De nausea.

Cap. lv.

+Cum sine cibo assumpto nauseabundus æger efficitur, cuius licet, arbitror, ratiocinari prauos humores ventriculum infestare. Nonnulli vero turbantur, sed nihil euomunt, humore ipsis tunicis imbibito. Pituitosos itaq; succos concoquere oportet, seruando ægrum in quiete, inedia, & somno. tenuiores autem vomitus eiicit, qui non nunquam ex pituitiæ cremore, vel mulsa excitatur. glutinosi humores & crassi. attenuantia desiderant. quod genus est oxymel, & similia. Humiditate autem praua in tunicis absorpta, picra ex aloë utilis est. verum quæ astringunt, haud mediocrem noxam conciliant, quæ admodum rursus, cum humiditas multa citra malitiam inest, astringentia quidem quam utilissima sunt, medicamentum vero ex aloë in marcorem perducit. Cum vero frigiditas humori adest astringentibus misceri etiam debent calefacientia. Nota est frigidi affectus, & neque sitim, neque ardorem eo detenti experiantur.

tes. Na
tura enī
cibū ad
mittit.
reliqui-
as pra-
uas per
vomitū
egerit,
q; duo
cōtraria
n̄ cocūt
in vnā
naturā.

PAULI AEGINETAE

† Hic locus sic legitur in veteri, ὅταν χωρὶς τοῦ προσενέχῃται τὸ ἐμετικὸν ναυτιώδης ὁ κάμνων γένηται, idest, cum æger sine assumptione eorum, quæ vomitum mouent, nauseabundus fuerit. Quæ scriptura clarior est.

De bilis vomitione.

Cap. lvi.

ga bilē
quoque
ad exci-
tādā sto-
machi
virtutē
fabrica-
ta natu-
ra est.

Bilem vomentibus cataplasma applicandum est ex palmulis, malicorio, galla, vino incoctis, vel posca, pane simul contrito. Item acacia, hypocystis, balaustrum & rhu cataplasmati adiungant. Præter hæc cucurbitula adnota magnifice auxiliatur, cum largiore flamma. Cibum vero frequenter paulatim dabimus. † In his autem qui atram bilem vomunt, & inflationes stomachi experiuntur, spōgias aceto quam acerrimo calente madidas imponito, vel hederæ foliavino incocta applicato.

† Vetus codex hanc scripturam habent, ἐπὶ δὲ τῶν χολὴν μέλαιναν ἐμούντων καὶ φυσωμένων τὴν σόμαχον καὶ τὰ ἔντερα καὶ τὴν κοιλίαν, idest, in his autem qui atram bilem vomunt, & inflationes stomachi, intestinorum & ventris experiuntur, spongas &c.

De singultibus.

Cap. lvii.

quū n.
quidpiā
spirituū
itineri
obstruit
singulū
facit.

Singultus oritur vel ex repletione, vel inanitione, vel succis acrioribus stomachū erodentibus, quibus per vomitionē redditis, cessat. Plerique vero medicamentū diatrion pepereon assumētes, si statim vinū superbiberint, singultiunt. q̄ aut nōnulli etiam cibo intus corrupto singultu infestentur, cuilibet notū est. iā nō pauci rigore correpti, singultiunt. Vomitū itaq̄ iis qui ex repletione, aut rosione stomachi singultu cruciant mederi abunde cōperimus. calida vero, iis qui ob perfrictionē. At quū ab humorū repletione singultus originē habuerit, violēta indiget euacuatione, quā sternutamentum præstat, ob inanitionem vero creatos singultus sternutatio nō finit, datur aut singultientibus ruta cū vino, vel nitrū in mulsa, vel feseli, vel daucū, vel cuminum, vel gingiber, vel calamintha, vel nardus gallica. Hæc sane singultus ex ciborum corruptione, aut frigore, aut repletione contracti, auxilia sunt. qui aut ex frigidorum viscosorumq̄ humorū copia singultum experiuntur, castoreum tribus obolis potui sument ex posca, idem cuti impositum vna cum oleo veteri sicyonio adiuuat. In super acetum scilites, vel oxymeli potum conuenit. deniq̄ spiritus rentio, præsens est remedium.

De aluo in febribus astricta, & cita.

Cap. lviii.

Quæ arecentem aluum proritant, libro priore quantū res exegerit comprehendimus. quoniam vero eadem quoque liquida febribus incidit, in præsentiarum mentionem ipsius facere oportet. Multi enim non satis ratione, sed ob hoc solum accidens in per

niciem præcipitati sunt. Principio igitur excipimus quæ egeruntur, nullo remedio occurrētes ut quæ a corruptione & cruditate emanent. Sin autem vacuatio modum excedat, cohibenda aliud est, & si quidem acriora efferuntur boni succi esse, & alioquin crassioris conuenit, quæ assumuntur huiusmodi existunt ex chondro, & ptisana forbitiones. balnea his post morbi concoctionem sunt idonea. Cum uero pituitosiora & fluida erumpunt, contra sicciores calidioresque cibi erunt, quatenus febres permittant. Huius generis habentur, quæ ex condimentis calidis confiunt. Balneis hi prohibendi si nihil aliud conpulerit. Porro ubi concoctrix facultas infirmatur, astringentibus tunc cibis, tum remediis utendum est. cibis sane, in quibus maxime malum granatum, aut malaycdonia, aut pira, aut mespila sint iniecta. vel etiam ipsis, & vino tenui odorato astringente, remediis autem cataplasmatibus, nimirum ex polenta, palmulis, absinthio, rosis, myrtis, & consimili materia. Cæterum considerandum venit, quibus potissimum particulis cataplasmata debeant imponi dico autem stomacho, aut imo uentri, nonnunquam & circa lumbos applicamus. Cruentæ autem excreationes reprimuntur ex thure confecta, deficcataque, vel subtilior portio polentæ cum thure, vel manna vino macerata, vel posca. Porro acriorem humiditatem etiam iniectione per aluum, edulcare competit, nunc ipsa aqua, nunc ptisanæ cremore, vel chondri, uel oryzae, uel tragi, idque non semel verum sæpius. Postea vero adiunguntur etiam rosæ siccae, uel myrti. nonnunquam & gallæ, & ouum simul cum rosaceo uinoque tenui astringenti, uel rosarum decocto inditum vel sedi quoque subiectum excernendi cupiditates retundit. Cum frequens desidendi est appetitus, Agathium sedi accommodatum ex calidis spissamentis immittatur.

De sanguinis distillatione, & eiusdem ex naribus profluvio
Cap. lix.

Quoniam sanguinis distillatio totius corporis, aut capitis redundantiam innuit, per contusionem, vel densitatem eueniens, largior autem excretio habilis est laxare & minuere copiam, ratioque est inde ipsam moliri, unde natura proclinauerit, his ego consideratis ausus sum in quartanarum distillationibus tyhphe, ut mos est, narium vasa conuulnere, oportet autem non exiguo fluore contentum esse, sed pro uiribus detrahare. Spontanea uero in febribus per nares sanguinis profluvia, si in crisi fiant, excipere conuenit. sin autem sanguis immodice erumpat, sistere conandum est. Primum itaque extremæ partes valide diligabuntur, æger sublimi capite figurabitur. Videtur etiam præputii deligatura sanguinis peculiariter ex naribus profluvia cohibere, æger non expurget narium foramina,

quia balnea prius iniata accoquen-
doprauo succo naturam diuertunt.

profluvium sanguinis e naribus a solo bene esse dicitur ab Arist. ob magnitudinem cere-

PAULI AEGINETAE.

tri, quo
ex pro
portio-
ne cor-
poris
magis
abundat
homo i
ter ani-
mantes.

deliquit
aia ma
gishois
ppriū,
q ob
plures
fluctus
curarū
cogita-
tionūq
cōflucta
tur hu-
manum
genus.
qua de
re aia
saep fa-
cit recel-
sum quē
dā in fe-
pta cor-
dis. hō
n. mēte
& cogi-
tatione
aliū. q
si incide-
rit ad-
uersum

neq locum irriter, verum sanguinem concrefcere finat. natus spōgia,
quæ in posca maduerit, refrigerat, ac obturamen ex panniculo nari-
bus profluentibus demittatur, medicamento quodam ex eis quæ san-
guinem comprimunt, inuncto, horum materiam, & reliquam cura-
tionem inter remedia vnicuique loco affecto conuenientia libro sub-
sequenti verbosius persequemur.

Si anima deficiat.

Cap. lx.

Qui ex cholera, alui profluuiū, aliisq multis, & vniuersim fa-
ctis vacuationibus, resoluuntur, iis aqua frigida aspergitur, &
nares comprehenduntur, os vetriculi infricatur, vomitus præcipitur,
stomachus turbatur, vel digitis immisfis, vel pinnis. præterea pluri-
bus vinculis valide deligari debent. Cum per imas particulas vacua-
tiones fiunt, brachia, cum per superiores, crura. Cæterum sanguinem
fundentibus prospicienda est & figura sine dolore sursum verges, &
cucurbitula defigetur, quæ ad particulas retrahat situ contrarias va-
cuationem experiuntibus. Curat etiam vinum aqua temperatum re-
solutiones ex subitis vacuationibus ortas, nisi viscerum inflamma-
tio, aut vehemens capitis dolor, aut mētem turbans aliquis affectus,
aut febris ardens, in crudo morbo prohibeat, in his siquidem magna
vinum adfert incommoda. Et si æstus fuerit, calidq temperamentum
æger, ac frigida assueuerit, frigidum vinum exhibebitur. sin contra-
ria euenerint, calidum. At si ex sudoris copia anima deficiunt, cutis
densanda est, quemadmodum a nobis prius est dictum. Tum vt fri-
gidus aeris perflatus accedat, prospiciendum est. Porro in ventricu-
lum defluxionibus nihil horum conuenit, præterquam ipsi ventricu-
lo stomachoq corroborantia admouere, & affectos in balneum du-
cere. Hoc siquidem illiusmodi fluoribus est accommodatissimum, ve-
rum sanguinis profluuiū, & sudores vehemēter proritat. Qui ob ple-
nitudinem animo destituuntur, vino ciboq abstinent. item balneis,
si febricitent. Potio autem mulsæ datur, in qua vel thymus, vel ori-
ganum, vel pulegium vel hyssopum sit incoctum. Propitium vero
iis est & oxymeli. At si propter humores vitiosos in stomacho cō-
tentos anima defecerit, iubendi sunt vomere ab hydrelæo, digitis aut
pinnis in os demisfis. Sin autem vomere nequeant, oleum quā lau-
datissimum ipsis propinabitur. hoc enim & aluo ex inferioribus
partibus infusum, subinde vacuat. Iam vero absinthium ipsis auxilia-
tur. Porro si propter stomachi imbecillitatem dissoluantur, iis vt ex-
pedit quæ firmando ipsi sunt, veluti antea in capite de eodem com-
prehensum est, summaq perfricare oportet. Exusti in sole ad balneū
ducuntur, qui perfrixerunt, medicamen diatricon pipereon, ipsumque
piper assumant. Qui vero ob caliditatem largiorem, æstum ve, aut lē-

tam in balneo moram animo deficiunt, curantur frigida aspersa, & si ad ventum conuertas, stomachi frictione, vini cibiq; vfu. Sin autē propter inflammationis magnitudinem, aut febris malignitatem in accessionibus animus deliquerit perfrigescantq; artus fricare valenter iubeto calefacere & deligare. Adhæc vigilias in ediamq; præcipito. Ea vero & ante accessionem faciunda sunt. Quibus ob siccitatem anima deficit, duabus tribusve horis ante accessionem, cibus offeretur, vel chondri cremor, vel panis ex aqua simul cum mali grana ti nucleis, aut malis, aut piris. Si autem magni periculi metus sit, etiā vinum dabitur. item iis qui subito animam perdunt, his remediis succurrendum est. ac ubiq; causam considerare conuenit, propter quam animæ defectus accidit, atq; contra hanc pugnandum est. Nonnunquam vero & symptomatis maior habenda est sollicitudo, nempe cum periculum, vel etiam mortem minatur.

Quomodo vlcus circa os sacrū proueniens curet. Cap. lx.

ET hic affectus, febribus potissimum lentis, ex diuturno decubitu superuenit. Cum itaq; sacri ossis regio incipit rubescere, circulū ex lana iustæ magnitudinis, parti subiiciemus, postea rosac eum, vel myrteum ceratum, quod argenti spumam aut cerusam habeat superaccommodabimus. Inflammatione autem oborta cataplasma ex pane cum solano vel polygonio vel plantagine vel tenera brassica applicatur. Si vlcus serpat lenticula cum malicorio instar cataplasmatiss inducitur.

*

FINIS LIBRI SECVNDI IOANNE
Guinterio Andernaco Medico interprete.

quid vel
infectū
vel etiā
nimis
lætabi-
leobit
plerūq;
diē suū.
at cæte-
ra bruta
ne deli-
quium
quidem
animæ
aiunt
tingete.

PAVLI AEGINETAE

LIBER TERTIVS,
IOANNE GVINTERIO
ANDERNACO MEDICO
INTERPRETE.

*

DE PILORVM AFFECTIBVS.

De alopecia, & ophiafi, & caluitio. Cap. I.

Pulcherrima
fame simili-
tudo,
ga aial
stas pla-
ta est,
aial ve-
ro locu-
e loco
mutat.
Et suc-
cus ter-
ra cum
cibo a-
nimatis
apte q-
dra.
Qui p-
ut afficit
multipli-
ci mo-
cutē, ita
facies
summa
carnis



QUEMADMODVM stirpium non-
nullæ succi defectu inarescentes contabescunt,
nonnullæ vero alienis a natura sua humori-
bus infectæ emarcent, haud dissimili ratione
idipsum quoque pilis vsu venit. Etenim Cal-
uitium, humidi penuria fieri consuevit, prauita-
te autem, vitioq; succi, Alopecia, & Ophia-
fis, figura tantum inter se differentes. Quoniā
in Ophiafi, partem oblæsam, serpentis modo glabram, ostendit, alo-
pecia, quod vulpes continue infestet, sic appellata est. Itaq; coniectu-
ram de humore, qui superat, ex cutis colore facientes, vacuationem
medicamento purgante prius moliemur, deinde loco vitiato auxi-
lia inducemus. Si igitur color ad nigrius, albidiusve mutatus fuerit,
Antidoto Hiera quod pituitæ educendæ, humoriq; melancholico
est, vtemur, sin ad pallidius, catapotia ex Aloe exhibebimus, singu-
lorum autem ipsorum descriptionem in libro de medicamentis com-
positis inuenies. Vbi corpus iam totum inanieris, medicamētū quod
pituitam per os extrahit, apophlegmatismū Græci vocant, vsus
erit, ex aceto, sinapi, & melle, isq; non semel, verum crebrius. Sati-
us autem fuerit, si etiam in aceto origanum, vel pulegium, vel thymus,
vel hyssopum commaduerit. Cæterum in aliis quoque capitis affe-
ctibus eadem vtemur curandi ratione, primum humorem, qui præ-
pollet euacuantes, vel purgatione, vel etiam sanguinis emissionē, si
eius subest redundantia, dein ad præsidia quæ parti extrinsecus ini-
ciuntur, transgredi conuenit.

De alopecia.

CV T I S nitro confricata, linteoque aspero, lanave potius deter

sa, & iterum defricata, adeo ut ruborem contraxerit, verbenaca in multi-
 Sole ex aceto detrita, illinitur. Aut alcyonio primæ asperitatis com formem
 busto, reductoq; in puluerem cum oleo ex lucerna inungitur. Aut colorē
 arundinis radix, aut amygdalæ amaræ cortex torridus, oleo, vel capit.
 adipe vrsina exceptus inducitur. Hæc itaque sunt mitiora medicami Quocir
 na, verum ex euphorbio, thapsia, & adarce, oleo leuigata laurino, ca pau-
 vel pice liquida, vehementiorem vim repræsentant. ALIVD. Eri peres in
 naceorum marinorum testa ignem experta cum adipe vrsino exce- uia ui-
 pta, loco prius nitro exterso illinitur. ALIVD. Piperis, sterco- ctū men-
 ris ouilli sicci, erysimi, ærucæ seminis singulorum drachmæ quatuor dicātes
 veratri albi drachmæ tres, murium stercoreis drachma. Excipiuntur hisce
 tur felle taurino, aut hircino, aut suillo. morbis
 Aliud experientia probatum ad alopeciam. passim
 MANDRAGORÆ radicis, mali terræ, ari radicis, ce- affectos
 ræ, picis liquidæ singulorum vnciæ octo, axungia porci subrumis, videre
 nerii herbæ medullæ modicum. Axungiam, & nerium incoquito, est ob ci
 donec herba intabescat, deinde exēptam proiicito, & reliqua axun borum
 giæ adiungito, incoquitoq; mox ceram, & picem liquidam. Vtitor prauita-
 in sole audacius. Vbi iam vlcera ad cicatricem venerint, caput vul- tem At
 peculæ vrito, & alcyonium, anchusæq; nigræ folia omnia contrita domos
 super inunctioni inducito, ut capiti pili succrescant. ALIVD. diuisum
 Muris capitis combusti pars vna, testarum marinarum tantundem, iis mor-
 cū axungia porcina. omnibus in fictili coctis vtitor, inspergens etiā bis alii
 ex ipsis siccis aliquid. respōdē
 Medicamentum ex thapsia ad omnes inueteratos affectus. tes ex
 EUPHORBII, thapsiæ, baccarum lauri singulorum vncia, opiparo
 sulfuris ignem non experti semuncia, veratri tantundem, ceræ vnciæ victu in
 sex, laurini, vel ricinini aut veteris olei quod satis est. In validiori- uadunt.
 bus etiam uti vincit nasturtii vncia, alcyonii combusti vncia, iisq;
 non solum ad Alopecias, verum etiam ad omnem diurnam perfri-
 ctionem. Summatim in Alopeciis cutis prius nitro est extergenda,
 infricandaq; & frequenter pili nouacula radendi. Si quidem plerisq;
 noui ex sola infricatione, frequentiq; rasura pilos prouenisse.

Quomodo caluitium abigatur, & pili crescant.

Ex Critonis commentationibus.

LEPORVM ventriculi quinque arefacti diligenter olla fi-
 ctili friguntur. His adicito, myrtorum, myrti summitatum, acaciæ
 fructus, acaciæ succi, rubi canini, æqualem modum, adianthi vncias
 tres. Hæc omnia accurate resiccata in pollinem coguntur, & subtili
 cribro incernuntur, deinde adipis vrsini libris quatuor, & phocæ to-
 tidem admistis denuo tunduntur. Excepta pixide plumbea reseruan

PAULI AEGINETAE.

tur. Cum vsus postulat, quolibet oleo aromatis imbuto diluuntur.

Quæ pilos conferuent.

POLITRICH herbæ pars vna, ladanii partes duæ, vino myrteoq; oleo exceptæ in vsum adhibentur. **ALIVD.** Anemonæ flos tritus cū oleo inungitur, idē vero, & nigrefacit. **ALIVD.** Verbenacam rectam vna cum radicibus torrefactam. tusamq; tenui cribro incernito, mixtam oleo vt sordium habeat spissitudinē æreo vase reponito. Cum liquefeceris, vtitor inuicem olei similiter.

Aqua pilos augens, eosdemq; denigrans.

AQVÆ pluuiialis sextarii sex, rhus alexandrii sextarii tres, polytrichi vnciæ quatuor, herbæ fabinæ tantundem, ladanii vncia, myrti vncia, cucurbitæ aridæ tantundem. Sinito ad dies viginti vitreo vase commadescere, bis mouens quotidie rudicula tedacea. † In sequenti tempore in aquam pilos singulos tingens, vtitor quotidie. Item semen althææ in balneo illitum pilos conseruat, augetq; . pari modo oleum inunctum, in quo semen ipsum althææ decoctum est, vel simul impositum.

† Vera scriptura est in antiquo cod. τῇ δὲ ἐπιούσῃ καταβάπτων εἰς τὸ ὕδωρ τὴν κτένα χεῖρ καὶ οὕτω ποιεῖ καὶ ἐκάστην ἡμέραν, idest, in sequenti die pectinem in aquam intingens vtere, atque ita fac quotidie.

Quæ medicamenta pilos extenuant.

FICVS foliorum, vitis agrestis albæ corticis, pumicis, testarū buccinorum, terræ cimoliæ singulorum mina. Omnibus in nouam, crudamq; ollam cōiectis, lutoq; oblitis, in camino coquito, teritoq; , adiiciens aphronitri minæ semissem, gallas immaturas numero triginta. In puluerem redacta excipito, ac vtitor. **ALIVD.** Aphronitri minæ septem, pumicis tosti minæ quatuor, aluminis fissi, iridis siccæ, myrti sylvestris nigræ, gummi, bryoniæ radicis singulorū drachmæ quatuor, lupinorum crudorum in pollinem detritorum, conggii pars quarta. Vtere absque pingui.

Ad fluentes pilos.

ALOE ex vino nigro austero illinitur, vel purpuræ tegmina ex oleo cocta, vel myrrha, & ladanum cum vino, myrteoq; , vel caprillum stercus in testa combustum ex oleo leuigatur ac cuti prius rasæ inungitur.

Quomodo pili crispi fiant, & tincturis inficiantur, ex Cleo patræ libris, quos de capillis crispis faciundis prodidit.

Cap. ii.

CApite prius deterfo, spondylii radix cum mero pilis inungitur. **ALIVD.** Nux pinea recens ad cinerem vsque comburitur,

infectaque pilæ teritur, myrteum vnguentum superinfunditur, donec mellis fiat spissitudo. Atque sic pili raso capite absterfoq; delinuntur. **ALIVD.** Myrti, & betæ pari mensura cum oleo pilos abstergēs vtitor. **ALIVD.** Gallæ viginti numero, adianthi vnciæ duæ ex aqua marina in mellis crassitiem coactæ inducuntur, sed pilo vrina prius deterfo, vel lixiuio, & aqua calente abluto, oblinetur medicamentum ad biduum, per quod vbi ipsum retinuerit, tertio die ablui debet, piliq; resiccati myrteo inungi. Id teneram crispumq; & nigrū efficit capillum. At si prius caput nouacula raseris, crispior euadet.

Quæ canos arcent, & eosdem denigrant.

OLEI, quod immaturæ oliuæ fuderunt sextarii tres, spicæ nardi drachma, vnguis odorati drachmæ quatuor, iunci rotundi floris tantundem, incoquuntur cum oleo. seorsim habebitur. Acaciæ succi vncia vna, vino soluta leuigataq; diligēter. Vbi vero tertia pars olei fuerit relicta, hanc percolato, & acaciæ mixtam in fidelia excipito, ac vtitor quotidie pilos inungens. **ALIVD.** Nucum viridium corticis vncias tres, ilicis radicis tātundem, vini nigri sextarios tres, ad tertias decoquito, ac vbi id quod reliquum est, expresseris cū olei myrtei sextario iterum subiges, vsus eius est quotidianus.

Aqua pilos denigrans.

GALLAE sextarius vnus, rhus coriarii sextarii duo, myrti nigrae totidem, cyperi foliorum æqualis mensura, cinaræ manipulus, papaueris nigrorum in floribus capitulorum tantundem, aquæ lacustris sextarii duodecim. Omnia multis ante diebus macerata, ad tertias decoquuntur. Deinde illinuntur, absterfis, siccatisq; crinibus. Ac cimoliæ terræ acetabulum cum viua calce pari mensura, inungitur. Hæc autem succo betæ elixæ soluta illinuntur. Deinde betæ folia tegminis gratia superacommodantur, ac vbi satis adhæserint, in balneo abluuntur.

Vt rufi capilli tingantur, & flauescant.

MIRRHAE pars vna cum salis floris altera, accurate teritur. vbi sordium facta est crassities, caput prius deterfum medicamento inungitur. finiturq; per noctem, & diem, postea tunc ablui præcipies. **ALIVD.** Lupinos crudos cum aqua illinito. **ALIVD.** Argenteæ spumæ drachmam, terræ creticæ drachmas quatuor, calcis viuæ drachmam. Ex aqua mellis crassitiem faciens inungito, & betæ foliis adiectis ad duos, tresve dies abluto.

Vt pili nigri flauescant.

FLOCES vini in balnei lordes mittuntur, & spissitudine cera

PAULI AEGINETAE

ti facta sub somnum illinuntur, & mane pili flauescunt. **ALIVD.** Cyperi folia succo herbæ lanari fruticis madescunt. Et diluto vteris.

Quæ capillum reddunt colore aureum.

ALV MINIS, sandarachæ, singulorum drachmæ sex, croci drachmæ duæ, thapsi qua tinctorum vtuntur, Romani vocant herbam rubiam, drachmæ octo, e cinere lixiui quo pilearii vtuntur sextarii quatuor. Lixiuum cum thapso confusa incoquito. vbi dimidia portio relicta fuerit, humorem exprimito. quo alumen, sandaracham, & crocum dilues. Deinde vase vitreo condes. Vbi vsus venerit, pilos prius absterfos illinito. postquam vero combiberint, ablues decocto fœnugræci, hordei, & cumini, aquæ prius tepidæ superfusa, quod sufficit, ad hæc saponis quântum satis est adicies. **ALIVD.** Flores vini vstæ vna cū oleo balanino, pilis oblinunt. **ALIVD.** Sapone gallico cum aqua in singulis balneis pili absteruntur.

Aliud valde generosum.

RHVS rubri sextarius, gallarū libra vna, Selydrii vnciæ duæ, herbæ aurum colore imitantis (quam Romani rubiam vocant) vnciæ duæ, polytrychi fasciculi duo, absynthii vnus, lupinorum quibus cortex sit detractus cyathi duo, aquæ sextarii septem. Omnia in vitreum vas coniecta, dies nouem finito commadescere, quotidie bis rudicula agitando. cum vsus exigit, auferes quod satis est. & hoc spōgiam madefaciens, pilos confricato, humectosq; combibere finito. vbi siccati fuerint, sapone calida aqua soluto, abluuntur.

Quæ pilos albos faciunt.

VERBAsCI candidi flos combustus aceto mergitur, & in saponem miscetur. **ALIVD.** Verbasci seminis, aluminis, raphanorum corticis singulorum drachma. Contundito, & glutini quod ex tergoribus bouum confit, ταυροκόλλην Græci vocant, drachmas quatuor misceto.

De capitis affectibus cutem infestantibus, porrigine, quæ pityriasis dicitur. Cap. iii.

Porrigo, quæ pityriasis Græce dicitur, est, cum tenues, & furfuraceæ squamulæ ex capitis, vel etiam reliqui corporis superficie citra exulcerationem resoluuntur. Id autem euenit vitioso corporis humore, salsaue pituita, aut bilioso, & melancholico sanguine caput subeunte. Itaque corpore toto (vt dictum est) euacuato, subscriptis remediis vtemur. Cimoliam aqua prius maceratam betæ succo miscebis illinesq; & tantisper ita permittes, donec inaruerit. Deinde postquam ablueris, thus ex vino oleoq; detritum perunges, die in sequenti staphida agriam, hoc est herbam pediculariam ex oleo inunges. **ALIVD.** Nitri, fecis concremata, myrobalanorum, singulorum

vacua-
tio cor-
poris re-
media
q̄ si sem-
per præ-
currit.

lorū libra, herbæ pediculariæ libra vna semis. vino dilutis caput abstergitur. sin autem reliquum corpus pruritu vexetur, siccis. Ad humidiores vero pityriasis, muria, vel lupinorum decocto caput abluendum est. hoc enim subinde sum expertus.

Ad psydracia & exanthemata capitis.

PSIDRACIA exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summam cutē excedunt. Exanthemata vero cutis sunt exulcerationes, subrubicundæ, & asperæ. Vtrūq; vitium præfidiis infra positis exteritur. Argentæ spumæ, cerusæ singulorum drachmæ quatuor, aluminis drachmæ duæ, rutæ foliorum viridum totidem, ex aceto myrteoq; oleo leuigata cuti illinuntur. ALIVD. Ruta & alumen cum melle trita, capiti prius raso inunguntur. Sin autem cutis a capite abscedit, oleæ folia elixa cum melle cataplasmatibus modo inducuntur. ALIVD. Argenti spumæ, cerusæ singulorū drachmæ duodecim, sulfuris viui drachmæ octo, cerato myrteo excipiuntur.

Ad hufcula capitis densa rubraq;.

HAE CAPILLIS sunt similia, ex quibus sanies eliquatur. Capite prius nouacula raso, & aqua nitroq; absterfo, sulfure viuo ex hominis vrina contrito vtitor. Vel creta sutoria, *μελανθηρίαν* vocant Græci, cum aceto inungito.

De manantibus capitis vlceribus, quæ achores græce dicuntur, & fauis.

INTER capitis vitia, quæ in cute oboriuntur, vnum est, quod appellatur Græcis Achor, a nostris manantia vlcera, tenuissimis cutem foraminibus perforas, per quæ glutinosa fertur sanies. Simile ipsi malum specie est, quod a faui similitudine *κῆριον* a Græcis nominatur. quod magis amplis foraminibus constat, quibus humor crassitudinem mellis referens sicut in apum fauis, continetur. Origo est ex nitrosa salsaq; pituita. victus igitur ratio ex cibis boni succi constare, omnia acria & salsa vitari debent, præsertim si inflammationem affectus resipiat. postquam corpus superfluo decenter erit leuatum, de rasis capillis caput fouendum bis ter ve die, aut etiam sæpius, aqua calida, in qua myrtus sit decocta, vel rubus, vel lenticula, vel amari lupini, vel asparagi radix. Quum vero plus saniei emanat, salicis folia cum aqua, vel lenticula, instar cataplasmatibus applicantur. terra autē cimolia, vel cretica, vel samia, vel pompholyx, vel spodium, vel argenti spuma, vel cadmia, vel charta combusta, vel etiam medicamentum ex charta Xerion, omnia ex aceto inducuntur. Smegmate vero hoc vtendum est, sulfure viuo, & perdicij herbæ, saponisq; æquali pondere. Composita hæc sunt, argenti spumæ drachmæ duode-

PAULI AEGINETAE

aliter. cim rutæ foliorū drachmæ octo, herbæ pediculariæ quam staphida
argenti agriam Græci vocant drachmæ quatuor, chalcanti drachmæ duæ,
spumæ Aceto myrteoque in sordium spissitudinem coacta illinuntur.
drach- A L I V D. Sandicis drachmæ quatuor myrthæ drachmæ quatuor
mæ sex sulfuris ignem non experti pondo drachmæ duæ, pollinis thuris
decim. drachmæ quatuor ex oleo veteri inunguntur.

Aliud ad achoras.

Alii le- A D achoras recrementum argenti, vel molibdenam contritam
gunt. hu oblinito. A L I V D. Ad achoras & humidæ scabies, rhodaph
mentes næ, rosarum vnciæ quatuor, sulfuris viui vnciæ quatuor, picis liqui-
pforas. dæ, & picis aridæ vtriusq; vnciæ tres, ceræ scilicet, olei myrtei quan-
tum opus est. in pueris autem, lacte soluta illinuntur.

De ficis.

F I C V S, nominant eruptiones, vlcerosas rotundas, subduras, ru-
bentes, quas dolor etiam comitatur. Fit vero hoc mali plurima ex
parte in capite, nascitur tamen & in reliquo corpore. Probatur ma-
xime contra hos alumen fissile, æris flos tostus, & glutinum pari
mensura cum squamæ æris duplo. Teruntur ex aceto illinunturque.
Præstans etiam remedium est menarum capita combusta, elixique
bulbi, & cinis aceto mixtus.

Aduersus capitis & menti ficosa exanthemata, xyraphium.

M I S I O S drachma vna semis, chalcitidis drachmæ duæ se-
mis, squamæ æris drachma, aluminis fissi, drachma. Bene loto, hoc
medicamen aridum impositum dimittitur. Die insequenti rursus pars
lauatur, spongiaque detergæ idem applicatur. Decidit enim ramen-
tum crassissimum. Et si diebus subsecutis idem fiat, sine cicatrice bre-
ui confanescit. Cæterū medicamen hoc non mediocriter adhæret.

Ad capitis pediculos.

L V P I N O R V M in aqua coctorum diluto, caput deterge-
ri iubeto, vel herba pedicularia, vel sandaracha, vel vtraque contrita
ex oleo veteri, seu aceto illinitur, vel piperis momentum, ne exulce-
ret cum oleo, aut hederæ succo cum melle, † aut minio synopico cū
aceto, aut cedrino liquore, aut pice liquida cum alumine, aut bacca-
rum lauri expresso. aut oleo raphanino. Ego pediculariam ex
aceto oleoque tritam inunxi, ac semper quod volui, sum alle-
cutus.

† Græcus codex manu scriptus ἡ σινιπὶ, idest, vel sinapi cum ace-
to. quæ scriptura verior est.

De capitis dolore, quem græci κεφαλαγία vo-
cant. Cap. iiii.

Capitis dolor qui græcis dicitur κεφαλαλγία, symptoma est gravior quæ humorum nimia humorum copia. Interim ex vtraque causa interim vero ex primaria causa, nempe solis æstu extrinsecus, frigore, ebrietate, aut ictu. Vehementissimi igitur capitis dolores ex efficientibus qualitatibus nascuntur, & potissimum ex calida, qui vero ob siccitatem contrahuntur, non æque vehementes existunt. Humida qualitas sui ipsius respectu, nullum plane dolorem conciliat, nisi caliditati, aut frigori, aut humorum copię adiuncta. Itaque de eo capitis dolore qui cum febris est eo loco explicatum est, quo febrium curatio exposita est, nunc de cæteris dicendum est.

De capitis dolore ex insolatu contracto.

QVI ex insolatu capite dolent, eorum cutis tactu calida est, & primo statim manus iniectu aridior apparet, oculos habent rubentes, frigidis asperginibus, & inunctionibus oblectantur, sentiuntque ab ipsis præsidium. Cæterum curatio his conveniet, etiam ea, quam dolori in febribus præscripsimus. Si dolor perseverat, infrascriptis utendum est cataplasmatis. Prodest fronti & temporibus inductus panis ex posca, & rosaceo. Interdum cum amygdalis, vel rosis siccis, aut teneris, vel cum menta cui pulegium sit adiectum, vel panis cum perfici foliis. facit etiam ocymum ex aceto & rosaceo tritum, vel hederæ corymbi in aceto elixi. Iam farinam triticeam cum rosaceo leuigatam vel serpilli ex aqua decocto miscere convenit, vel cardamomum torridum leuigatumque ex aceto & rosaceo, vel fermentum cum rosaceo, vel iridem aridam cum aceto. Sed mutantur continue singula, nam si diutius adhæreant, inefficacia redduntur.

Pastilli ad capitis dolorem ex intemperie calida.

CROCII drachmæ quinque, chalchanti drachmæ decem, aluminis drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ septem, omphacii drachmæ tres, chalcitidis drachmæ tres, gummi drachmæ tres. Vini austeri quod sufficit. Ex posca sumuntur. Sin etiam vigiliæ infestent, aliquid ex somniferis applicatur.

De iis quibus caput ex frigida intemperie indolefcit.

† AT si frigus nocuit, contraria iis qui ex solis æstu dolent, affectos signa testantur. Etenim facies ipsorum non concidit, sed colorem decoremque amisit. Item frigidis nec gaudent, nec iuvantur. Verum horum agnitionem tum victus ratio, tum reliqua concurrentia firmabunt. Inunctiones igitur adhibendæ ex oleo rutaceo, laurino, vel irino, vel nardino, vel etiam

quæ humorum copia in stomacho potissimum exuberat. Nā ut ait Hippo. in libello de hom. structura ad Perdicā, oēs capitis noxiæ affectiones ex stomacho oriuntur.

Alexā.
croci
chalcanthi drachmæ x.
† Alex.
aluminis sciss.

PAULI AEGINETAE.

opobalsamo, praesertim si recrementa fuerint crassiora viscosa-
que. Frons autem tum hoc liquore, tum iis medicamentis debet illi-
ni, quae ex pipere, & euphorbio praeparantur. Vinum subtilius pro-
pinandum, corporis motione & balneis vti calidis praecipendum.
interim a rad icula vomitu. In quibus autem qualitas citra humoru
copiam diutius persistat, hoc vtendum est medicamine. Piperis albi
drachmae duae, crocomagmatis drachmae duae, euphorbii recentis
drachmae octo S, stercoris columbini drachma vna S, aceti acerrimi
quantum satis est. Illinitur pars laborans, sed prius infricata.

† Locus hic sic legitur in veteri graeco exemplari, τοῖς ἐπὶ ἑγκάυ-
σει κεφαλαλγούσιν ὑπεναντίας ἐχειτάτε σημεῖα, καὶ ἡ θεραπεία
τῶν ἐπὶ ψύξει, idest, signa & curatio eorum, quibus caput ex frigore
dolet, sunt contraria signis & curationi eorum quibus caput ab
aestu dolet.

Si biliosus humor dolorem inuexerit.

NOTAE horum persimiles iis quos ob solis aestum dolor af-
fligit. Sed maior ipsis rosio accedit, & faciei pallor. interim etiam os
inamarefcit. Porro affectus hic aetatibus potius vigentibus, & tem-
peraturis calidioribus, vitae sollicitae, & bilem flauam coaceruantibus
solet accidere. Quamobrem balneum temperatum his, inunctio-
nes, aquae potus, & vniuersa victus ratio humidior, bonique succi ad-
hiberi debet. Biliosus humor absynthii diluto, vacuabitur, vel aloe,
aut ipsa Picra, antidoto per se, aut cum modica scammonia, aut cata-
potiis quae ex aloe constant. Inungenda frons, aut crocodi pastillo,
aut trigono, aut quodam simili.

Si caput consortii lege indolecat.

SI caput consortii lege cum toto corpore afficiatur, cura adhiben-
da, vt contra intemperiem, & superantem materiam pugnemus. &
si copia quidem premit & maxime in venis, sanguis mittendus est,
sin autem magis qualitas vrgeat, purganti vtendum medicamine.
Quod si particula laborante aliqua simul condolecat, veluti iocino-
re, aut ventriculo, aut stomacho, his succurrendum est. Vbi calida af-
ficit intemperies, panis ex aquoso vino exhibetur, vel etiā ex chon-
dro sorbitiunculae. Extrinsecus vincit superfundere, quae modice re-
frigerent, viresque confirmant, sicut a me prius comprehensum est. At
si glutinosi, crassique humores in stomacho infarcti, capitis dolorem
concitent, hos quoque amoliamur potu oxymelitis, tum simplicis, tum
Iuliani. Insuper medicamentis ex hyssopo & origano, & his adhuc
calidioribus magisque incidentibus. Iam vomitus a rad icula utilis, su-
perfusiones calidiores, & cataplasmata.

De capitis dolore ex vino.

Qua pter
cor no-
bilissi-
mū om-
niū mē-
brorū.
quippe
quod sua
frigidi-
tate cor-
dis calo-
re tēpe-
rat, iti-
dēque ca-
lore cor

SI vinum adhuc incoctum in stomacho fluctuet, tepentis aquæ potu vomere dolentem iubebis. Quod si etiam post concoctionem caput indoleat, refrigerantibus, repellentibusq; utemur, quale est rosaceum priuatim sumptum, & cum aceto, vel hederæ succo, vel brassicæ. Quin & ipsa brassicæ folia in aquam calidam demersa, & capiti circumdata ligataq; naturaliter ebrietatem arcent. eiusdem decoctæ elus in id efficax est. Item lenticula hos adiuuat, potissimumq; ventriculo humidior præditos. Adhæc alica, malicorium, & mala ipsa, piraq; tum aquæ potio, vtiliter assumuntur.

De capitis dolore ex ictu.

QUI ex ictu capitis dolorem conceperunt, iis, nisi summa omnino cute percussi sint, sanguis statim emittendus est, & convenientes aspergines capiti sunt adhibendæ. Oleoq; dulci irrigandum ipsum lanisq; contegendum. Vino ciboq; pleniori, præsertim si febris adest, ægros coercere expedit. Et tota curatio ceu ad nervosarum partium inflammationem & præcipue membranarum cerebri quas meningas appellant, adaptabitur. Si vero & vulnus factum fuerit, huic quoq; decenter medebimur.

Malagma ad capitis dolorem.

CERAE drachmæ septem, amygdalini olei vnciæ tres, terebinthinae drachmæ octo, æruginis rasæ, cimoliæ, chalcitidis singulorum drachmæ quatuor, pumicis drachmæ tres, æris vsti, squamæ stomomatis singulorum drachmæ duæ. Si videtur paulo esse durius, amygdalino emolliendum.

De cephalæa, & hemicrania.

Cap. v.

Terq; hic affectus, stabilis ac permanens capitis dolor est, qui strepitu, clamoribus, claritate lucis, vini potu, & implentibus caput odoribus excandescit exacuiturq;. Ac aliis totum feriri caput in hoc dolore, aliis alteram ipsius partem duntaxat excruciarı videatur, quos etiam hemicranicos nominant. Quibus sane intra caluariam malum consistit, iis dolor ad oculorum radices porrigitur, quibus extra est, circa ipsam caluariam indolescent. Quapropter dolores cum gravitate molesti, plenitudinem testantur, cum erosione infestantes, vel humorum, vel vaporum acrimoniam, qui cum pulsibus obueniunt, inflammationem, qui cum tentione, si quidem gravitas et pulsus non adsit, spiritus tenuis, & flatulenti, redundantiam innuit. si cum pulsu, membranosa partis inflammationem, cum gravitate vero, copiam intra membranas contineri. At si putridus etiam humor, calidior euaserit, & cum febris simul capite dolitant, febriunt autem omnino, & quibus inflammatio dolorem parit. Quum igitur corpus totum succis æquabiliter omnibus redundat, quod plethoricum.

PAULI AEGINETAE.

38. dicitur, venam secare si vires patiantur, & acrioribus vti clysteriis conuenit. Inde si adhuc sanguis videtur exuberare, etiam vena narium ad aperta, quantum satis esse videtur, detrahes. Mox hiera, quæ ex acueris, intenderisque exhibenda, deinde pituitæ educationibus, apophlegmatismos vocant, vtendum est, tum iis quæ per nares vacuant, & Græcis dicuntur. Eiusmodi est elaterii succus, cum lacte infusus, vel etiam aridum elaterium inspiratum, succusque cyclamini & porri. Hæc quæ sequuntur, sunt composita. Medicamentum quod naribus inditur ad veteres cephalæas, lippitudines & morbos comitiales. melanthii drachmæ octo, salis ammoniaci drachmæ quatuor, elaterii drachmæ quatuor. Tunsa; oleo sycionio, vel irino, vel cyprino excepta, vt cerati fiat spissitudo, naribus demittuntur.

Medicamentum quod pituitam extrahit,
naribus inspiratum.

addunt
iris di
narii
duo a
Gale.

CICLAMINI sicci drachmæ octo, nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autem in vicem nitri elaterium indideris, magis proficiet. Tritum accurate calamo scriptorio naribus inspirabitur. Porro epithemata quoque capiti admoueto, & inunctiones, vbi morbus in vetustatem magis inciderit.

Epithema ad cephalæam.

Gal. ait
agni se-
minis,
rosarum
ficcarū
singula
rū drac.
duæ ru-
tæ.

VNGVENTI irini, peucedani, castorei singulorum drachma, baccharum lauri drachmæ duæ rutæ summitatum drachmæ quatuor. Excipitur cerato rosaceo, rasoque capiti, toti ipsi imponitur. Mulier quædam in hemicranicis hoc etiam quod sequitur epithemate vsa, mirandum in modum inclaruit. Radicem cucumis syluestris viridem minutim concisam, absinthiumque cum hydrelæo incoquebat, dum intabescerent. Ac hydrelæo calente mediocriter partem affectam irrorabat. radicem vero & absinthium, in puluerem contrita oblinebat. Atque hoc solo medicamine, hemicranicos, idest altera capitis parte dolentes, & cum febre, & sine ipsa, curauit. At si malum maxime increuerit, vt dolorem ferre nequeant, vtitor medicamentis etiam quæ lenire possunt, & noxia euocare, quale est quod sequitur.

Vnguentum ad cephalæam.

LIQVORIS peucedani drachmæ sedecim, lachrymæ papaueris, anisi, alterci quod hyosciamum græci vocant, croci, myrrhæ scammonia singulorum drachmæ duæ. Aceto excepta in pastillos coguntur. Cum vsus postulat, ex aceto vel posca illinuntur iis, quibus humores crassi, vel spiritus flatulentus dolorem fecit. Iam dropax & sinapismus iisdem benefacit, & pastillus ex thapsia. Iam quæ ex atramento scriptorio sit mirifice eidem causæ medetur, quo possit

LIBER III.

52

hæc vtendum est sicut in opere de compositis docebitur. **Quintus** & istud mirabile in modum ad hemicranicos ex crasso glutinosoque humore dolescetes efficax est. Euphorbii portio vna cum pari castorei modo aqua excepta auriculæ demittitur qua parte indolescit, inde balneum adeundum, vbi paululum immorati ipsum assument, & consueto more lauabunt. Sic quidem expertum est, verum non alienum absurdumque fuerit, & oleo ipsa excepta, in aurem instillare. Itē quod medicamen ad coxendices inscribitur, etiam longo capitis dolore laborantes, & hemicranicos ex toto per sanat.

Ad hemicraniam veterem.

ALLIORVM drachmæ quatuor, ceræ drachmæ duæ, axungię veteris drachmæ duæ, cantharidum drachmæ duæ. Vespere illitum finito per noctem adhærere. Mane rupta papula, malagmate, quia liquidum est, *παραγγρόν* appellat, ei medeberis. **ALIVD.** Baccarū lauri quibus cortex sit ablatus, drachmæ duæ, rutæ foliorum, drachmæ duæ, sinapios, drachma. Aqua dilutum oblinito. Atque iis qui frigori patuerunt, vtilissimum est infra scriptum medicamentum vt plerumque semel ante balineas illitum, confestim affectui medeatur, & ægrotantes omnino sani post lauacrum euadant. Olei sabinii pondo, ceræ quadrans, euphorbii vncia. Hoc dimidiæ frontis parti nempe quæ temporum musculus habetur, delini debet. Qui vero frigoris iniuriam non senserunt, iis gallæ, & crocomagmatis par portionem cum vino detritam inungito. Sed qui ex calidis vaporibus, vel succis capite dolitant, iis medicamenta quæ euphorbio constant, non applicabis.

Apophlegmatismus, id est medicamentum quod saluam mouet contra cephaleam.

SINAPEOS contriti & in succū redacti ex aceto & melle drachmæ quatuordecim, herbæ pediculariæ drachmæ quatuor, pyrethri tātundē. Tusa, cribrataque miscero, & in sole gargarizato. Porro si ob biliosum humorem aut quandam intemperiem orta Cephalea diutius prorogetur, eorum usus veniet quæ in sermone de dolore capitis comprehensa sunt. Si ne sic quidē dolor finitur, neque cucurbitulis neque hirudinibus adhibitis sed suspicio sit humores per arterias in caput esse distributos non absurdum fuerit & arteriam post aures incidere. Porro humidioribus etiam balineæ naturales recte adhibentur.

De phrenitide.

Cap. vi.

Phrenitis membranarū cerebri, quas meningas græci appellant, inflammatio est, nunc quidē ipso quoque cerebro simul eā experiunte, nunc autem calore præter naturam in eo consistente. Causa morbi est vel sanguis superans vel biliosus humor, nonnunquam

quæ balis-
neū sua
nāficat
eneruat
que ioc
ipsis te-
perate
vtendū.

G 4

PAULI AEGINETAE

Ratio
est, quus
somnia
venit
ab hu-
mido so-
pore ca-
put pe-
tente
Aristo.

& flaua bilis perusta, adeo vt in nigram degenerauerit, quando etiā grauisima phrenitis nascitur. Aliquando cerebrum septi transuersi consortio dolens, ex neruis qui in ipsum sparguntur vitium concipit. At quæ mentis alienatio in ardentissimorum febrium statibus accidit, quæq; ex stomachi consensu exoritur, phrenitis non est, sed hoc solum, puta delirium. Comitantur proprie phreniticos vigilæ quidem plurima parte, interdum vero & somnus turbulentus accedit, vt consurgant, exilient, & furibunde vociferentur. Quibus sanguineus humor morbum fecit ii cum risu insaniunt. quibus flaua bilis ferociter, quemadmodum quibus atra vitium contraxit, tam immaniter sæuiunt vt coerceri nequeant, omnium quæ dicunt, faciunt, ve, obliuiscuntur. Oculos habent sanguineo colore tetricos, ac perfricant, interim aridos, interim lachrymantes, vel lemis, hoc est crassiore pituita oppletos. Lingua est aspera, & sanguis e naribus destillat, floccos festucasq; colligunt, febri per totum morbi decursum acuta conficiuntur, sed quæ in alto maligna delitescat. Pulsus ædunt exiguos, languidos, & quadantenus etiam duos. Respirationem magnam & raram, cum cerebrum primario afficitur. At si phrenitis septi transuersi, quod græci phrænas vocant, consortio concitetur, & respiratio inæqualis est, & præcordia fursum conuelluntur, & multo calore ardent, sicut iis qui ex cerebri vitio insaniunt, facies incalescit, & subruenta est, venæ repletæ. Quod si humor pituitosus sit temperatus bilioso, vti causam, ita appellationem quoq; compositam habet. Nam vigilans coma, nominant, in vniuersum quidem cum biliosus superauerit, quippe tales ægri vigilantes phrenitide laborant, cum vero pituitosus præpollet, contra in grauiorē veluti somnum quem coma vocant græci deferuntur. Atq; hoc malum antiquiores Galeno medici, Catochon vocauerunt.

Curatio phrenitidis.

QVOD si vires ægri patientur, sanguis protinus e cubito mitti debet, & copiosior. At si desipiens brachium non porrigat, aut si porrigat, metus sit secundum vacuationem, sanguinis profluuii, dum manum æger subinde ob mentis turbationem iactitet, recta in fronte vena diuisa, vna vice quod satis est auferemus. item clysteris utemur, ex hydrelæo, vel rosaceo cum ptisanæ cremore. Si vigilæ urgent, rosaceum, vel oxyrhodinum in caput dandum est. Aliquando calida ipsum aqua prius superfundendum, & medicamentum quod ex papaueris capitibus vocatur diacodyon exhibebitur nisi virtus imbecilla prohibeat. Et alia quæ ad somnum conciliandum superius scripta sunt huc transferemus. Decumbat æger in loco, tum lumine tum temperie moderato, & variis quibusdā picturis libero, vt quæ

LIBER III.

53

tales deterreant. Quo amici quidam gratisimi ingredientur, & cō-
modum incident, qui nunc blande ægrotum alloquantur, nunc acer-
bius corripiant. Cibus primum esto aqua mulsa, deinde ptisanæ cre-
mor, & sorbitiones ex chondro cum quadam dulci potione, vt apo-
melite, vel hydrosolato, vel rhodomelo, vel dulci hydromelo. Nam
vinosum hydromelum, quod in paruis vasculis ex Cibra appor-
tatur, repudiandum, vt quod grauioribus vino noxas in talibus excitet,
& maxime in capitis affectibus, idque ante concoctionem. Panis
quoque aqua lotus recte exhibetur, intubi, lactucæ elixæ. Si mul-
tus feruor conficiat, etiam cruda hæc dantur. Item cucumeris me-
dulla, peponis, duracini, & similia. Aquæ frigidæ potu coercen-
di sunt, potissimum si septum transversum consortii lege malo de-
disse originemprehenderimus. Quod si vrina ipsis, vt consenta-
neum est, delirii vitio cohibeatur, tñota adhibito calente hydrelæo
& inferiorem ventris ab umbilico regionem ἡττον græci vocant
& vesicam superfundemus, deinde digitis manus, loco innixis ad-
reddendum vrinam incitabimus. Reliquum corpus ipsis decum-
bentibus calido oleo perungi debet. Etenim in quiete, quoad eius
fieri licet, seruari debent, ita vt siquidem prædiuites aliqui fuerint, per
famulos contineantur, sin minus, vinculis constringantur. Nam
inordinata motio vires conuellit. Iam uero alia etiam de causa pe-
des, prius foti, deligaturis constringi, manuque contrectari debent,
nempe quo humores deorsum reuellantur. Porro si longior affe-
ctus, & contumax fuerit, ab iis quæ soporem accersunt, καρωτικά
græci appellant, abstinendum, ea uero quæ digerendi facultatem
obtinent, capitis perfusionibus miscenda, scilicet mentæ succus,
uel serpilli uel calaminthæ, uel ruthæ. Tum iis quoque utendum
quæ naribus inseruntur. A septimo die si uiscera sentiant inflam-
mationem, cataplasmatibus ex lini semine, & hordeacea farina cum
hydrelæo leniemus. Deinde cucurbitulas leues, aut cum scarifi-
catione, tum his ipsis, tum occipitio, & spinæ accommodabi-
mus. Si corpus squalidum, perustumque esse coniecturaueris, fe-
brisque adsit, etiam balneis utendum aquæ potabilis, & unctio-
ne liberaliore. Vinum tenue & aquosum, quod ὀλιγοφόρον ap-
pellant, uiribus recolligendis propinabimus, nullam inde mentis tur-
bationem, ut est uerisimile, futuram suspicantes. Aut enim nulla
fit, cum morbus declinat, aut certe si fit, ex facili subsidet. Pro-
cessu autem declinationis, gestatione corporis uti expedit, & con-
grua uirium recreatione. Sed ita phrenitici sese recolligent, ut ebrie-
tatem, iram, ciborum corruptiones, & in primis solis æstus ca-
ueant.

preceptū
Hippo.
ἐν πα-
ραγγε-
λίαις.

PAULI AEGINETAE.

¶ si ex
cofortio
ductū
neruorū
phrenes
patiunt
in amen
tiā inci-
dunt.

† Hæc sic leguntur in antiquo codice, ποιήσαντες ἀλέαν καταντλή-
σωμεν θερμῇ ὕδατι καὶ ὕδρελαίῳ. idest fota adhibita calente aqua
aut hydrelæo.

De inflammatione cerebri. Cap. vii.

Cerebrum inflammatione laborans, sæpe ita intumescit, vt capi-
tis futuræ distendantur. Dolor comitatur maximus, & diutur-
nus, multus angor, rubor in facie multus cum tumore molli, oculi
fiunt emissicij, caput inturgescit. Qui hoc malo impliciti sunt, sangui-
nem ex cubito mittere, item ex naribus, & vasis linguæ subditis de-
bent. Porro vtitor & asperisionibus quæ per inflammationes capiti
adhibentur, & cataplasmatis. quæ humectare, & maturare sunt
idonea.

De erysipelate cerebri. Cap. viii.

Accidit quoq; erysipelas cerebro, quo laborans hæc patitur, capi-
te dolet vniuerso, adeo vt flammis id vri putet. facies frigida est
& subpallida, os siccescit. Quare sic affecto sanguis detrahendus est,
& potissimum ex venis sub lingua sitis. Refrigerantia conueniunt,
quibus in aliis quoq; erysipelatis vtimur.

De lethargo. Cap. ix.

Lethargus itidem, cum ratiocinatricis animæ noxa sit aliqua, lo-
cum eundem quem phrenitis, nempe cerebrum, occupat, materiæ
vero mali, contraria est. Nam ex pituita humidior, frigidiorq; ce-
rebrum madefaciente, contrahitur. Lethargicos comitatur febris len-
ta, non impense acris erodensq; cū alto sopore, quæ cataphora Græ-
cis dicitur. Pulsus his magni, rariq; sunt, & vndosi, respiratio nimis
rara & imbecillis. somno perpetuo premuntur, a quo ægre possunt
excitari, & quocunq; modo interpellentur vix respondent, obliuio-
si, mente capti, oscitant crebro, & hiante ore nonnunquam persistunt
tanquam claudere id obliti. Deiciunt per aluum complures quidem
liquidiora, nonnullis autem cōtra venter inarescit. Urinam reddunt
iumentorum lotio similem. Quidam ex eis tremiscunt, & vndiqua-
que defudant. Huic affectui respondet Caros quasi dicas veterinosus
sopor ex eadem materiæ proficiscens, sed hoc discrimine variat. Fe-
bris Carum præcedit, eaq; vehementior, Lethargum subsequitur, itē
quod Carus etiam alia comitetur symptomata. siquidem frequenter
febrium accessionibus superuenit comitialibus, cerebri compressio-
nibus, modo ossis quidem in fracturis, modo autem membranæ custo-
de, quem μινυγοφύλακα Græci vocant, priorem cerebri ventricu-
lum premente. Lethargus autem peculiarem quandam constitutio-
nem obtinet, superuenit comitialibus.

Curatio lethargi.

Vires si permittunt, etiam hic vena secari debet, sin minus, clysteris acribus aluum ducemus. Aeger decumbet in domo spatiosa, mediocriter lucida. Caput eius oleo perfundi oportet, cui etiam castoreum sit adiectum. Nonnulli in vicem olei, oxyrhodino cum castoreo vtuntur, robur hinc capiti caloremque simul accercentes, reliquum vero corpus delinentes, & præcipue extrema, oleo veteri, cum nitro tosto, vel piperethro, vel pipere, vel cocco gnidio extergunt. Licet & cerato quod his, & castoreo simul constet, vti. Porro naribus admoventur odoranda thymum ex aceto contritum, aut origanum, aut pulegium. Os vngi conuenit, & palati cælum detricto sinapi, cum melis momento. Conariq; oportet pituitam indidem affixam digitis eiicere. Si admittant, etiam apophlegmatismi vsus erit ex oxymelite cum hyssopo, aut pulegio, aut origano, aut ipso quoque sinapi. Potui exhibebitur aliquid ex iis quæ cito transeunt præsertim diaspolites cochlearii mensura cum posca, iis autem qui in vetustatem inciderunt, & tremuli sunt, castorei quoque scrupulos duos, tresve dabitur. Si humoris inest copia, nihilque aliud prohibeat, scammoniae scrupulum, castoreo temperatum exhibebimus. At si his affectus non discutitur, caput radendum fouendumq; est sale, milio, & similibus per sacculos adhibitis. Adhæc sinapis vti in capite prodest, tum iis quæ per sternutamenta euocant. Postea cucurbitulas occipitio agglutinare partim leues cum multa flamma partim cum scarificatione. Præterea ad naturæ excretionem frequenter sollicitare oportet tum infectionibus, tum iis quæ urinam mouent. Inferiorem ventris ab umbilico regionem oleo rutaceo, aut sycionio cui sit adiectum castorei paululum aspergere fouereq;. Iam vero ut deglutiant, crebrius admonemus, cum calida aqua dulcium potionum aliquam, præsertim apomeli ex angustioribus vasculis, *βουβύλια* Græci vocant, instillantes. Quod si mediam infestet regionem quædam inflammatio, huic itidem medebimur superfusionibus & cataplasmatibus. Naribus sinapi aceto tritum, vel castoreum vstum admoovere profuerit. Alimētum esto cremor ptisanæ, vel auenæ, vel alicæ cum oxymelite, vel salibus, vel pulegio, nunc quotidie, nunc vno die interposito. A cibo, vinciri debent, summa cedere multum oportet, cruraq; pun gere, non nunquam pilos etiam in ipsis vehementius euellere coniti, quo excitentur. Iam femorū & crurum rubores excitati, *φωιγγμους* Græci vocant subinde profunt. Cæterum ubi morbus inclinare inceperit, gestationibus statim congruis vtendum, & ad balneum reducendi sunt. Victus qui vires recolligat, recreetque, decenter adhibendus.

Deatocho, aut vigili comate.

Cap. x.

ria autē triplici de causa amitti solet ne gligētia quū ipsa minime exercet. tpe sicut senes obliuiosi ex illo oīa fert ætas, anīmū quoque iōq; ait philo sophus ī 4. phy si. qdam eē tps obliuiosū, appellarunt. & morbo amittit, ut lithar gico hoc affectu. porro illud sciendū n̄ hōī solū aduenire memoriam sed & brutis quibusdam.

PAULI AEGINETAE

Nascit
is mor-
bus ut
ait Hip-
pocrates
ex eo, q
frigidis
humori-
bus ca-
put rep'e-
tum est.

catochi
etiā a-
pud the-
ologos
appella-
tur, q in
ecclesia
praua
hæresi d
tinentur
uel spiri-
tu quo-
dā dæ-
monia-
co.

Huius morbi causam, ubi de phrenitide sermo est habitus, sumus
complexi. notæ, ut summatim dicam, communes quodam mo-
do sunt phrenitidis & lethargi. Sed pro materia abundante variant,
peculiare autem hæ. Detinetur æger supinus extensusq; interim
facies subtumescit & modice lethargicorū modo liuet. interim rubo-
re tincta est, & superior gena sursum conuelli videtur ac excedere,
ut ne conuiere quidem æger queat. respiratio nulla apparet sed qua-
si mortuus decumbit. pulsus est exiguus, languidus, & creberri-
mus. Vrina & aluus cohibetur, aut certe modice redditur. ac
qui sane mediocriter habent, liquorem aliquem infusum deglutunt,
qui vero malo victi sunt, ad nares regurgitant. Itaque affectus qui pi-
tuita bilem superante constituuntur a lethargicis discernimus, eo-
quod neque facies tumescit, neq; liuida est, sicut lethargicis, præter
quam quod paulatim etiam leuiter desudant. In iis autem periculū
maius est, quibus peruigilium adest continens, vrinæ non respon-
dent, difficultas spirandi intenditur, sudores erumpunt, item quibus
ad nares potus resorbetur. At si mulier hoc laborare vitio cœperit,
ab ea quæ vuluæ strangulatu correpta est, hac nota discernes, quod
naturaliter iacere videatur & inclamantes percipiat, excitetur, rur-
susq; somno graui sopiatur. Est ubi dicunt catochon diuersum a vi-
gili comate, quod simplicem non mixtam habet causam, nimirum
frigidiorē, siccioremq; materiam, quæ posteriore cerebri ventricu-
lo obstructo malum hoc excitat. Ob quam etiam æger, si corripit-
tur subito, in illa permanet figura, qua correptus est, stans scilicet, uel
sedens, clausis oculis, aut respiciens. Quam ob causam antiquiores
Græci hoc pressos morbo, catochomenos quasi dicas occupatos, de-
tentosque nomiuauerunt, recentiores affectum catochen, & catale-
psin, veluti detentionem, & deprehensionē. Curatio prædictis quidē
est, sed pro symptomatum ratione quæ superueniunt, euariat.

Curatio catochi.

HUIC quoque malo sanguinis missione succurritur, præsertim
quibus faies rubescit, modo uires suadeant, aut clysteres iniiciendi par-
tim qui pituitam pollentem eliciant, partim qui bilem abundantem
leniant, pari modo aliorum quoque præsidiorum vsus erit. Simili-
ter ægros nutrire confert, interim diebus singulis, interim vno inter-
posito. Porro affectus admodum periculosus est, si ex quodam ali-
menti, aut potus errato acciderit, qui statim ad vomitum cogendi
sunt, ac parciori victu continendi, aluus irritari, ac viscera respersio-
nibus ex cumino, aut ruta foueri debent. Qui ex ebrietate vitium
conceperunt, crapula dissoluta, humidiorē cibo tractandi sunt, qua-
lis est pitauæ cremor. Præterea caput inunctionibus accommodis

per æstatem frigidis, per hyemem tepidis obducetur. Sic rapula ne uti quam fuerit soluta, neque ad sobrietatem reditus est, desperatæ valetudinis ægrum longe fugere oportet.

De memoriæ iactura, & ratiocinationis, item de icaro, hoc est, veterioso sopore, & fatuitate. Cap. xi.

Memoriæ iactura partim per se, partim etiam cum aliqua ratiocinationis offensa acidit, quemadmodum, & mentis seu ratiocinandi facultatis nox a priuatim prius accidit. deinde memoriæ iactura insequitur. Verum cum utraque pars, male fuerit affecta, fatuitas seu stultitia, quæ Græcis morosis appellatur, oboritur. causam habent communem efficientem nempe intemperiem. Quod si humida solum fuerit, memoriæ & ratiocinationis vitium creabit, torpores graues, animi sopores, cataphoras Græci vocant, longos, altosque somnos. Si vero humori frigiditas etiam accesserit, caros & lethargos, eodemque modo si sola quidem fuerit siccitas, vigilias tantum inducit, si autem calor accesserit siccitati, delitia & phrenitidas mouebit. porro intemperies hæ nonnunquam cerebri ventriculis, vel ipsius vasis, vel utique humiditate in sparsæ vel in ipsomet cerebri corpore vel etiam temporum musculis tali modo vitiat. At si quādo humores cum ipsis fuerint mixti similem quoque morbum inferent. verum simplex, an composita sit intemperies efficiens ex specie excrementorum condiscas. Quod enim memoriæ, & ratiocinationis iactura frigiditatis soboles existat, compertum habemus, ea vero humiditati ne, an siccitati iuncta sit, ex recrementis, ægri habitum, temperatura, victus ratione, anni tempore, & loco deprehendimus.

Curatio.

Si frigida male habuerit intemperies, calefacere, si humiditati iuncta sit, etiam exiccare oportet. rursus si mixta cum siccitate, humectare simul, & calefacere. Pari modo etiam in calida intemperie refrigerare conuenit. si siccitas accesserit, pariter humectare, si humiditas, refrigerare simul & ficcare. In quibus autem sanguineum humorem deprehendis abundantem, venam aperire, vel clysteriis acerbis uti consilium est, deinde etiam hiera exhiberi debet, & apophlegmatismis uti conuenit. Item unctiones capiti sunt inducendæ ex oleo, cui adiecta sint quæ refrigerant, excicantque, rosæ dico, myrti, lentiscus, aliaque similia, nec non toti corpori prospiciendum est.

Quod si ex æstu, & lassitudine orta fuerit intemperies, caput oxorhodo perfundendum. tum reliqua curandi ratione frigida, humectaque uti conuenit, cum in aliis tum in cibo & potu. Quod si caros fatuitati, vel obliuioni accedat, huic etiam prospiciendum est,

Quæ præcipit Gal. & hipp. fuge hoïes & speratæ salutis

mira -
dū & il
lud, qd
extat a
pud va
ler. ma.
quendā
philoso
fophum
athenis
capite te
cto la
pide a
misisse
memo
riam re
rum om
nium ui
ta inco
lumi qd
a medi
cis stat,
in capi
te scili.
esse ani
mi prin
cipatū.

PAVLI AEGIN ET AE

ut in lethargicis prius comprehendimus, vbi ipsorum discrimen ex-
quedam plicitum est.

etiā ars
est huius
morbo
similis
in quæ
si m-
χιομα-
τω per
unguen-
toru su-
ffitus
quosdā
efficitur,
ut aspe-
ctantes
inter se
alia atq;
aliasigu-
la esse vi-
deatur.

De vertiginibus.

Cap. xii.

Vertiginum affectus nascitur cum frigidus, glutinosusque hu-
mor cerebrum occupat, vnde leui occasione protinus etiam cō-
cidunt. ueluti quando aliqua circumagi extrinsecus aspexerint, ut
rotas, verticesve, aut quando etiam ipsi circumaguntur. Interim ve-
ro etiam calefacti capite cum humores in eo contenti, vel spiritus
quoque commouentur, interim prioribus cerebri ventriculis, dum
caluaria contrafacta perforatur pressis, in quibus etiam vehementes
oboriuntur cruciatus. præcedit autem in eis, quibus caput primario
afficiatur vehemens in eo dolor veternosus sopor, qui κατὰ τὸν ὄφθαλμόν Græ-
cis dicitur, & aurium sonitus. & quidam sane olfactu læduntur, q-
dam vero gustu. at quibus ex consensu ventriculi oris vertigines ac-
cidunt & stomachi rosio. quam cardiogmon Græci appellant, &
nausæ simul comitantur

Curatio.

VERTIGINOSOS in accessione quidem medicamen-
tis quæ odore mouent idoneis, excitare conuenit. Item frictionibus
vti et id genus aliis. Vbi morbus remiserit, eius amoliendi gratia san-
guis primum mitendus est, deinde purgatio ex hiera præstan- da. In-
terposito tempore acri clystere ex centaurei, vel cucurbitæ syluestria
decocto vtendum est. Secundum huiusmodi vacuationes caput ip-
sum cucurbitulis ad occipitium cum sacificatione lancinari debet,
mox apophlegmatismi, id est, medicamenta quæ saliuam per os
eliciant adhiberi, & sternutamenta moueri. At quos capitis calor,
auriumq; sonitus male habet, ceu vaporibus calidioribus per arteri-
as sursum elatis, etiam arteriæ sectio retro aures iis adhibenda est, ut
in parte chirurgica sumus dicturi.

is quoq;
morbus
homini
cū plæ-
risq; ani-
malibus
est com-
munis.
ob hanc
n. hu-
moris pi-
tuitosi
cōgeriē-
epilepti
ca gene-
rant, est

De morbo comitiali

Cap. xiii.

Morbus comitialis, cum totius corporis sit conuulsio, cum prin-
cipis animæ functionum noxa. partim sanæ in ipso cerebro,
partim verò in vniuersis huius uentriculis causam habet constitu-
tam, ea modo est humor pituitosus, modo melancolicus, præterea
etiam ore ventriculi affectio consortri lege oboritur. quemadmo-
dum in colicis quoque, sicuti cum de illis agemus exequemur. uel
certe aliis quoq; partibus contagionem impartientibus nasci-
tur. - cum aura quædam frigidior ad cerebrum ascendit, ali-
as a crure, alias a manus digitis. Insuper visus est quandoque pro
uenire etiam in quadam muliere ab utero quo tempore esset graui-
da, a partu autem cessauit. Occu- pat hoc morbi genus maxime pue-
ros, eosq; adhuc paruulos, dei n de vero adolēscētes, & iuuenes.

minime senes & decrepitos. Præcedit igitur comitiales inuitus corporis, animiq; status, tristitia, eorum quæ perceperant obliuio, turbulentæ insomniorum imagines, capitis dolor, eiusq; repletio continua, ob iracundiâ maxime, & pallor faciei, & inordinatus linguæ motus, nonnulli ipsam quoq; comordent. Quibus aut a stomacho vitium oritur, etiâ palpitatio ipsius præcedit, turbatio, & erosio, iâ ex inedia, seu cibo tardius assumpto, irritantur. vbi vero symptoma iâ insisterit, ægri de repente cōcidunt, cōuellunturq; interdū etiâ exclamant voce nihil significante. at eximia, peculiarisq; admodū nota ipsorum existit, oris spuma, cū alia cōmuniter aliis quoq; morbis eueniant. Nō desunt quibus etiâ vrina & stercus præter voluntatē excernitur. nonnullis & genitura. In quibus igitur acutissimus est affectus, statim iugulat, & accessionum continuatione, & symptomatis. vehementia. In pluribus autem longus esse solet, eoq; si non in pubertate, vel mensuris purgationibus, vel per conceptum solutus fuerit, aut si post hoc tempus contractus fuerit, sæpe vsq; ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medici curationē consequitur. Coarguunt comitiales suffimenta, bitumē, vel lapis gagates, vel coru caprillum, iecur hircinum comestum, & iecoris tostū odor.

Curatio.

SI infans adhuc fuerit qui ægrotat, nihil moliendum est. nā ætate ad biliosiores, siccioremq; statum transeunte, & victu moderatione adhibito, sua sponte plerunque morbus finitur. Conuenit autem victus etiam solum tum infantium, tum nutricum rationem habere. Qui vero post annos pueriles in morbum hunc prolabuntur, eorum partes conuulsæ ac distractæ pingui oleorum aspergine foueri, vinciri & in rectum dirigi debent. Deinde ore dissento digitus demitti, aut penna oleo irino vincta, pituitæ auferendæ gratia. Quin & medicamentis quæ naribus adhibentur sensum mouere conuenit, vt peucedano, cyrenaico liquore, bitumine, pice cedarina. Post accessiones si nihil prohibet, sanguis utiq; e cubito mittendus est. At si nihil remittat accessio, summæ partes sinapis mo delinendæ sunt, cucurbitula autem præcordiis defigetur. Quod si nec his morbus comprimitur, minimum in medicina spei superest. nihilo secius tamen medicus animo confidente castoreum necessitate adactus, & liquorem cyrenaicum cum melle & aceto ori infundet. in anum centaurei decoctum, vel cucurbitæ sylvestris dabat. vbi ad se redierint ex morbo comitali viribus ante recreationis purgatione ex hiera vacuandi sunt. hæc sane est recentis & acuti morbi comitalis curatio. Deinceps quomodo inueterato succurratur, trademus. Itaque ægrotos aquæ potu continere

nāq; p-
pemodu
eadē cā
materiā
lis epi-
lepsiæ
& soni
rone tñ
modog
differūt.
Huic
morbo
quoque
felis a-
quaticā
pellem
exutam
more
anguiū
pdesse
memi-
nit Ari.
i libello
de mi-
rab. aud.
rō ē, qā
vt iqt A
lex. i. p
ble. quū
aīa se in
tus reci-
pit ad
cordis ?
auxiliū,
reliquo-
ru mem-
brorum
corruūt
faculta-
tes atq;
uirtutes.

PAULI AEGINETAE.

diu expedit, aggredientes autem curationē si nihil obest, sanguinē dimittere. Interpositis quatuor aut quinque diebus corpusculum reficere & sic purgante medicamento euacuare praesertim veratro nigro, vel certe scamonia. porro veratrum sine medulla tunsum cribratum, quae aquae mulsae cyathis quinque, vel sex inspargere oportet, aut melle discocto cum piperis momento excipere. Cucurbitam vero sylvestrem semine eiectione sed quae medullam referuet passo implebis, finesque totam noctem commadescere, mane passum auferetur potuit quae dabitur, vel etiam medicamento ex veratro albo purgationem molieris, quod haec recipit, bacarum lauri purgatarum piperis albi alypiados euphorbiae, veratri albi singulorum drachmas octo. Hoc totum datur cum passo quod in cucurbita sylvestri pernoctarit, probe vacuat per vomitu. ubi vero sat purgati sunt, aegri balneo credentur. Tertio die in precordiis & dorso cute scalpello incisa cucurbitulae affigendae sunt. Deinde complusculis diebus interpositis corpusculum reficiendum est, & Hiera diacolocynthidos assumi debet, postea capiti & occipitio cucurbitula agglutinari. Sequenti die panis coctus in mulsis, tritus autem cum amaris amygdalis, vel serpyllo, vel menta, vel calamintha, vel ruta superdandus, atque id per triduum continuabitur. ab hoc, caput redendum est, & peucedani liquore, ex aceto diluto, in quo spondylion sit coctum perungendum, rursus interposito spacio corpusculum reficitur, & anridoti diacolocynthidos oboli nouem ex aqua mulsis exhibentur, & interpositis diebus iterum tres ex antidoto offerre conuenit. Inde medicamentis uti quae sternutamenta citant. post quinque decem vel dies castoreum ex mulsis praebetur, tempore rursus interposito in aluum dabitur centaurei decoctum & cucurbitae sylvestris, ab hoc iterum hiera offeretur mox utendum iis quae saluam per os nares educant, deinde sinapis capiti inducitur. iam etiam acrium ciborum elus conuenit, cum opportunitas est, adhibitus. Auxiliatur his etiam oxymel scilliticum quotidie potum, & mel, in quo scilla intabuerit, instar cochlearii assumptum. Victus autem ratio est quae incidat, tenuetque. Capparis igitur frequenter elus & salsamentum prodest. Fugere oportet carnes, legumina, vinum copiosius, venerem liberaliorem, balnea, sinapi, & potum statim a balneo, praesertim vini meraci. Exercitia prosunt & frictiones, sed capiti post reliquas omnes corporis partes adhibita.

De his qui stomachi vitio comitiali morbo corripiuntur.

SI stomachus primario affectu, morbum inuenerit, sollicitudo habenda est, ut ex facili aeger concoquat. Panis igitur accurate elaboratus ex uino temperato quod leuiter astringat, albumque colore sit

fit ad horam tertiam assumi debet. medicamentum vero ex aloë bis, terue singulis annis dare his expedit. Vidi autem quandoque pellum (inquit Galenus, neutiquam hoc tentatum morbo posteaquam radicem glycydis (dicit autem peoniam magnam recentem) ex collo suspensam gestaret, insuper agaricum opitulatur comitialibus, idem præstat sesili, spondylii fructus, radixque aristolochia rotunda ex aqua pota, non parum huic facit, & continua crurum scarificatio.

De his qui a particula quadam morbum concipiunt.

INVASOR quidem symptomate, ubi particulam communicare morbum, senserint, siue ea fuerit manus, siue pes, fune excipi valenter debet quæ superposita est. Cum autem remittit, recreare corpus oportet, adurens quoddam medicamentum particulæ inducentes, cuiusmodi est lepidium, & diacantharidos dicta similiaque. Ad hæc oxymel Iulianum comitiales vehementer adiuuat, particulatim materiam emolians. Post omnia commemorata & Theriace, & naturales balinæ locum obtinent. per totum autem vitæ curriculum, cauenda maxime cruditas, cibus ante concoctionem obitam, isque crassi succi, tarda cibi assumptio, corporis exagitation, vinum largius & potus a balneo, sicut comprehensum est, maxime, meracus, præterea valde vetusta, crassaque vina, tum acris ex his quæ odore mouent, & caput replent, incontinues & sublimi conspectus, in balneo mora, & capitis ex sole exustio.

De melancholia.

Cap. xiiii.

Melancholia mentis quædam alienatio est sine febre, ex melancholico maxime humore nascens, qui mentem occupauerit, alias cerebro ipso per se ægrotante, alias totius corporis consensu immutato. Tertia vero melancholiæ species est, quam flatulentam & a præcordiis hypochondriacam appellant, ob inflammata circa stomachum præcordia proueniens, quæ modo auram quandam maligniorem, modo substantiæ humoris partem ad cerebrum sursum transmittant. Communia omnium signa sunt, metus, tristitia, homines auersantur, alii se credunt animalia quædam bruta esse, & voces ipsorum imitantur, alii vasa fictilia, metuuntque ne rumpan- tur. adhæc mortem hi expetunt, illi eandem expauescunt, nonnulli semper rident, nonnulli plorant. Alii vero putant a maiore quadam vi se inuadi, & vaticinantur futura, non aliter quam uates & diuina culi quos græci ἐνδρακτύους proprie naminant, peculiare autem nota eorum sunt, qui ex totius corporis consensu melancholia laborant, gracilis corporis habitus, niger, hirsutus, & ex toto melancholicus, vel natura, uel etiā ex acquisito per sollicitudines quædam, aut

odiū hominū sicut, cimo
μοῦον
της
melan-
cholico
hoc mor-
bo apud
sophocle
laborare
Ajax ui-
detur.
afflati di-
uū numi-
ne sicut
apud
Hom. et

H

PAVLI AEGINETAE

Vir. cas prauiorū ciborum esus, aut hæmorrhoidum, aut mēstruorū sup-
fandra presionem. At qui ex præcordiis melancholici existunt, eos testan-
chalca - tur cruditates, accidi ructus, ardor, & ipsorum grauitas, tu quod præ-
serfylla cordia fursum conuellantur, interim etiā inflammatione confligent.
itemq; q Ad hæc quod incipientibus, deinde maioribus affectis melancholi-
moriut i ca comitentur symptomata. quodque hæc leuētur, concoctione, vel
manibus alui excretionē, uel multis flatibus, uel uomitu, uel ructu. Cum autē
hostium nullum ex his, aut certe pauca eueniūt, melancholica quæ apparēt
ut He. va gna cerebrum primario affici in totum succi contagione melanco-
tes quo- licifantur. Porro si quando flauæ bilis supra modum exustæ in ni-
q; et phi gram fiat mutatio, insaniam, dictam græce manian inferet, ob quam
loso. εὐ ferarum modo efferuntur insani, ut etiam eos qui imprudentius ipfis
δουσιξι occurunt, manu uolenter tractent.

Curatio melancholiæ.

appellāt QVI igitur exprimatio cerebri affectu melancholici sunt, cre-
apud pla bris balneis, victu boni succi & humido curantur una cū decenti ani-
to. ex q mi delectatione, sine alio præsidio, cum certe humor qui molestat nō
& illud dum ob temporis longitudinē excerni contumax est. quando etiā va-
refert o- lentiora magisque varia tentare oportet remedia. Itaq; purgentur p
lymp. in initia epithymo, aut aloë. Nam vel paucillum ex his sumptum quo-
phædo- tidie maxime iuuat, & leuiter aluum subducit. vbi uero purgati fue-
ne. rint, uti dictum est, absinthium propinabitur, nunc quidem herba ip-
εξ εὐδου sa in aqua macerata cocta q; duorum cyathorum instar, nunc autem
σι' α' eins succi drachma semisis, cum aqua continue liquefacta. Aceti quā
μοι affla acerrimi modicum sorbitioni datur somnum inituro. Iam multa ob
tu quodā sonia in id intincta, esse conuenit. præstantius autē fuerit aceto mix-
raptū tam esse scilam, polium, & tenuem aristolochiam. At cum morbo
Apollo. quidem incipienti ex totius corporis affectus consortio, ut supra di-
quū Ro. ctū est, incidis, corpus autē, viribus cōstat a sanguinis missione inci-
cēt, ea ui piendum est post hanc, viribus relectis, inferius purgare conuenit
disse, q in medicamento ex cucurbita syluestri, tum eo quod constat nigro vera-
Aeg. age tro. ac si hæmorrhoidibus, aut mēstribus suppressis malum fuerit con-
rētur. Est citatum, illas adaperiemus, hoc proritabimus. Laudantur etiam fa-
εἰ παρὰ cultates, tum quæ urinae ciende sunt, tum quæ p sudores purgāt. Sin-
κοπimor autem præcordiorum offensionī morbus debet, & horū habēda e-
bus qdā rit sollicitudo, ac fouebunt ipsa decocto rutæ, anethi, absyntii, pulegii,
q; qdā mē agni seminis, & fructus lauri perfundēdo. Hæc etenim dolores quo-
temotifuc que leniūt & flatus discutiūt, oleo incocta, & sic affectæ parti appli-
cedūt iso cata. Cæterū præter hæc insint, cataplasmatibus etiā ea quæ flatibus
litudines discutiendis faciunt. nēpe apiū. vel anisum, vel cuminū. Nil mali fue-
quasdā i rit, si indatur cataplasmati & cyperus, & iris, & libanotis quam ros-

marinum vocāt. Cum hæc admoues lōgo tempore per diē & pasto
& ieiuno adhærere fines. Vbi ademeris, aliud quoddam operimentū
super accommodato, lanā scilicet latiore. Cucurbitulis ad flatu di
gerendos leuibns vtitor, ad dolores vero inflammationesq; cum sca
rificatione. Porro adhibita curationi diligentia, nec sinapi obliuiscere,
sed acribus smegmatis, & dropacibus super dorsum, vētremq; uti
conuenit. Quibus vitiū iueterauerit præsentsimū est remediū etiā
citato p ueratrū albū vomitu purgatio. victus omnibus melācolicis
cōferet probi succi, & mediocriter humectās. Vitanda sunt, caro bu
bula ceruina, lenticula brassicæ cochleæ, vina crassa, & nigra, bre
uiter, quæ atram bilem generant.

Curatio insanix.

INSANIENTE S confimilem melāchoicis curationem re
cipiunt. propriam vero habent, vt caput ipsorum tū rosaceo tū oxy
rhodino perfundatur. Item ex antidoto picra purgabimus, verum san
guine prius misso, nec nō hirudinibus in capite utemur. vnice ipsos
iuuat hippomarathri radix, semenque eius ex aqua potum. Insuper
Brionix radice drachma ex aqua quotidie assumpta. Sin autē delirā
tes purgatiū medicamētorū potionē renuāt, misceri debēt ea nesciēti
bus ipsis, cibus nēpe bucellis vel ficibus pinguibus. vel palmulis, in
terdū vero potionibus adiicienda sunt. † Ante oīa uero aut in lecto
vinciendi, ne sibi, & iis quibus incidunt mali quippiam inferant, aut
gestandi grabato intra lecticam quandam insanientibus peculiarem
γύγας δὲ ὁ γράκι vocant, ex alto pensili.

† Plura leguntur in nostro codice. ita enim habet, *προδ' ἐγὲ παν
των κρατέισθωσαν ὑπὸ τινῶν, ἢ σιωδ' εὐσμέισθωσαν &c.* id est, an
te omnia contineantur a seruis aliquot.

De incubone, qui ephialtes græce
dicitur. Cap. xv.

EPhialten, qui latinis incubo est, aliqui a viro dictū asserūt, vel in
de quod hoc malo correpti ceu infilientē aliquē se imaginentur.
Themison autem decimo epistolarū volumine a suffocādo forte, pni
galionem appellauit. Constituitur id vitii ex crapula, & continua
stomachi cruditate. Comitatur eo detētos difficilis motus, torpidus
in somno sensus, suffocationis imaginatio, & ueluti quodam super
incidente, oppressio, ita ut exclamare nequeant hoc detenti, aut vo
cem edant nihil significantem. Nonnulli uero etiam audire sæpe
eum qui super ipsos inciderit, ac uenerem exigere imaginātur, sed cō
tractis eos digitis fugere. Cura itaque habēda est mali per initia nā
si diutius prorogetur, continue per noctem incidens, magnū aliquē
morbum nunciat, vt apoplexiam, insaniam, & morbum comitia-

oblectāt
sicut dō
dā scri
bit Ari.
q i thea
trū, vbi
nullus e
rormor
talis, p
plures
ire dies
cōsueue

rat ibiq;
specta
bat, perī
de ac si ī
scena ac
tores es
sēt. post
quā ue
ro ad sa
nitatē re
dierat,
dicebat
se ibi ma
gnā ce
pisse uo
luptatē.

Idē scri
bit quē
dam no
ctu furē
tem in
ter diu
sanæ
mentis
esse.

PAULI AEGINETAE.

lem. cum in caput huius vitii causa ferri coeperit. Quæ.n.comittia
les interdiu, eadem ephialtici dormientes noctu patiuntur. Itaque
modum est sanguinis detractioe & purgationibus vniuersum æ
gri corpus vacuare. Maxime his opitulatur, nigri veratri drach
ma, cui scammonia oboli tres sint adiecti. & nonnulla ex odoratis
anifum, daucum, petroselinum. Iam hiera diaculocynthidos, strenu
auxiliatur, est autem ea quæ ad Rufum authorem refertur. Victu
porro sit tenuis, non qui inflationes pariat. Succurrit ipsis & præ
niz semen. Dandaque continue sunt potui ex aqua grana eius ni
gra quindecim contrita.

noctur-
nus is
morbus
dem en-
tia est
ad homi
nē acce
dēs cū re
curfione
humoris
atri p lō
gū habi
tū redire
fueti nō
fine ma
lodæmo

De lycæone, vel lycanthropia.

Cap. xvi

Qui lycanthropia detinentur, noctu domo ægressi, lupos in on
nibus imitantur, & donec dies illucescat, circa defunctorum
monumenta plerumq; vagantur. Hæ comites ipsorum notæ sunt
facies pallida, oculi ad uidendum imbecilles & ficci, lingua aridissi
ma, nulla in ore salua, sitis immodica, tibiæ quod frequenter impie
gant exulceratæ, adeo ut sanari nequeant. Tales quidam sunt notæ
speciem vero melancholiæ lycanthropiam esse existimare conue
nit, curandumq; in accessione tempore, sanguinis ex vena ad an
mi vsq; defectum detractioe, item, cibis prohi succi, æger, & baln
is dulcis aquæ sustinendus est. Deinde lactis sero per triduum vsu
etiam hiera diacolocynthidos, bis terve purgabitur. a purgationi
bus. Theriacem quoque exicperis assumet, ac alia reliqua in melan
cholico affectu commemorata. Inuadenti iam morbo, asperginibus
somnia accerscere conuenit, in id efficacibus, vbi somnus accesser
rit, nares opio illinuntur.

De amantibus

Cap. xvii.

AMores cerebri affectibus annumerare cum sint quædam curæ
haud fuerit absurdum. Cura vero affectus est animi, ratiocina
tione in motu laborioso occupata. Hæ sequaces amantium sunt
notæ. Oculi concaui non illachrimant sed tanquam, voluptate
pleni apparent. continens palpebrarum motus, & cum reliquæ cor
poris partes non collabuntur soli hi amantibus concidunt. Pulsu
ipsorum proprie nullus est, quidam opinati sunt vt verū, qualis eo
rum deprehenditur, qui cura conficiuntur. Cum vero id quod
amatur in mentem ipsis vel auditu, vel visu, & præsertim re
pente uenerit, tunc pulsuum animo turbato contingit immutari
neque naturalem æqualitatem, neque ordinem retinere. Hos igit
tur & tristes, & vigiliis torfos nonnulli qui dispositionem igno
rarent, balnei abstinentia, solitudine & tenui victu consumpse
runt, in quibus sapientiores cum amantem deprehendunt, ad bal

nea, computationem, gestationem, ludos, fabulasque animum ab re usque
ducunt, nonnullis metum incutere conuenit. Nam qui amor ad lucē
semper indulgent, iis difficulter abigi potest affectio. Quidam igitur p noctu
tur obiurgandi sunt, pro ratione vitæ quam singuli delegerint. In bat. inde
vniuersum mens ad alias curas abducenda est.

De apoplexia & hemiplagia, vel paralyfi. Cap. xviii. Etum re

Quando commune quidē neruorum principium affectum est, ferebat.
eoque omnes corporis particulæ motum simul & sensum ami somno
ferunt, a poplexia morbus appellatur ita vt pariter principis ani- excita-
mæ functiones sint oblese. Sin autem in altera capitis parte ob- tus nihil
structio fuerit oborta, hemiplagia & paralisis nominatur. Si ue talerecor
ro vnam quandam particulam talis noxa occupauerit, illius affe- dabatur
ctio particulæ dicitur. Quippe Hippocrates memoriæ prodit, sunt. n. q
apoplecton hoc est resolutum ipsi crus euascerat. Seruatur ira q in quū dor
apoplectis modica quædam respiratio, quæ si permultum a natura miunt,
li functione recesserit, maximam esse affectionem putabis. si paulu- multa fa
lum, exiguam. Deterrima vero est respiratio, cum intermittitur, vel cere solē
etiam vbi magna cum violentia trahitur. Origo uitii est ex fri- quæ uigi
gidioze pituita, quæ principalissimos cerebri ventriculos vniuer lantes fa
se & subito repleat. Sin autem spinalis medullæ principium cere uidē
quandoque totum huic conflictatur malo, omnes faciei subiectæ tur. Ari.
partes resoluuntur, ipsa manente incolumi, eo quod sensum mo de som
tumq; partes quæ ibidem habentur a cerebro excipiant. Si di- no & ul
midia ipsius regio infestatur illarum partium resolutio quæ dicitur gilia.
paraplagia constituitur. Si odoratus vitiatu fuerit, vel ad prio
res cerebri ventriculos intemperiem expertos, vel ad meatus os-
sium quæ a percolando ethmoide dicuntur, obstructos, talis re-
feretur affectio. Itaq; iacent apoplecti, voce intermortua, sensus
motusq; expertes, citra febrem. Præcedit hoc mali, capitis subi-
tus, acutusq; dolor, venarum circa guttur extantium, sphagitidas
Græci vocant, toruli eleuantur, tenebræ oculis offunduntur, itemq;
splendores eisdem oboriuntur, & extremarum partium sine ratio-
ne algores, totius corporis palpitatio, difficilis motus, & dentium
inter dormiendum stridores, urina veluti æruginosa, atra modica, &
farinæ crassiori similia subsidentia quædam refert. Accidit autem
hic affectus circa ætatem senilem temperaturis pituitosioribus, vi-
ctusq; tali visis. At si iuuenes, & per ætatem infestet, magnam neces-
sitatem fatetur.

Curatio.

APOPOLEXIAE morbus, nequaquam, aut raro curat,
ut qui mortem minetur præcipitem, Si vero etiam discussa fuerit,

H 3

PAULI AEGINETAE.

plurimum cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit. Qui igitur quoquo modo curationem recipiunt, iis statim sanguis ex vena detrahendus est, & sicubi remissionem quandam habuerint, detrahere conuenit eadem die, aut sequenti, aluum autem acti clystere ex muria & melle temperatis ducere. Dein oleo copiosiore suffurato totum corpus perungere, caputque chamæmelino, vel anethino oleo, in quo spondilium decoctum sit vel calamintha, mulsaque instillatur, & ea quæ odore mouent, naribus admouentur, uti opopanax, vel sagapenum, & galbanum, vel castoreum. Oportet autem et ori per vim aperto digitum, vel pinnam oleo madefactam inserere, ut ea quæ ipsi inhærescunt, eiiciantur. Cæterum sedes etiam iis quæ flatus educunt, perungenda est, mulsa vel oxymel potioni dabitur. Quinetiam apophlegmatismis ex thymo, vel origano cum aceto decoctis utemur. Vbi morbus se remiserit, cibis mollis, distribui facilis & succulentus assumetur. Si vox nondum redit, & vires permittunt, cucurbitulæ occipitio cum scarificatione defigentur. si fieri possit etiam præcordiis. deinde gestabuntur ægri curru, aut lectica, aut lecto pensili. assumi etiam debent crebrius quæ sternutamenta excitant, & apophlegmatismi. Vbi quatuordecim dies morbus excessit, ad reliquas gestationes ducentur. Cæterum sermonis etiam sollicitudo habenda est. vetus apomeli cum micis panis, vel alica dabitur, mox pauxillum ex hiera. Post vigesimum primum diem balneo ægroti credentur. † Vinum tenerum calente aqua temperatum potui exhibebitur, ac reliquo tempore vires balneis & vñctionibus reficiendæ sunt, degent autem ægri in locis si fieri potest, mari vicinis.

† Melius hic locus descriptus est in veteri καὶ οἱ νόν παλαιὸν νόσον πινειν, idest vinum vetus &c. quanquam hæc admodum leuia sunt cum nemo tam stupidus sit qui οἶνον παλαιὸν nunquam dici non sentiat.

Curatio resolutionis, quæ paresis dicitur.

AT si principis animæ functionibus liberis, omnium particularum aut quarundam remissio acciderit, etiam hic qui molestat humor, qualiscunque ille fuerit, euacuari debet. Mox hiera, cui castorei quoque pars sit adiecta, dabitur, per initia drachma semissis, cum tantillo mellis, & aqua calente soluta, vel per se, piperis quoque dimidio scrupuli addito. Quatuor deinde diebus interpositis integra drachma assumetur, dehinc vna & semissis, postea duæ, atque tres. Rursus totidem diebus interpositis quatuor drachmæ, si ægri vires sustinent, offerentur, mellis adiecto cochleario. Particulis autem, medicamentis quædam discutientia, & ea quæ cutem possunt cruentare, impo-

nuntur, addendo simul castoreum, aut piper, aut pyrethrū, aut cachry, aut euphorbium. Prodest etiam eis oleum rutaceum, vel lycionium, vel vetus superfundere. Cibi conueniunt frumētacei, forbiles, vel alio qui ad concoctionem expediti, nec recrementicii. Cucurbitulæ remissis partibus agglutinantur, si multæ fuerint, distinctim, si paucae, vni, post cucurbitulas delinuntur medicamenta ex pice, vel rasina, vel manna. optime autem facit cum artemisia simul incocta calamintha, & cunyla, & nitrum ex aqua modica, quæ inter coquendū absumatur. Alius iterum subducatur ex aloe, vel polypodio, vel scāmonia, vel ex pulte diacolocynthidos. vñctioni vero accommodata λιπασματα græci a pinguitudine appellant, huiusmodi habentur vetus oleum, in quo scilla quadraginta diebus sub sole intabuerit. Si huius copia non est, duas scillæ vncias in oleo coquito, illinitoq, vel cachry similiter præparatum, miscenda vero & ceræ vncia, ne illita disfluant. At si galbani, castorii, euphorbii, adarce, & nitri singulorum vnciam semissem acceperit, multo erit medicacius. appositum etiam conuenit ranunculus herba incocta oleo, in quo per insolatū intabescat. Potiones erunt castorei circiter drachma, opopanacis succus fabæ instar deglutitus. Mirifice facit etiā sagapenon ad erui magnitudinem, ex mulla, & castoreum cum opopanace. item liquoris cyrenaici milii instar. Auxiliatur & antidotum ex triplici pipere, quod dyatrion pipereon dicitur græcis. Vtemur etiam acopis calefacientibus, & apophlegmatismis. Post diem quartumdecimum solidioribus vti cibis expedit, & auxilio multum proficiente, in balneum deducere. A trigésimo dropacem adferre conuenit, & balineis committere, reliquo tempore sinapi cataplasmatibus modo obducere, in quibus & motus & sensus perit, attendentes ne ideo quod non sentiunt magis quam par est vrantur. In iis autem qui sensus compotes sunt, cutis ruborem duntaxat oportet excitare post tumorem factum ad lauacrum mittere, & mollibus ceratis medicari. Vomitus a cœna conueniet, & is qui radiculis assumptis cietur, item gestationes, sella, aut lectica, aut vehiculo, postea ducentur ad balnea naturalia. Victus ficior utilis est, potio modica, & frictio. cibos igitur siccos esse debent, sitim quantam possunt sustinentes.

De iis qui laxatione, aut distentione resoluti sunt.

QVONIAM resolutæ partes vel conuelluntur, vel laxant, idq, vel a repletionem, vel inanitionem, attendendum rursus est, partim etiam sanguinem detrahi debere, partim non. Deinde in relaxatis quidem membris adstringentia, iis quæ laxant miscere, & frictionem intensam moliri conuenit. In contrariis, laxantibus duntaxat vtendum, frictione simul molli adhibita, oleo in relaxatis nitri

PAVLI AEGINETAE

paulum & sæculæ contritum adiciatur. fotus erunt ex aqua vehementer calida, & potissimum marina, in qua decoctæ sint lauri, vel viticis germina, vel samfucus, vel aliquid huiusmodi. Si autem æstas fuerit etiam natationes in mari, rubores autē in cute excitati his maxime conferunt. Itaque cedantur etiam particulæ ferulis, vel vrticæ ramis. Quod si perseveret resolutio, carnem, quæ inter articulos resoluta est, attractam ferris oportet cudentibus exiguis tenuibusque transmissis adurere. Contractis autem membris dropacem continue superiicere commodum est.

De resolutione quæ vnamquamque particulam obsedit.

QV AE a nervi divisione oritur particularum resolutio, insani-
bilis est, quæ vero ab intemperie, vel humore quodam contrahitur,
commune quidem ex remediis commemoratis præsidium recipit.
sunt autem peculiaria quædam singulis ipforum dicata, quæ subiun-
gemus. In iis igitur qui canum more convelluntur, æqualiter in op-
positum capistro appellato deduces. Profuerit etiam sanguinis de-
tractio, ex vasis linguæ subiectis, item cucurbitulæ priori vertebræ
defixæ, tum apophlegmatismi & per narium clysterem facta purga-
tio. Sciendum itaque est non eam maxillam quæ perverſa esse appare-
re mē- sed oppositam resolutione infestari. Guttur autem resolutum, cucurbi-
tulas mento agglutinabis, perungesque medicamentis ex castoreo, sa-
gapeno, & liquore parthico. auxiliatur etiam gargarizatio ex acris-
bus. Vbi lingua resoluta fuerit, venæ ipsius incidendæ sunt, cucurbitu-
læ mento admouendæ & apophlegmatismis ex sinapi utendū est,
& linguæ exercitiis. Si vocis instrumēta resoluta sunt, thoraci præ-
sidia adhibenda sunt, spiritus retentione, & vociferatu utendum. In
superciliis autem palpebrarum inunctiones similiter profunt, iam &
futura proficit. Vesica vero resoluta siue vrina impediatur, siue præ-
ter voluntatem excernatur, inferiori ventris ab umbilico regioni,
& ei quæ scrotum & anum intercedit medicamenta applicanda sunt
sedi autem immitendum est oleum rutaceum, vel lycionium cum bu-
tyro, castoreo galbano, vel opopanace, vel liquore silphii, vesicæ
porro hæc per colem transmissa valde profecerunt, vel sola etiā suf-
fecerunt, ex centaureo autem, & colocynthide cum lycionio clyste-
res etiam intestinis utiles sunt. Benefaciunt & medicamina vrinæ
cientia potui data, & castoreum consimiliter. In primis iis, qui nihil
vrinæ reddunt, per rectos siphones, quos catheteras dicunt, in vesi-
cam medicamina infunduntur. Præterea laxantibus infidebunt, &
eisdem cataplasmatibus forma oblinentur. Qui præter voluntatē vri-
nam excernunt, corroborantibus auxiliis astringendi sunt, cibis sic-
cis, potione frigida utentur, vbi se recolligunt, summæ cutis ad rubo-

tem vsq; exasperatione, & lauacris sponte preuenientibus frigidis vtentur. Eos autem qui resolutionem experti sunt ob spinæ vulnus, aut casum, aut vertebræ luxationem, superuenientibus, quæ mortem fatentur, symptomatis, nulla medicina periculo subtrahit. Quod si coles resolutus fuerit, iis quæ in vesica dixi, vtendum, in eisdem partibus & lumbis, item quæ intendendi vim habent, vsurpabimus. nō conuenit autem lac, caseus, & reliqua bellaria, lactucæ, aliæq; olera. Longanone vero soluto, in quo nonnunquam citra voluntatem ster cus erumpit, nonnunquam cohibetur, iisdem vti par est, interim hæc ab inferioribus partibus clystere demitti, alias astringentia, vt cupressi decoctum, lentisci, rubi, alias laxantia, vt adipem suillum, & anserinum, vitulinumq; & oleum, interdum rodentia, qualis est muria, vel cucurbitæ syluestris, vel similium decoctum. Neq; enim quicquā sic motum promouet, veluti varia agitatio. At si frigus prehenderit, etiam ex euphorbio acopon oleo dilutum per inferiora inditur. Artus autem resolutionem experti, cum communi curatione flectantur, perfrientur, extendanturq; in modum prædictum. Nam in frictione spei plurimum consistit.

De resolutione ob colicum dolorem contracta.

NOSTRA ætate colicus quidā dolor incurrit, ex quo præsertim superstites futuros consummata artuum motus priuatio comitabatur, tactus sensu, vt videbatur, in eolumi seruato, ceu Critica quadam ex alto oborta transmutatione, vnde motus pleriq; spatio temporis sponte rediit. Qui vero difficiliore curatu extiteret, etiam simplicioribus ex prædictis inunctionibus leuati sunt. præcipue autem efficacia sunt experti, acopon ex populo nigra confectum, itē quod abiete constat. Sed quæ roborandi vim obtinent, ac modice refrigerant, multis præclare opitulata sunt.

De conuulsionibus.

Cap. xix.

Postquam de resolutione tractauerimus, proximum est, vt de conuulsionibus agamus quoniam neruorum vterq; affectus est, quare etiam de tremoribus dehinc dicitur. Cum igitur statim ab initio, vel non multo post morbi principia exorientes conuulsionēs lōgius prorogantur, ex repletionē ducunt originem. Vbi vero sudores largos, aut vomitum, aut deiectionē, aut sanguinis profluvia, aut vigilias, aut famem, aut motus, tum multos, tum vehementes subsequuntur, inanitioni feruntur acceptæ. Et cum ex sanis alicui repentinā superuenit conuulsio, ob repletionem eam fieri necesse est. At si vniuersum corpus, neruiq; ex febribus perardentibus inaruerint, ac deinde ob siccitatem conuellantur, maximum sane hoc malum est, & premodum insanabile. Primum itaq; partes quæ contrahuntur, va-

Letale
hoc ge

PAULI AEGINETAE.

ius con
uulsio-
nis ap-
pellat
Hip. in
pigno.

lenter vincienda sunt, & inordinatis resistendum motibus, oleo per fricare oportet rutaceo, aut lycionio, aut veteri, aut quodam ex hoc genere, tum aquam mulsam potui præbere. Eos autem qui ex inantione conuelluntur, oleo, vel hydrelæo calido fouere competit, si nihil prohibet etiam ad lauacrum deducere, temperatoq; folio vti, cum oleo & frictione lenissima. Nutriendi sunt sorbitionibus ex chondro & alica, vinoq; tenui & quod facile distribui possit, aquoso, nisi febris adfuerit, tunc enim ptisanæ cremor utilis erit, somnumq; accersimus. Iam vero ex plenitudine, aut inflammatione, contractas conuulsiones curabis, si copiam euacues, inflammationem vero propriis ipsi præsidiiis discutias. fit etiam conuulsio, cum vomentes vehementius turbantur. Succurrit autem conuulsis acanthii radix, spinæ albæ, & ægyptiæ semen epotum, nonnulli centaurei tenuis succum potui exhibent, cum repletio conuulsionem parit. Atqui non modo potui dato castoreum, sed etiam a foris cuti vna cum lycionio illinito. Si vero malum hoc modo non finiatur, cucurbitulas cum scarificatione ad mouere prodest, si crura contrahantur, coxis, & postremæ vertebræ, si manus conuellantur, etiam dorso, & primæ ipsius vertebræ, tum ei quæ humeros superiacet. In vniuersum corpore ab affectu immuni, si labrum, aut palpebra, aut lingua contrahatur, graue symptoma existimandum est, quod maxima inuehat pericula, licet exiguæ partes affectæ videantur. In his itaq; sanguinis ex occipitio, & primis vertebra detractio recte adhibebitur.

De tetano eiusq; differentiis. Cap. xx.

ἐκ το-
ῦ το-
υ
ὑπὸ
τοῦ
τέτα-
νω.

Tetanus, cum & ipse conuulsio quædam sit, procreatur musculis corporis, & præsertim spinæ, a frigido humore intus & foris infixo ceu congelatis, ideoque hoc malo occupati, flectere sese nequeunt. Verum cum particulæ corporis in anteriora tenduntur, affectus nominatur emprosthotonos, cum in posteriora, opisthotonos, cum in alterutram partem æquali robore intenduntur, tetanus appellatur. Pelops hæc vitia tensionem vocat, & contensionem musculorum cervicis, nervorumq; per quos caput inclinatur, renuit & circumuoluitur. At si circa posteriores cervicis musculos malum consistat, opisthotonos ex accidente, si circa priores, emprosthotonos, si vtrinque, tetanus nuncupatur. Causam tribuit musculis repletis spiritu & aere crasso, nebulosoq; quem impense frigidum, & concretum, eoq; ad motum contumacem affirmat, vnde etiam sicca potius quàm humida fomenta malo prehensis conuenire. Hæ quædem tetani differentia sunt. Curatio autem in his cum communis quædam sit, non euariat. Optimum itaq; præsidium ipsis est febris, quæ per initia nō

fuerit, superueniens. Notæ horum sunt, angusta respiratio, pulsus rarus & exiguus, nonnunquam & risus ipsis sardonius oboritur, rubet facies, oculi magis intumescunt, adhæc aut non urinam reddunt, aut aquæ similem, aut cruentam, cum bullis quibusdam, item aluus siccescit, vigiliæ magis vrgent, crebroque a conuulsionibus periculum est, ne lecto ægri excidant, quinetiam singultire incipiunt, indolentque, alii capite, alii clauiculis, & lumbis, quidam ipsorum subtremit quoque euadunt. Porro facit affectum (quamuis raro) lassitudo, humi dormitio, ponderis eleuatio, casus, vulnus, ardor, ictus, & alia quæ eandem neruis offensam inferre possunt. Curatur, quo modo conuulsionem ob inanitionem generatæ solent.

Curatio tetanorum.

QVIBVS ceruix recta intenditur, initio sanguis detrahendus est, partes lanis oleo madidis sycionio, castoreoq, cum veteri cōtegendæ, aut vesicam quoque latam calido oleo repletam, tendinibus superimponere oportet, & cucurbitulas admouere, cum lancinatu. leues enim noxam quoque inferunt, item ceruicibus nonnunquam cucurbitulæ defiguntur, & vtrique spinæ parti, adhæc pectori, qua est musculosius, & præcordiis, interim vesicæ regioni, & renum. Porro liberaliter sanguinem auferre conuenit, modo non vniuersim id fiat, sed particulatim & per vices. Sudores lanis oleo madentibus abstergere, ne imprudentes refrigescant. Quod si tetanus in vetustatem inciderit, in oleum bis quotidie descendere confert, non tamen diutius immorari, quippe in oleum descensus, maxime vires conuellit. Potus erit hydromeli spissius ad dimidias decoctum. Qui robusti sunt, panacis liquoris drachmam bibent, si minus, tres obolos, vel minimum, obolum. At si quis ipsum celi stomacho inimicum habeat suspectum, ammoniacum quoque exhibeatur, vel liquoris cyrenaici instat erui discocto melli circumlitum deuoretur, & laserpicis radicis duo cochlearia, tribus mulsæ cyathis inspersa, vel ipsius decoctum exhibetur, vel myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopique decocto, sed omnium securissimum expeditissimumque est duo, triaue castorei cochlearia, partita ipsius quantitate, & per vices data. Non enim offendet etiam si secundum cibum ex eo quid exhibeas. Potus vero ipse præter aliatum paulatim, tum modice assumetur. Nam dum ægre potio nem transmittunt, in nares ipsam propellunt, vnde vehementer turbati, ad conuulsionem prouocantur. Sedes oleo tutacæo cum opopanace perungi debet, quod ab inferioribus quoque partibus iniicietur. frigida superfusionem, cum sit (quem-

PAULI AEGINETAE.

admodum ait Hippocrates) maxime temeraria, & eoq; posteris, credo, vituperata, & nos damnamus, deuitamusq;. Vnguentum hoc conuenit, nardi sextarius, ceræ vnciæ duæ, folii, amomi, styracis, mastiches singulorum vncia, castorei, adarcæ, euphorbii piperis singulorum vncia, spicæ nardi, opobalsami, singulorum tantundem.

Hæc ita scripta sunt in veteri codi. τὴν δὲ τοῦ ψυχροῦ κατάχυσιν, ὡς ἰπποκράτης φησὶν τολμηροτάτην οὖσαν καὶ διὰ τοῦτο τοῖς μεταγενετέροις οἱ μὲν παραλείψουσιν, frigida autem affusionem (quemadmodum Hippocrates ait) quum maxime temeraria sit, & ob id a posteris prætermissa vitamus.

Potio opisthotonicis accommoda.

PANACIS radice, piperis albi, costi, myrrhæ, papaueris lachrymæ, singulorum pares portiones, exhibentur cicerculæ modum somnum capturis, benefacit etiam orthopnoicis. Porro victus erit tenuis, qui expedite distribuatur, & recrementis omnino vacet.

De tremoribus. Cap. xxi.

Remoris origo in vniuersum quidem ex neruorum imbecillitate est, quod ætas senilis palam testatur, priuatim vero plures causæ ipsum efficiunt, nempe frigida intemperies, frigida potio, & præsertim in febribus intempestiue assumpta, frigidi, glutinosiq; humoris redundantia, & vini vsus liberalior. Qui igitur ex erroribus commissis manifesto tremunt, a noxiis abstineant. At si perseuerat etiam diu in febribus tremor, primum corpus totum oleo fabino perfundatur, vbi autem accessiones remittunt, veteri, aut sycionio, summa vero corporis membra lanis mollibus prius tamen præuncta cõteganur. Deinde cucurbitulæ a priori vertebra vsq; ad spinam, lumina bosq; agglutinentur, sic vt particulæ prius cum præcordiis cruda hordei farina ὠμὴ λυσιν Græci vocant, delinantur. Iam hæc quoque partes lanis ex veteri, aut sycionio oleo respersis operiantur. Quod si febres inueterauerint, die vno interposito in oleum, aut hydrelæ tremuli descendant, vtanturq; frictionibus mollibus. Si longius prorogatur dispositio frigoris suspitione, mulsa, castoreumq; potui dabitur, & calidis locis gestari debent. Cibus diductus facilis offeretur, primum sorbilis, mox volatiliū, & piscium, qui molli carne sunt præditi, febribus solutis lauandum est, sed vitari debet frigidum solium, viniq; potio. Porro si crassorum, viscosorumq; succorum copia fuerit, vt conuenit iis quæ incidunt, extenuantq;, verbi gratia, rutæ ramusculo, spondylii, quantum tribus digitis comprehendi possit castorei, & nitri singulorum obolis duobus, Datur quotidie cochlear vnum cum oxymelite ad tres vsq; dies ieiuno, vel panacis, & piperis grana quinque ex mulsæ cyatho, Simplicia præsumpta tremen-

quia in
neruis
motiua
i primis
virtus
cōsistit.
quæ vbi
libere
neruis
i perare
non pōt
oppressa
prauis
humorū
vitiis hæ
noxæ
oboriun
tur.

ses adiuuant, castoreum, leporis cerebrum comestum, althæe radicis decoctum, damassonii foliorum drachmæ quatuor in mulsa, eupatorium ex aqua. Superante autem frigore etiam zosymi vngvine, item acopis ad resolutionem conscriptis, vñctionibusq; & cutis ad ruborem vsq; exasperatione, phænigmon Græci vocant, vtemur, præterea exercitiis, perfricationibusque. iis vero qui ex vini potu tremunt, vinum circundendum est, qui ad in totum morbo fuerint liberati,

Ocularia, & primum de dolore ex Galeni

commentariis. Cap. xxii.

Cum in oculis vehementiores oboriuntur dolores, considerato, quam ex affectione corporis dolere ipsis in inflammationibus accidat. Vel enim, dum ab influentium acrimonia vehementius eroduntur, vel quia tunicæ succis repletæ tenduntur, vel quod crassæ succis, aut spiritibus flatulentis quodammodo intenduntur, graues in ipsis dolores oboriuntur. Rosiones igitur purgantibus curare præsidii, noxium humorem vacuando par est. item candido oui liquore in oculo s infuso. Vbi vero concocta iam fuerit inflammatio, corpusq; superfluis vacuum, balnea ipsis aptissima sunt. Et repletionem autem contractas inflammationes, sanguinis detractio, alui detractione, & partium inferiorum frictione per sanare conuenit. Intensiones autem, toto prius corpore vacuato, item humoribus qui sursum tendunt, ad inferiora reuulsis, deinde loco iniectis remediis, quæ discutiendi facultatem habeant. fomenta itaque adhibenda ipsis sunt & foenugræci decoctum infundendum. In quibus autem sanguis crassus oculorum venulas intendit, sic tamen vt corpus totum plethoricam affectionem non præ se ferat, vini vsus est, quod possit excallescere, vacuare, & meatus aperire.

quò fiat
dolor,
pulcher
rima ac
difficillima
quæ
stio est.

De perturbatione, & lippitudine quam proprie ophthalmiam græci vocant.

PERTURBATIO humiditas oculi est, & calor cum rubore naturæ alieno, non ex corpore, sed ab externa causa aliqua proueniens, vt a sole, fumo, puluere, oleo, quare etiam occasione ipsius se parata, promptissime soluitur. In genere huius perturbationis, lippitudo est, verum non extrinsecus tantum, sed ex interiore etiam causa cæca ingruit, perq; tres quatuorve, aut quinque dies plerumq; durat. facillime discutitur, si obseruentur omnia quæ foris accedentia turbare lumen possint, item parcior cibo, aquæ potu, aut inambulatione, & aluo ex facili respondente.

De inflammatione.

Cum inflammatio ipsos oculos occupauerit, post totius corporis vacuationem, perungendi sunt iis quæ impetus humorum pos-

PAULI AEGINETAE

alia le-
ctio. fo-
tus ex
melilo-
ti & fœ-
nu græ-
ci deco-
cto.

sunt repellere, & irritationem lenire, quale est, quod ad Neilum au-
thorem refertur, diarodon, vel etiam Mediacum Nardinumq. Vbi
membrana adnata inflammatione tentatur, medicamentis utemur,
quæ græci ab vno die monemera vocant, cum oui candido infusis.
Die insecuto nisi inflammatio crescat, nardino delinentur, fotu ex me-
liloti decocto vti conuenit, vbi vero crassus humor est, qui lippitu-
dinem facit, medicamenta accommodantur, quæ neque infarciendi
vim habent, emplastica græci vocant, neque humores incrassent, sed
quæ diffundere, humectare, & excernere idonea sint, quale est Chia-
cum. At si humores in capite fuerint impacti, cucurbitulam occipiti
ad mouere oportet, vel scarificare, vel hyrudines fronti qua oculus do-
let, adhibere, panemq. purum aqua maceratum cum modico rosaceo
aut polentis in octis capitum papaueris decocto, similiter cum ro-
saceo, superdare. efficacior autem vtendum est cataplasmate, ex cro-
co, melilotis, palmularum carnibus, teneris coriandri foliis ouorum
luteis tostis micis panis in sapam intinctis, rosacei momento, & pa-
paueris capitum contritorum decocto. Interdum semen quoque ip-
sius ad leniendum dolorem miscetur. Si magna doloris necessitas
est, etiam opii pauxillum adiicitur, vbi dolor abest, stupefacientia
græci *ναρκωτικά* appellant vitari debent. Quod si mediocris inflam-
matio infestet, aloen per se, vel aqua vel oui albo dissolutam illini-
to, vt autem expeditius sit auxiliū, croci drachmas sex, aloes drach-
mas sedecim, gummi drachmas nouem coniecta in vnum, aqua plu-
uiali excipito, singitoq. collyria. Nam quæ vocantur diacrocu lip-
pitudinum initiis sunt idonea, in quibus vero tumor œdematodes
hoc est mollis cedensq. & exalbidus habetur, tum circa palpebras,
tum membranam adnatam sine tunicarum offensa, benefaciunt etiam
liquida collyria (Græci hygrocollyria vocant) & ex croco, & atra-
mento sutorio & melle præparata. hoc autem est laudatissimum.

† Aliter hæc leguntur in antiquo exemplari, καὶ τὰ διακροκά δὲ
προσαγορεύομενα πρὸς ταραχὰς ὀφθαλμῶν εἰσὶν ἐπιτήδεια, idest
quæ diacroca appellantur oculorum conturbationibus sunt ac-
commodata.

Liquidum collyrium quod dolorem leuet
anodynou appellatum.

CRETAE sutoriæ, mellis attici succi foeni græci singulorum
pares portiones incoquito donec mellis spissitudinem habeant. dein
de specillo duos angulos attingito.

Ad defluxionis impetum qui epiphora Græcis dicitur,

AD fluxionum impetus per initia quidem cōuenit inedia aquæ
potus & multo magis veneris abſtinentia Alius subduci facies po-

ſca aquoſa collui debet. præſertim ſi feruens fuerit fluxio. ſin minus, atramento ſutorio cum melle frons & palpebræ delinantur. Nonnulli atramentum ſutorii aqua diſſolutum ad collutionem exhibent. Porro qui deſluxu citra inflammationem vexantur vel etiam cum inflammatione quidem ſed ita vt ſupra os caluariæ affectus coſiſtat agglutinantem utendum eſt in fronte ſimplicibus ſane viridibus vitis foliis vel rubi ſucco vel portulacæ vel cottoniorum cum polenta tenui vel galla leui cum vino, & polentæ polline vel cicuta vel pſyllio cum aqua vel ſolano vel cochleis cum teſtis ſuis in puluerem redactis a tempore ad alterum tempus illitis. In vniuerſum iis quæ aſtringunt refrigerantque. Compoſitis autem his pollen frumentaceus & myrrha vel thus cum oui aquato illinatur vel ſamia terra cum myrrha & manna ſimiliter vt oui albor inungetur. In frigidioribus autem humorum curſibus ſulſuris viui bituminis picis colophonix ſingulorum drachmæ duæ item Muſcæ paſtillus & Aſter ſimiliaque probe repellunt. Iam vero Theriacæ vino aſtringenti diſſoluta frontique illita frigidos humorum influxus ſiſtit. quinetiam eadem pota vehementer his ſuccurrit. Ipſi vero oculo lana aut panniculus tenuis oui albo madens imponitur item caſeus recens ſimiliter oculo applicatus acres maxime influxus cohibet. tum collyria a reprimendo dicta ſtaltica ſi illinantur inſtillanturque ex oui aquato idem efficiunt. At ſi in imo & ſub oſſe hæreſcens humor longiore ſpatio duret poſt generales corporis vacuationes medicamentorum uſus eſt quæ per nares atque os pituitam eliciunt er-rhina & apophlegmatismoſ appellant, caput radetur & rubor in cute excitabitur. Porro in hiſ etiam curandi rationes quas in capite manu adminiſtramus aſſumunt nempe Angiologiam arteriotomiã hypopſatiſmum & periclyphiſmum vti græci appellant & in uertice uſq; ad os aduſionem. Iam cucurbitulæ occipitio incifa cute admotæ impetum ſtuoris poſſunt reuellere. Fluxiones extra caluariã notant uafa in fronte & temporibus diſtenta & capitis ueluti uinculum tum quod ex agglutinentis ſicca præſidio ſunt. Si hæc deſint & ſtuoris impetus prorogetur & ſternutamenta nonnunquam moleſte elidantur, humorem ſub caluaria teneri cenſendum eſt.

De chemofi.

CHEMOSIN appellant cum utræq; palpebræ ex uehementi inflammatione inuerſæ fuerint ut uix oculi ab ipſis contegantur & album oculi nigro ſublimius euaserit rubrumque etiam magna ex parte nigrum occupet. Curatur uenæ ſeſtione medicamine purgante collyrio diarodon albo & quod a cinereo colore uocatur *πρόδυσιν*, cum lacte uel oui aquato. Eodem uero palpebras.

ex So-
cratis di-
cto apud
Pla. uis
recte
purgare
oculū,
purga
caput-
uis recte
purgare
caput
purga
ſtomachū
&
totū cor-
pus. ea
hoc gñā
hiſ va-
cuatio
præire
iolet.

PAULI AEGINETAE

tempora & frontem illinere oportet, tum fomentis & cataplasmatibus lenibus uti. cum autem remittit inflammatio, acrioribus quale est etiam viride diarodon.

De hyposphagmatis, & emphysematis.

HIPOSPHAGMA venarum adnatæ membranæ rupturâ dicitur, ex ictu potissimum: eueniens. Instillatur itaque ipsis sanguis palumbi, vel columbæ, vel calido lacte muliebri thuris paululum conterens, vel muria, & præsertim ex sale cappadocico, fotu utitur ex hyssopi decocto. Porro tumor mollis, cedema vocant, oculis ex ictu obortus, fomentis ex posca continuus, & spongia ex eadem superdata discutitur. Recte huic specularium combustum, & stercus columbæ æquis portionibus, vino aut aceto contrariâ illinunt. Iam caseus recens vel raphani cotrex, vel vua passa sine acinis, singulatim ex posca, vel mulsa applicantur. Eadē faciūt ad Emphysemata.

Ad emphysemata pruriginosa, & pforophthalmias.

EMPHISEMA palpebræ tumor est, cedemati similis, pforophthalmiam pruriginosa eiusdem scabies, ex salso & nitoso humore contracta. Conuenit ipsos fouere, posca, lenticulæ decocto & rosarum. Hygrocollyrium autem hoc, æris drachmæ sex, misyos tosti, myrrhæ singulorum drachmæ tres, crocci drachma vna semis peris drachma vini Chii & passi cretici singulorum cyathus vnus, & dimidius, incoquantur quoa mellis yspisitudinem habuerint. Hæc est Erasistrati compositio, quæ panchrysos vocatur, facit etiam ad anginam, vlcera oris, pudendorumq; & aurium dolores. Inungant & oleo palpebras, somnum inituri. Ab acidis, salis, & acribus abstineant.

De sclerophthalmia, & xerophthalmia.

SCLEROPHTHALMIA, durities oculi, & difficilis motus est cum labore, ruboreq; citra humiditatem. fouere igitur ipsos crebro, spongiis aqua calida imbutis ex usu est. Item ouum palpebris in lecto imponitur, cum rosaceo, vel adeps anserinus. Frigida & quæ indurant vitanda, caput velandum, vngendumq; alius ducenda. Xerophthalmia, quasi dicas arida lippitudo, pruriginosa oculorum est sine fluore dispositio. Curatur balneis, inunctionibus, & vinctu probi succi, vtriusq; vero communiter conueniunt medicamenta acria, ut vel lachrymas prouocent, per quæ & durities emollietur, & siccitas humectabitur. Talis est Erasistrata quoq; panchrysos, & quod dicitur Dicenteton. item cui nomen est Stratiotico.

De ectropiis.

HI C affectus palpebræ inuersio est, aut propter cicatricem, aut ex crescentiam carnis nascens. In quibus igitur ex crescentia inueterauit

rauerit, æruginem rasam torrefactam conterito & admoueto, ¶ vel plumbo vsto cum sulfure viuo, & loto vtitor, vel vtriusq; paribus & æruginem & plumbo. Nam ex cicatrice proficiscens Ectropion, si in totum curare studueris, id manu faciendum est.

† Verior lectio est in antiq. ἡ μολίβδω κεκαυμένω χρω μετὰ δείου ἐπύρου καὶ πεπέργως, id est, plumbo vsto vttere, cum sulphure ignem non experto & pipere.

De ægilope, & anchilope.

ÆGILOPS abscessus est, qui inter maiorem oculi angulū, & nares fit, qui ruptus, si negligatur, vsq; ad os in fistulam dehiscit. priusquam vero abscessus in vicus erumpat, Anchilops vocatur. probe igitur faciunt glaucium & crocus vna cum perditii herbæ succo imposita. crebro autem variare oportet, & neq; in vomicæ eruptionem degenerabit. **ALIVD.** Halica cocta in aceto & probe trita, non solum incipientes, sed etiam in vomicam mutatos per sanat, rum pitq; & vsq; ad os penetrat. Hoc vsus non solum ægilopas, sed etiā anchilopas curabit. **ALIVD.** Ruta satiuā vna cum lixiuio, quod ex cinere & calce confectum est, contrita, coctaq; & imposita pulchre admodum ægilopas emendat, & ad usq; os permeat, initio erodens, postea non ita, ac mirum est, quod ne cicatricem quidem indecoram hoc præsidium relinquat. **ALIVD.** Cochleas cum testis suis tritas imposito. interdum aloë, vel myrrha admista. Præsidium hoc antequam ægilops in pus degenerauerit, & postea cum ruptus fuerit abscessus, eum desiccet. **ALIVD.** Cum manus opera ægilopa & anchilopa aduris, hoc vttere cataplasmate, lenticulas decoquito, & cum melle vtitor, vbi crusta exciderit, vuam passam excipiens liquida terebinthina, vtitor in modum emplastri. Hoc enim & purgat, & carne replet, & cicatricem inducit.

De trachomate.

TRACHOMA internæ palpebrarum regionis asperitudo est, harum intensio, vt veluti incisuras habeat, σὺκωσις a fici similitudine græcis appellatur. Cum inueterauerit vitium, callosq; contraxerit, tylosis vocatur. Colliriis igitur vtendum est tum eo quod ex vino, tum quod ex duobus constat lapidibus, ipsosq; hæmatite lapide, ex aqua loto subiectis palpebræ abstergentur, Hermatioq; cum Cignarii modico. Adhæc diacrocū collirium pariter psorophthalmiis citra ex ulcerationem efficax est palpebræ inuersæ illitum. At si durior callus, his non cesserit remediis, palpebra inuersa pumice raditur, aut sepiæ testa, aut foliis fici, aut etiam instrumento, quod a palpebrarum rasura blepharoxiston græci appellant.

De chalaziis.

in Ald
no textu
non est
hoc vlti
mū me-
dicamē-
tum.

PAULI AEGINETAE

CHALAZION, otiosi humoris in palpebra colluuius est in qua ammoniacum aceto detritum simul cum galbano inungitur. facit etiam terebinthina pariter cum cerato excepta.

De crithe tuberculo.

CRITHE, paruulum abscessus tuberculum, oblongum, palpebrae cilio obueniens. Id cera alba foueri oportet, muscae capite abiecto reliquo corpore infricari, vel hordei diluto perfundi.

Ad palpebrarum pediculos.

EXPURGATIS prius pediculis, marina tepida palpebras colluere oportet. Deinde medicamento subscripto cilium attingere, aluminis scissi partibus duabus, herbae pediculariae parte una, tritis utitur.

De madarosi, vel milphosi.

HIC affectus palpebrae pilorum defluuium est. Ad quod cura prius vniuersi corporis habita, smegmatis utere, quibus ab honestandis palpebris nomen est calliblephara. Terrae ampelitidis, croci gallicae, ladani, singulorum pari portione contrita utitur. **ALIVD**. Stimeos tosti lotiq; drachma, plumbi combusti & eloti drachmis quatuor, croci totidem nardi indicae drachmis tribus, in puluerem reductis utitur. **ALIVD**. Palmarum ossium combustorum tribus drachmis, nardi gallicae drachmis duabus, leuigatis utere. hoc etiam scabiosis oculis medetur. **ALIVD**. Neapolitae ad palpebrarum defluuia, *μηλφώσεις* appellant longosq; palpebrarum affectus. Stimmeos, cadmia, chalcitidis, misyos xenici singulorum pares portiones, crassiuscule contudito, & melle respersa torreto, leuigatis utitur.

De ptillo.

PTILLOSIS, palpebrarum crassities est, callosa, rubicunda quibus accidit saepe pilorum etiam defluuium. Praeter praedicta igitur etiam hoc summe facit, Muscerdae combustae, & melle contritae, inunguntur.

Ad superciliorum defluuia quae madarosis dicitur.

PLVMBVM digitis oleo, vel adipe anserino vinctis detritum illinitur. **ALIVD**. Hoc etiam subnigros reddit, nuges auellanae exustae simul cum adipe caprillo, uel ursino infricant. **ALIVD**. Hoc efficax est etiam barbae alopeciiis. Alterci drachmae duae, muscerdae drachma, polytrichi drachma, irini vnguenti cochlearia quatuor. Tritis perbelle vnguentum admisceatur. fotuq; prius adhibito illinitur. quod, si rasa pars ante fuerit, magis proficit.

De palpebrarum pilis oculum irritantibus

τρίχιασιν appellant.

PILIS qui oculum pungunt prius euulsis, locus statim sanguis

ne ranæ per se inungitur, vel cum cinere chamæleontis albi, vel sanguis cimicum, vel fumarie quæ in hordeo nascitur succus, cum gummi, vel tellinarum falsarum cinis cum cedria, vel loti cinis, vel alumē liquidum quod phorimon appellant, vel muscæ caninæ sanguis admodum in id efficax est.

Pilorum glutinans medicamentum.

CONGLUTINANT pilos infractos bitumen, mastiche colophonia, gummi, cochleæ pars glutinosa.

De enanthide & rhyade.

ENCANTHIS naturalis in maiore angulo carunculæ ex-
crescentia est. Rhyas autem huius imminutio. Enanthidas igitur
iis quæ aduersus ectropia dicta sunt, similibusq; vrendi vel exeden
di facultate præditis, hæc σπηρτικὰ illa κενυτικὰ græci nominant, ab-
sumes. sed non totas, ne eius loco Rhyas sub nascatur, verum ad natu-
ralem vsq; magnitudinem. Rhyadas, carnosâ parte in totum, vel rudi
manus opera, vel medicamentis absumpta, insanabiles existimato.
Quod si pars ipsarum immixta fuerit, iis quæ mediocriter astringūt
caruemq; creantibus reficitur, qualia sunt medicamēta ex croco, glau-
cio & aloe confecta. item collyria diacrocu inscripta, necnon alter-
cum prodest in vino coctum, impositumque, & aluminis ex vino
pauillum.

De vlceribus.

VLCERVUM in oculis genus quidem vnum est, differen-
tiæ vero speciales diuersæ. etenim in cornea membrana quæ græcis
ceratoides appellatur, vlcus cauum, angustum, & purum, a fossula bo-
tryon græcis dicitur. quod autem latius botryo est, sed minus altum,
cæloma nuncupatur. Argemon in pupillæ circulo nascens, ambien-
tia comprehendit, vt etiam in exteriori pupillæ parte rubicundum,
in interiori candidum appareat. Epicauma vlcus est sordidum, &
crusta obductum, quo repurgato humores oculi sæpe effluunt. Iam
vero aliæ plures vlcervum sunt differentiæ, de quibus dicemus com-
munius. Si igitur vlcus simul cum inflammatione obortum fuerit,
curationem ex iis quæ inflammationem lenire possunt, & cōcoque-
re, moliemur, non neglectis iis quæ ad vlcus proprie pertinent. Ta-
lia vero sunt collyria, libanium, cygnus, & pelaria vocata, item asier
& similia, insuper quæ ex amylo, terra samia quæ ἄσμη dicitur & ce-
rusa constant, omnibus autem magis leniendo dolori esse llamo-
nem nouimus, verum diu ei insistendum non est, eo quod ad-
modum stupefaciat. Laudatissimum vero & quod diazema-
ton a decoctione dicitur, vt quod stupefaciendi vim non habeat.
At si cum fluxione vlcus infestari, collyrium aliquod illi admi-

λίμν-
θιογ
cerusa,

PAULI AEGINETAE

ſcebum, quale eſt diahydruſ, & Chiacum, præterea Cygnus fuluus & quæ repellendi ſine roſione facultatem obtinent. Sin autem vlcera ſordida fuerint, muſſa mediocriter aquata, & fœnugræci decocto vtemur per ſe, & cum aliis ad id dicatis collyriis. † Si aciora ſint albis, ſeberiano & fœnugræci diluto, ſi non acia, diaſmirnes, & nardinis. Purgata vero vlcera medicamentum Cleo probe poteſt cicatrice obducere, eamq; præterea concolorem reddere.

† Exemplar græcum typis expreſſum ita habet *δριμυτέρων τῶν ἑλκῶν*, ideſt, ſi aciora ſint vlcera &c.

De oculi providentia quæ *προπτωσης* dicitur.

PROPTOSIS tuniculæ quæ græcis ab uux acino *ἐαγρε* *δης* dicitur, procidentia eſt, quæ eroſa ruptave cornea tunica accidit. Ea cum nondum creuit quod muſcæ capiti ſimilis ſit, myocephalon nominatur. Cum vero amplius & eo uſq; ſucceuerit, ut acinum uux repræſentet, ſtaphiloma, quaſi vuatio dicitur, ubi plurima facta eſt acceſſio, ut palpebras tranſiliat, melon, hoc eſt malum. Si vero obcalluerit, elos, ideſt clauus tunc dicitur. Si igitur ad myocephalon fere oculi procidentia degenerauerit, repellentibus cōſtringentibuſq; ipſum medicinis utendum eſt, Chio nimirum, Phæo, Nardino, & Theodotio. item eo quod dia thallias, & quod diaceratos vocatur, iam vero ſpongiam leniter ipſis poſca, aut vino adſtringente, aut roſarum decocto imbutam, ſuper dare commodum eſt, aut ſplenium. Principatum vero obtinet ad procidentias omniaq; vlcera, medicamentum cui nomen eſt Olympiacum, vel Olympus, cum ſucco oliuæ, vel polygonii, vel polii. Eadem hæc etiam clavis conueniunt et ſtaphilomatis, priuſquam inalbeſcant. Vbi vero alborem aut callum contraxerint, nullus remediis locus eſt.

De oculis purulentis.

ALIQUANDO membrana a cornu dicta ceratodes, purulenta efficitur, nunc altius nunc in ſuperficie, ita ut pus habeat vnguis figuram, quæ cauſa eſt ut hoc etiam malum vnguis oculi nominetur. Huc ergo ſpectat curationis ratio ut vel pus diſcutiatur, medicamenti mediocriter in id efficacibus quale eſt aqua muſſa, & fœnugræci ſuccus, ex eoq; collyria, ſimiliter libanum, & quæ ex thure conſiunt, dia libanu inſcripta, vel rumpatur vomica, & vehementioribus repurgetur, quod genus ſunt diaſmirnes, & hygidion. At ſi pus in oculis citra exulcerationem coierit, etiam hoc liquidum collurio utendum eſt. Atramenti ſutorii, croci ſingulorum drachmis octo, mirrhæ drachmis quatuor, mellis libra. Cæterum phlyctæna cum ſit ceratoidis membranæ excreſcentia, ex humore quodam tunicas ipſius excoſcente, purulentorum curationi ſubiicitur.

Hygra, hoc est liquidum medicamentum ad suppurantes oculos quos hypopios vocat, Bassi. croci, aloes, myrrhæ singulæ vnciæ, vini quadrans, mellis optimi selibra. Crocus ex vino modico teritur, deinde alo & myrrha. Vbi crassitudinem acceperint, mel additur. Vnita in vitreo vase reponuntur, vti licet bis quotidie, aut si necessitas urgeat ter. Quando quidem oculum simul purgat, & carnem, cicatricemq; inducit.

hæc oīa
de Gal.
adverbū
sumpta

De cicatricibus & albuginibus.

QVAE per summa oculorum cicatrices fiunt, aliqui hoc nomine solo cicatrices dicunt, alii vero nubeculas. Altius autem delitescētes, albugines, medicamentis absterforiis, extergentibusq; discutuntur. Nebulas igitur anemonæ succus abstergit, & minoris centaurii succus cum melle. Vetusiores autem cedria extenuat, & æs solum aqua tritum modo collirit, ad hæc quæ detergent collyria, quale est quod cornu ceruino constat, dia ceratos elaphiu dictum, item Rhinarium, Hecatombe similiaq;. Albugines vero nitrum cum oleo veteri detritum diligenter, & inunctum probe, extergit. Item sepia testa combusta, cum melle leuigata. Inter colliria hoc bene, & leniter abstergit Collyrium. Mamiræ, guttæ ammoniaci, myrrhæ troglodytidis, crocodilorum fimi, singulorum æqualia pondera. in collyrium coactis vtitor, vel crocodili terrestres finum ex aqua leuigatum illi nito, in collyria redigens. Recte autem sal cappadocum aqua soluitur, quo collyria albuginibus exterendis dicata dissoluēs instillabis.

Quomodo cicatrices tingantur.

GALLAE, acaciæ, singulorum drachmæ quatuor, atramenti sutorii drachmæ duæ illinentur. Collyrium autem hoc proficit, floris mali punici, citinorum, atramenti sutorii, acaciæ, gummi, singulorū drachmæ quatuor, stimmos, gallæ, singulorū drachmæ duæ. Aqua teruntur, si flos mali granati desideretur, interius membranosum quod grana intercedit, misceto.

De vngui oculorum, quod pterigion græcis vocatur.

VNGVIS quod pterygion græci vocant, nervosa membrana adnatæ ex crescentia est, quæ ab angulo quidem oritur, sed adusque oculi coronam peruenit, vbi vero supramodum fuerit adaucta, pupillam obtegit. Magni igitur & inueterati vngues solam manū expostulant. Recentiores vero & magnitudine mediocres, præfidiis eliduntur abstergentibus, qualia aspretudini idonea sunt, & albuginibus. inter simplicia igitur æs combustum, vel atramentum sutorii simul cum porcino felle pulchrefaciunt. Efficacius autem hoc est quod sequitur, atramenti sutorii pars vna, gummi pars semissis, vino leuigata illinuntur, vel etiam colliria formantur, nonnulli ve-

PAULI AEGINETAE.

ro caprinum fel melle mistum inungunt.

Ad vngues oculorum, suppurationem, & hebetudinem. Oribasii.

LAPIDIS magnetis, æruginis rasæ, minii sinopici, suffiminis ammoniaci singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, mellis attici cochlearii dimidium. Idem valet aduersus albugines.

De carbunculo & carcinomate.

CARCINOM A tunicæ ceratoidis affectus est, cui dolor adfit, distentio, rubor tunicarum, cruciatus punctorius ad vsque tempora magisque si moueantur, cibi torquet fastidium, acribus irritantur, & excandescunt. Hoc malo nulla medicina subtrahit. Nihilominus dolor leniri lactis potione debet, item cibus frumentariis & alioquin probi succi, omni acrimonia liberis. Collyria lenia infundantur, vt spodiaceum, seberianum & consimilia. † Cæterum bonæ totius corporis temperaturæ prospiciendum est. Carbunculus autem & ipse malignum ac contumax vlcus est, crustatum alias bulbo, alias palpebræ, quemadmodum reliquis pariter corporis particulis accidit. Itaq; in bulbi carbunculis per initia quidem clystere primû, mox lacte discocto, mediocriter purgare conuenit. deinde spongia foto erui farinam, vel triticeam ex aquæ mulsæ decocto obducere in stat cataplasmatibus, nonnunquam & iridem detritam applicare, & lacte oculum eluere. Si vlcera serpendo depascent, lenticula cum melle, vel malis cydoniis incoctis forma cataplasmatibus obducuntur. Si latius depascendo penetrent, foliis oleæ decoctis, vel malicorio in uino cocto leuigatoq; ex melle. At si cessent proferpere, crustaq; medicamento quod subiungetur, imposito, exciderit, & vlcera sint pura, lutea ouorum tosta, leuigataq; cû croco & melle cataplasmatibus modo inducentur, quousq; ad cicatricem perueniant. Medicamentum autem est hoc, spodii drachmæ quatuor, myrihæ non nimis torrefactæ drachmæ tres, totidemq; oboli. Detritis in uino amineo quousque inaruerint, passum creticum vetus miscetur. Vbi leuigata sunt inuicem, liquida, pixide fictili excipiuntur, subiungunturq;. Ad palpebrarum vero carbunculos malum granatum acidum, totum frustum concisum aceto incoquito. Vbi intabuerit probe, in læuoremq; detritum, illinito in linteolum ac vtitor, bis terve quotidie immutans, noctu semel.

† Hic locus integrior est in nostris exemplaribus, in quibus ita descriptus est. προνοεί δὲ καὶ τῆς τοῦ ὅλου σώματος ὀγκρασίας, πρᾶναι δὲ τὰς ὁρμὰς τῶν κερκίνων ἀφ' ἑνὸς φακοῦ ἐγκυματίζομενον ἢ χυλὸς πολυγόνου ἢ ἀερογλώσσου, ἢ ἀνδραχίνης, ἢ δὲ ἀνδραχίνης, id est, bonæ totius corporis temperaturæ perspiciendum est. Car

cinomatis autem dolores lenit decoctum lentis impositum, vel succus polygoni, vel plantaginis, vel portulacæ. Quam veram esse scripturam ex Aetio facile intelligi potest.

De mydriasi.

C V M pupilla colore quidem nihil magis euariat, sed multo est quam naturalis status exigit latior. interim ex toto visum impedit, interim permultum, & omnia quæ conspiciuntur ab ipsis minora quam sint, videntur esse, Mydriasis quidem affectus est, causa autem ipsius humor quidam excrementitius, itaque curationem ipsius sanguinis emissionem a cubito, vel purgatione tentabimus, si minus, venas in angulis oculorum diuidere oportet, deinde cucurbitulam occipitio ad mouere, & marina frontem, & oculos perfundere. si marina desideretur, muria, vel posca. Medicamentis autem iis vtendum est, quæ etiam ad pustulas conducunt.

De phthisi & atrophia.

P H T H I S I S affectus est, quo pupilla fit angustior, obscurior, rigosiorque. Res luminis obiectæ, in his maiores apparent, causa vero est densatio, quæ siccitati potius fertur accepta. Sed phthipsis ab atrophia hoc dignoscitur discrimine, quod illa angustio rem pupillâ, hæc totum oculum minorem, humilioremque reddat. Mederi his conuenit exercitio, & studiosa capitis, faciei, & oculorum fricatione, Ad hæc aquæ in faciem superfusione & vnguine quodam calfaciente in caput dato, oculos autem medicamento, quod rarefaciat, & acriore oblinito, quale est infrascriptum. Ammoniæ drachma, croci magma-tis drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, æruginis drachma. Tritis in aqua, formatisque vtitor.

ga q̄li-
bet diffu-
sa poten-
tia in na-
turali-
bus he-
betatur,
vnita in-
ualescit.

De nocturna cæcitudo quæ nyctalops dicitur.

N O C T V R N A cæcitudo, qui Græcis Nyctalops dicitur, vitium est quo per diem homo cernit, Sole dein occiduo obscurius, noctu omnino nihil. Curari debet sanguine ex cubito, & oculorum angulis vacuato, mox purgatione, vel per clysterem inanitione adhibita. Deinde apophlegmatismi indicentur, aut sternutamenta prouocare oportet. Ante cibum hysopus potui, vel ruta dabitur. Si his remediis morbus non cedit, iterum purgationem moliemur ex scammonia, & castoreo, oculi vero melle despumato illinentur, claudunturque, premendo liquamenta, continendoque. Aluminis combusti partes duæ, salis fossitii pars una. Trita cum melle sublinunt. A L I V D. Iecur hircinum assatur, aquosa inter assandum sanies inde emanans collectaque inungitur. Quin & ipsum iecur comedendum exhibetur, coctique vapor oculis excipi apertis præcipitur.

PAULI AEGINETAE.

De glaucomate, & suffusione quod hipochima dicitur ex commentariis Ruffi.

GLAUCOMA, & hypochyma veteres vnum quoddam mali genus esse existimarunt. Posteriores autem glaucomata quidem humoris, qui ob similitudinem cristalli *κεντραλλοειδης* appellatur; vitia, prae humiditate in glaucum colorem transeuntis iudicant. Hipochimata humorum affusionem, qui inter tunicam ceratoidem & cr stalloidem concrefcunt. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt, hipochimata autem curantur, sed non omnia. proinde suffusione tentatis succurremus, antequam malum radices egerit, consistatque sanguinis ex cubito detractione, & purgatione. item iniectionibus acrioribus, veluti ex cetaurii, aut cucumeris amaræ decocto petitis & alui solutione crebriore, cucurbitulisque occipitio cute incisa admotis. Cæterum aquæ potus toto victus curriculo competit, cibisque vti qui extenuant. Proderit autem temporis spatium & apophlegmatismis diebus aliquot vti. Quibus vero ceu culices, oculis obuerfari perperam videntur, ex quadam humorum prauitate, vel biliosioribus vaporibus sursum distributis, medicamentum dialoes amarum exhibetur subinde, vel etiam inde sumetur purgatio. In oculis autem medicaminibus vtendum est, primum simplicibus, puta melle, cum oleo, & feniculi succo. postea etiam compositis, quale est hoc. Sagapeni drachmæ duæ, liquoris cyrenaici, veratri albi singulorum drachmæ sex. Alii addunt in mellis heminis octo. Nos autem tradit Oribasius, subscripto vtetur, caucalidis succi, chamedrios, sanguinaræ singulorum æquis portionibus contritis. Benefaciunt item colliria, & quod succo feniculi constat, & Protheus, & Thalasserus, & diaopobalsamu, & quæ ex his præparantur, præfidio esse solent. Insuper feniculi decoctum per initia superfusum adiuvat. item ex succis confectum, opobalsamo, melle, oleo veteri, & similibus.

De glaucomate & suffusione, ex commentariis Demosthenis.

Hoc carent te-xtus qui dam.

FLORIS æris oboli quinq, myrrhæ drachmæ tres, nardi indicæ drachma, lapidis hæmatitidis drachma, aphronitri drachma, salis floris drachmæ duæ, opobalsami drachmæ nouem. melle attico excepta offeruntur.

De obscuritate, & hebetudine.

OBSCURITAS, quam amaurosim Græci vocant, est totius cernendi visus plerumque absque manifesto oculi affectu impedimentum. Hebetudo quæ amblyopia Græcorum lingua vocatur, obscuritas visus est, ab occulta quadam causa proueniens. Curatione commu-

LIBER III.

99

nis sane est ei quam in suffusis diximus. Priuata vero est, ab angulis sanguinem mittere, hircines ad mouere temporibus, inferiores partes perfricare. Procedente tempore etiam iis quæ sternutamenta protuocant, vtendum est, tum vomitu ante cibum, & inunctionibus, primum ex mellis, & olei æqua portione, deinde composito quod subiungitur. Croci obolis duobus, fellis hyenæ drachma, piperis communis granis octogintaquinque, feniculi succi drachmis sexdecim, guttæ ammoniaci drachma. Contritis ad læuorem aridis ex succo, mellis cochlearia quatuor adiiciuntur. Præparata excipito ærea pyxide & vtitor. priusquam vero illinatur oculi, in marinam calidam demersi fouebuntur.

De strabismo.

INFANTES ab origine strabones curantur larua faciæ circumposita, vt in rectum videant. Nam strabismus' conuulsio ramusculorum qui bulbum mouent, dispositio est. & lucerna e regione posita, & non a latere elucente. Præterea cum ad nares conuiuent oculis floccos rubros agglutinare vincit angulis qui circa tempora habentur, vt visu ad hos inconuiuentem directo, oculos emendent.

De oculorum expressione qui *ἐκπίεσις* appellatur.

EXPRIMUNTUR oculi nonnunquam, vt exerti perseuerent, quibus sane strangulatus, mali causa est, ex cubito venam incidere oportet, sin alio modo id acciderit, medicamento purgare, veratro nigro, vel scammonia. Ex doloribus autem contractas oculorum expressiones, quæ frequenter sane etiam ex partu accidunt, vteri purgationes soluant, vnde has promouere conuenit. in viris autem post sanguinis detractionem, si non remiserit vitium, cucurbitulam occipitio defigere commodum est. Lanam melle imbutam imponere, aut panni floccos cum aqua, superq; duplicatum linteum illigare leniter. His prodest & marina frigida fronti superfusa, item sereos, et polygoni succus cum meconio illitus, tum alia quæ reprimere possunt, & contrahere.

De confusione.

CONFUSIONE Sex ictu, curamus sanguinis detractione a cubito, totum oculum sanguine, potissimum quidem palumbi recens occisi, sin minus, etiam columbæ replemus, deinde lanā mollem in ouum cum vino, rosaceoq; confusum demersam imponimus, illigamusque, sequenti die idem facimus, & tertio fomenta exhibemus, lac instillamus, applicamusque idonea, deinde sublinimus medicamentis quæ ad veteres affectiones inscribunt, quale est Chiac.

De miopia si.

MIOPIA E dicuntur Græce, lusciosi nostris, qui prima nata

q̄a mēbra a tenero facile fingitur, sicut & figura capitis vt ait Hippo. vinculis ab antiquis ad speciem decorā redigebatur.

PAULI AEGINETAE.

li die propinqua sane vident, remota vero non item. Infanabilis est huiusmodi dispositio vt quæ ab imbecillitate spiritus visorii proueniat. Contrario his modo senes afficiuntur. Cū enim propinqua non videant, procul disita assequuntur.

Auricularia & primum de aurium dolore.

Cap.

xxiii.

ο φησὶ καὶ
ακον
πρωτο-
σινδασ-
καλοι α-
cies lu-
minis &
auditus
primi p
ceptores
puerbiu
stoicoru

Aurium dolorem ex frigidityte contractum, vbi ex anni tempo-
re, præcedente victu, vel ægrotantis quoq; percunctatione, an
ob exteriorem causam acciderit, didicerimus, inde quod dolor alte
citra grauitatem, vel distentionem, vel ardorem fixus sit, calfacienti-
bus curabitur præsidis, nempe oleo rutaceo calido vel nardino, vel
laurino calido, vel amaracino, vel philiato, vel spicato, vel commu-
ni, cum euphorbio, vel piperi, vel castoreo, vel cōmageno, dicto vn-
guine, vel liquore balsami in meatum auditorium instillato. Iam ve-
ro oleum in quo allium decoctum sit, vel cepa, instillatum auxilia-
tur. At ex calida conceptum intemperie dolorem, in quo feruoris cu-
iusdam sine grauitate seu tensione sensus est, contraria medicatur ouī
albumen subactum in aurem demissum, quemadmodum oculis adhi-
bemus, lac muliebri cum quodam collyrio, quod dolorem lenit, vel
succo perditii herbæ, cum modico rosaceo, ipsumq; rosaceū, vel oxy-
rhodinum, vel succus solani, vel coriandri, vel hastulæ regiæ, vel
oleum in quo lumbrici, vel aselli qui sub aquariis stabulantur, inco-
cti, vel oleum amygdalinum per se, vel buccina viua numero tria, in
eo decocta naturaliter proficiunt. Quod si glutinosi, crasq; succi do-
lores fecerint capitis, ipsiusq; auris grauitas, & præcedentis victus
ratio testatur. sola vero citra grauitatem distensio ipsius auris spiri-
tum flatulentum, cui exitus non patescit, indicat. Itaque in ambobus
vitiis vtere medicamentis, quæ aperiunt, inciduntque, cuiusmodi est
aphronitrum cum aceto, & melle. Item fel ouillum cum oleo com-
muni, vel amygdalino, præterea porri & cepæ succus tepidus cum
melle, aut origanum tritum, cum melle & lacte muliebri instillatur.
Ad vehementiores aurium perfriktiones fel caprillum cū succo por-
ri inditur. Verum in iis quos multus dolor, longusq; vrget, & gra-
uis simul auditus existit, hæc quoque vsurpari debent, cuiusmodi dra-
cunculi succus est, ari, brionia, & similia. priuatim vero qui ob fla-
tuosum indolescunt spiritum, cucurbita ex aqua calida foru prius fa-
cto, circa aurem fixa strenue auxiliatur. At si grauitas, distensio, si-
mulq; calor, & dolor pulsatilis, aut etiam febricula oboritur, inflam-
matione aurem laborare censeo. Atq; ante omnia hic sanguis emit-
tendus est, & deinde foru frequenti vtendum ex oleo dulci calente per
specillum lana inuolutum, meatui vero adeps anserinus, vulpinusve,

aut medicamen basilicum cum rosaceo, vel cyprino, vel irino debet instillari, extrinsecus ea quæ dolorem lenire, & concoquere possunt, cataplasmatibus modo superaccommodare. Si dolor violentus est, iis vtere, quæ leuiter sensum stupefaciunt, non enim mediocre periculum est, quod cerebrum neruo per quem facultas audiendi erogatur inflammato, vicinum sit. Probe igitur hoc dolorem lenit, opii pars vna, castorei partes duæ, cum lacte muliebri, vel oui albumine, aut vino dulci tepido instillantur. Iam pastillus Crocodes, Ast er, Philonis antidotum frequenter his profuerunt. verum conuenit crebro fouentem aut oleo communi, aut ex quodam calido fomento lanam, hoc ipso imbutam in aurem conicere, sed ita vt partes inflammatione tentatæ quam fieri potest minime attingantur. At si dolor in vetustatem incidit ac in pus degeneraturus est, medicamentum vti, quod ex lini seminis succo conficitur, vna cum rosaceo, aut chamæmelino solutum, instillatis. Cum autem aqua medicata meatu recepta auditorio dolorem parit si quidem copiosa fuerit ore vel etiam arundine ipsam exugere ratio est. Sin autem pauca specillo auricularia lana inuoluto extergens oleum quoddam instil-

ratio est
ne vtri
culi ce-
rebri ni-
mis in-
calescen-
tes redi-
gerent
hoïem
ad infla-
miam.

† Hic locus magis expressus in veteri exemplari in quo ita est de scriptus. *ἡ δὲ δὲ στυχῶς πυριῶντα, ἢ τῷ κοινῷ ἐλαίῳ, ἢ τινὶ τῶν δεξιῶν μύρων χρῆσθαι. ἢ καὶ ἐμὸν ἐν αὐτοῖς τοῦτο βεβεγμένον ἐπιτιθέναι τῇ ἀκοῇ*, idest, oportet autem assidue fouere & oleo communi, vel aliquo medicamento vti, atque eo madefactam lanam auri imponere.

Ad vlcera quæ simul cum inflammatione affligunt.

LICIVM & meconium æquali portione trita cum melle iniiciuntur.

Ad dolores maximos, pus & grauem auditum.

AMIGDALARVM quibus corticem detraxeris & aphronitri singulorum drachmæ tres, opii drachmæ tres, thuris drachmæ tres, croci drachmæ quatuor, galbani drachmæ duæ, myrrhæ drachma. Aceto læuigata instillantur. si dolor quidem exercet, rosaceo diluta, sin autem pus profluit, mulso, vel oxymelite, si grauius audiunt, aceto. recentia vlcera glaucium solutum aceto, per sanat, item ex eo collyria, tum quæ appellantur diarodon, diacrocū, & diasmirnes. quemadmodum rursus suppurantes citra dolorem, ferri recrementum cum aceto diutius læuigatum.

PAULI AEGINETAE.

Ad fordium duritiem.

NITRO aceto diluto cum aqua auris illuitur, cumque sordes deterfæ sunt, nitrum aceto solutum cum rosaceo instillatur.

Aliud ad fordes.

CARDAMOMI & nitri exiguum, cum ficis pinguibus sine granis exceptum, & in collirii formam redactum, auriculæ committitur. Tertio quoque die educitur. Copiosas enim sordes extrahit, & abunde leuat. Proficit hoc etiam aduersus carnis excrescentias, longos dolores, exulcerationes, recipit aloes, thuris, mirrhæ, singulorum drachmam, mifeos drachmas quatuor ex aceto in pastillos digeruntur, cum vsus requirit, aceto & rosaceo soluta instillantur, Item Andronis pastillus & Heræ, & Musæ.

Ad diuturna vlcera.

CEDRIA melli admista illinitur. ALIUD. Misi vstum & in puluerem redactum inspiratur. Per clisterem vero auriculariæ eluuntur aures posca, vel oximelite, vel mulso, vel decocto quorundam repellentium (verbi causa) lenticulæ, vel rosarum.

Ad aures cruorem fundentes.

LENTISCI decocto auris illuitur, polygonii vero succus cum paucissimo aceto instillatur, vel licium, vel amurca, vel acacia, vel porri succus.

Si caro excreuerit.

NITRO ex aqua calida, simul cum squama æris, & sandaracha pari modo auriculam illinito. Vbi crustam acceperint, melle repurgato.

Aduersus auriūm vermes.

vt. n. in ABSINTHII decocto, vel centaurii, vel porri eluuntur, cap-
it testinis paris autem foliorum viridum, aut fructus succus instillatur, vel ce-
vermes, drinus liquor, vel vrina humana vetus, vel album veratrum cum mel-
sic & in le, vel calaminthæ succus, vel scammonia cum aceto, vel succus ab-
auribus p sinthii, oleum vero meatui inditum vsque ad superiora, exire ipsos
fertim compellit, potius autem est oxelæum. Eodem ad ea quæ auribus in-
ex putri cidunt animalcula vtitor.

nascunt Ad calculos & similia quæ in aurem inciderunt extrahenda.

& in py SPECILLVM auricularium lana inuolutum in resinam,
lis & in aut gummi aut aliud quoddam glutinans medicamentum intingen-
longano dum, idque in aurem iniiciendum, ac quod in ea est protrahendum.
ne pro Si hoc modo nihil efficitur, oleum calidum continue instillato. At si
pter se- ne sic quidem exciderit, aut comprehensum fuerit, aliis quoque uti-
dem. tor modis, vt in parte chirurgica docebimus.

Ad sonitum aurium intra seipsas.

SI in febribus, aut harum crisi- bus sonitus aurium euenerit, nullum ei negotium facessere oportet, quippe statim magna ex parte finiuntur. Sin autem post morbum perseverauerit, absynthii decocto ubi aures foueris, acetum, rosaceumque infundi debet, uel raphani succus cum rosaceo, aut veratri nigri cum aceto. Ad veteres autem sonitus, qui ex crassis glutinosisque humoribus creantur, inde uero illos cognosces quod non subito, sed paulatim crescunt, nascunturque, aceto, nitro, & melle aurem illinito. ALIVD. Veratri albi drachmæ duæ, castorei totidem, croci drachmæ tres, nitri drachmæ sedecim. ex aceto contrita, in pastillos digerito ac utitor.

Ad veteres sonitus, & tinnitus.

EUPHORBIVM cum cyprino oleo leuigatum, calefactumque usurpato, in quibus autem ob multam sentiendi facultatem vapores, & flatus sursum distribui percipiuntur, castoreum, & cicuta semen tritum cum aceto instillatur.

Ad grauem auditum, & surditatem.

QUAE ab origine quidem, vel etiam post natalem, diem sed longissimæ, & absolutæ surditates constituuntur, nullo remedio illidi possunt. Quæ uero, non absolutæ quidem, sed diuturnæ tamen, & ipsæ curationem non recipiunt, aut certe difficillimam. Quæ ob biliosum humorem sursum vergentem nascuntur, vacationibus per medicamenta bilem ducentia ex facili abolentur, quidam etiam sua sponte affectu liberantur, bile inferius descendente. At ex crudis crassisque humoribus prognatas surditates, uel grauem auditum, uenæ incisione curato, aut omnino purgatione ex Hiera, apophlegmatismis & errhinis. item balnei sua sponte scaturientibus, vel ex aqua marina. Porro in meatum ubi facultas audiendi est, conuenit instillare, quæ ad sonitus tradita sunt. Priuatim uero hæc, urinam & fel caprillum, aut seorsim fel, aut rutæ succum cum melle, aut castoreum, cum oleo anethino, & hyssopum medicamentum cum nardino uinguine, uel caprillū fel cum galbano, uel quod recipit castorei drachmas duas, nitri, ueratri albi singulorum drachmam.

Ad contusionem aurium quæ θλάσις dicitur.

HIPPOCRATES quidem nihil ipsis adhibendum præcepit. Cum uero sæpe ab ægrotis cogamur, utendum est his. Myrrhæ, aloës, thuris, acaciæ, pari singulorum modo, ex aceto inunguntur, aut panis calidi pars interior cum melle in pila contusa obducitur, aut hoc, bituminis, thuris, aloës, cochlearum carnis, bulborum polentæ par modus, ex aceto leuigata imponuntur. Quod si inflammatio oborta est, sesamum leue factum applicatur, uel chondrus, cum aceto coctus, laxiora autem esto cataplasmata, & citra deli-

PAULI AEGINETAE

gaturam aut leuiter deligentur. & lana oleo imbuta auris infractis demittatur.

De parotidibus.

PAROTIS glandularum iuxta ipsas aures affectus est materia morbi illic eructante, alias a capite humoribus videlicet in eo impactis, alias a reliquo corpore in febribus critico modo proueniens. Si igitur, alte adhuc delitescens parotis in tumorem non attollitur, natura debet adiutari præsidiis, quæ coactas sordes extrahant, vel etiam cucurbitula agglutinata, vel crebro fotuum vsu. Nam si in altum recurrat colluies, periculum haud mediocre subsequitur est. Sin autem inflammatione tentata in tumorem fastigiatur, e contrario his quæ leniunt, & concoquunt, utemur cataplasmatibus, quale est ex farina hordeacea, aut triticea, aut semine lini cum mulla, aut foenu græci, aut althææ, aut chamæmelorum coctionem expertorum iure incoctum. item quod ex rumice, & axungia insulsa constat. at si exuperare sanguis tibi videatur, prius ipsum venæ sectione vacuabis, modo vires permittant. Tumore autem non discusso, medicamentis utere quæ puri mouendo sunt, nempe farina triticea cum pinguium ficorum decocto, vel oleo, tum medicamento quod ex polline, & quod ex fermento confectum est. Vbi iam abscessus, ad suppurationem spectarit, vel cute ferro discissa pus excernetur, vel acri medicamento rumpetur, cuiusmodi existit smidion appellatum, & diascorodon, hoc est ex aliis præparatum. Cæterum mitiores parotidas etiam fots ex muria discutit, item medicamentum diaperanu. Hoc sane etiam pus iam maturatum discutit, præter quod dolori leniendo sit efficacissimum. Ad inueteratas parotidas buccinorum, aut purpurarum combustarum cinerem cum melle, vel axungia imponemus, aut ficus marina incoctas, uel marrubium cum sale. Induratas autem iam emollit & medicamen Mnasei, & Ariobarfani. os. optimum etiam quod ex succo lini seminis præparatur. ante hæc autem obducere ammoniacum conuenit, mista cum cataplasmatibus pice liquida, vel seuo taurino, vel bdellio, vel stirace, vel medulla ceruina.

marru-
bium
πικρατιον

De narium & olfactus vitiis.

Cap. xxiiii.

OLfaciendi facultate oblæsa, si vox seruetur incolumis, ad priores cerebri ventriculos morbus refertur, qui aut ex intemperie sola noxam conceperunt, aut etiam ex humorum copia. Sin autem uox quoque mali contagium senserit laboriosior quodam modo reddita propter ossa quæ a colatu ethmoide græce vocantur, obstructa, affectum rursus malis quibusdam succis contractum esse censeto. Itaque cerebri intemperies, ubi ex notis sæpius a me dictis depre-

LIBER III.

72

hensa fuerit, contrariis curatur remediis. humores autem apophlegmatismis euacuare oportet, maxime uero utitor medicamentis quæ per nares valide educunt. & quæ odore mouent tenuis substantiæ, quemadmodum in defluxionibus quas *καταρροὺς* græci vocant, adhibeto. Cum autem totius corporis humorum copię suspicio subest, hæc prius, aut sanguinis dimissione, aut purgatione ex Hiera vacuatur. Ita quoque in polypode, & ozæna faciundum est, deinde loco etiam affecto inducuntur remedia. quin & Theriace pota sæpe magno fuit præsidio. Cæterum polypus, tumor præter naturam in naribus oritur, substantia respõdens polypodis carunculæ, eiusdem vero naturæ est & sarcoma. Ozena uero vlcus est, putridum ex humorum acrium illuue creatum.

Ad polydodas & Sarcomata.

SQVAMAE æris drachmæ octo, atramenti sutorii drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, veratri nigri drachmæ duæ naribus inspirantur. In usu hoc est laudatissimum, nam tredecim diebus, insigne affert præsidium benefacit & atramentum sutorium cū aceto. **ALIVD.** Malicorii drachmæ duodecim, atramenti sutorii drachmæ decem, chalcithidis drachmæ octo, fellis taurini, amomi, mirrhæ, calaminthæ, marrubii, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, veratri albi drachmæ quatuor. sicco utitor. Aliud. Diphrygi trito nares, linamentoque ex ellychiniis contorto attinguntur, dilatanturque.

malico-
rium
οιδιόν

Ad ozænas.

MISIOS, chalcitidis, myrrhæ, singulorum drachmæ septem, atramenti sutorii drachmæ sex, aluminis scissillis gallæ, squamæ æris, singulorum drachmæ quatuor, aluminis rotundi drachmæ duæ, thuris drachma vna. aceti sextarius. totum in uase æreo coquit. ubi ad mellis spissitudinem venerit, ex carptis linamentis utitor **ALIVD.** Aeruginem & æris squamam pari portione aridum medicamentum facito.

Ad foedum narium odorem.

MIRRHE, acaciæ, amomi singulorum drachma. melle cocto excepta summo nariū intersepto iubeto agglutinari. **ALIVD.** Amomi, mirrhæ, rosarum siccarum partes æquales, nardino vnguento exceptas illimito. Item benefacit aduersus foeditatem odoris, & malagma hedichroë cum vino admotum.

Ad narium ulcera,

CERVSÆ libra, argenti spumæ quadrans, recrementi plumbi tantundē, vel plumbi cõbusti. omnia uero lota esto, excipianturque vino, myrteoque oleo. Ad vlcera quæ vocantur glicæa.

PAULI AEGINETAE

ARGENTI spume drachmæ quatuor, rutæ nouellæ totidem, aluminis scissilis drachmæ duæ. Myrteo oleo aceto que excipiunt.

Quæ sternutamenta citent.

VERATRUM album, vel castoreum, vel piper, vel struthium, vel simul omnia, non autem oportet inspirare, sed pina vel digito penitissime, in nasum demittere. vbi sternutamentum frequentius est, medicamento sedari debet. Infunditur nardinum, uel rosaceum, vel glycelæum. Iam q̄ odore mouent, sternutamenta sedant, anisum, ocimi stipulæ contulæ, sed ante hæc omnia caput deficcandum est smegmatis ex nitro & pumice factis, vel etiam asclepio vocato vtendum, & Constantini sapone, & sale cappadocico, similibusq̄.

Ad sanguinis eruptionem e naribus.

SANGVINIS e naribus profluuium, quod febribus superuenit, secundo volumine inter illas sum executus. De eo autem quod alia quacuncq̄ de causa accidit nulloq̄ sisti potest remedio, in præsentia tractabimus. Chalcitidem contritam linamento ex ellychniis contorto, aqua imbuto, vel eo quod a genitalis humani forma priapicon appellant exceptam, narium foraminibus demittes. Vel testam oui exustam admiscebis, & dimidiatam gallæ partem, vel lycio indico attinges. Vel fimi asinini cinerem inspirabis. Vel eius expressi succum instillato, vel molaris lapidis aceto extincti, vapor naribus attrahatur. Vel hoc quoq̄ medicamenro obstruendi vtitor, Mannæ, thuris, partem vnam, aloës partem dimidiam. Candido oui liquore excipito, ac utitor, per linamentum ex ellychniis contortum, extrinsecus leporis pilis unctioni impositis. Vel funiculum lucernarum in nare conicito. Vel cucurbitulam leuem directe, qua sanguis profluit præcordiis magnam affigito. præcordiis autem magnam, & perseveranter admoueto. Vel aures valide obstruantur, frons spongiis ex aqua frigida foueatur. Vel cucurbitula occipitio agglutinetur, cum sanguinis detractione, interim etiam venam incidere, si nihil prohibet, & summas partes vinculis excipere. præsertim brachia, & femora, sicut in uenæ sectione fieri solet. Eadem motu concuti iubeto, manus uero fricatione, pedes autem obambulatione. Nam uenis indidem sanguine repletis, narium uasa deplentur. Item spongia in poscam siigidam demersa, naribusq̄ profluentibus a foris strictim admota, id quod requiritur, subinde perfecit, melius autem proficit longo ex linamentis in tortis penicillo naribus prius subiecto.

Ad faciei vitia.

Quomodo facies a rugis asseratur. Cap. xxv.

Thuris drachmæ quatuor, fuci quod φyx̄ dicitur græcis, drachmæ tres, argenti spumæ piperis, singulorum drachmæ octo, omnia

profluuium aut tangui- is in homine solo est & non in cæteris animantibus homo qđ plurimo cerebro affluit Arist.

LIBER III.

omnia ex ichthyocollæ contusæ diluto soluuntur, in pastillos redactis vtitor. **ALIVD.** Eburnei scobis drachmæ octo, thuris masculi, ichthyocollæ pares portiones. Vtitor, quemadmodum est prædictum.

Ad faciei nigritias.

IRIDIS, vel ptisanæ fresæ singulorum sesquiseptarius, salis ammoniaci, cornu ceruini combusti, thymiamatis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ. Aqua dissoluta in pastillos coguntur, ac iterum aqua trita ante balneum illinuntur. **ALIVD.** Ptisanæ, erui, thuris, iridis illyricæ, aphronitri, singulorum choenices duo, costi, amygdalorum amarorum singulorum drachmæ viginti. Quorum albumine, lacteq; asinino subigito, ac vtitor veluti prædiximus. Benefacit etiam pastillus Peponatos.

Ad epheledem & lenticulas.

TERRAE cimoliæ torrefactæ, semicongius, aphronitri tostæ drachmæ octo, erui farinæ elixatæ drachmæ quatuor, fellis taurini, eburnei scobis singulorum drachmæ octo. Leuigatis facies defricatur. **ALIVD.** Fœcis drachmæ decem, erui farinæ drachmæ decem, lomenti drachmæ decem veratri albi drachmæ quinq; aphronitri drachmæ decem, alcyonii drachmæ decem, tritis abstergito.

Ad suggillata.

PER initia decocto fœnugræci postea & meliloti oculi fouēs, Nilei collyrium diarodon aqua solutum illinito, deinde diasmyrnes. Et si nihil profecerit, id quod diasandicos inscribitur, combustum, perungito, vel hisopum cum aqua applicato. Vel hyssopo in panniculum illigato & calida aqua respersa foueto, vel acri muria. item raphani corticem cum melle detritum impones. hoc etiam veteribus efficax est. Porro ad vetusta faciei suggillata, & liuores tordili partes duas, terræ samiae partem vnam cum melle admovento, cura adhibita ne exulceretur.

Aliud deterforium.

HISSOPI, thapsiæ, casiae singulorum drachmas duas, ceræ tantundem, terebinthinæ drachmam iniicito, cauens ne exulcerationem excites, eoque frequenter tolles.

De varis.

EXIGVI sunt & duri in facie tumores. Oximelite illinito, vel argenti spumam cum terebinthina, aut olei candidi momento triam fricando perunges, vel alumen fissile cum terebinthina, vel amigdala amara aceto macerata infricantur. In callum vero concretos varos, saponis gallici drachmis quatuor, thuris, thymiamatis ammoniaci singulis drachmis, aqua dissolutis perungito, & post

PAULI AEGINETAE

horam eluito.

Ad varos, pilos, & aspredinem faciei.

CERAE drachmæ decem, terebinthinæ, drachma, visci drachmæ duæ. Liquato vna oleum superinfundens atq; hoc medicamentum faciem abstergito, tollit enim radicitus. ALIVD. Papauer detritum, vel pulegium cum sale, acetoq; applicato.

Ceratum thaidis quo facies rubescat.

CROC I, erythrodani radicis, fuci, thuris, myrrhæ singulorum drachmæ duæ. Adipe vitulino, oleoq; mastichino excipiuntur, dein de illinuntur. Interposito tempore, spongia ex calente aqua facies abstergitur. Cæterum faciei remedia, etiam reliquo corpori cōuenient.

De oris affectibus, & primum de dentium dolore. Cap. xxvi.

Dentium dolorem siue gingiuarum inflammatione, interim in proprio ipsorum corpore, interim in neruo, qui ad ipsos pertinet, oriri contingit. quapropter valentissimorum in hoc medicaminum vsus est. Atq; inde plurima ipsorum quam acerrimo aceto præparantur. At gingiuis propter inflammationem dolentibus præsentissimum est remedium, oleum lentiscinum, calore temperatum, si in ore retineatur, esto autem id recens. nam vetus tanto recenti deterius, quāto calidius. Communis autem ratio etiam hic seruetur, vt humor qui in toto corpore superat, prius euacuetur.

Ad dentium inflammationem.

alterci
ἄλτερκι
μῶν.

OS colluatur aceto, in quo decocta sit galla, vel halicacabi radix, alterci semen, foliave, vel pulegium, vel solani succus, vel capparis radix, vel myrti folia, vel polium, vel cucumis sylvestris radix, vel rutæ folia cum exymelite, vel cornu ceruinum, vel acetum scillites, vel pyrethrum, cum hyssopo. At erosionem experto denti, styracem cum opio imposito, vel sulfur viuum cum lycio, vel alterci seminis vaporem excipiat per infundibulum. Item Philonis antidotum denti circumlitum, dolorem sedat. Quod si defluxione laborent dentes, myrti, lentisci, & gallæ decocto colluuntur, vel rhus syriaci, balaustii, vel malicorii, applicantur autem salis partes duæ, aluminis vsti, & aceto extincti tritiq; pars vna, deinde vino perluuntur. porro gingiuis cruentis alumen tenue inspergitur, vel aloë cum vino eluuntur, vel rubi radice vino decocta, vel rhu syriaco. cruentis autem & defluxione tentatis gingiuis crudum fassamentum in olla comburito, quoad in carbones redigatur, puluere attingito. At mobiles stabilit aloë inspersa, vel rhus syriacus, vel alumen scissile, vel galla, vel rubi radix per se, aut cum vino incocta.

Aliud ad dentes.

NVCIS viridis corticem terito, eiusque ius, cum habes, in id conicito myrrham veram, & alumen scisfile, vbi omnia in vnitate coegeris, in vsu infundito, ac in gingiuas qua parte dens indolet, demittito & persanabis. **ALIVD.** Allium, piper, herbam pediculariam quæ staphisagria dicitur, detrita, in linamento in globulos coges quos circa dentes versans humorem in capite contentum elicies, dentemque sanabis. **ALIVD.** Ad dentes mobiles, & gingiuas fluxione pressas omniaque oris vlcera depascencia, Chalcitidis tostæ drachmæ duodecim, cadmiæ drachmæ octo. vtitor sicco, aut cum aceto, sine dolore dentes tollit, farina cum liquore tithymalli imponitur, & super hederæ folium accommodatur, ac per horam finitur, sua enim sponte dens cõteretur. Dentium smegma, quod & parulidibus benefacit. Aluminis latercularii triens, salis ammoniaci tantundem, myrrhæ, costi, pyrethri, singulorû drachmæ quatuor, piperis grana octoginta.

Ad parulidas.

SVLFRIS viui, piperis, aluminis scissi, æquales portiones. Ac parulis inflammatio quædam est in aliqua gingiuarum parte suscitata, quæ nisi discussa fuerit, in supurationem conuertitur, & cum suppurauerit, scapello incisa, linamentis insertis distenditur. Epulis autem carnis excrecentia est, quæ ab inflammatione contracta ad intimos molares dentes pertinet, nonnunquam cum febre & dolore. Quoniam igitur reprimi debet, vtendum est, ærugine rassa priuatim, vel cum pari galla, vel fori combusto, vel alumine quolibet cremato, vel galla per se vel squama æris cum aceto diebus sat multis leuigata deficcataque.

Smegma dentium.

ARISTOLOCHIAE radix combusta, cerui cornu combustum cum mastiches momento, sal candidus melle respersus & fici foliis inuolutus exustusque donec in carbonem mutentur. **ALIVD.** Buccina sale respersa, vstaque, cochleæ terrestres cum melle combustæ, lanæ succidæ crematæ cum modico sale. Singulis ipsorum grati odoris gratia misceatur iunci rotundi flos, vel nardi spicæ, vel folium malabatri, vel iuncus odoratus angulosus, vel iris.

Dentium candorem concilians, & oris suauitatem
faciens gingiuasque reprimens.

PVMICIS, salis costi, iridis singulorum drachmæ quatuor, iunci odorati angulosi drachmæ quinque, spicæ nardi drachma, piperis drachmæ sex. Tritis vtitor.

PAULI AEGINETAE

Ad stuporem dentium.

STVPORE Ibenefacit, portulaca commanducata, vel oleum quod immaturæ oliuæ fuderunt infricatum, vel amurca in æreo vase cum oleo cocta, donec mellis spissitudinem habeat, † atq; vetusta si perungatur, magnum affert momentum.

Ad dentes attritos.

DENTIBVS attritis, baccarum lauri, aluminis scissi, aristolochiæ sarmentorum quæ clematidis dicitur, singulorum pares portiones iniiciuntur.

Ad gingiuas corrosas.

ROSARVM floris drachmis octo, gallarum drachmis quatuor, mirrhæ drachmis duabus, si gingiuæ erosæ, & humiditatis vitio flaccidæ, colluantur, sanescunt. Idem præstat lac asininum, oliuæ foliorum decoctum, acetum scillites, arida vero admota, ærugo ferri, citini. Tumidas excrecentesq; gingiuas portulacæ succus in ore retentus, muria ex colimbadibus oliuis, calidum vel lentiscinum, vel melinū amurcaque discutit, sicca autem, ærugo ferri, vel æris, aristolochiæ radix, arnoglossi semen, diphriges, atramentum sutorum tostum, citini.

Ad disrupta labra.

AMVRCA cocta illinantur, vel hoc prodest adeps anserinus cum melle, terebinthina æquali portione, rosarum floris, hiscopi rosacei, singulorum momentum.

Aduersus linguæ morbum qui batrachus appellatur.

BATRACHVS tumor est, ad inflammationis similitudinē sub lingua erumpens, maxime in pueris, itaq; locus missos, æruginis rasæ, pari pondere sicco perfricatur. Mento autem adhiberi debet medicamentum. Anthera, vel sphæxion, vel ex ouis parigrum. In adultis remedium est venas sub lingua diuidere. **ALIVD.** Valet etiam ad oris vlcera, quas Græci aphthas vocant, æruginis rasæ, gallæ, chalcitidis singulorum æquale pondus cum passo. os etiam his colluitur. **ALIVD.** Erui farina cū melle prius absterfis, delinitur, galla læuis cum melle, vel rosarum flores similiter. Vel oliuæ foliorum decocto colluant.

Ad tonsillarum inflammationem.

SI in febris tonsillæ, & columella inflammationem senserint, gargarizare conuenit decocto furfarum, aut rosarum, aut palmarum, aut mixtæ, aut lenticulæ. Cum vero inflammatio remittit, consistitve, mel ipsis adiciendum est, quod per initia facere non oportet, nec in augmento, ne acrimonia fluxionem quandam concitent. Vbi in supurationem conuersa eruperit, gargarizandum est, ex mulsæ vel len-

† utrūq;
exēplar
hēt, &
vetusta
illita sed
Gal. i li.
περί ού-
πορίστω
de para-
tu facili-
bus, pter
superio-
ra reme-
dia etiā
hanc sen-
tentiā quo
posui
modo,
legit.

ticulæ decocto, vel rosarum, idq; faciundum est, donec in totum sol-
natur, aut stomatica collutio ad gargarizandum etiam exhibebitur.
At si pestifera tonsillis vlcera oboriantur, vtendum quidem & præ-
scriptis, sed priuatim exhiberi debet medicamen diamoron, ex aqua
calida, vel aqua mulsa, quæ rosarum inspersum florem obtineat, vel
costum, vel rhus sicca, vel decocta, vel glauci foliorum aridorum de-
coctum quod amarum est. optime autem facit, si succum, vt ad colly-
ria vtimur, in mulsa dissoluis. ipsius autem fruticis sicci, si inspiretur,
vltus est laudatissimus, aut si digito admoueatur, cura vero habenda
est ne prorsus attingatur, aut certe leniter admodum. Profuit & pa-
stillus Andronius. Post hæc acris irritantiæve gargarizatur ex me-
dicamento, quod ex dulci radícula quæ glycyrrize dicitur, constat, aut
eo quod croco, vino scybelite, terra chia, & myrrha componitur. de-
inde amylo, & tragacanto. Vbi iam constiterit vlcerum depastio,
gargarizandum medicamento ex lacte & samia terra confecto.

ALIVD. Ad tonsillas quæ post inflammationem induruerunt,
αὐτρίαιδες græci nominant. Ex malo punico dulci cum cortice tuso
succus exprimitur, & eius partes sex, mellis vni mistæ coquuntur,
donec eis mellis spissitudo sit & perunguntur. **ALIVD.** Gallæ
omphacitidis vnciæ duæ, aluminis scisilis vncia, salis ammoniaci
tosti tantundem. Pulvere attingito. **ALIVD.** Gallæ drachmæ
octo, misyos drachmæ duæ, salis tosti drachmæ quinq; vtitor pulue-
re. est autem Antias, tonsillarum tumor, schirrum præferens.

De vua.

V, V A si inflammationem experitur, gargarizandum ex iisdē,
quæ tonsillæ inflammatae postulant, & mediocriter astringentibus,
qualis est mali punici succus per cochlear, vel instrumentum, quod
ab vua attollenda staphileparton appellât, subiectus, tum per se, tum
cum melle affatim cocto, vel dulcis radix, mali punici succo mista.
proficit etiam succus dulcis radiceis cum melle illitus. iam hæmatites
lapis vuam reprimat, & phrygius combustus, & ageratus, item ex
lapide phrygio medicamen ad pudenda inscriptum. His adduntur
terra samia, erethrias, sinopis, lemnia, & omphacium, per se & cum
horum aliquo. Item spinæ ægyptiæ succus & alumen scisile. rosæ
vero, & semen, & folia lenius operantur, adhuc lenius gummi, traga-
cantha, sarcocolla, amyllum, quibus vtendum dum magis vua prema-
tur ab astringentibus constricta. vbi æqualiter crassa fuerit ipsa, quod
vitium iam vuam Latini, χιόνα Græci proprie dicunt, gargarizatio-
nibus fidendum etiam iis quæ ex myrrha, & croco, & iunco angu-
loso fiunt. Contusiones autem cauendæ sunt. ob quod pinna potius
perungere conuenit, compositū vero hoc vtile est, thus syriaci drachmæ

PAULI AEGINETAE.

ma octo, croci drachma quatuor, costi drachma octo, rosarum seminis drachma quatuor. Præterea gingiuis benefacit, linum ex pura marina, quod viperæ collo circumdatum ipsam strangulauerit, deinde circumadigatur tonsillis, & colli vitiis, mirabili quodam modo opitulatur, vt Galenus author est.

Ad sanguinis ex ore profluuium.

P O R R I folia contusa imponuntur, vel spongia recens in pi-
cem crudam mersa comburitur, in puluerem coacta vtitur, ac valde
utile est remedium, & collutiones oris ex rosis siccis, aut viridibus.
Ad hæc decoctum frigidum, vel pampinorum vitis, vel lentisci fo-
liorum, vel rutæ, vel malorum cotoneorum, vel rosarum, vel vuae
acinorum, vel lenticularum.

De angina, eiusque speciebus, vbi etiam de strangulatis, vel
alio modo suffocatis agitur. Cap. xxvii.

Interioribus faucium, pharynga Græci vocant, musculis inflam-
matis angina accidit, quæ synanche Græcis dicitur, exterioribus,
parasyanche. Eodem modo & in superiore gutturis parte, λάρυγγας
Græci nominant, habet, cuius si interiores musculi inflammatione
conflicentur, cynanchem, si exteriores, paracynanchem efficiunt.
Hæc autem comitantur omnes. recta ceruice spiratio, dolor cum dif-
ficultate spirandi, nonnullis etiam febricula oritur, faciei rubor, cerui-
cisque, & tumor in quibusdam os ægri apertum habent, & deuora-
re nequeunt. Cynanchicos vero strangulatus quoque interdum se-
cutus est. Pueris raro talis affectus oboritur, cum scilicet ceruicis
vertebræ affectæ loco suo excidunt. Verum illis ceu curationem
non recipientibus, ac deploratis, manum admoliri non oportet. Re-
liquis autem sanguis protinus e cubito mittendus est, sed non subito
ac semel, verum pluribus interpositis vicibus euacuabitur. quippe cu-
mulata, semelque facta vacuatione, anima ipsis deficiente, suffocatio-
nis periculum superuenit, dum materia in affectam partem collectam
præsumpit. Si per hæc non leuantur, eas quoque venas incidere con-
uenit, quæ sub lingua sunt, vel ipsa quoque lingua scarificanda, si pro-
pensior foras cum tumore appareat. Alius acriore clystere subdu-
ci debet, pedes aqua calida foueri, extremæ partes valide deligari,
collum lanis succidis, vel etiam oleo imbutis contegi, crudaque fari-
na ordeacea, quæ Græcis ὠμὴ λύσις dicitur modo cataplasmatibus
obduci. gargarizandum vero per initia ex eis quæ in tonsillarum
inflammatione dicta sunt, vel simplici diamoron, † cum rhus deco-
cto. Potius autem est diamoron, quod syluestribus moris confici-
tur. Deinde & composito diamoron, vel eo quod diacaryon a nuci-
bus vocatur perungantur. Cum autem morbus viget, consistitque, &

nitri momentum admiscendum est, aut etiam sulfuris viui, nisi acrimonia quædam prohibeat. item sterco caninum aridum contusum, & cum melle perunctum, præstantissimum est remedium, idque album maxime, item sylvestrium hirundinum cinis similiter efficax est. Si malum longius prorogatur, etiam perunctione diabefasa, utemur, nunc vires ipsius remittentes, aliorum mistura, nunc iterum intendentes. Cucurbitula quoque, vel hirudo sub mento, & circa ceruicem admoueri debet. utendumque gargarismatis ex iride, hyssopo, melanthio, abrotano, dulci radice, ficis pinguibus in mulla decoctis, vel rutæ succo cum lacte, vel sinapi cum oxymelite. Sin autem ex his quædam acrimonia percipiatur, oleum ipsis quam optimum calens exhibetur, aut rosaceum per se, aut cum cremore ptisanæ, aut fœnugræci gargarizandum. Cibus sit triduo aqua mulla, inde ptisanæ cremor cum dulci quadam potione, deinde & ouorum lutea perliquida, ac sorbitionibus utendum ex chondro, ubi deuorare melius coeperint, & cibus qui ægri viribus respondeant. Cum morbus coeperit inclinare, ægri deambulationibus & balneo credentur, pars affecta cerato ex oleo rutaceo operietur, reliquaque virium colligendarum ratio, ut par est, adhibebitur. Porro ex strangulatis, quibus spuma iam circa os emanat, manus admoueri non debet, si Hippocratis consilio acquiescimus. Alii vero vitæ restituntur, aceti infusione & piperis, vel vrticæ seminis in aceto triti acerrimo. Verum quia ægre magnoque negotio assumunt, compellere eos ratio est. Discussis autem colli ruboribus, statim sutsum respiciunt, & ad se redeunt. simili modo in his qui naufragium passi sunt. Summatim in omnibus qui suffocantur. Nam ita horum calor recreatur, refocillaturque.

† In nostro codice est σὺν ἀφελήματι ῥοιᾶς, id est, cum decocto mali punici.

De grauedine, destillatione, raucitate, & tusfi.

Cap. xxviii.

Communis est hisce vitiis, excrementitii humoris ex capite in subiectas partes descensus, si in nares decumbit κόρυς Græcis, grauedo Latinis appellatur, si in fauces, & paulatim, simplici vocabulo κατὰ ῥίνα, nobis destillatio. si in guttur, & asperam arteriam defluerit, ut etiam membranam interiorē quæ hanc integrit, exasperauerit, rauca vox efficitur, vocaturque malum Græce βρόγχος & ἀσπρηγίακον Latinis raucitas, In quibus non solum ex capite, sed etiam vehementi clamoris conatu, & spiritus inspiratu frigidi asperitas contrahitur inflammatoria. Si morbus perseveret, fluxioque in pectus, pulmonesque desertur, tusfis oboritur ipsis

q. nio cerebro abbat hoc quoque morbo laborat sus brachus

PAULI AEGINETAE.

græce *maligna, ac contumax*. Iam & propter intemperiem subinde *tussis* appellat accidit, interim ob calidam, vt in febribus, interim ob frigidam, vt laborat aquiloniis diebus, eaq; magis sicca est. Iam vero aliis quoq; morbis vero ca *tussis nonnunquam symptoma efficitur, verbi gratia, pleuriticis, ieco* tarro plu *rariis, phthificis, pulmonariis. Galenus itaq; in diuturna tussi grandi* rimū hō *nes quasdam ex pectore educi memorie mandauit. Alexander au-* ſter cæte *tem calculum quendam grauem, qualis in meatibus vrinariis nasci-* ros aīan *tur, post longam tussim expulsum, ac inde illam quoq; cessasse pro-* tes, q; ex *didit. Porro nos in sanguinis reiectione calculos excerni vidimus,* plurimo *quemadmodum cum illuc peruentum erit, exactius commemorabi-* humore *mus. Qui igitur ex æstu grauedinem, vel destillationē concipiunt,* caput pe *his caloris sensus oboritur circa partes affectas, acris, tenuisq; humor* tēte refri *destillat, tum per nares, tum per os, faciesq; rubescit, & nasus. Qui* geratoq; *ex frigore, iis caput vndiq; & frons distenditur, meatusq; osfiū quæ* ob cere- *a colo ethmoide vocant, clauduntur, ne vox deorsum per nares trans-* bri frigi *meet, si vero longius malum trahatur, tussis quoque affligit, pituita* dā natu- *educitur, nunc cruda & liquida, nunc viridis. Quibusdam & febris* rā phleg *superuenit, quæ ob æstum laborantes nihil iuuat, frigore pressis, etiā* ma gi- *concoctionem efficit.* gnit &

Curatio destillationis, & grauedinis.

VBI calida præpollet intemperies, iis pugnandum est præfidiis quæ dolori capitis ex tali causa contracto conueniunt, balneo vtendum est, caput aqua copiosiore calida perfundendum. Cibi vero his proderunt ad sorbitionem aptati, oua sorbilia, amyllum, liba dulciana, quæ itria dicuntur, sesama, necnon amygdala. item nux pinea, & quæ ex lacte fiunt bellaria, vina dulcia, non vetera. medicamentum diacodion linctu assumptum, & quæ his congruunt composita auxilia. Quod si frigida intemperies afficiat, & morbus cōtumax sit, modico vtendum cibo est, caput calefacientibus, tenuique substantia præditis nardino, rutaceoq; debet perungi. Irinum vero non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur. intus nares thure, & myrrha cū oleo perunguntur, præsertim si perfrectio grauedinem crearit. Alios naribus odoranda adhibita iuuarunt, vt lacineæ panniculorum combustæ, vel melanthium, vel cuminum vstum, illigatumq; in panniculo. Iam cyphi selenaicum, idest lunare olfaciant, fronti q; illinatur, cui simul vnum ex emplastris, quæ inflammationem arcent, agglutina-bitur. Exempli gratia Icesium, vel Oxera, vel Barbarus, vel Athena. Ad destillationem vero ex frigore ortam, & cyphi potus utilis est. Thorax autem balsami liquore illinetur idemq; per lanas succidas cum styrace, & irino, vel anethino cūscūfouebitur. Cibi calidioribus, & ad cōcoctionem promptis vti commodum est, vbi iam mæ

seria concoquitur, medicamen quod pituitam per os educat, idoneum erit, tum capitis smegmata, nempe Constantini sapo, atque eius generis consimilia.

Raucitatis curatio.

RAVCITATI quam arteriacum & branchum appellauimus, competent quidem superius comprehensa, verum priuatim ubi arteria, & caput eius quod larinx dicitur inflammatoriam quādam affectionem experiuntur, emplasticis, idest, obstruendi meatus facultate præditis per initia vtemur, donec inflammatio remissior euaserit, talia vero sunt quæ ex passo cretensi, tragacatha, gummi & amilo constant. Item pinguium palmularum decoctum, & dulcis radicis cum sapa, donec mellis spissitudinem conquirit. Item compositionum quas quod sub lingua teneantur, *ὑπογλωττίδας* appellant vsus est. Ante omnia vinum hoc tempore circuncidendum, postquā inflammatio moderatior fuerit reddita, vinum dulce assumetur, tum confecta ex melle, lacte, cum amylo, vel pane filigineo. Adhæc forbitiones ex amygdalis, butyrumque utile. At si humor in particulas se receperit, transeundum est ad ea quæ valentius abstergunt, cuiusmodi est ferculum ex faba fresa paratum, & quæ ex melle præparantur. His adde brassicam & porra probe cocta. medicamenta vero calidiora & ad tussim accommodata profunt, quæ constant sapa ex ficis pinguibus confecta, thure, iride, terebinthina, styrace, galbano, pipere, cinnamomo, casia & his similibus.

De tussi.

TUSSIS quoque eadem ratione curanda. hoc solum inspicitur, num aliarum particularum consensu fiat ut gurgulionis distillantis, vel capitis, an aliis morbis coincidat. His ubi quam fieri potest optime erit prospectum, quemadmodum a me comprehensum est, diciturque in posterum, tussis curationem molire. Compositorum vero præsidiorum enumeratio hic subiecta est.

Catapotia ad distillationem in fauces & tussim.

STIRACIS, myrrhæ, opii, galbani singulorum pares portiones. passo excipiuntur, vel priuatim in pila contunduntur, & ad magnitudinem erui terna, quaternave aut quina, noctu dormituro dantur, passumque superbibitur. Hæc ad acrem tenuemque fluxionem valent. **ALIVD.** Alterci seminis drachmæ duodecim, nucleorum pincorum drachmæ sex, croci drachmæ duæ. sapa, vel passo in vsu excipiuntur.

Eclegma.

MELLIS vncia, butyri semuncia, simul incocta exhiben-

PAULI AEGINETAE.

tur, item ex hyssopo, sicubus, nucleis pineis, & inde decoctum sorbetur.

Catapotia ad veterem tussem accommodata.

STIRACIS drachmæ sex, myrrhæ drachmæ duæ semis, terebinthinæ, galbani, opopanax, iridis singulorum drachmæ duæ, piperis albi, nitri seminis alterci, lachrymæ papaveris, singulorum drachma, sine ullo liquore in pila tusa in catapotia rediguntur, utitur ut prædictum est.

Ad aspreddinem gutturis tussem & sputum cruentum.

AMIGDALA amara, quibus cortex sit detractus vigintiquinque, seminis lini torrefacti drachmæ quatuor, tragacanthæ drachmæ duæ, pini nuclei triginta, oui in adipe cocti luteum. Tragacanthum, aqua maceratur. Totum vero passo excipitur, si vero & sonus vocis fuerit oblat, mel miscetur in passi vicem, & præsertim in quibus educi ex gutture aliquid oportet.

Arteriace quæ quod sub lingua teneatur hypoglossis appellata, facit ad abscissionem vocis, raucitatem, item ad eos qui ægre reiciunt, anaphoricos græci nominant.

TRAGACANTHÆ drachmæ sex, gummi tantundem, myrrhæ drachma, thuris drachma una semis, piperis albi grana viginti, croci drachma una, dulcis radicis succi drachmæ sex, palmarum trium caro, passi cretici, quantum sufficit. Atque succus tragacanthæ solus ipse sub lingua loco dulcis radicis succi retentus. Eiusdem decoctum dum spissitudinem habeat quadruplum inditur.

Arteriace, ad abscissum vocis sonum convenit, & eos qui vocis exercitio utuntur.

PORRA sex coquito, usque ad tertias, atque ipsa proicito, iuri ipsorum succum alicæ admisceto, mel & ouorum prius decoctum lutea tria simul incoquito, circumagitans anethi ramusculo.

Compositio ad tussem, græce bechicon appellatur.

PVLEGGII sextans, nucleorum pineorum, enici seminis, lini seminis singulorum uncia, piperis cocti triens, melle cocto excipiuntur. **ALIVD.** Hyssopi, pulegii, piperis singulorum uncia, petroselinis semuncia.

Medicamentum tussem veterem concoquens.

MELLIS drachmæ sedecim, terebinthinæ drachmæ duæ, galbani drachmæ quatuordecim. Vbi simul fuerint incocta, orbiculi finguntur, circa fabæ magnitudinis, nucisve auellanæ, atque ex his delingitur. **ALIVD.** Aridam tussem curant tum arteriaca medicamenta, tum aquæ nonnunquam feruentis sorbitio, nam dum

propter pituitæ crassitiem non excreant, reiciuntq; humectantibus aliquantulum iuuantur. cæterum conuenit ipsis etiam hyssopi, iridis, & pinei nuclei decoctum.

Pastillus a fumo dictus capnistos ad
tusim continuam.

STIRACIS, piperis, mastiches, petroselini, singulorum vni-
ciam, sandarachæ scrupulos sex, baccas lauri duas. Melle excepta in
carbones proicito fumumq; excitato, vt tusiens hunc per infun-
dibulum aspiret. conuenit & qualemunque perfrictionem ex-
pertis.

De orthopnæa, suspirio, & spirandi difficul-
tate. Cap. xxix.

Q Vi febris expertes, crebro veluti a citatiore cursu respirant,
ab accidenti quod superuenit nostris suspiriosi, Græcis ἀσθ-
ματικοῖ appellatur, iidemque hinc quod omnem figuram totius
thoracis rectam seruent, strangulari metuentes orthopnoici dicun-
tur. creatur hoc mali cum fistulosæ pulmonum cartilagine crassis,
glutinosisque humoribus fuerint infarctæ. spirandi autem difficul-
tas commune est symptoma quod & his & aliis compluribus affe-
ctibus superuenit. In curandis suspiriosis huc omnis cura dirigen-
da est vt per extenuantia abstergentiaq; medicamina glutinosus hu-
mor & crassus absumatur. Acetum igitur ipsis conueniet scillites &
oxymelitis ex ipso præparati potio ipsaque scilla tosta læuigata-
que cum melle. Ex antidotis hiera & purgatio continua ex va-
lidissimis medicamentis petita a radícula vomitus aristolochia ro-
tunda pota centaurii magni radix spondilii semen radixq; calamin-
thæ semen hyssopus, iris, melanthium, asellorum qui sub aquariis va-
sis agunt sextarius in vas fictile coniectus carbonibus subditis frigi-
tur. Vbi candorem acquisierint, teruntur & melle cocto excepta my-
stri mensura ante cibum secundumque ipsum dantur. Quod si neces-
sitas vrgeat etiam vena ante hæc omnia incidetur & quantum vi-
res patiuntur sanguinis detrahatur, alius clysteriis sollicitatur. Tho-
rax a foris ficibus & lolii farina obducendus est cui adiecta fit resi-
na cera & mel. Inspergatur autem ipsi iris & manna. Non inutilis
est & farina ordeï cruda cum resina cera iride & manna. vnguentis
autem vtendum calidioribus, irino anethino rutaceo. Sed quod sub-
scribitur medicamentum huic vitio proprie dicatum est. pumicis pars
vna sæculæ quæ est vini sæx combusta, partes quatuor, auripigmēti
pars vna iunci rotundi floris partes duæ alcyonii pars vna aphroni
tri partes duæ. Contusa incernuntur, vnguentisque excepta thoracis

PAULI AEGINETAE.

infricantur. Malagmatis vtendum est quæ serofas superfluasq; sanguinis humiditates, græci ἰχθῆες nominant, possunt extrahere.

Potio suspiriosis apta.

POLII, abrotani, castorei, chamæpyteos, guttæ ammoniaci, singulorum par modus. Melle subacta exhibentur. **ALITER**. Nonnulli dederunt, aphronitri cochlearium cum tribus mulsæ cyathis. **ALIVD**. Aphronitri drachmæ nouem, piperis drachma, silphii drachma semis. Cochleariū ex aqua datur. **ALIVD**. Castorei, suffiminis ammoniaci, singulorum drachmæ sex, piperis grana viginti, passo excipiuntur. Instar fabæ cum mulsâ exhibetur. **ALIVD**. Sinapi drachma, nitri spumæ tres oboli, elaterii semio-bolus. Totum in pastillos octo digeritur. Bini duobus diebus offeruntur, nam sine molestia supra purgant. His qui præfocantur, aphronitri drachmæ tres, cum tribus hydromelitis cyathis assumentur ac cum cardamomo nonnunquam subito auxiliatur. benefacit etiam coxendicibus.

De peripneumonia.

Cap. xxx.

Peripneumonia pulmonis est inflammatio quæ plurimum ex valentibus in eam partem distillationibus aut angina aut suspirio aut pleuritide aliisve morbis contrahitur, Aliquando etiam ipsa inflammatio affectus origo est. Hæc subsequitur spiritus difficultas febris acuta & ardens, grauitas distensioq; pectoris tumor & magna repletio faciem occupat materia sursum ignis instar impetum faciente. Malæ itaque in his rubent, oculi intumescunt, supercilia deorsum nutant, tunica oculi ceratoides ob cornus imaginem dicta in pinguedinem languescit. Cum vera signa ad æstum flagrantiorē declinare videntur pulmonis inflammatio Erysipelatis naturam respiciens subesse existimabitur. In iis igitur qui ex aliis morbis huc decidunt, sanguinis detractio vitanda est maxime si diu hoc in statu fuerint vel si per initia sanguinem dimiserint. Verum alius in morbi remissione clystere ducenda est si ægre respondet aut cucurbitulæ vbi nihil obstat pectori & lateribus admoendæ sunt exq; prægrandes & multæ cute incisa. Sin autem peripneumonix affectus statim ab initio inuaserit sanguinem mittere suffragantibus qui huc requiruntur numeris ex usu est sin minus, cucurbitulas certe desigere quibus tantum elicietur sanguinis quantum vires patiuntur. Quod ad cibum vero attinet danda est sorbitio ex ptisanæ cremore & chondri cum melle vel ex amaris amygdalis cum similagine aut chondro dulci quadā potione admista hydromalo vel apomelite uel hydrosato, Recte sumitur & recens butyrū cochlearibus circa tri-

bus. Propinatur autem ipsis ficum cum hyssopo decoctum, vel iri hūe mor
dis in mulla coctæ, vel leuigatæ instar duum cochlearium mullæ bñ quana
insperforum. Hoc itidem, ab inferioribus partibus expurgat. At vir sublequū
tutis tuendæ gratia, crebrius potui assumetur, mulla per se et cum nu tur.
cleis pineis, ac cucurbitulæ uniuerso thoraci lateribusq; agglutina-
buntur. Ceratum vero cyprinum quod contineat iridem insparsam,
imponetur, vel ceratum ex rutaceo oleo, & iride sicca, vel epithema
ex cera, resina, medulla ceruina, butyro, œsypo medicamento, iride
sicca, & nardina unguento.

De cruentis sputis.

Cap. xxxi.

CRuentum sputum si disrupta vasorum comercia excitant, multum sanguinis euacuabitur. Et quidem modo manifesta ex causa. ut alto delapsu, clamore, & confimilibus, modo ex oculis, veluti plenitudine, aut frigore immodico, nam id venis rumpendis esse habile scribit Hippo. Si vero exesa parte aliqua sputum cruentum æditur, non confertim sed paulatim sanguis reicitur, sic ut acres quidam prauiq; cibi, vel inedia, vel acris ex capite distillatio præcesserit. At si ex adapertione, ἀναστροφῇ appellat, nullum quidem ex prædictis, præterquam plenitudo interdum præcedit, sed vitus humidior, calidiorq; balnei immoderati vsus, calidinis loci inhabitatio morbum facere videbitur, & neque inflammationes, neq; febres, neq; dolores experientur, sicut in iis euenit qui exeso vasorum corpore, διασφραγισίῃ appellant, sanguinem reiciunt, Imo contra leuius facilius q; agent (ut uerisimile est) euacuari, Quod si hæmorrhoides, aut mulierum menstrua, non responderint, etiam periculis, erumpens sanguis subtrahet. Idem vero hic pariter iis qui ex vase plenitudinis causa rupto vacuantur, satis ad valetudinem proderit, nisi ex ulcere, aut immodica vacuatione noxam senserint. Quæ uero exesis vasorum tunicis sanguinis sit euacuatio, nunquam commode cadit, facitq; valetudini. Quod si per vomitum excreetur, clarum est eum ex stomachi. aut ventriculi regionibus procedere. In quibus & per anum infra descendens, nonnunquam vacuatur. Si cum tussi, ab instrumentis respirationi dicatis prodit. Iam uero si spumans & subalbidus sit ex interualloq; reicitur, ut dolor absit, & pressio, ex pulmone ferri notum est. in quibus temporis spatio, febris sequetur continens præsertim iis quibus ex erosione profluit, & non nihil ex pulmonis substantia, aut arteriæ asperæ circulus qui βρόγχιον dicitur, aut uena egeratur. Notus certe qui dam mihi est ex iis qui sanguinem e pulmone reiciunt temporis processu maxima cum tussi, & sanguinis copia calculos quatuor, aut quinque expuisse asperos tribulorum modo, ad matissimæ

quæ est ex
ui frigori
ris tãquã
friabiles
uenæ si
ut calido
humido
exhau-
stout A.
i. iiii. me
teor. &
Plin. ii.
bruma
rumpunt i
tætæ spi-
ritu mē-
branæ.
quod br
ma scilicet
uis ingēs
spiritus i
tus exu
perat ex
circun-
stãtia fri
goris &
ui oilen-
tæ uirtu
tis ieternæ

PAULI AEGINETAE

adeo ut ^{gn}itudinem filiquarum trium, aut quatuor, ac deinde dolore leuā
interdū tus est. paulo post tabe consumptus interiit. Porro si pituitosa
tātā au cum tussi leuiore, vel screatu quoq; edantur, eaq; spumosa leuiāq;
rā uita- ex aspera arteria prodire scito. Si uero ater sanguis & in gru-
lis arte- mum concretus fuerit doloremq; in loco testetur, ex thorace educi
riarū mē significatur, per pulmonem arteriam ve traslatus. Qui uero screatu,
branæ ex faucibus per palatum educitur. † Cæterum si quando a capite de
non sint stillet, cum irritatione quadam, & tussi editur, ut qui ad asperæ arte
capaces. riæ caput defluat, iterumq; sursum feratur. hæc acris plurima ex par
tex pu te distillatio, vel capitis dolor, uel grauitas præcedit, accidit autem
ere hoī nonnunquam per palatum sanguinem vacuari, & propter hirudi-
nē solū nem deuoratam, & alicui indidem particulæ adhærescentem. Ve-
notum rum de hac in libro de uenenis pertractabitur.

Curatio.

gentem **Q**UIBV S destillatio cruentum sputum concitauit, vena pro
phleg- tinus debet incidi, nisi uehementer acris humor destillauerit, ac pro
matis co uirium modo sanguis detrahi. Extrema deligari, oleoq; veteri cali-
piam a do. vel sicionio præter caput perfricari. cibis adhiberi frumētaceis
cerebro cui succus alicuius austeri adiectus sit, ut mali granati pirorum ma-
manan- lorum vel illa eadem simul incoquatur. dormituro ex pastillo diae-
tem, lectru datur tertio die mellis cocti momentum delingitur. Quod si
morbus longior hæc vicerit capiti raso medicamentum quod ex-
fimo siluestrium columbarum constat, imponis. & post tres horas
medicamento deposito balneo ægrum committis, sic ut caput ne-
quaquam inungatur. De inde ubi sorbitionibus alueris somnum cap-
turo Theriace antidotū datur, iterumque die insequenti, ubi dederis,
similiter totum corpus præter caput perfricato. huic autem ceratum
ex thapsia aut aliud quoddam iniicietur & rursus utendum sorbitio-
nibus. Quod si malum in uetustatem incidit, cucurbitula occipicio
defigenda est. At si acris admodum fuerit distillatio sanguinis detra-
ctio caueri debet, alimentis autē & præfidiis iis tum quæ supra ubi
de distillatione egimus cōprehēsa sunt tum que mox dicentur uten-
dum. Qui ob frigoris iniurias sanguinem spuunt thoraxillis fouden-
dus est remediis quæ calfaciunt ipsum simul & desiccant, quod præ-
stat medicamentum diadiopeperion id est, quod duplici pipere con-
stat, vna cum pastillo diaelectru, hoc est ex succino exhibitum. At-
qui ex respiratoriis sanguinem reiiciunt disruptis oris venarum aut
pate factis, venam iis secare cōuenit nisi sanguinis copia prorumpat.
omnes autem quos hoc vitij premit locis aeri expositis decumbent,
lecto immobili figura sublimi cauētes ne uehementer respirent loquā-
turque. imponenda autem extrinsecus supra partes affectas spongia

ax tepente polca A septimo die lana succida cum vel mirteo vel lē
tiscino cui interim acetum interim vinum austerum sit additum si
copiose effertur farinae pollinem & mānam thuris cum aceto super
accōmodamus vel alumē, vel malicorium vel gallam cum aceto,
vel palmulas cum polentis & malis cidoniis in uino austero deco-
ctas. post hęc autem & emplastrum diaitcon hoc est ex salicibus
iniiciendum, præsertim ubi moderatior sanguis fertur. Per os autem
hęc sumpta proficiunt. portulaca commanducata benefacit. effica-
cior autem succus ipsius epotus, balaustrum, rubi fructus et flos quer-
tus membrana cortici subiecta, & quæ glandis putamini subest tūn-
ca, maxime vero cocta ipsa vtuntur, fagi autem & ilicis membra-
næ præstantiores sunt, terra samia quæ aster dicitur, ad omnem san-
guinis reiectionem. Item lemnia sphragis, lapis hæmatites in tenuis-
simum pollinem detritus cum succo mali punici, vel polygonii. pon-
dus autem lapidis erit scrupulus vnus. Composita medicamēta hęc
profunt, pastillus dialectru, diacoralliu, & qui ex spina ægyptia cō-
ficitur. item puluis confectus ex terra samia quæ ^{ἀσθη} aster dicitur, lem-
nia sphragide, corallio, simphtio, amilo, omnibus pari modo. In his
autem qui corrosis partibus ex puunt sanguinem, idque potissimum
vt destillatio præcesserit & opii partem semissem adicimus. Insu-
per medicamentum his facit, quod samii asteris, agerati lapidis, lem-
niæ sphragidis æquas portiones capit, duobus cochleariis potum
ex duobus plātaginis succi ciathis. A L I V D. Lemniæ sphra-
gidis drachmas sedecim, samiæ terræ, quæ aster dicitur drachmas
octodecim. amili drachmas octo. sarcocollæ drachmas quatuor
gummi drachmas duas, pulueris cocheleare vnum cum decocti pal-
mularum ciathis duobus. Superbibant autem etiam poscam frigi-
dam, vel palmularum, vel malorum, vel pirorum, vel pampinorum
vitis, vel eiusmodi cuiusdam decoctum. nutriuntur vero, si vires qui-
dem requirant, ad secundam tertiamve horam, sin minus circiter
quartam. Panis sit lotus ex aqua frigida, vel alica, vel chondrus
cum quodam succo refrigerante, puta mali granati, vel mirti, vel
omphacomelitis, vel oua forbilia, vel aliquod ex lacte bellarium,
cum quodam astringente. Inter olera seris, cichorium, plantago, cum
oleo immaturo, acetoque incocta. Ex fructibus mala, pira, melspi-
la, malum granatum, corni fructus. potus erit si febris careant, vi-
num aquosum, modicum, si febris adest ex prædictis quædam po-
tio, vel hidromalum cibaticum. Porro qui uomunt sanguinem, iis
dem sustentandi sunt, sola hac cura adhibita, ne crebro cibum su-
mant, quippe ex facili curantur, quandoquidem auxilia etiam
quæ bibuntur particulis ipsis sanguinem fundentibus palam ap-

PAULI AEGINETAE

propinquant. At sanguine in ventriculo grumi instar concreto, con-
gulum potandum est maxime leporinum, aut lixiuium ex fici cine-
re, cum aqua, vel thymum, vel satureia cum aceto, vel etiam ex la-
cte scisili vacuari debent, aut ex aloë. Rursus qui per palatum scra-
tu sanguinem reiciunt, gargarizabunt ex astringentibus, frontique
& capiti admoenda sunt quæ ex naribus sanguinem fundentibus
accommodantur. Hæc eorum qui sanguinem expuunt curatio est,
quam summa obire cura conuenit propter imminens ex immodica
vacuatione periculum, siquidem copiose vacuatus sanguis quemad-
modum in his qui iugulantur, mortem infert præsentaneam, si affe-
ctus remanet, in tabem transire minatur. postquam igitur omnia, vt
postulat ratio, peracta fuerint & sanguinis fluor substiterit, vires ip-
sis recolligendæ sunt, roburq; adhibendum, ac recentium porculo-
rum petunculi ac cerebella huc faciunt, corpus perfricari debet. uita-
ri autem, balnei frequens vsus, & vini portio, ira & venus.
†Scriptura quæ est in veteri codice est multo uerior, μετὰ τινὸς τῶν
ὑφ' ὀνότων χυλῶν οἱ οὐ γ' οἶασι ἢ μύετων &c. id est, cum aliquo succo
adstringente.

De purulentis & tabe quæ phthisis dicitur.

Cap.

xxxii.

PVris illuuiæ quod ἐμπνύμα græcis dicitur, in va cuius thoracis
regionibus, vel membrana quæ costas succingit, colligitur. inte-
rim propter sanguinis eductionem, vlcere ad cicatricem non perdu-
cto, quod etiam tabes statim comitatur si ex pulmone fiat reiectio,
Interim ex inflammatione suborta, quæ deinde in abscessum conuer-
sa, ruptaq; fuerit, quemadmodum & in laterum doloribus, quam pleu-
ritidem vocant, nonnunquam accidit, uel propter confluxum ex ca-
pite manantem, notæ igitur empyematis adhuc consistentis erunt,
grauitas thoracis, tussis ualida, siccaq; cum dolore, aliquando etiam
cum humiditate, ob quam releuari quoque videntur, febriculæ per
initia affligunt, languidæ, inordinatæ, & ad iudicandum difficiles,
postquam vero abscessus ad vomitam inclinauerit, vehementius
cum quodam horrore febricitant, ac in sermonis proprietate contur-
bantur, spiritu molestati. Rupto abscessu, pus educitur, nunc purum,
nunc fæculentum. & nonnunquam sursum abscessus erumpit, quan-
do etiam periculosior est, nonnunquam infra. Ac ea quæ inferius tē-
dunt, partim in ventrem & intestinum transsumuntur, partim in ue-
sicam traductione per vasa quædam administrata, semper autem fe-
bri hectica laborant, quoad sursum omnia fuerinteducta. In quibus,
nisi summa adhibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio
in tabem quam phthisin græci vocant transit, pulmone exulceratio-
nem

nem sustinente. In qua iam phthisi confirmata, genæ liuescunt, desu-
dationes in fronte, ac ceruice fiunt, carnes colliquantur, vngues cur-
uantur, pinguesq; & exalbidi vel pallidi apparent. Malo iam vin-
cente, venter turbatur, præcordia sursum conuelluntur, sitis ipsos ma-
gis conficit, cibiq; fastidium vrget, & id quod sursum vergit, vehe-
menter foedi odoris est.

Curatio.

PRIMUM Migitur puris collecti concoctio adiuuanda est
fomentis per spongas, & cataplasmatis, ex hordei farinis cum ficis
pinguibus incoctis, resina modica, columbarum simo, nitro, & hibi-
sco. Rupturam vomicae promouet etiam sani lateris incubitus. mul-
sæ autem sorbitio interposito tempore, & ptisanæ cremoris cū mel-
le. Valentiores, bibant decoctum quoq; hyssopi, & thymi cum mel-
le. opitulatur etiam rupturæ, & salsamentorum esus, & catapotia
hieræ diacolocynthidos dormituro data. At vbi pus excerni coepe-
rit, iterum dabitur hyssopi, iridis, & dulcis radicis decoctorū in mul-
sa potio, vel dulcis radícula cum sisamo detrita. Item pollen, mulsa
& oleo incoctus superaccommodatur. Quod si vlcus ægre possit
sursum repurgari, compositis vtendum est, puta medicamēto dia pras-
siu, hoc est ex marrubio, simplici & composito. item, dia orobon, id
est, eo quod eruis constat, necnō dodecatheo & phyloxeno appella-
tis. Verum in tabem quæ phthisis dicitur prolapsis, porra capitata,
quæ in chondri & ptisanæ sorbitionibus contabuerint, exhibentur,
quæ simul per se bis cocta offeruntur. Potus autem aqua cœlestis erit
atq; mulsa inde confecta. Extrinsecus applicantur per initia quidem
remissionum, cataplasma ex semine lini & polline ex decocto foe-
nugræci, vel maluæ, olei, mellis & foliorum althææ. temporis autē
processu, ad cerata ex butyro, cyprino, laurino, & iride transitus est.
quin & emplastri Mnasei vsus conducit. Verum si thorax fluxio-
ne infestetur, medicamentum diaiteon, hoc est, ex salicibus confectū
recte imponitur. atq; superius in purulentis simplicia dicta, nonnul-
laq; composita ipsis propinantur. Tus si vero grauiter affligente, thi-
mum, hyssopum cum succo radiculæ dulcis melle decocto excepta
formataq; sub lingua tenenda dantur. Cæterum cōueniet ipsis & an-
tidotum Mythridatis, diebus intercedentibus, sic quod viperis con-
stat. Optimum vero auxilium est, & boli armeni, potio. item Eledra
Antidotum, nihilo prædictis minus proficit.

De laterali dolore, quæ pleuritis dicitur. Cap. xxxiii.

Pleuritis, qui nobis lateralis dolor appellatur, proprie inflamma-
tio est membranæ, quæ costas succingit. Huic simul accedit spiræ-
di difficultas, tussis, febris continua, dolor vsq; ad iugulum & præ-

cōuulsio
nancq; sit
ad sua
princi-
pia. Hip-
pocra. in
progn.

PAULI AEGINETAE

cordia pertinenſ. Sed pleuriticus morbus a iocinoris inflammatione in qua etiam omnia modo comprehenſa apparent, his notis diſcernetur, quod pleuriticis dolor punctorius adſit, tuſſis alias ſicca, cum & crudus morbus ſignificatur, alias cum ſputo, quod humoris qui morbum facit index eſt. Rubrum ſi quidem & ſubcruentum æditur, cum ſanguis ſuperat. Flauum vero & ſubpallidum, cum flaua bilisquemadmodum ruruſ album, & leuiter ſpumofum, cum pituita. Ob melancholicum vero ſuccum, nigrius pulſumq; durum & ſerræ modo inæqualem obtinent. Iocinoris autem inflammationi, neque punctorius dolor, neque pulſus adeo durus ſuperuenit, verum tuſſis perpetuo ſicca & quæ nihil emolitur, male habet, facies pallidior apparet. At quibus pleuritides ex muſculorum exteriorum inflammatione creantur, quæ proprie pleuritides non ſunt, iis cum eo quod ſint ſine tuſſi, ſine ſputo, ac ſine pulſus duritie, ad manus tactum locus affectus indoleſcit, atque ſi tumor purulentus non fuerit diſcuſſus extrinſecus incidi poſtulat, cum pleuritis quæ inflammationi membræ coſtas integentiſ fertur accepta, eo non feratur. Illa nanque, niſi vel extra, vel intus, expurgetur, purulenta colluuiſ empyema Græci vocant, multo citius in peripneumoniam degenerat.

Curatio.

ITA QVE ſi dolor ad iugulum uſque peruenit, remedium eſt ſanguis dimiſſus. ſi autem ad præcordia deſcendat, purgatio. Recentiores autem omnibus venam incidunt, veriti, vt opinor, turbationem, quam purgatio ſolet accerſire. Quod ſi vires non patiantur, neutrum facere oportet, clyſteribus acribus vtendum, & ſiquidem dolor fuerit mediocriſ, aqua mulſa, & ptiſanæ, vel chondri cremor propinari poſt illos debet. Vbi morbus inclinauerit, porrum cremoribus recte iniicitur, vel calamintha, vel pulegium, & vrticæ ſemen, cum melle delingitur. Porro vehementeſ doloreſ a corporiſ vacatione leniendi ſunt lana calente, aut ſulfurata impoſita, aut etiam fomentis ex milio, aut fuſſure per ſacculos adhibitiſ, aut ex aqua calida, aut oleo in veſicula. Lanæq; ſuccidaſ imponere vtile eſt cum oleo & vino ex marina præparato. Vel ſal iniicere, vel cataplaſma diaſpermon ideſt quod ſeminib; conſtat ex decocto chamæmeli, althææ, vel ſicorum pinguium, iridiſ, abſynthii, mellis modico cum oleo nardino. Quarto die cibi erunt ſorbitiões cum mellis momēto, a ſeptimo autem linctus ex amygdaliſ, & vrticæ ſemine, ex melle ſimul contritiſ dabitur, vel eclegma quod ex butyro, & melle coctum eſt, vtendumque medicamento ex melle cocto, quod quia ſub lingua tenetur, Græci vocant hypoglottida. Epithemata conuenient cum quod a graui odore dyſodeſ nuncupant, tum diaſampſa

chu, id est quod constat amaraco. Item emplastrum peganera dictum locis dolentibus vtiliter accommodatur. Præterea ad curationem bulbi cum axungia cocti frequenter fuerunt abunde. Aluo iniici debet ab inferioribus partibus butyrum & terebinthina. At efficacius eclegma est ex fructu picæ, amygdalis amaris, lini semine, nucleo pineo, & amylo æquali portione cum melle. Quos torquent vigilæ medicamen diacodyon delingere conueniet. Ex antidotis, & Athanasia, & aliis ad hoc compositis vtemur. Post quartum decimum diem, si malum remanet, cucurbitulæ ipsis admoueri, tenuiorq; seruari victus debet. Deinde morbo inclinante balneo æger credetur, frigus vitabit, solidiore vtetur cibo. At si inflammatio membranæ costas integritatis non discussa, in pus transire videatur, supra commemoratis vtendum.

Ad laterum dolores sine febris.

L A T E R V M doloribus sine febris, bdellium medetur, & costus, brassicæ caulium combustarum cineri adipicq; mixta. Nam id medicamenti affatim discutit.

De cordis affectibus.

Cap. xxxiiii.

Cordis affectus si quidem primario accidit, omni destitutus medicorum auxilio, in præsentaneam mortem præcipitat, nempe cum inflammationem, erysipelata, & intemperies validas in acutissimis febribus ipsum experitur, vel sanguinis profluvium ex sinistri potissimum ventriculi vulnere. At si consortii lege afficiatur, cerebro, iocinore, ore ventriculi laborante, tum si ob tristitiam, metumque, & alias plerasque causas, syncopen appellatam, quæ subitus est virium collapsus sustinebit, quæque indicatur, animæ defectu, pulsum paruitate, extremorum perfrictionibus, & sudore circumfluo. Quæ inquam syncope, si valida est, medicinæ locum non est. Si vires adhuc tantillum constant, aliquando ad sanationem recursus est. Itidem valentes cordis palpitaciones sæpe ex sanguinis in eo concepti copia, aut feruore contrahuntur. Idem vero cor si incaluerit, magnam crebramque ædit respirationem, si perfrixerit, paruum & raram, quomodo autem cardiacæ syncopæ possint emendari, secundo volumine, inter ea quæ febribus superueniunt, sumus executi. Tantum vero hic adiciendum est, si symptoma euincit, postquam extrema perfricata fuerint, nunctaque & post puluerem ex pauimento iniectum aliaque virium recreationi apta, particulis sudore diffatis iniicere emplastri modo conuenit myrtum detritam, vel cimoliam cretam, vel succinum, vel

gaiprincipatus
aiæ in
corde ha
bitas ex
sententia
sapietissi
morum et
nō in ce
rebro ut
medici
volunt
put va
ri s cura
rū cupi
diratūq;
fluctibus

L 2

PAULI AEGINETAE

iacet in malicorium cum manna, vel terram samiam cum gummi. Extremis
multipli autem frigentibus ad usque inguina & alas sinapi, vel prethrum, vel
cis sinco adarce imponitur. Cibus erit panis ex aqua, aut vino frigido tempe
pes ge rato, suum petunculi, articuli, rostra, alae, omniaque frigida. Capiti fron
nus icur tiq; omphacinum, aut astringens aliquod cum gummi, vel rosarum
rit, & ex decocto imponetur. Praecordis & stomacho cataplasma admoue
pportio bitur ex palmulis, rosis, cenanthe, acacia, hypocistide & alumine.
ne suevir De palpitacione cordis.

NOVI (Galenus inquit) qui annis singulis verno tempore, cor
dis palpitacione affligeretur. Aduersus quam venae sectionem trien
nium expertus commodam, quarto anno sanguinem prius misit qua
simptomate corriperetur, atque ita securus fuit, eoque modo multis sub
sequentibus annis factitauit, & conuenienti victus ratione usus est.
attamen & hic ante senectutem, fato functus est, quemadmodum alii
quoque omnes, nonnulli in febribus acutis subita sincope oppressi si
militer interierunt. alii ipsorum etiam citra sincopen, veluti apople
xia tentati repente diem obierunt. Complures ita affectorum aeta
tem egerunt, minorem annis quinquaginta, maiorem vero qua
draginta.

De mammillarum affectibus. Cap. xxxv.

Ac a partu saepe casei modo coactum mamillis inflammatio
nes parit. Utendum igitur per initia est hisce rebus. Spongia mol
lis posca tepente imbuta, expressaque loco apposite superaccommoda
tur illigaturque, vel palmulae cum pane ex posca in laeuorem contri
tae, vel ouo toto utendum est cum rosaceo, & cerati momento. vel
alumen, psylliumque cum coriandro, vel portulaca applicato. Vel la
pis pirites tritus cum cerato impositus illigetur. At distictione obor
ta, vel lacte in grumos concreto, panis ex hidrelaeo, aut mulso in
star cataplasmatibus iniicitur. Aut panis cum perdicii herba viridi si
mul cum cerato, bis quotidie, aut lomentum cum hidromelite, vel
sapa applicatur. Quod si vero pondus ferre non poterint, superfusio
ne utendum est ex dulci oleo calente, per lanas delicatiores. Fotus
autem adhibendi ex vapore calidae aquae, vel decoctis fenugraeci,
vel althaeae, vel apii seminis. Delinere vero mamillas conuenit pol
line farinaceo cum semine lini, aut fenugraeco cum hidromelite, aut
sesamo quod cum melle aut butiro sit leuigatum. Ceterum ne lac
exugatur cauendum est, nam maior per lactationem materies illuc
citabitur. Inclinate autem inflammatione, cerata haec recte induces.
betam oleo incoctam quoad intabuerit, ipsam quidem proicito, oleo
autem cerae modicum iungito, ac utitor. ALIVD. Quorum cru
dorum lutea decem, cerato miscentur, cui vnciae duae & semis cerae,

LIBER III.

rosacet vncie quatuor sint adiectæ. Postquam radícula agitaueris, muria quantum recipere potest indito, & rursus vbi permoueris, vtitor. Porro ad mamillarum duritias, facit & medicamentum ex melle, tum omnia medicamenta molliendi facultate donata. Cum vero in abscessum vertitur, iis vtendum est, quæ in parotidibus comprehensa sunt item illis, quæ, vbi de abscessibus tractandum erit, enumerabimus.

Archigenis de erosione mamillarum cum malignitate.

VINI Adriani boni sextarii viginti, rhus quo coriarii vtuntur libra, cupressi pilularum tantundem, gallæ omphacinæ nigrae se- libra, casia tantundem. Contusa vino diebus decem commadescant, deinde coquuntur agitata cupressi rudicula, donec dimidia fere pars fuerit absumpta. atque tunc herbæ proiciuntur, succus coquitur dum mellis spissitudo fiat, deinde vitreo vase reconditur. In vlcerebus depascentibus mero vtitor. Sin autem crassius fuerit medicamen, vino liquari debet, vt applicetur mamillis depastis, auribus suppura- tis, gingiuis ex humiditate putridis, intestinorum torminibus. Idem vero dolores etiam lenit, lacte dilutum. Aliæ mammarum exulcerationes communem reliquis vlcerebus curationem recipiunt.

Quomodo mamillæ conseruentur.

CVMINVM cum aqua tritum mamillis obducitur, deinde spongia extrinsecus imposita, ex posca pectus cinctura stringito, a tribus diebus cumino deposito, mamillis florem bulborum cum melle superaccommodato. Et deligatum rursus triduum finito, idque ter mense facito. ALIVD. Cicuta in pollinem detrita, ad nouem dies imponitur, spongiaque extrinsecus, sicut comprehensum est, pauculis diebus interpositis idem facito, Quin & Naxiæ cotis detrimentum, virginum mamillas conseruat tueturque.

Ad scedum axillarum odorem, sudationesque.

ALV MINIS liquidi partes duæ, myrrhæ pars vna. Vino dissolutis vtitor. ALIVD. Plumbaginem combustam, vinoque odorato extinctam, ex vino terito, myrrhæ momentum iniiciens quoad sordium fiat spissitudo, ac vtitor. ALIVD. Argenti spumæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ duæ, amomi drachma. vi no excipiantur. ALIVD. Aluminis liquidi drachmæ octo, amomi, myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachmæ quatuor. vino leuigatis vtitor.

De stomachi, præcordiorum & ventriculi affe-
fectibus.

Cap. xxxvii.

DE cibi fastidio quod febribus superuenit, grandi fame, quæ Græci bulimon vocant, canino appetitu, stomachi imbecillitate, ani-

Arist. et Alexā.

Tria aut esse, quæ cordi potissimum adueniunt test. Ari.

in libello de respiratione.

πύδισιν καὶ σφυγμὸν καὶ τὸ τῆς ἀναπνοῆς

salta-
tionē pul-

sum, & actū re-

spirandi.

Itaque in palpitatio-
ne cor-

dis, quæ græce

παλμός

dicitur, sa-

lit pluri-
mo ictu

percitū
cor, non

ga ictū
patiatur

cor, quia

& pars
est oīs of-

feniæ cor-
poralis.

sed quia
ob super-

PAULI AEGINETAE.

mi defectu, in super siti, singultu, nausea, & syncope, libro superiore, ubi de febribus tractatum est, abunde differuimus. quare de eisdem rursum dicere opportunum non est. At inflammationes oris ventriculi, & iocinoris, astringentia misceri desiderant. Nam si sola relaxatoria medendi ratione curationem tentes, vitæ periculum intuleris. Ob quam causam, siue oleum fuerit quod superfunditur, siue cataplasma, recte adicitur astringens aliquod, verbi causa, absinthium, vel nardinum vnguentum, vel melinum, vel & malum cotoneum incoctum. Ceratum vero eius notæ est quo subinde vtimur, ceræ candidæ vncia, per æstatem drachmis septem, aloes, mastichæ, singulis drachmis, olei omphacini, vel melini, & nardini quantum ad spissitudinem in usu satis est. Sin maiorem requirat astrictionem, ubi tam fuerit imbecillis, ut ne cibis quidem sit retinendis, admisceatur etiam omphacii drachma, aut absinthii succi æqualis mensura, & tertio ad hæc hypocistidis, cœnanthæ, & rhus succi. Augendus autem cerati modus, qui aliorum medicaminum numero proportionem respondeat. Quod si inueterascit inflammatio, indurescitque, varia iam magis applicare oportet. tum ea quæ ex aromatis nonnihil, & emollientibus, discutientibusque continent, cuiusmodi est quod ex meliloto præparatur. philagrianum, & quod ab odore grato *ῥωσέης* dicitur, & viridis iaspidis torques a collo suspensus, ut stomachum contingat magno est præsidio. In calida autem stomachi intemperie & ardore cum eius resolutione, vel animæ defectu, vel quodam cibi fastidio, ex quacunque tandem occasione, præterquam febri, aqua frigida cum vix acerbæ succo propinatur, vel malorum cotoniorum decoctum, vel pampini vitis, vel semen cucumis leuigatum cum frigida. Verum stomacho vesicam aqua frigida repletam, vel cucumeris ramenta imponito. Catapotia quæ siti restinguendæ sunt, danda, ut supra de siti a nobis dictum est. Porro medicamen quod stomachum ex humiditate superflua imbecillem, refrigeret confirmetque, istud est. Rosarum viridiorum foliorum drachmæ sex, iduleis radiculæ succi drachmæ quinque. vino dulci excipiuntur, & ut sub lingua teneri possint, formantur. Cæterum in quibus crassior pituita calefieri incidique desiderat hoc medicamentum proficit, foeniculi radicis corticis vnciæ duæ, aceti sextarius unus & dimidius, aloes quadrans, mellis libræ quatuor. Radices cum aceto coctæ exprimuntur, abiciunturque. Mel autem inditum ad spissitudinem usque coquitur, & tunc aloe trita inspergitur. Tria huius cochlearia cum aqua sumuntur, quidam vero sine aloe ipsum præparant. iam vero medicamentum diacalaminthes his idoneum est. Quibus autem cibus acescit, coriandri seminis drachma, polentæ

modo inspersa commode bibitur, vel mastiches cochlear, vel lactu-
cæ albæ seminis cochlearia duo. Compositum autem hoc est, pi-
peris drachma, anethi drachmæ tres, cumini drachmæ quatuor. tri-
ta cochleari vno noctu sub somnum ex vino temperato præben-
tur. Porro in quibus atra bile vitiosus est stomachus & inflatione
laborat spongiæ in accessionibus oleo acerrimo imbutæ applicen-
tur. Deinde si malum remanserit, alumen cum ære læui, melle ex-
ceptum admouetur, sereos succus bibitur, vel menta potui inspergi-
tur. Si flatibus turget stomachus, & distenditur, calaminthes deco-
cto, mediocris mellis piperisque mensura mixta exhibetur. Ad sto-
machi peruersiones conueniunt mali granati acidi nucleorum succi
partes tres, mentæ succi pars vna. Vbi coxeris quoad in vnitatem
coierint, ante cibum, mystrum vnum dato.

Ad stomachi saluam.

ACETO scillite, aut sale conditarum oliuarum iure, aut
summitatis olæ decocto os colluatur, aut etiam minimum ex ip-
so deuoratur. Inter omnia præsentissimum est, aloe aqua diluta. Ad
eos autem qui cibum non continent, quos veteres proprie stoma-
chicos nominant, foenugræci farina melli mixta, & maluæ semen-
tritum aridum applicatur. ceratum vero ex cera, iuni olei sæce &
pastoreo.

De cibi fastidio quod Græci

ἀνορέξια vocant.

FASTIDIUM, quod anorexia dicitur, est, cum stoma-
chus aut intemperie vitiosus, aut humorum redundantia pressus
cibos auersatur. Calidam intemperiem testantur, sitis, nidorosi,
olctosique ructus, si cibis quodammodo præter voluntatem sit as-
sumptus. item si frigidiora potius & elaboratu peruiacia, hac de-
tenti queant concoquere. Frigidam contraria indicant, neque enim
in hac ægri sitiunt, neque frigida sustinent, & acida nonnunquam
erudiant. Qui humorum vitio cibum respuunt, partim ob tenui-
tatem ac rosionem illorum ita laborantes, ventriculi demorsu tor-
quentur. nauseaque magis & siti conficiuntur. Quibus autem hu-
mores computruerint, interdum ii etiam febricitant. At quos crassi
viscosique succi male habent, ii plane nec rosionem ventriculi, nec
sitim experiuntur. communiter autem omnibus superuenit nausea.
porro si in ventriculi sinum humores se receperint, etiam hos ipsos
euomunt. si vero infarcti vel etiam imbibiti tunicis adhærescunt,
nausea solum, non vomitu premuntur, præterquam cū cibos assump-
serint. Qui igitur ex calida intemperie fastidio laborant, refrigeran-
te victu curantur, præcipue qui ex aceto assumitur. Panis ergo posca

PAULI AEGINETAE.

imbutus esui, ipsaq; posca potui datur. Item ozigala, & quam Romani melcam appellant, quod ex lacte quoddam est opsonium, in-
tib i & portulaca, interim etiam aqua frigida, omniaq; mediocriter
secundum eius quæ subest intemperiei contrarietatem. Nam im-
deratus horum usus, non modo non iuuat, sed etiam sæpe insanabi-
lem morbum efficit. Frigida intemperie laborantes, contrariis medi-
cari conuenit, vino veteri & condito, hydrogaro, item anisi, rutæ &
petroselini decocto, iam pipere ex aqua calida communi, vel etiam
ipso medicamine, quod inscribitur diatrion pipereon, vel cui nomen
est diacalaminthes. Dabis etiam nonnihil theriacæ ex viperis con-
fectæ, quæ nec ipsa, fastidio ob humorum copiam laborantibus in-
 idonea est. insuper allia his & alimenti & medicaminis nomine cõ-
ueniunt. Sin autem humorum abundantia fastidium excitarit, tenues
mordacesq; aut vomitu, aut per aluum euacuabis. faciem itaq; vo-
mitum reddit aqua temperata, vel mulla dilutissima præbibita. Sa-
tius fuerit, si ante hæc humectantia exhibeas alimenta, veluti ptisa-
næ cremorem, vel ouorum lutea. Cæterum quomodo ex facili vo-
mas, priori libro est expositum. At si difficilius æger vomat, præ-
stat materiam ad aluum elicere copiosiore temperatoq; alimento his
prius humectatis. Purgans vero medicamentum esto, vel picra ex
aloe, vel ex malis cotoniis præparatum, cui adiectum sit aliquid
scammonix, vel quod constat rhodomelite. Si verò citra scammo-
niam aloes potius copia ipsos euacuare liceat, melius feceris, eo q
illa stomachum offendat. Quibus crassi humores viscosiq; fastidii
authores sunt medeberis extenuando ipsos incidendoq; tum oxyme-
lite, tum iis quæ ex hoc & muria componuntur, vt cappari, oliuis,
sinapi & similibus. Non inepta sunt his, & quæ ex frigida intempe-
rie fastidientibus consulimus, maxime post vacationem, quæ ni-
mirum fiet oxymelite Iuliano. Extrinsecus vtendum quæ calfacere
stomachum & corroborare queant, inunctionibus & malagmatis,
qualia sunt potissimum quod dicitur diaomphacos, & Marciatum
aliaq; consueta vnguina, insuper epithemata, Baium & Euodes hu-
iu sq; notæ reliqua, his addentur exercitia & frictiones potissimū.
Ad eos qui frigidi humidiq; humoris, vel talis intemperiei vitio dif-
ficulter concoquunt, cibumq; respuunt, ea quæ ex malis cotoniis cõ-
fiunt, pertinent. Dico autem quod vocant meloplacuntion, itē quod
ex malorum cotoneorum succo præparatur, tum quod ex carne eo-
rum constat. præterea dia citrii, idest ex cytrio confectum. Malag-
mata vero, Marciatum & quod ex acerbæ vux succo componitur.
item Baion, Polyarchion, atq; his finitima. Sin vlcus fuerit in sto-
macho, aut ventre, omnibus acribus & cibis & potionibus abstine

se oportet, vti vero medicamentis quæ leniunt, puta sorbitionibus ex oleo, tum iis quæ ex amylo, terra samia, lemnia spargide & lacte, vel melle paucissimo conficiuntur, vt etiam purgent citra rosionem. Epithema facies ex palmulis cotoneis, & polenta. Ceratum ex melino, vel rosaceo cum ammoniaco & thure. Ad hæc Nelet epithema conducit, & emplastra ex salicibus, & Icesion. Notæ vlcus sunt vomitus sanguinis, vel puris, vel etiam ramentorum.

AD solutum imbecillumq; stomachum, & ob hoc cibum non concoquentem, valet hoc, Aloes, masuche, mastiches, styracis singuli sextantes, absinthii triens, cenanthe quadrans, gleucini selibra, melini quadrans vini quod satis est. Nonnulli etiam cypheos & rosarum singulos sextantes miscent. Hæc in leuorem redacta, purpura, vel lana, excipiuntur, ac stomacho imponuntur. Quidam ceræ selibram adiungentes, epithema ipsum faciunt.

Ad ileosas stomachi affectiones, hoc est vehementes & conuulsorios dolores.

OPTIME facit pastillus Amazonum, inuenies autem huius scripturam, tum aliorum ad stomachum compositorum materiam ad calcem libri de medicamentis compositis explicatam.

De flatu ventriculi.

Cap. xxxviii.

Flatus in ventriculo generantur, humoribus, vel cibis, exigua caliditate in uapores dissolutis, nam frigiditas hoc nomine quod extenuare ac dissoluere non sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum non tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem impedit, minor vero caliditas diffundit quidem & transmutat alimentum, verum minus quam opus sit, vnde flatus excitantur, quare calidis eos medicamentis extenuare conuenit, cumini semine, & apii, & spondylii, & dauci, in oleo decocto. Vbi vero adfectioni adest frigiditas, ruta, bacca lauri, nigella, & feniculū oleo incoquuntur, misceturq; bitumen & oleum laurinum. At si inflammatio dolores comitetur, in vicem calefacientium laxantibus uteris, acetum decoquens, cui gallinæ anserisq; adipem adicias, iam vero polii fasciculus, vel calaminthæ decoctum cui mellis pauxillum cum piperis drachma sit iunctum, flatibus infestatis auxiliatur. Hæc itaque, dum vehemens dolor inciderit, adhibenda consulo. dum mediocris, etiam fomenta ex milio sufficiunt. Cæterum cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum vndique comprehendens toto symptomate frequenter subito liberat, castoreumque ipsis prodest, tum ex posca potum, tum extrinsecus cum oleo ficyonio appositum, vel si cum tormine intestinorum flatus incidant, medetur. Item talus suis combustus, potusque, tormina & flatus tollit. Idem facit aristolo-

Similis
.n. ppe-
modum
& vëto
rum &
multipli
cis spiri
tus aura
rū i mū
do sobo
les exi-
stit. &
vtrūq; p
miscet
exēplū
Arist. in
meteor.
quod cū
vniuerso
corpus
aīantis

PAULI AEGINETAE.

magnū
similitu
dinē ge
rit. ita
vario
quocq; tē
pore hu
iulce uni
uerſi na
turæ ip
ſi m ex
oportio
ne reſpō
dere ſa
pientes
ſcripſe
runt. ob
idq; &
mūſos
xoo μo
appella
tur.

chia rotunda. Iam vero aduerſus dolores flatuoſos ex ventris ob
ſtructione, vel craſſitie, vel perſtrictione obortos, vinum meracius, a
cibo ſumptum proficit. Vbi ſomnus acceſſerit, etiam ex toto leuat
affectos.

De cholera.

Cap. xxxix.

CHolera eſt immodica ventris perturbatio ſupra infraq; ex con
tinua ciborum cruditate proueniens. quæ inquam cruditas nō
nunquam ex magna alimentorum prauitate, interim ex vitioſorum
humorum ſuperfluo contrahitur. Si igitur naſceabundus æger eſt,
& turbatur, cibus etiamnum crudis in ventriculo manentibus, aqua
tepida propinari debet, deinde vomere oportet, digito, vel pinna ori
indita, item alui ductione adiuuandus eſt. Vbi vero hæc ex inaniti
ta eſt, conqueſcere, & præcordia oleo dulci cum vini modico, vel
maſtichino, vel etiam nardino ſi hyems fuerit fouere conueniet, ſom
numque permittere. Vbi iam exacta apparuerit concoctio, bal
neis & probi ſucci cibo vtendum eſt. At ſi inanitio fiat immodica,
ſufficient quidem initio vel ea quæ ſecundo libro de ventris pertur
batione comprehenſa ſunt. Sin autem perſeueret euacuationis im
petus, venter concidat, pulſus minor creberque euadat, cataplaſma
adhibendum ex palmulis cum cenanthe & acacia item hypocisti
dis & malicorni ſucco. Adhæc offerendus eſt ad ſorbendum aquæ
mediocriter frigidæ cyathus. Præſtiterit roſarum, vel cenanthæ, vel
rhus, vel vitis capreolorum decoctum, vel mali granati acidodulcis
ſuccus, ſcui mentæ pauxillum ſit inſperſum. Porro ſi excrementa
fuerint acriora, vexetque ardor, & ſitis, cucurbitæ ſemen cum aquæ
cyathis tribus, tum intybi, & portulacæ in poſca coctæ alimenti
nomine exhibeantur. Verum ſi fluxio ſiſti nequeat, vinum quod
dam auſterum, potui dandum eſt. ſi febris abſit, palmatianum, vel
aminæum, vel ſpathites, vel emphacomelites. Sin abſit, rhoetes, vel
myrtinum, vel cibyriticum, hydromalum & potui, & cum mica,
vel halica, vel chondro. At ſi reſpuant cibum frumentaceum hora
rios ſeu fugaces fructus mandent, meſpila ſcilicet, vel pira, vel ma
la cydonia, vel punica, quod carnoſum eſt & durum expuant. Sine
his quidem auxiliis cibum retinent, extrinſecus contra ventriculum
ipſum, cucurbita leuis quam maxima admouenda eſt. Dum autem
ipſa adhæret cibo aliquo ex prædictis ali debent. Ad conuulſo
rias autem contractiones calida linimenta, oleo imbuta, muſculis
circumponere oportet, tum cerata liquida, quibus adiectum ſit ali
puid caſtorei & ficyonii. Ante hæc artus aqua calida ſuperfunden
di. At ſi vigilæ torquent, ſomnus, iis quæ aduerſus illas prodidi
mus, conciliabitur. Si vires autem non prohibent, etiam medicamen

rum diacodion ipsis propinabitur, ubi morbus inclinaverit, ad balneum deducuntur, cibis ad refectiōem, pulli gallinacei erunt, columbæ, vel suum petunculi, similiave. Alui profluuium, *ἡ ἀγρὸς οἶα* græcis vocatur, quod ciborum corruptela est, plerunque sua sponte cessat, ægris non citius alimentum sentientibus quam absoluta facta fuerit concoctio, & corruptorum euacuatio, sin autem remaneat, iis quæ in cholera dicta sunt, utendum.

De leuitate intestinorum quæ lienteria dicitur
& coeliaco affectu. Cap. xl.

Cum lienterix duplex sit species, vna sane ex superficiali intestinorum exulceratione, secundum quosdam vero etiam ex catrice, quam dysenteria magna ex parte, vel aliæ fluxiones excitant, altera ex facultatis cibum in ventre continentis imbecillitate secundam opinor differentiam cum coeliaca dicta affectione commisceri confundiq. Etenim in hac cum venter præ imbecillitate nequeat cibos & concoquere & distribuere, læuia, cruda & perliquida redduntur, taluo in omnibus fluida. Verum in lientericis celeriter, quæ assumpta sunt, egeruntur, tamq. intensa est cruditas, ut alimentum assumpti genus aperte cognoscatur. atque hac nota potissimum a coeliacis discernuntur. Itaq. semen lini cum palmulis ipsis obducitur. Summe autem iacit lentiscus, rubus, oxymelite incoctus, cum adest inflatio cuminum miscebitur, anethumq. & ruta, augescente verbo pro fluuiio adiungemus mala cotonea, alumen liquidum, acaciam, hypocistidem, gallam, uel quædam, uel omnia. Cerata ex oleo myrteo cum vino quodam astringente. Epithemata calidiora quidem ex baccis lauri, & quod ex seminibus constat. Astringunt autem magis diacœnanthes, & diagigarton, idest ex acinis malorum puniceorum, item quod ad Antyllum authorem refertur, & Erythrii mirificum, si vero morbus in vetustatem incidat, etiam ventri recte applicatur & ceratum ex sinapi, ipsumq. sinapi. Potiones cōueniunt, simplices quidem, plantaginis, vel rumicis, vel mali granati cortices, vel sorba arida, vel immatura, vel omphacium siccum, ex vua aminæa, tribus obolis potum. Qui febris carent cum uini austeri cyathis sex, sebricitantes autem cum aqua pluuiali sumunt. Porro aluus arida galinarum potui inspersa, stomachū minus attingit, tū ea quæ urinā citant, exēpli gratia, apium, adianthum, similiaq. epota deriuationem moliantur. Cōposita vero sunt polyidæ sphragis, pastillus ex succino, itē ex spina ægyptia cōfectus, insuper clidium appellatus, & diaspermaton. Itē hoc est præstātissimū quod sequit, rumicis s. luestris seminis fescucia, plantaginis seminis uncia, & hypocistidis succi drach-

strangu
riā uero
tollit ra
sura os
sei geni
talis mu
stellæ
eius, q
ex nidis
auiculas
uenatur.

PAULI AEGINETAE.

mæ sex, gummi vel acaciæ drachmæ tres. Excipiuntur cotoneo-
rum ad tertias decoctorum liquore. ALIVD. Cumini, piperis,
rhus syriaci, balauſtii ſingulorum ſeſcuncia, malicorii, vncia, laſeris
ſeſcuncia, aut eius pulueris drachma potui inſpergitur, aut oxymeli-
te macerata dantur mane & vſperi. ALIVD. Myrti nigræ
cochleare, eiufque dimidium, aniſi, roſarum ſiccarum, ænanthes ſin-
gulorum cochlearis dimidium, palmulas viginti, in paſtillos cogi-
to, & drachmam vnam cum aqua aut diluta vini portione porrigi-
to, iam Theriace ex viperis optimum his eſt præſidium. Cibus au-
tem, ſi acris & bilioſa ſit deiectione, ex chondro, oriza, halica & ſimi-
libus erit, quibus cum aſtringens aliquod decoquetur pirum malum
cotonium, meſpilum & id genus alia item lac decoctum probe his
proderit. Potus erit aut vinum aquoſum tenue aut dulcis quædam
potio. Sin autem pituitoſiora excernunt contrarius iſtis cibus ex-
hibetur, nonnulla ſtomacho grata admiſcentur aniſum cuminum uel
apii ſemen Adhæc lenticula bis cocta plerunque iſtis profuit cum
aceto modico vel oxymelite commanducata. Præterea braſſicæ
& iſpæ bis coctionem expertæ, præſtat autem ſecundam iſtorum
coctionem in poſca fieri. Vinum aſſumetur vetuſtius calidiuſq.
† Rectior eſt ſcriptura veteris codicis *ῥευματιζομένης ἐπὶ πᾶν*
τοῦ γαστροῦ, ideſt ventre omnino fluxionem abunde accipiente.
† Veteres libri hoc loco hanc ſcripturam habent. *ὕποκυστις* & *χρ*
λοῦ Ζ. 6. κόμμε & *ἡ ἀκακίας ἰσον.* ideſt hypocyſtidis ſucci drach-
mæ ſex gummi vel acaciæ par modus.

ut co-
gnoscas
quot vi-
res me-
dendi
braſſica
habeat
lege M.
Cat.

De tenefmo.

Cap. xli.

præcedit
quod mor-
bi in ini-
tio in ex-
trema
erumpunt
membra
eaque debi-
litat. &
hoc prui-
dit natu-
ra ut me-
dia mē-
bri ſub

TENEFMUS interdum dysenteriam præcedit ſæpe vero & ipſe ſo-
lus paulatim generatus deſinit. Eſt autem affectus hic implaca-
bilis deſidendi cupiditas qua nihil præter modica cruenta vel mucos-
a egeritur quæ totius prope mali cauſa eſt factaq; in longanone in-
flammatio œdematodes hoc eſt mollis & cedens hærentis illic ſter-
coris opinionem & deſiciēdi ea deſiderium mouet. Galenus memo-
rix prodiſt etiam calculum quendam in tenefmi affectione per anum
ſuiſſe excretum. Subinde vero obſtructionem ſtercoris in tenui inte-
ſtino coacti tenefmus ſecutus eſt qui aſtringentibus quidem obturan-
tibuſq; remediis magis increuerit. clyſteribus autem acrioribus nem-
pe mulſa cum ſale vel medicamine quod emolliat per os aſſumpto
ut damasceno vel pinguib; ficis rore marino ſero lactis ſi rore ex-
creto conſeſtim finitus eſt. Quod ſi igitur citra talem cauſam te-
neſmus obortus ſit, conuenit inflammationem cruda ordeï farina ca-
lida & ſotu ex vino oleo myrteo vel roſaceo vel omphacino lum-

his & inferiori uentris ab umbilico regioni adhibito lenire. ad ea
 vero quæ lōganoni mucosa impacta sunt, mulsa īdita aluo absterge
 do muriacq; sæpe demissa auxilii fuit abunde. Sufficiunt autem salis
 drachmæ sex in aquæ calentis hemina. Porro dolores intentio-
 nesq; leniuntur infessu scœnu græci, uel maluæ, uel seminis lini. Alii
 autem frequenter hunc quoq; infessum felicem sunt experti, rutæ,
 myrti, citini, lauri, cupressi. æqua singulorum viridum portio in a-
 qua coquitur, est autem Marcellium. Vbi alte affligit inflammatio,
 irritationesq; iniici debent ab inferioribus partibus cremores frumē
 tacei cum quodam astringente decocto. oleum vero dulce inditu
 ætentumq; dolorem soluit. Cum autem crebra desidendi est cupidi-
 tas, etiam Agatidem spissamentis calidis sedi apponēt, aut fures
 calidas in fascia, aut spongiam, aut aliquid huiusmodi.

De torminibus quæ dysenteria dicitur. Cap. xlii.

Cum intestina intus exulcerantur, latini tormina, græci dysen-
 teriam appellant, quæ nunc ex teneſmi mutatione, uel quadam
 ex prædictis alui turbatione prouenit, nunc per se incipit. in qua ex-
 cernuntur primum biliosa, varia. deinde leuiter subcruenta, postre-
 mo saniei similia. cuiusmodi a mortuorum cadaueribus solent pro-
 fluere. At quæ a bile nigra oritur, exitialis est, ut quæ cancrum cum
 exulceratione testetur. Si igitur ab exulceratione, cruēta stercori cō-
 mista deiici cum dolore & torsionibus cernantur, ulcus tenuia inte-
 stina obsidere nota est, quod per os potissimum remedia desideret.
 Sin autem sincerum stercus descendat, crassa, quod enematibus ma-
 gis cedit. Porro cum multum sanguinis seorsim excernitur, affectū
 cruentam dysenteriam appellant, quanquam interim sanguis etiam
 nigrior, quam naturaliter esse debet, & splendescens deiiciatur, cum
 scilicet iecur alimentum distributum non probe conficit. Iam vero
 cum retentrix ipsius facultas, uel alteratrix imbecillis est, sæpe e-
 iusmodi descendunt ut recens in eis caro lota esse videatur. Atq; hāc
 iecorariam uocant dysenteriam, de qua in iocinoris affectu agemus.
 Itaque utendum est communiter iis quæ in coeliacis & aliis præter
 naturam excretionibus comprehensa sunt. Priuatim conueniunt,
 lemnia sphragis, quæ etiam depascentem modo dysenteriam persan-
 nat, & pota in aluum data, si intestinum mulsa prius fuerit abster-
 sum. Deinde muria & lactuæ succus potus conuenit dysentericis,
 ipsaq; lactuca in posca cocta esui idonea est. item plātago, rubi tum
 fructus, tum folia, & althææ radice decoctum, hippuris ex aqua,
 uel uino bibita, eiusq; succus prodest. Mori succus immaturus exic-
 catus, atq; hoc magis batina mora similiter resiccata, sic-
 cant etiam uentris fluorem oua ex a ceto cocta comestaq;. Sati-
 us

stātiā
 ab iniu-
 riā mor-
 bi tuteē
 ppulsa
 ad par-
 tes extre-
 mas ui-
 materiæ
 urgente.

PAULI AEGINETAE

fuerit, si commista quibusdam ex iis quæ ad dysenteriam faciunt, fruxaq; elui exhibeas. Vtilissimum his est omphacium rhus rubrū, eiusq; succus malicorium, galla, acini vux. Compositum hoc bene facit, cochlearum cineris partes quatuor, gallæ partes duas piperis partem unam in puluerem redacta oblonis inspergito, vel ex aqua, vel ex uino albo aquoso potui dato. Generose iuuat dysentericos quos nondum ulcus putre occupauerit, & canum ossa uorantiū ster cus aridum, cum lacte caseato, ex lapillis marinis iniectis potatum. composita uero ex ægyptia spina pastillus, item Philippi, tum qui ex cornu ceruino constat, adhæc qui ex seminibus conficitur, quiq; ad Trigonem refertur. Iam catapotia ex macere admiranda. maxi me autem commendatur et hoc opii, croci, lycii indici, acaciæ, rhus thuris, gallæ hipocistidis, malicorii, mirrhæ, aloës, æquales singu lorum portiones, nempe tres oboli ex aqua propinantur. ALIUD Rhus drachmæ octo, gallæ, malicorii, singulorum drachmæ qua tuor cochleare vnu ex vino datur. ALIUD. Rhus drachmæ octo, gallæ, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ duæ opiidrachma. Ex hibetur drachma ex uino temperato. Hoc autem eclegma ipsis con ueniet. Mirtorum nigrorum, rhus siriaci singuli sextarii, palmula rum thebaicarum duæ libræ, malorum cotoneorum carniū libra, mala granata acida cum ipsis corticibus decem, vini astringentis se xtarii duodecim, ad tertias decoquuntur. Percolatis libræ lex mel lis iniiciuntur, & ad spissitudinem iam incocta linctu exhibeto. No tum vero est catapasmata quoque ex astringentibus componenda, quorum materiam explicatam habes. Porro aluo indita, dysenteri cis propter tenesmos infestantes, ex usu fuerint, cremor orizæ, vel chondri, vel huiusmodi alterius cum adipe caprillo, vel hircino, tū ea quæ capite de tenesmo diximus. Si autem sanguis profluit, ex in ferioribus partibus infundere oportet succum poligoni, vel planta gini cum acacia, vel hipocistide, vel id genus aliquo. Sin urgeat flu xus, etiam quod sanguinem cohibeat quoddam iniiciendum est. vt cinis lanæ lucidæ, vel spongiæ inanis, pice liquida, vel sanguine bu bulo imbutæ vel alumine liquido, combustæ, uel asinini stercoris succo. Huic & Andronis pastillus præstans est remedium. tum qui Musæ ascribitur, ac per similes. Insuper subiecta collyria multo sunt in id efficacissima, in quibus potissimum etiam dolores circa deie ctionem fiunt. Vbi uero vlcera intestina depascantur quæ tum fæ do excrementorum odore, tum putredine, tum quod non statim per initia fiat, sed temporis interuallo, agnoscimus, enemātibus quæ cru stam inducunt utemur, cuiusmodi sunt pastilli nomine Faustiani, item diachartu id est ex chartha inscriptus ac Bitinius, Theo-

nusque, Præterea qui ex suberibus constat, ex lenticulæ decocto, uel cuiusdam astringentis, iniecti. Arque hoc enema est ex iis quæ admodum expertus sum, glandis caliculi combustis (Est autem caliculus concavum illud unde querna glans prodit, quo coriarii utuntur) Auripigmenti consolidæ. rhus s. riaci. æquales partes. his contusis, duo cochlearia excipito cremore orizæ & succo anchusæ quæ foliū habet spinale, amplū nigrūq; quod choëro spileton apelant. Item ouorum candidi liquoris similiter ad vncias duas ternasue immittito. Epithemata vero in cœliacis enumerata sunt. Item ventris inunctiones quæ astrictoria ac siccante constant materia, glutinatorio quodam adhibito, gummi thure, taurocolla, polline, in similibus cataplasmatibus locum habeant. † Alimentum his erit p̄ initia, pulicula ex ouo & lacte deinde sorbitiones frumēticiæ per se. & cum lacte, irem lac mediocriter coctum maxime commendatur. holerum usus non est necessarius quidem, attamen gustandas exhibebis serim coctam, intybum, plantaginem, brasficam bis coctam, poma quæ πῶρα dicuntur astringentia, carnibus ipsorum reiectis, uel aliis quæ asperare intestina possunt. Verum si multa sit calor interperies, etiam intybus cruda esui danda est, & aqua potioni frigida. Alia uero potabilis aqua cœlestis esto, si uero laborauerit stomachus, vinum quoque propinandum est. Postea ex aucupio sic ciora & concoctioni morigera sumantur, balineis dulcibus utuntur, a quibus si fluxionem experiantur, spongiā magnā, vel panis siliaginei micas vino ascalonite, vel quodam astringente calido imbutas, toti ventri imponere oportet, contra quem cum deligaueris, sic lauare inbeto.

† Hoc loco uetus cod. habet, τροφή δὲ τούτοις ὡς τὴν ἀρχὴν ἔσται id est, alimentum per initia his sint oua. Sed vulgarem scripturam bonam esse ex Aetio qui uis intelligere potest, apud quem νοσὶς ὡς γὰρ est, quam interpretes oua lacti mixta reddit.

De morbo intestini plenioris. quem græci colicon appellant. Cap. xliiii.

Colon, cum pars sit intestini crassæ, a dextra ilium regione procedens, ad sinistriorem cincturæ modo pertinet, huic dolores grauisissimi plures ob causas suboriuntur. vel enim ex crasso pituitosoq; humore intra tunicas ipsius recepto, vel ex spiritu crasso, & flatulento qui non habet exitum, vel propter inflammationem intestini, vel ob acres mordacesque humores. Qui ergo ex humo-

PAULI AEGINETAE

re crasso, ac pituitoso dolorem concipiunt. hi per totum abdomē
 in alto excruciantur, praesertim sensu, qua parte colon situm est ceu
 terebra per tundatur. Hos torsiones quoque affligunt, ructus, nausea,
 nihil red dit aluus vomitio cuiuslibet humoris, potissimum pituitae. Aluus grauer
 quod ip impedita nihil reddit, ac ne spiritū quidē transmittit. Stercus aut quā
 fuis potē doque excretum bouino simile videtur leuē & flatus plenum prae
 tia excre cedens horum causa est magna ex parte, continuus ciborum frigido
 tiua supe rum, crassiq; succi. vsus, repletio, crudita otium & his finitima. Qui
 rioris autem ex spiritu flatulento indolescunt, iis tensionis magis sensus
 partis obuenit. qui autem ex inflammatione, iiferauorem internum percipi
 morbo unt. & febris non ignaua, urinae retentio simul & stercoris, pulsus
 lege con in uentre molestat, sitis, ardor, nausea, bilis potius vomitiones quae
 fortis in nihil leuant malum, summatim inter colicas affectiones, haec est gra
 firmatur uissima quae, in Ileū transitionē minatur. at quibus acres rodētesque
 & a suo succi dolorem mouent, sicut etiam qui ob inflammationem dolent,
 opere hos ardor sitis & uigilia torquet, & febricitant autem omnino vel
 alienat, minus quam illi, vrina redditur acris, & biliosa per aluum descen
 dunt. Saepē alui deiectio maiorem excitat cruciatum, grauiusq; irri
 tant calidiores cibi potusq; assumpti. Itaque doloribus quos frigidi
 & glutinosi ac crassi humores contraxerunt, medebimur sic ut nō
 vehementer calfaciamus, quippe huiusmodi humores iis quae nimis
 ex calfaciunt, praesidiis funduntur, ac in spiritalem potius substantiā
 rediguntur. Qua propter & incidi, & concoqui medicamentis de
 bent, quae non inflent, sed extenuent desiccantq; nec per morbi initia
 valde calefaciant. Prius itaque aluo stercore leuata, congrui clyste
 res ex oleo iniiciuntur in quo decoctum sit cuminum, vel ruta cum
 adipe anserino, vel gallinae, aut cucumis siluestris radicum decocto,
 & myrrhae drachma, melle & oleo, aut ex myrrha, melle, & oleo si
 cioneo. Iam vero commune oleum iniectum, saepe vitream simul pi
 tuitam expulit, ac dolorem subito finiuit. At si ob doloris vehemē
 tiam etiam enema retinuerint, glans aluo demittenda est, ex melle,
 cumino nitro, rutae semine sicco, brasicae caule probe polito & mu
 ria madefacto, uel cinere brasicae melle consperso, uel cucurbita silue
 stri trita cum melle, nitro et cumino. Glandes autem digitorum sex
 erunt, ut strictiorem ani musculum quem σφιγκτηρ vocant, exupe
 rent, sedemq; ungere oportet, ciclamini succo cum melle & nitro.
 vel centaureo cum melle & nitro. Si dolor non remittitur, enema
 praeter commemorata sit. Resinae terebinthinae uncia, vel opopana
 cis drachma, vel galbani drachmae quatuor, bituminis tantundem,
 cum nitri drachma. & aquae uncia, olei rutacei vnciae quinque, aut
 amplius, fatus autem partibus indolentibus superacomodandi sunt
 ex cumino

ex cumino, vel anethino, ficyonio oleo, cataplasma admouendum, tri-
 spermum appellatum, cum cumino, baccis lauri, apii semine. Epithe-
 mata vero conuenient, diaspermaton, diadaphnidon, adde diamelilo-
 ton, & Poliarchion. Inseffus autem utilis ex decocto foenugraeci,
 althææ, chamæmeli, artemisæ anethi, tauri, & fimitium. Item in o-
 leum calidum, aut hidrelæum descendere alienum non est. potui
 offertur absinthium, & cuminum æqua portione, vel panax cum a-
 qua, vel castorci, a nisi, piperis, siugulæ drachmæ cum oxymelite.
 Quod si dolor non conquirit, propinatur ipsis medicamentum dia-
 trion pipereon, vel theriaca. Iam sinapismo, & dropace in remis-
 sione doloris utendum est, ac balneis naturalibus, † a balneis autem
 aquæ potabilis abstineant, nisi doloris circumstantia compellat. Vbi
 iam prædictorum aliquo medicamento facta prius fuerit euacuatio,
 iubebis vt lauent, incalescantque laconico intra ignitos parietes in-
 spargendo nitrosa quædam smegmata. Cum dolor est vehemens,
 mediocriter lenientibus uti conuenit, qualis est pastillus ex casto-
 reo, tum aluo ab inferioribus partibus inditus, tum potus, similiaq;
 his medicamēta. Nam quæ ualenter stuporem inducunt, vitare opor-
 tet. quippe paulisper quidem leniūt, sed longiorem affectionem red-
 dunt, dum materiam incrassant, meatusq; intestini condensant. Por-
 ro ubi iam pituita fuerit extenuata, purgabitur hiera amarescente,
 vel his catapotiiis. Aloes, euphorbii, cocci gnidii, scamoniæ æquali
 singulorum modo. dantur duobus scrupulis. Victus utilis erit quia in
 calidior siccioreq; per initia morbi, a cibo abstinebitur. deinde a-
 cria assumentur. Porro igitur ipsis exhiberi cocta cum condito de-
 bent, apium, asparagus palustris, cruda allia, & maxime iis qui
 talibus non offenduntur. ipsumq; vero conditum bibant. panem ve-
 ro cum ipso assumant. Insecutis diebus etiam reliqua boni succi ali-
 menta concoctaq; facilia dabuntur, sic vt repletio cruditasq; uitetur.
 At si flatulentus spiritus doloris author fuerit, secundum clysteres
 qui status discutiant, potionesq; etiam cucurbitæ quam maxi-
 mæ cum flamma ac leues toti abdomini defixæ, frequenter abun-
 de auxilii præstiterunt. Porro cum inflammatio intestinum ex-
 ercet, vena in cubito aperienda est, sin vrinæ difficultas distorqueat,
 etiam ex talo sanguis detrahi debet, & prædicta admoueri præ-
 sicta, † præterquam quæ acria sunt & ualenter pergant, vtendum
 vero iis quæ magis leniunt enematis, cataplasmatibus & superfusioni-
 bus, in oleumq; descendēdū, ac cucurbitulas ipsis defigemus, cera-
 tum abdomini applicabimus quod habeat ceræ quincuncem, olei
 chamæmelini vncias duas, rosacei tantundem, lomenti semunciam
 vitella ouorum quinq;. Hæc succo lini seminis soluuntur. Victus

PAVLI AEGINETAE

tenuis ac febricitantium proprius ipsis conuenit, quousque inflam-
matio discutiatur. Atqui si propter acreis rodentesque succos dolitant,
oleum ipsis ab inferioribus partibus iniicietur, in quo fenu graecū de
coctum sit, vel althea cum tenera adipe recenti anseris, vel galli-
nae vel etiam cremore ptisanæ cum rosaceo, vel succo quoque lini
feminis. Propinandumque ipsis antidotum picra dia aloes, & balne
is vtendum ex dulci aqua, cibo sorbili, chondro, vel ptisana, pisci-
bus saxatilibus. In summa uniuersus victus humidior erit, & frigi-
dior. Abstinentum acribus omnibus cum cibis, tum medicamen-
tis, fotuque ex asperginibus, & cataplasmatibus, vini potione & potis-
simum veteris. Cum autem dolor præpollet, etiam iis utendum est
quæ sensum obtupefaciunt, nam offendunt minus aliis huiusmo-
di affectiones medicamenta quæ tenues, mordacesque humores in-
crassant, & mediocriter refrigerant. Puto autem colicam affectio-
nem, quæ etiamnum regnat ex huiusmodi prouenisse humoribus,
quæ ab Italiæ quidem regionibus incepit, in aliis autem multis Ro-
manorum Reipublicæ locis pestiferæ cuiusdam luis modo sit gras-
sata, ex qua plerique in morbum comitiale, alii in artuum resolutio-
nem sensu in columi, nonnulli in vtraque sunt prolapsi, ac eorum
qui in comitiale morbum inciderunt, plures interiire. Ex illis ve-
ro qui in resolutionem, plures euaserunt. tanquam in crisi, causa ali-
orum ex loco quem infestauerat, conuersa. Sic igitur laborantes,
medicus quidam in Italia curauit victusquadam ratione infideli re-
frigerante & maxime temeraria. lactucas enim non coctas refrige-
rataque ipsis porrigebat, intybumque similiter supra satietatem come-
dendum. Item vuas, mala, pisces dura carne præditos, omniaque crusta
cea quæ vocat Græce ὀσθακόδεμα, pedes bubulos, bulbos, et similia,
non solum facultate, sed & tactu frigida. vinum raro præbebat, cum
autem dabat frigida miscebat, ipsamque frigidam uel etiam poscam
frigidam exhibebat, ab omni alio calido, & medio cibo abstinens.
Atque plurimos sic præter omnium opinionem persanauit, imo non
nullos qui iam in morbum comitiale, vel resolutionem prolapsi
erant, propemodum sanitati restituit.

exortus
quasi ui-
detur et
tēpesta-
te nostra
morbus
gallicus
pluresque
alios
morbos
nobis i-
gnotis
futuris
seculis
nasci
posse ex
prauita-
te huma-
ni uictus
in peius
uentis
ex malis
moribus
rationa-
bile est

† Veteris Cod. hæc est scriptura, πῦρε ττουσι δὲ οὐδὲν ὅλως ἢ
ἐκείνων ἢ τιτὸν. Sed vulgarem lectionem, vel eā quam habet codex
Orosii πῦρε ττουσι ὁμοίως, meliorem esse ex Alexand. Tral. intelli-
gere licet, qui scribit, eorum qui colico dolore laborant, οὐκ ἀνὸν πῦ-
ρε τοῦ διατελείντους πλείους, id est plurimos non esse sine febre

† Totus hic locus sic legitur in antiquis libris. τῶν δὲ δι' ὕδα-
τος ποτὶ μου λούτρων ἀπεχέσθωσαν, πλην εἰ μὴ διὰ τὴν περὶ τῶν

τοῦ ὁδύνης ἀνανκά ζῶντο, ἢ νίκα δὴ πρῶτος ἐν ἑντῶς αὐτοῦς τινὶ τῶν
 ἐξημέων φαρμάκων λούειν καὶ πυνξάσθαι, κελεύειν ἐν τοῖς διαπύροις
 τοῖς ποῖς. i. a balneis aquæ potabilis abstineant nisi doloris intensio co-
 pellat, ubi iam prædictorum aliquo medicamento facta leuiter fuerit
 euacuatio, iubebis ut lauent, incalescantq; laconico in locis ignitis.

† Hæc scriptura est in veteri codice πλὴν τῶν δριμέων καὶ τῶν δερ-
 μαίνοντων ἰσχυρῶς, id est præterquam quæ acria sunt & multum cal-
 faciunt. Quæ scriptura rectior est.

De tenuioris intestini morbo, qui ileos dici-
 tur. Cap. xliiii.

Ileos cum affectus sit maxime acutus, & dolorificus, symptoma
 quoddam habet periculo grauius. Qui enim hoc malo sunt oppres-
 si, miserabili morte pereunt, ad vitæ finem, stercus per os reddentes.
 Contrahitur id vitii cruditatibus, & obstructo recrementorum itine-
 re, iis nimirum retentis, quæ iam corruptionem experta sunt, ex leta-
 libus medicamentis, cunque in scrotum prolabantur intestina, & cū
 inflammationem sentiunt colica, afflictione plerunque præcedere, cau-
 samq; adferente. Pueros itaque superfusionibus, cataplasmatibus, enema-
 tibus, glandibus & fomentis. sicut in capite de colicis comprehensum
 est, curare oportet. Adolescentibus autem & ætate floridis indubita-
 to sanguinem detrahare, sin minus, vincit multas ac leues cucurbitu-
 las toti ab domini admovere. Loco autem dolenti, etiam cute incisa,
 item perfricare & deligare artus, & tunc efficacioribus clysteriis &
 iniectionibus uti. Ad hæc in oleum calidum descendere, antidota pur-
 gationesq; assumere. breuiter omnia adhibere conuenit, quæ ad coli-
 cos scripta sunt, prætereos qui ex acribus, rodentibusq; succis indoles-
 cunt. Mirifice autem ipsis facit etiam si vomuerint, anethum coctū,
 potumq; a potu panis in calidam demersi frustula statim esse, dum
 incalescunt. Ad eos autem qui cibos non retinent, rhus & cuminum
 in eadem trita potui dato in senis oxymelitis cyathis. Qui ex medi-
 camento in ileon inciderunt, vomant compellendi aquæ calidæ
 potu. Noxiorum autem medicamentorum notas, quinto libro habes
 expressas. Deinde oleum calens propinari debet, vel iura pingua ut
 denuo vomant. Diebus aliquot interpositis, theriace potui detur. At
 si obstructio perseueret, lacte scisso cum scammonia, vel aloës, uel cu-
 iusdam purgantis momento, aluum inanire cōfert. Si ex intestini pro-
 lapsu in scrotum affectus processerit, figuratis statim ipsis sublimi-
 bus in inguina compelletur delapsum intestinum, fasciæq; deliga-
 bitur.

De renum & vesicæ affectibus, & primum de
 calculo. Cap. xlv.

M 2

Proclm
 et stoici
 putant
 quemad-
 modum
 et quorū
 dā dicit
 esse sciē-
 tia, quæ
 tu late-
 ret ad-
 huc mor-
 tales.
 ἀπὸ τοῦ
 εἰλέας
 dictus
 morbus
 qđ inter
 Pinutor
 tu multi-
 plicabili
 uolunt.
 ideū quo-
 que mor-
 bum utā
 ἰππία-
 κοῖς
 equiple-
 niori ci-
 bo edu-
 cati ἐκ-
 τῶ φέας
 græce di-
 citi pa-
 tiunt ex
 Aristot.

PAULI AEGINETAE

Morborum cognatio, ordinem disciplinæ transgredi nos compellit, nam communis est Colicis, & lapidem in rene habentibus alius initio astricta, vehemens dolor, fastidium, cruditas, & tormina. Propria uero, colici habent omnia hæc magis intensa, nephritici minus. At colicis quidem in dexteriore potius ileum parte dolor excruciat, & usque ad stomachum, iecur, & lienem peruenit, alius omnino cohibetur, adeo ut ne spiritus quidem infra transmittatur. Cum vero necessitas stercus expellit, flatulentum bouilli modo est. Interim etiam vitrea pituita excernitur, vrina copiosior pituitosaque redditur. verum nephritici grauem in ipsis renibus infixum dolorem impacti pali instar sentiunt, eiusdemque lateris ac e directo subiectus testiculus indolet, femur eiusdem partis directe obstupefcit, excerniturque etiam sponte quidem raro, omnino autem clysteriis alius citata, flatus, stercusque biliosius egerit. vrinæ paucæ, & arenosæ magis prodeunt, meatus per quem vrina distillat, astringitur. hæc indicia calculos in renibus esse fatentur, quæ adultis potius oboriuntur, in vesica autem pueris magis calculus solet con crescere, noræ harum sunt cruda & subalbida vrina cui subsideat arenosum. Pruriunt laborantes crebro, & contrectant pudenda, intenduntque, & continue ad vrinam reddendam virguntur, ac stillicido vexantur. Materiam igitur calculis creandis suppeditat crassus, terreusque humor. Effectri ipsorum causa est ignea renum, aut vesicæ caliditas. At in renibus quidem medicamentis uti conuenit, quæ calculos confringunt dissecantque, non autem manifesto calefaciunt. Talia habentur basilicorum asparagorum radices rubique, vitrum combustum, graminis radix, adianthum, bdellium, liri radice cortex, altheæ semen, cicer nigrum arietinum spongiarum calculi, acetum scillites, phu, meon, asaron, carpesion, saxifraga. sion uero, & esu, & potu prodest, cardui radix, erysimon, & prionitis. balneis autem crebro vrantur, & post lauacrum statim quædam ex prædictis bibant. Cæterum superfusiones, cataplasmata, fotus, infusus, relaxantia & quæ leniunt, ex colicis huc transferre conuenit. Compositæ potiones sunt, rutæ syluestris, maluæ syluestris, apii radices. incoquantur vino, & liquor inde expressus temperatusque aqua, duobus cochleariis porrigitur. Hoc inspergi potest. Balsami fructus, lapidis spongiarum, pulegii ficci, maluæ syluestris seminis singulorum pares portiones. ubi contusa fuerint, cochleare inde cum vini temperati cochleariis duobus exhibetur. Item sanguis hircinus inarefactus, cicadæ siccae sine pennis pedibusque, lapis iudaicus, qui tecolithos dicitur, ex mulso in calido balnei solio offertur.

ita enim
hi lapides
in me
bris ani
matorum
causam
suam et
materiā
habent
ut si
nu terræ
ipsi lapi
des solent
concre
scere. Sic
Arist. sc
pe cor
pus ani
matorum
fert cito
to mundo

LIBER III.

tum medicamenta composita, quæ ex ipsis præparantur. Insuper, ⁹¹ inferiori
fca nephritice, & ad hoc composita, condita. His accedit laudatissi- & econ
mum remedium troglodytes, est autem passerulus omnium auium tra.
minima, ea sola excepta, quæ Regulus appellatur. Hoc enim solo
paulo maior est, eiq; similis colore inter cinerium & viride, tenui ro
stro, in muris maxime & sepibus degens. Hic inquam totus sale cõ
ditus crudusq; frequenter commanducatus, calculos iam creatos per
vrinam expellit, in posterumq; generari prohibet. Combusti integri
cum pennis cinis vniuersus per se & cum pipere, phylliq; momento
ex mero & melle potus, idem potest efficere. Ad dolorum vero acu
men & vigilias bona sunt remedia Sotira, & Philonis medicamẽ.
iam sanguinis misfio adhibita dolorem sæpe leuauit, celeriter calcu
lum emolita. Tuetur a calculis, ne fiant, primum sane cibus boni suc
ci, & moderatus, dein exercitia, rarusq; leguminum omnis generis,
frumentaceorumq; vsus, item casei abstinencia, lactis, & quæ ex ipso
præparantur, obsoniorum, vini nigri, carniū copię, & omniū sum
matim crassi succi, ac nimis calidorum acriumq; hydrogarorum di
co, & conditorum & similibus. Hæc enim si obseruentur, nõ solum
lapides nondum creatos prohibent concrefcere, sed etiam iam factos
confringere, vel excernere idonea sunt. bibant autem oxymeli cum
quodam simpliciore vrinam citante, veluti adiantho, apio, graminis
decocto. A balneo ieiunus ante vinum aquam temperatam potet. ac
in medio prandii frigidam superbibat, si nihil prohibet. † Vbi prau
humoris copiam persentiscunt, sanguine detracto, aut purgatione va
cuentur. Omnium vero præsentissimum est ad calculos arcendos se
cundum balneum, aquam temperatam prius bibere, quam vinũ, aut
aliud alimentum assumas, ac vesicæ calculos in pueris, valentioribus
emolieri præfidiis, delectu ex supra comprehensis habito. Quod si
impendio excreuerint, aut ceruici vesicæ impegerint, iniectione re
cti lyphonis, catheterismum uocant, per quassatum vtendum, aut etiã
calculi incisio adhibenda, vt in parte chirurgica dicitur.

De inflammatione.

AT si inflammatio renes, aut vesicam exerceat, quam hæ notæ
testantur, loci affecti ardor, dolorq; cum grauitate, febricula, mentis
alienatio, vomitio bilis synceræ, vrinæ reddendæ impotētia, & præ
sertim vbi vesica inflammationem experitur, sanguis statim detra
hendus est, vtendumq; superfusionibus, quibus leniendi potestas est,
& cataplasmatibus ex ruta, anetho, fœnugræco, althææ radice, cliste
riisq; mollibus, & iniectionibus ex oleo, papauere, adipe anserino.
In vesicæ affectu etiam, opii semiobolum cū mirrha, croco, & oleo,
in aluum demitti, nullaq; potui sumi debet, ab iis abstineri quæ val-

PAULI AEGINETAE.

de urinam citant, ac multa potio vitanda, nisi acris biliofusq; humor superet, tunc enim potui quoq; liberaliori indulgendum est, ac vna vice cumulatim, qui ex aliquo citra resolutionem, urinam mouente, sumetur. Seminis lini partes duæ, amyli pars vna, cochleare ex aqua datur, item cucumeris & peponis semen. Cum ardorem igneum renes sentiunt, linamenta ex vino & oleo rosaceo, vel aqua & oleo rosaceo, vel melino super accommodantur, aut ceratum ex cera & rosaceo, chamæmelinoq; vel melino & luteis ouorum confectum cum aceti paululo, vel polygoni succo imponatur. Postea etiam emplastrum quod a succis diachylon dicitur, cum chamæmelino adhibeatur. calida autem nimium vitanda, ne puris generationem suscitent, item quæ impendio refrigerant. quippe ab his renes facile in scirrhum indurescunt. Ad hæc balneis. cum inflammatio instat, abstinendum, victus qui in febribus dari solet, & ab inflammatione arcenda nomen aphlegmanton sortitur, utilis est.

† Hic locus sic descriptus est in veteribus codicibus. δίδου κοχλεάριον μετ' οίνου κεραμένον κνάζων β. idest, cum vini temperati duobus cyathis.

† Locus hic integrior est in vetustis codicibus. πλῆθους δὲ καὶ κακοχυμίας συνκινούμενοι διὰ φλεβοτομίας ἢ κατάρσεως κενύωσαν, idest, si sentiant plethoram & cacochymiam sanguine detraeto aut purgatione vacuentur.

De abscessu & exulceratione partium per quas urina descendit, οὐρητικάς, græci vocant.

DOLORES circa ilia oborti, horror inæqualis, & febris inordinata, abscessum in renibus fatentur. In vesica autem præter commemorata, loci cruciatus testatur. Cæterum affectus renum, hac nota deprehenditur. si homo in sanum recumbens latus, in opposito percipiat dolorem ceu e sublimi rene suspenso. In quibus vtendum est in sessu ex hydrelæo, item cataplasmatibus ex polline, oleo & resina, vel erui farina, cum melle, vel cardamomo, vel columbæ stercore, cum ficis pinguibus. Pus autem per urinas confectum excretum, abscessum esse ruptum, & vlcus in particula ostendit. Quoniam vero etiã sine abscessu, instrumenta per quæ urina fertur exulcerationi patent, vase, aut rupto, aut exeso ex materia acris vel lapide per radente, distinguenda est renum exulceratio, ab ea quæ vesicæ exercet, vel meatus quos οὐρητικές vocant, hoc pacto, Renibus quidem exulceratis in lumbis dolor exercet cum grauitate & sine impedimento urina redditur, cui pus mixtum reperitur, carnosus particulis innatantibus. Vesica autem exulcerationem experta, tormentum vehemens in perine imoq; vetric mouet, urinae difficultas vrget, pus vbi reddita urina

na est, subfidet, squamulae foedi odoris, vel laminis similes insunt. fur-
 furacea autem subfidentia vesicam scabie laborare notat, si vero mea-
 tus urinarum sint exulcerati, etiam puris mixtura medio quodam mo-
 do habet, & pilis similia potius in lotio feruntur, dolorque mediam in-
 ter renem & vesicam, regionem occupat. Si autem pus aut sanguis
 ex cernatur, idque citra urinam, nullius particulae ex praedictis, sed pu-
 dendorum exulceratio significatur. Itaque cum vasa urinae dicata ex-
 ulcerationem sentiunt, aqua mulsa bibitur, aut fenugraeci decoctum
 cum melle, aut cucumeris semen cum passio. Pus reddentibus per uri-
 nam, bolus armenus datur, aut ferularum combustarum cinis, quantum
 tribus digitis comprehendi potest, ex passio, item lactis potio vehe-
 menter his auxiliatur. Composita autem haec, seminis lini, seminis
 cucumeris, tragachantae, singulorum drachmae duae, pastilli fingun-
 tur. **ALIUD.** Noces pineae numero viginti, cucumeris domestici
 seminis grana quadraginta, amyli drachma. Excipiuntur heminis
 duabus decocti nardi apii seminis. Archigenes in epistola ad Atti-
 cum iubet, cum urinae difficultas urget, papaveris albi torridi semi-
 nis detriti drachmam unam capi, quae decocto iunci rotundi, aut ca-
 lami, aut dulcis radice inspergatur. Dolores autem ex ulceribus con-
 tractos hoc lenit, cucumeris domestici purgati seminis grana nume-
 ro triginta, noces pineae duodecim, amygdala amara corticibus exu-
 ta triginta quinque, croci quantum ad colorem satis est. Ieiunus quo-
 tidie assumet cum lacte, aut passio. Mitius erit si pro nucibus pineis
 maluae seminis aequalem modum iniicias. Elidere autem potest (in-
 quit) vesicae exulcerationes etiam cyphi & antidota inde confecta.
 Ego vero in vetustioribus hoc usus, nunquam aliud magis varium
 desideravi, chamaedryos, chamaepyteos singulorum drachmae vigin-
 ti quatuor, asari, piperis albi singulorum drachmae septem, cinnamo-
 mi drachma, optime detriti cochlearia duo ex passio cretico, perrigo
 si febris adsit, ex aquae cyathis tribus, ubi vero mordax est exulcera-
 tio, etiam amyli duobus cochleariis, & cucumeris seminis granis
 quindecim adiectis, voti compos evasi. Haec quidem ex Archige-
 nis scriptis sunt. Item medicamenta, diaphysalidon, idest ex halica-
 cabo, & antidotum ex sylvestris maluae semine, necnon ex tra-
 gematis confectum benefacit. Regioni inter scrotum, & anum,
 necnon inferiori ventri, cerata imponuntur ex oesypo lota, buty-
 ro, adipe anserino, styrace. In vesicam autem infunditur clyste-
 rio mulsa aquosissima, vel lac cum paululo mellis, vel cum cu-
 cumeris semine, vel candidus oui liquor cum pompholyge, vel
 dictorum medicaminum aliquo. Si vlcus pascendo serpit, pa-
 stillus ex carta iniciendus est, aut Bithinius, & cataplasma ex
 M 4 bibere.

PAULI AEGINETAE

palmulis & vis pasfis cum galla, acacia, hypocistide, & alumine
debet imponi.

De sanguinis renum profluio.

RENES infirmi lotium subinde retinere nequeunt, sed paten-
tiores redditi sanguinis nonnihil ex vena laxant, aliasque crasfities
remittunt. Saepe renes etiam iuxta circuitum quemadmodum hæ-
morrhoides, sanguinis profluio laborant. Inaniti vero subleuantur,
in quibus nihil subito tentandum est si sanguinis cursus sistatur. At
si fluxus eius perseveret, vena in cubito aperitur, ac medicamentis
quæ ad sanguinis sputum, aliasque sanguinis eruptiones inscribuntur,
in renibus ac vesica sanguinem fundenti, utendum est. Maxime ve-
ro dari debet symphyti radix, & tragacanthum vino maceratum.
Ad hæc poligoni & plantagi nis succus, cum posca, aut amygdala
amara cum passo. Vel hoc, aluminis scissi drachma, tragacanthi drach-
mae duæ, gummi oboli quinque, ex passo assumetur, item cataplasma
ex ordeï farina cruda cum posca & rosaceo, aut ex palmulis & pa-
ne filigineo cum acacia, vel hipocistide, in vino astringenti, vel po-
sca decoctis obducitur. Cum vesica sanguinem fundit, etiam cucur-
bitulas in iliis & coxendicibus defigemus. Cæterum particula quæ
sanguinem fundit, hisce notis agnoscitur, loci dolore, & quod san-
guis urinae miscetur, aut e contrario, veluti in pure comprehensum
est. Concretus in vesica sanguis inde adeo deprehenditur, quod post
illum urina subito cohibeatur, & fibræ quædam sanguineæ (ut ve-
risimile est) aut humiditates cruentæ emanent. Datur autem potui ar-
temisæ decoctum, heliochrisi, vel cunilæ, vel raphani semen, vel
liquor laseris, vel cirenaicus, vel apii succus, singula in aceto tempe-
rata, aut leporis coagulum, aut hinnuli, aut hædi in oximelite, aut
lixivium cum oleo, spongiaque a foris ex muria, vel lixivio calido
accommodatur. Quod si vitium his non abigitur, secatur locus in-
ter anum & penem, quemadmodum in calculosis, ablatisque grumis
commode curantur.

De renum duritia.

QUAE durities in renibus contrahuntur, nullum sane dolorē
mouent, sed videntur renes ipsi tanquam ab iliis suspendi, coxæ stu-
pent, crura impotentia vacillant, urina modica egeritur, Totus denique
habitus duricie renum laborantium iis potissimum qui aqua subter-
cutem laborant, similis est. Hi ergo emollientur ceratis, malagmatis,
frictionibus & fomentis. Ad hæc quæ urinam cient, assumuntur,
aliusque subduci clistere debet.

De diabete.

CVM poculenta, statim qualia assumpta sunt per urinam trans-

mittuntur, diabetes vitium appellatur. Qui igitur eo sunt occupati, immodica siti conficiuntur, unde quoque dyspnoea graeci affectum nominant, qui ex retentricis sane renum facultatis impotentia contrahitur, attractricis autem maiore robore, ut totum corpus ob immodicum calorem exhauriat exugatur. Itaque aduersus hunc pugnant, cibum plenior, quique difficulter confici queat, nec liquidus sit, offeremus, veluti alicam cum rosato, vel rhodomalo, vel hidromalo, vel vino non vetusto, vel alias quodam calido. Ex oleribus autem intibum, serim, lactucas, inter pisces erunt saxatiles, suum petunculi, vuluæ, pira mala, punica mala, & frigida potio. Item poligoni succus, heleniumque recte ipsis propinatur ex vino nigro, palmularumque & mirti dilutum, præcordiis & renibus obducitur polenta ex aceto & rosaceo, folia vitis cotiledonis, parietariæ, portulacæ. sudores excitandi, vomitusque a potu frigido, omnibus quæ urinam mouent, abstinendum. At sanguinem per initia mittere non fuerit alienum.

De stillicidio urinæ & eius difficultate.

CVM neque inflammatio, neque calculus, neque aliud quippiam ex prædictis infestat, urina autem acris est, totusque habitus, vel etiam reliqua signa, bilem testantur, ex hac vel urinæ difficultas, vel stillicidium contrahitur. Quare ex usu sunt quæ hanc inalterant contemperantque, ptisanæ cremor, pisces, balnea, victusque idoneus, acria vitanda sunt, vinum, exercitia, ira & tarda comestio. Quod si urinæ tenuitas, alborque & reliqua signa frigidam fateantur intemperiem, conueniet vinum calidum, condita, tum quæ urinam cient & medicamina & cibi, adhæc infusus calidiores. At si præter alborem, etiam crassities in urina appareat, pituitosus humor censendus est, qui ceruicem vesicæ obstruxerit ubi utendum est oximelite, tum iis quæ constant ex hisso, pulegio, vel thymio, vel silphio, aqua emulsæ incotis, item superfusionibus calidioribus. siue autem humor crassus, siue calculus, siue grumus, vel eius generis aliquid obstruens, urinæ transitum impediat, syphonem rectum catheterem appellauimus, indere ex usu est, nisi particulæ inflammatio prohibeat. Porro in febribus urinæ difficultati medemur, super fuso rutaceo, vel anethino, vel veteri oleo. Si aluius astricta est, iniicietur ab inferiori parte decoctum scænuæ graeci, vel maluæ, vinciturque infidere ægrotantes supra comprehensos in hidrelæum, vel aliquod dictarum specierum decoctum cum oleo. Ceratum hoc magnifice proficit, sylvestris maluæ radices in fictonio cum aqua modica decoctæ donec inarescant. ipsæ quidem proiciuntur, succus autem oleo miscetur, rutæ quarta pars, ceræ & castorii quantum sufficit.

De vesica resoluta.

motū vni
uersi se-
quitur.
motum
deinde
corporis
motus
morbo-
rū sequi
tur clau-
destina
& oc-
cultā uir-
tute. &
ita muta-
tiones tē-
porū, re-
rū, mor-
borūque
in orbē
eunt ut
placet
Proclo
in timæo
et Alex.
in pbl.

PAULI AEGINETAE.

VESICAE resolutionem nunc vrinae difficultas, nunc spontanea ipsius emissio comitatur, vt in ipso capite de resolutione supra expositum est.

De vrinae incontinentia.

MVSCVLVS, qui ceruicem vesicae ambit, relaxatus, hoc mali generat. Quare pueris etiam maxima ex parte solet accidere. Communiter itaq; roborantibus potissimum vti conuenit, vt cœnelæo calido & similibus, abstinendum iis quæ valide refrigerant, calidis fouendi potius ægri, quatenus fieri potest. Etenim frigiditas veluti resolutionem repræsentat, naturaliter autem hæc opitulatur. Galli guttur combustum ieiuno bibendum in aqua tepida præbatur, vel leucanthemi flores similiter, vel leporis testiculus densus in vinum odoratum, contra hæc vitia bibitur. † vel calamintha myrrhaq; ante cœnam propinetur, vel rutæ sylvestris semen torrefactum per triduum potui exhibeatur. Cæterum pudenda eius qui hoc detinetur vitio, cimolia cum succo herbae perdicij perunguntur.

† Huius loci hæc est lectio in ueteri, καλαμίνδην ἢ σμύρναν δὲ σπρίν, idest, vel calamintha myrrhaq; in vino ante cœnam detur.

De iocinoris affectibus.

Cap. xlii.

IEcur pluribus vitiis opportunum est, nam imbecillitate, inflammatione, erysipelate, scirro, abscessu, vlceribus & obstructionibus corripitur. Primum de imbecillitate ipsius dicendum est, a qua proprie iocinorosos nominare ægrotantes cōsueuerunt. Si ergo alius in succum quidem conuersa verum liquidiora deiiciat alimēto minus probe, aut neutiquam in iecur distributo, sic tamen vt venter a noxa sit immunis, attractricem visceris facultatem infirmari suspicio est. Si vero in eis recens caro lota esse videatur, alteratricem, tum eam quæ sanguini creando est dicata. At si ex calida intemperie sit, imbecille, recrementum alui temporis spatio fœculentius apparet, valdeque foetidum, bilis insigniter colorata crassaq; descendit. Iam vero etiam quando iecoris substantia cum ea colliquatur, & totum corpus consumitur & febris vrget, cibiq; fastidium, & biliosus vomitus. Cum autem frigida affligit intemperies, neq; frequens, neq; copiosa aluus est, quippe affectus longius prorogatur. & certis diebus venter cumulatius deiiciet, sed minus foetida ceu sanguinis crassi fœcem, vt prope atra bilis videatur. Item plures & varij deiectionum colores, frigidam notant intemperiem, in qua febris languida apparet, facies non collabatur, maior ciborum appetentia inest. Harum intemperierum

alterutri si accedat siccitas, recrementa erunt sicciora & pauciora, uāte uir
magisque ægri sitient, si vero humida, liquidiora & copiosiora, tum tute cor
sitis minus excruciat. At si inflammatio iecur infestat, omnibus dis peri
quidem ex æquo dextra parte sub præcordiis dolor est, idemque ad patetici
iugulum supra, ad vsque costas spurias infra peruenit. Huic dolori dicūt ad
accedit febris acuta, tus sis sicca, sitis, cibi fastidium, spiritus difficul- plenā cō
tas, lingua primo rubra apparet, mox nigra, bilis euomitur, & coctio-
aluus non respondet. Quum autem similia in pleuriticis signa exi- nē ex-
stant, quo modo hos ab illis discernas, capite de pleuritide com- plendā,
prehensum est. Si vero Erysipelate iecur conficitur, flammeus ar- ex uari-
dor gliscit, vrunturque ægri, & marcor sequitur, qui μαλακίμω is diuer
græcis dicitur. Priuatim vero cum caua quidem iecoris inflam- sisq; san
mationem experiuntur, nausea adest, vomitus, cibi fastidium, & guinis
flammeus ardor intenditur, anima deficit, & sæpe membra perfri- elabora-
gescunt, vt aqua subter cutem transfundi inde incipiat. Rursus si ti quali-
gibbam ipsius regionem inflammatio exerceat, præter alia supe- tatibus
rius commemorata, tumor quoque manifestus in superficie oculis multipli
& tactui conspicuus est. hæc quidem validam grandemq; inflam- cē quo-
mationem testantur. sin obscura quædam fuerit, iubebimus ægro, que affe-
magnam edat respirationem. Et si dextra parte præcordia dolo- ctuū ha-
re dicat, moderata iecoris inflammatio censebitur. Quod si ob- bitū con-
longus inflammationis tumor, qua parte musculi incumbunt, ap- trahit. di-
pareat, sed ita vt nullum ex prædictis adsit, illos ipsos eadem in- stributa
flammatione occupari noscemus. Grauitas autem cum distentio- nanque
ne, & doloris, dextra præcordiorum parte sensus, nullo substante tu- dulcis
more, nulla febris vrgente, venarum signatur obstructio, qua venæ boniq;
portas & concaua iocinoris perreptantes iis quæ per gibba ipsius sangui-
excurrunt, committuntur. Itaque si in abscessum degenerat, inflam- nis por-
matio, dolor & distentio ipsis increfcit, rigores sine ratione acce- tione in
dunt, dolentesque iocinore, in sinistrum magis latus decumbere ne- totū cor
queunt, rupto autem abscessu, vel per vrinas, vel per aluum cumu- pus, reli
lata puris subluuies prorumpit. At si tumor in scirrhosam affectio- qui mor-
nem deciderit, dolores quidem remittunt. sed tumor cum duritie est hosi san-
conspicuus, quæ ambiunt partes extenuantur & tempore proce- guinis
dente difficulter poterunt discerni. Quippe aqua inter cutem pro- seminia
tinus comitatur, & tota præcordia humiditate conteguntur. Itaque moran-
aduersus calidam iecoris intemperiem, refrigerantibus, tum is quæ tia huc
viscus mediocriter confirmet, vti consilium est. id autem præ- illucque
stat seris & cichorium, interim crudum, interim coctum cum co- cōfluen-
riadro assumptum, item decoctum ipsius, epotum, & succus non tia ge-
solum, verum & puluis ipsius mullæ insparfus & calidis, & frigi- nera

PAULI AEGINETAE.

morb-
rū plura
afferunt,
χολη-
δολη-
uesicula
oēm san-
guinem
prauum
ex pur-
gare nō
facile pōt,
ipsa nā-
que a bi-
lioso suc-
co, quo-
ad eius
fieri pōt,
aīal de-
fendit. et
hoc pro-
uidit sa-
gaciter
natura,
quia bi-
lem prae-
sertim
follem
morbi
acuti an-
tiquissi-
mi medi-
ci voca-
runt.

dis iocinoris vitiis opitulatur. Adhæc intybum troximum & son-
chus eiusdem sunt generis. Benefacit etiam mali medici succi cya-
thus in aquam mulsam demissus, similiterq; filicis succus. At si cum
obstructione mediocris affligat intemperies, ea ex vino quodam te-
nui, & quod urinae mouendæ est, porriguntur. Catapotium vero
quod recipiet radices cichorii drachmas quatuor, chamæpyteos ra-
dicis drachmas quatuor trita cum melle cocto dantur ad nucis auel-
lanæ magnitudinem, quibus aquam calidam superbibere conuenit,
iam ex opio & semine alterci confecta propinantur, ipsumq; Philo-
nis antidotum. In quibus calor intenditur, etiam rosaceum primi me-
riti ipsis, vel melinum potui datur. Esui, ptisanæ cremor, vel chon-
dri cum hydrososato, similiter panis ex aqua, cum quadam id genus
dulci potione. Et summatim cibi erunt, qui mediocriter refrigerant,
non obstruunt, vinum omnino circūciditur, nisi alteram ob causam,
nempe stomachi imbecillitatem, hoc requirant, tum enim ex tenui-
bus & iis quæ græci ὀλιγοφύγον vocant, aquosum aliquod exhibe-
tur, Ac Erysipelas quoq; in eum modum curabitur. Porro in frigida
intemperie contrariis pugnandum est. Panis igitur recte cum vino
assumitur, item brassica bis terve incocta, castaneasq; esse confert &
vvas passas tum ex gallinis quod satis est, vinumq; bibant, sed prius
ipsis eupatorium, vel asarum, vel medicamentum diapedereon pro-
pinari debet. Iam ex iis quæ prius ad coeliacos & dysentericos in-
scripta sunt, idonea deligi debent, cyphoides autem appellatæ com-
positiones, ad calidas intemperies neutiquam conueniunt, nisi modi-
ca quædam caliditas cum humiditate copiosiore oborta fuerit. ad
frigidam autem optima sunt remedia, magisq; si cum humiditate, aur
iecoris obstructione euenerint. Si vero obstructio ex crassis glutino-
sisq; contracta humoribus fuerit, corruda & præsertim huius semen
datur, item lauri radices cortex eupatoriumq; ex oxymelite, vel lu-
pinorum amarorum decocto cum ruta & pipere. Ad hæc farina lu-
pinorum pota, & capparis radices partes du y, costi pars vna cum
vino, & medicamentum diabadanu ad obstructions quas crassi vi-
scosiq; humores excitarunt salutariter sumitur, præterea iris & pista-
ciorum fructus cortexq; marrubium insuper & amygdalæ amaræ
& ex ipsis pastilli, dracunculi, ariq; radix, agaricum, acetum scilli-
tes, oxymel, iecur lupi, aridum tritum & cochleario datum, omnib; i-
ecoris affectibus ex vino dulci succurrit, item antidotum Theodo-
retum efficacissimum est remedium iecori obstructo, scirrhus indura-
to diuq; inflammato. Item colicis & ictericis. similiter etiam picra
ex oxymelite. Cibi his dandi sunt calidiores & qui aperiundifacul-
tatem habent, nempe porra ex oxymelite, sylvestris asparagus, &

capparis, reliquaque obsonia ex condimento aliquo calefaciente,
 quodque meatus referat, incocta. Vinum tenue ac vetus vitale. vitanda
 sunt alimenta crassi succi, balnea crebra, eaque potissimum a cibo. Si
 morbus in vetustatem incidit, etiam venae sectio purgatioque adhi-
 benda, si nihil prohibet. Cum autem iecur inflammationem experi-
 tur, sanguis ex cubito dextro intrepide mittendus est, & copiosus
 si vires sufficient. Extrinsecus farina hordeacea & scenugraeci, & se-
 mine lini cum palmulis, vel malis cotonis, meliloti flore, absynthio
 chamæmelino obducetur. Illud autem in summa præcipiendum est,
 ut astringentia emollientibus semper admisceantur. Epithemata ve-
 ro iniici debent tum quod ad Nileum authorem refertur, tum quod
 a grato odore euodes dicitur item Philagrianum & Apollophe-
 nis necnon ex melilotis confectum. denique quod coptum appella-
 tur. Porro ad maximas inflammationes hoc valde experiētia com-
 probatum est, absynthii comæ nardi gallicæ asari croci singulorum
 vncia iridis myrrhæ styracis bdellii ammoniaci suffiminis quod thy-
 miana appellant singulorum vnciæ duæ medullæ vitulinæ vnciæ
 quatuor, cerati lentiscini libræ quatuor. Adhæc oxymel ipsis dandum
 est simpliciaque auxilia nempe asarum, nardus, gallica, vel indica, iun-
 cusque odoratus rotundus petroselinum. Alius irritanda est vrticæ
 vel mercurialis coctorum esu. In declinatione morbi epithymum &
 polypodium ex mulla porriguntur aliuusque inaniri postulat per cly-
 sterem initio quidem ex aqua mulla cum sale vel nitro. facta autem
 in declinatione miscetur hyssopum vel origanum vel cnicum vel cen-
 aureum & cucurbita sylvestris. Summatim vero caua iecoris pars
 per aluum, gibba per urinas expurgatur. Alimentum his dabitur cre-
 nor ptisanæ in quo apium decoctum sit. At inflammationis quæ
 erysipelatis naturam referat, curationem superius sumus executi. Ab
 cessu autem facto ruptura adiuuanda cataplasmate trispermo cum re-
 sina manna pice radicibus althææ columbæ fimo, caprillo stercore,
 præbitorum autem ius decoctorum ad tertias polii & fumarie quæ
 a ordeo nascitur, item decoctum thlaspi vel cicorii & chamædryos
 radicis bibant. uomicaque abscessus facta mulla conuenit & quæ in re-
 cibis exulceratis commemorata sunt. Extrinsecus imponitur me-
 dicamentum Mnasei, reliquaque emollientia. Item Icesion, vel quod
 ilicibus constat. Si vero iecur scirrhus induratum fuerit parum in me-
 dicina spei est, affectu in aquam subter cutem transeunte. Attamen
 mollientibus admiscenda sunt ammoniacum bdellium medullæ adi-
 es & quæ his similem potentiam obtinent. Potiones expediunt,
 quæ angustias visceris recludunt absterguntque. Huiusmodi sunt quæ
 rinam citant & calculos confringunt. Adhæc quæ nuper ad ieco-

nardi

celticæ

vrticæ et

mercu-

rialis

ἀκαλύ-

φη λίαν

σωσις.

apium

σέλινον

PAULI AEGINETAE

ris obstructionem dicta nobis sunt, alimento nimirum decenter adhibito.

De malo corporis habitu, qui Cachexia dicitur. Cap. xlvii.

Pincipia hydropicorum affectuum vocare nostri malum corporis habitum, Græci καχεξία consueverunt. Auxiliū est, nisi aliquid impedit, in sanguinis detractione, quæ particulatim ac per vires adhibita ad tertium quartumve diem producit. Sed vacuandi sunt potissimum, qui hæmorrhoidibus, aut mensstruis non respondentibus in morbum inciderunt, quemadmodum iis qui copia vitiosorum humorum laborant, vacuatio sanguinis per venam vitanda est, purgandi autem sunt ex hiera, dia colocyntidos. victus erit tenuis, & desiccans. Aquarum naturalium vsus adhibebitur, primum aluminosarum, nitrosarumque magis, mox sulfurosarum, pluribus diebus interpositis aliud balneum accommodabitur, varioque exercitationis generi credentur ægrotantes, maxime autem ei quod per medicos aliptas, idest reuñctiores administratur. postea veratrum assument. mirifice quoque iuuat ipsos & absynthii potio, & cottabismi, & dropaces. Si affectus in hydropem deciderit, aquæ subtercutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

veratrum
ἐλλέβο
ρε

De aqua inter cutem. Cap. xlviii.

Cum iecur vehementer perfrikerit, interim sane primario aut inflammatione, aut scirrho, aut alio implicitum vitio, interim lege confortii quod cum aliis partibus habet sanguinis elaboratio non succedit, ac vitium aquæ intercutis quod hydrops græce dicitur, inde contrahitur, in quo nonnunquam spiritus copia cum humidi momento intra membranam, quæ peritonæos appellatur, & intestina colligitur, ut abdomen percussum tympani modo crepitum elidat, qua ratione etiam tympanias nuncupatur, qui stomachi, alui, & coli inflationibus, febribusque longis superuenit. nonnunquam vero ex duritie peritonæi, aut vuluæ in mulieribus, aut ex scirrho generatur. Aliquando contra humorum abundantia cum paucissimo spiritu, in eisdem regionibus collecta, tanquam in vtre quodam conseruatur. vnde malū, ascites nominatur h drops, & ipse ex causis quas comprehendimus, contractus. Plurima vero ex parte, ex duritia & scirrho lienis, & iocinoris longisque intestinorum profluuiis, in quibus fit ut venter quidem intumescat, reliquum autem corpus quod alimentum non sentiat, consumatur. Nonnunquam etiam in tota corporis mole frigidior pituitosiorque sanguis continetur, qualis partim a iecore descendit, partim ex tota carne corporis veluti in aqua resoluta emanat, adeo ut corpus albedo, & pituitæ colore emortuū

instar appareat, vocaturque hydrops leucophlegmatias hypofarci-
 dios, vel anasarca. Quem lentæ febres, malus stomachi habitus, hæ-
 morrhoides diu suppressæ fluxus muliebris, spiritus difficultas, vigi-
 liæ sine ratione oborientes, causæq; his consimiles mouerunt. Cura
 tio igitur communis ab euacuatione incipit. Verum ascites & tym-
 panias appellatus medicamenta requirit quæ aquam educant. Cui
 autem anasarca nomen est, sanguinis detractio succurrimus, maxi-
 me si affectus origo ex hæmorrhoidibus, aut mensstruis suppressis
 existit, nisi prius cum malo habitu premebantur sanguinem emise-
 rint. Et hic igitur vt in iis qui malam corporis habitudinem sortiti
 sunt, per vices tentanda est uacuatio. Deinde sterco bouis gregarii
 aridum exacte tritum, coctumq; in posca, vel oxymelite, sulfurisque
 pars quarta superinspersa, toti ventris capacitati iniiciatur, uel sterco
 ra caprilla in pueri urina ad sordium spissitudinem macerata, appli-
 cato, per ventrem summe ipsos purgat. Item cataplasmatibus utendum
 ex fermento, ficis pinguibus, calce, nitro, iride, cardamomo, sulfure ui-
 no, ammoniaco, baccis lauri, uua taminia, columbarum ruralium fi-
 mo, uel omnibus, uel quibusdam ex his cum oxymelite. Post quæ
 epithema spongium appellatum ex caprillo stercore mirifice humi-
 ditatem uacuat, tum per latentes meatus, tum per aluum. Insequenti-
 bus diebus emplastra persiccantia imponuntur, tum dia iteon, idest,
 quod ex salicibus est, tum quod icesium dicitur, uel quod Cureo ascri-
 bitur, uel diadaphnidon quod ex baccis lauri factum est, uel polyar-
 chium, uel epithema diaspermaton ex seminibus præparatum. At-
 que hoc indubie mirificos præstat effectus, quod sequitur. quippe hu-
 mores ex alto eripit, lapidis pyritis, sulfuris uiui, guttæ ammoniaci,
 singulorum drachmæ duodecim, cumini drachmæ sedecim, nitri
 drachmæ duodecim. Excipiuntur cera modica, & terebinthina,
 pellicæ illita, toti ventri imponuntur. Ius radices sambuci decoctæ
 in uino potui datur, uel cucumer syluestris uino austero maceratus
 per triduum, cyatho uno propinatur. Accessio autem fit quotidie
 usque ad cyathos tres. Hoc quod subiungitur, uaria constat mistu-
 ra, balsami, nardi, casia, cumini, dulcis radicula, hyperici, iunci ro-
 tundi, asari, dauci, amomi, myrrhæ, petroselinii, calami aromatici,
 piperis, seselis, spondylii pares portiones, faciunt autem bene etiam
 singula per se, & omnia quæ urinæ ciendæ sunt, similem faculta-
 tem obtinent. Cæterum scilla tosta, cum melle trita & linctus
 modo exhibita, sine grauitate urinam mouet, coqui autem pos-
 sit etiam in aqua, iis qui bibere uelint. Iam hoc quod sequitur
 præcipue bonum est, interioris scillæ libræ duæ, in uini austeri
 sextariis tribus adusque tertias incocta porrigito ex uino quo-

PAULI AEGINETAE

tidie, orsus a mystro usq; ad unciam. Istud urinam optime prouocat, quod recipit aluminis liquidi circa fabæ magnitudinem, ubi aqua dissolueris, linteosq; percolaueris, ad tres dies propinato uel uno interposito. Conuenit etiam his picra ex oxymelite. Adhæc Theodoretus, & ex amaris amygdalis pastillus. Plura uero aquam educunt sed hic usus e comprobauit gnidia grana quadraginta aut quinquaginta uel lathyrides uiginti aut triginta uel euphorbii filiquæ quinque aut septem uel squamæ æris drachmæ duæ aut tres cum micis panis exceptæ ac in orbiculos digestæ uel sambuci radicis corticis succus epotus cum condito uel chameleæ foliorum, æris combusti, anisi singulorum par modus, datur in aqua per initia quidē drachma una, diebus aliquot interpositis etiam duæ & plures. Atque insequentia mirifica sunt catapotia aloes euphorbii cocci gnidii singulorum uncia rhei semuncia excipiuntur succo, brasicæ singunturq; catapotia dantur filiquæ septem aut nouem. Antidotum ex gariophilo aqua mirabiliter elicit iam uinum quod aquæ educendæ est dare tentabimus. Est autem hoc præstantissimum scillæ uncia tres seminis apii capparis radicis corticis, piperis singulorum drachmæ quatuor cocci gnidii decorticati drachma phylli drachma malabathri galbuli duo uini optimi hemina duodecim mellis crudi libræ sex. Contusa cribataque uino perfunduntur scilla simul leuigatur. dantur cyathitres, post humoris euacuationem etiam theriaca utendum est & stercoreis bubuli cochlear ex uino potum quotidie strenue auxiliatur. item clysteres adhibendi acres nisi uenter sua sponte humescat, tunc enim exiccare ipsum magis cōuenit. Porro in mulieribus quas aqua subter cutem male habet etiam pessus hic utilis est. Anisi cardomomi cumini nitri aristolochiæ scœnu græci pulegii ficuum interioris pares portiones susino excepta mulieribus subiiciuntur. Secundum hæc aquis naturalibus uti continenter expedit ad hæc in arena coniecti desudent & aliis autem lauacris abstinebunt. Quod si uero interrim lauent etiam utentur in lauacro nitro, sale, sinapi, calce, & persimilibus insperfis. Hæc sane uel citra lauationem utilia sunt aridaq; cum oleo uentri adfricata. At si id uitium est cui anasarca nomen est reliquas partes exerceri quatenus licet oportet & ficas ad solem perfricari. Reliqua uictus ratio ficcior assumetur. Cibus itaq; erit sal famentum sinapi & allia ex aubus syluestres & ficcæ magis. Inter olera asparagus, bisacutum, porrum sinapi caucalis reliquaq; syluestria. Obsoniis miscabitur sal theriacus, uel iamblichus uinum uetus tenue, ad urinam mouendam efficax ebibetur. Sin autem facultas datur, ex marina confectum, omnis potio liberalis uitanda est, aquæ intotum. Quod si cum febris aqua subter cutem inuadat, calidioribus, acrioribusq;

aerrioribusq; cibis & auxiliis abstinendum, mixtim vero his vtendu, ita vt ei quod magis vrget, occurramus, si uero id morbi genus est quo ventre sonitū ædit, Tympanias vocat, purgātia, & quæ vniuersum corpus, emaciāt colliquātq; relegēda sunt, itā ex his quæ vrinam mouent efficaciora. Illis autem quæ extenuare & discutere spiritus possunt, intrinsecus, tum a foris vtendum est. aut cucurbitulæ leues crebro toti ventri suffiguntur. Sin id uitii male habet, in quo veluti in virem aqua contrahitur ascites uocatur, nisi prædictis cesserit remediis, ad perforationem ueniendum est quæ παρυάκνυσις dicitur, quod nulli alii aquæ subter cutem generi conuenit.

De Liene.

Cap. xlix.

CVM lien melancholicū humorem, qui veluti limus sanguinis existit, a iocinore trahere soleat, si quidem facultas, attractrix in firmat fuerit, meatusue obstructus per quem prius trahebatur, niger morbus icterus constituitur, sanguine impuro per totum corpus disperse. At regius. si lienem grauitas, & distentio, vel etiam dolor exerceat, obstructio melas indicatur, si nihil horum euenerit, attrahendi potētiae imbecillitas. iκτερος. Quin etiam si atræ bilis vomitus sine febre alia ve malignitate oboritur, retenticem lienis vim laborare iudicium est. Expultricis imbecillitas cibum fastidium efferet, dum non amplius melancholicū quia natura quo excrementum, ab liene ad uentriculi ostium defertur, appetentiamq; tura quo excitat sed in ipso liene obstruitur, primum sane inflammatio huius, q; bilio cuius notæ sunt, feruor, & distentio, excitatur. quæ paulopost in fo & me scirrhum degenerat, sic ut feruor quidem dolorq; finierit, tumor autē lancholico succo ad suscitandā uentriculi facultatem ut vlcera in cruribus cicatricem non recipiunt, ob quæ simul affecto iocinore cutem subeuntes aquæ colliguntur, sicut comprehensum est. cibum Itaque intemperies ipsius eandem cum iocinore curationem postulat. si adest inflammatio, sanguis a cubito sinisteriore, vel ab extrema expetat manu dimittendus est eo quod reuulsio longioribus interuallis fieri utitur, se debeat, vel etiam propter naturalem quandam cognationem, deinde cataplasma inducendum ex quæ citra euidentem calorem exte pe. n. a- nuant, admixtis quibusdam etiam nunc astringentibus, videtur aut mat rea- tem hanc facultatem habere suapte natura, qui uocatur flos salis. Por de re ad ro est & hoc cataplasma mirificum, scœnugræci triens. farinæ hordea duo ope cia, nasturcii, singulorum vncia, ficuum pinguium libra, verbenacæ ra fungē herbæ aridæ uncia, ficus aceto quam acerrimo macerantur. da nta. Deinde cum aliis prius contusis incoquantur, postea iterum coquantur. Vel sterqus caprillum cum cruda ordeï farina coctum

N

PAULI AEGINETAE

ad altera
principa
le τωε
γω ad al
terū uero
ἐκ παρ
ου.

ex posca inducitur, adhibeto, si placet, & salis florem, fouendo aut prius cyprino cum aceti momento, malagmatis utitur primum simplicioribus, quale est hoc. Ceræ sesquilibra, cētaurii libra, nitri triēs, terebinthinæ, seminis uiticis, capparis radices corticis, singulorum quincunx. Coctis quæ liquari possunt, arida insparguntur. iā quod ad Nileum autorem refertur præstantissimū est. Verum ubi inflammatio in scirrhum denegerat, valētioribus uti conuenit, ut etiā cutis summa exculceretur, quale est quod ex fimo caprillo constat, & citrinum. huc accedunt Macherionis, Curei, item ex baccis lauri cōfectum, & ex salicibus. Quod subsequitur, etiā ipse expertus sum, auripigmenti vnciæ duæ, sandarachæ vnciæ duæ, ceræ libra. terebinthinæ libra, picis aridæ tantundem, galbani vncia, opopanax vncia, capparis radices corticis, glandis vnguentariæ, singulorum vnciæ quatuor, lachrymæ ammoniaci scrupula sex, nardini, vel cyprini vnciæ quinque. Ammoniacum etiā cum aceto applicatum, lieni sæpe profuit, item potum scrupulis tribus quaternisve cū vno castorei, si priusquam lauacrum descendant, ficum siccata comederint, sputoq; eam reddiderint, vel ammoniaci pars vna, castorei tantundem, datur drachma. hæc etiam ad induratos scirrhos, proficiunt, quemadmodum capparis quoq; cortex ex aceto contritus, applicatusq;. Idē bibitus aceto, vel oxymelite, crassos, glutinososq; humores vacuat, interim sanguinem. Iam salicis cortex, cōsimiliter iniungitur, & cinis ex officina fabrilis cum cruda ordeī farina ex oxymelite inductus. Item centaurei succus a foris impositus, epotusq; & lupinorum amarorum decoctum cum ruta & pipere potu assumptum, nec non farina ipsorum obducta, & aqua in qua candens ferrum subinde extinctum est, febricitantibus per se data cyathis tribus. febris carentibus autem cum vino & aceti cyatho vno, vel rumicis syluestris radices cum scilla tres oboli, vel chamædryos, vel serpilli acetabulum totū cum oxymelite, vel anagallidis, quæ cœruleum florem obtinet, duo oboli cum posca bibuntur, vel acetum scillites, vel oxymel. Cōposita autem hæc, panacis radices, guttæ ammoniaci, capparis radices corticis, herbæ lanariæ, scillæ tostæ medullæ æquales portiones, exhibentur drachmæ vnius pondere. benefacit etiam suspirosis, & hydropicis. ALIVD. Myricæ fructus drachmæ quatuor, piperis tantūdem, spicæ nardi drachmæ duæ, suffiminis ammoniaci totidem. Teruntur aceto scillino, instar drachmæ vnius dantur ex oxymelite.

Ad lienem scirrhu induratum.

CICLAMINI drachmæ viginti, brioniæ drachmæ tres, dictamni drachmæ duæ, scillæ tostæ drachmæ octo herbæ la-

narix drachmæ sex, capparis radice drachmæ sex. pastillus triobolaris ex oxymelite porrigitur, & qui ex æruca præparatur, non inidoneus est, cibus competit tenuis, acris, fucus, potio paucissima, adhibendæ exercitationes frictionesq; & sinapismi, interim etiam cucurbitulæ cum scarificatu defigendæ.

De morbo regio, qui icteros Græce dicitur.

REgius morbus, quem Græce icteron appellant, bilis est per totum corpus suffusio, modo atræ, de qua in lienosis a me dictum est, modo flauæ. Differentiis constat numerosis, quarum causæ & notæ hæ sunt. Si enim febricitante ægro repente superueniens febrim finierit, crifim testatur, materia ex alto foras prorumpente, contractum. Medicina non indiget, ut quod balneis & moderata frictione subito discutiatur. Si autem cum febre & biliosis deiectionibus inuadat, & præcordiorum dextra parte grauitas adsit, feruens iocinoris inflammatio significatur, cuius vi sanguis in bilem mutatus, per vniuersum corpus defertur. Sin autem feruor citra grauitatem in ipso substat, ex sola iecoris calida intemperie, vitium gignitur. Si absque febre alba deiiciantur, vesicæ fellis malum ostenditur, vel ipsius meatuum, si grauitas quidem præcordiorum dextram partem premat, obstructorum. Sin autem citra illam facultate imbecillium. vel attractrice, eius qui humorem ex iocinore eliciat, vel expultrice, illius qui ad intestina eundem protrudat. Quippe sanguis biliosus non expurgatus, in totum corpus diffunditur quemadmodum in nigro arquato fieri dicebamus, statim vero his etiam urinx biliosissimæ affatim excernuntur. Cæterum fit etiam arquatus, ex intemperie calida solidarum partium, dum id quod ratione alimenti, ipsis offertur, in bilem transmutant, quemadmodum in aquæ subtercutem genere, cui nomen anasarca, in pituitosam humiditatem est mutatio. Verum talis arquatus dignoscitur hac nota, quod non subito, ac vna vice, sed paulatim procreetur, sic ut nullum ex commemoratis adsit. Iam vero noxii medicamenti potus, & virus extrinsecus a venenato animali illatum, regium morbum parit. Itaque calidæ iecoris intemperiei, & inflammationis viriumq; imbecillitatis, curationem supra sumus persecuti, ubi de ipso agebatur, quam etiam integram huc transferre oportet, ne eadem mihi sint repetenda. At si meatus conceptaculi fellis utriusq; sint obstructi, vel alter duntaxat, venam in cubito dextro ipsis diuidi consilium est. Nonnulli vero, tum his, tum illis qui ex iecore inflammato, arquat.

ab aue is
morbus
appellat
Græce.

hoc inde
est, q̄ na
tura in
corpore
quoque
alendo
mutat in
aliū hu
more, ut
aliquod
magisq;
nullum
porrigat
aīātī ali
mētū. bi
liosus at
humor
quia su
perat in
corpore
ac domi
natur, sui
qualitate
totū san
guinem
lermen
tat.

PAVLI AEGINETAE

calamin- tum contraxerunt, venam propter minimum detræ manus digi-
tha quo- tum, incidunt. Cataplasmatibus quæ inflammationem arcent utendum
q̃ cu ui- est, & purgatione ex hiera, cen non clysteres idonei sunt, potui recte
no sum- datur arquaticis, ius apii, vel adianthi, vel rumicis, vel serpilli deco-
pta sa- ctorum ad tertias, uel absynthium potioni inspergitur. Præclare fa-
nat hoc- ciunt raphani succi cyathi duo, cum vini cyatho vno poti. Et ci-
morbo- chorei succi cyathi bini, vel terni per se aut cum vino poti. Sed qui ie-
laboran- coris inflammationi arquatam ferunt acceptum, mulsum bibent,
tē excō. vel decoctum tenuis aristolochiæ, vel hyperici, uel adianthi, vel her-
Nic. bæ lanariæ, vel erythrodani similiter, vñ cornus ceruini scobis drach-

ma cum vino, vel pastinaci syluestris decoctū in uino, vt tertia pars
superfit, vel sulphuris viui drachma in ouis sorbetur. Hæc etiam pro-
pter obstructionem arquato laborantibus ualde auxiliantur, semini-
nis autem atriplicis scrupuli octo, cum chrysattico, aut alio passo in
folii ingressu poti, uacuationem magnam præstant. Recte etiam pi-
era datur, & sicca, & ex oxymelite, & Theodoretus. Iam ex ama-
ris amygdalis pastillus datur, & cinamomi quantum tribus digitis
comprehendi potest, in mulsi cyatho vno, vel aqua temperata, uel
myrrhæ ad fabæ magnitudinem cum piperis granis quinque, tantun-
demque cinamomi. Qui vero ex calida solidarum partium intem-
perie in arquatam inciderunt, molli frictione, exercitiis moderatis,
vnctione & balneis tractandi sunt, cibo humido & mediocriter re-
frigerante cremore ptisanæ, intybo, feri, cichoreo, piscibusque, vino
tenui aquoso. Qui ex lethali potione, aut ex virulentorum anima-
lium morsibus in hunc affectum sunt prolapsi, de iis quinto volumi-
ne tractabitur. Porro si bilis in oculos faciemque se receperit, elate-
rii instar erui cum lacte muliebri naribus in balneo instillato, &
statim in solum descendant, cauentes ne caput immergatur. Post
balneum victu recreatis, rursus medicamentum errhinon in sole, na-
ribus infundito. Bene facit etiam cyclamini succus, porri, et nigellæ.
Acetum vero accerrimum naribus attrahat in folio desidens, conti-
neatq̃ etiam presfis naribus paulisper, & mirifice uacuabitur.

De umbilico prominente.

Cap. li.

Causam umbilici prominentis, & quomodo id vitii manu cu-
retur, in parte chirurgica docebimus. Quoniam vero nonnulli
hūc quo- etiam medicamentis in naturalem statum redierunt, ipsa hoc loco
q̃ p̃mi- dicemus. Aluminis scissilis drachmæ quinque, flocium uini dracmæ
nere tm octo, rosacei decem, gallæ immaturæ dracmæ duæ. Vino dilu-
dicūt et ta, & in mellis spissitudinem redacta loco affecto inducuntur. Ex-
nō cade trinfecus spongia posca madens superinticitur, & fasciola deliga-
re quē- tur.

LIBER III.

79

ALIVD. Fabæ frescæ, corticum gallæ, balaustii pares portiones, coquuntur in aqua, ubi dissoluta fuerint, tritaq; diligenter, spongia, vt prædictum est, imponuntur. **ALIVD.** Plumbi scobis drachmæ sedecim, cicutæ, mannæ, cerussæ, hypocistidis succi, singulorū drachma, vino dissolutis in modum prædictum vtitor.

Quomodo impuberes imberbesq; diu maneant, & particulæ naturales testesq; conseruentur, ibidem etiam psilothra numerantur.

Cap. lii.

Cimoliæ cretæ, & cerussæ æquales partes, alterci succo excipiūtur vt sordium spissitudo fiat, deinde oleo lentiscino quantum sufficit adiecto contundito, ac vtitor. **ALIVD.** Cicutæ succum, solani, alterci, lupini foliorum tenerimorum, psillii æqualem modum, ubi contriueris, vtitor, sed locum prius abstergito abluitoq;. Oportet autem pridie quam vsurpare velis, aquam bibere. Medicamentum pilis abolendis dicatum, psilothra appellatum. Asellorum domesticorum, qui tacti conduplicant sese in orbem, pilulæ rotundissimæ si milem, græci κατωικιδίους ὀνίσκους vocant, drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, calcis drachmæ octo, aceti veteris cyathus.

Lixiuia e sicu tantundem, coquito in fictili, ac in balneo vtitor.

ALIVD. Calcis viuæ partibus duabus, auripigmenti totidem, terræ cimoliæ parte vna, in aqua coctis quemadmodum explicitū est vtitor. **ALIVD.** Simplex odorisq; expers, calcis viuæ vtriusque sextarium, sandarachæ vnciam. Coquito vt dictum est, & vtitor.

Porro quæ pilos adimant, in oculariis exposta sunt.

De ramicum generibus.

Cap. liii.

Cum intestina peritonæo rupto deuoluuntur, operosa nimium est curatio, cum vero ob raritatem illius descendunt, facilior sanandi ratio est. Ac huic malo pueri potius, vtpote humidioris naturæ, sunt opportuni, multiq; adeo citra manus operam medicaminibus impositis, & conuenienti deligatura persanati sunt. Utendum vero est remedii infra comprehensis, ubi hoc solum addiderimus, afsectus solo loco differre. Quando namq; intestinum etiam num supra in inguinibus iacet, nostri inguinis ramicem græci, βουβονοκλήν vocant. Cum in scrotum iam infra delapsū est intestinorum ramex, græce ἐντεροκλήν dicitur. Malicorii igitur drachmæ decem, gallæ immaturæ drachmæ quinque, in vini austeri cyathis tribus incoctæ, & leuigatæ imponantur, intestino prius confricato, & aqua frigida superfusa, decimo die soluuntur, sed ita, vt æger in lecto maneat diebus triginta, bibatq; cupressi decoctum cum vino, vel eius globulorum tres oboles, ex diluta vini potione. hoc medicamentum auxiliatur pueris.

admodū quoque vterū fœmini pro minere Arist. dicit. cadere vero negat.

ob id quoque pueri im putes sunt noctu vel interdū etiā vrinæ continendæ, ex nimio humore remittitur retētrix facultas.

N 3

PAVLI AEGINETAE.

Aliud glutinatorium.

neq; ob
stat illud
calidum
plurimū
innatum
pueri ha
bent.

malico-
rium si
d'ov.

a sanis
quoque
hæc im
modica
utanda,
vel me-
diocri-
ter uten
da. cur-
sus tamē
saltusq;
damnat
Gal. ni-
hilomi-
nus mili
tates ho
mines
cursu ac
palestra

SIMPHITI radices, marrubii succi, amygdalarum amararū,
gummi, pares portiones. **ALIVD.** Terebinthinæ fescuncia, ceræ,
thuris, myrrhæ, ichthyocollæ, cochlearum cum suis testis, singulorū
vncia, ichthyocolla in aceto diebus tribus ante macerat. **ALIVD.**
Cupressi galbulorum vncia, gallæ tantundem, malicorii semuncia,
taurocollæ vnciæ tres, mannæ thuris, semuncia, simphty tantundem,
cochlearum cum testis vncia. Galbuli & malicorium vino astrin-
genti diu incoquantur. Et cum reliquis leuigatis excepta, in vsum
accommodato. **ALIVD.** Aloes, malicorii, thuris, hypocistidis
succis, glutini fabrilis, picis, bituminis, singulorum fescuncia, vini dul-
cis quod sufficit. **ALIVD** magis varium, facit etiam adultis cum
morbus vetustatem nondum senserit, chrysocollæ, taurocollæ, sarco-
collæ, ichthyocollæ, lapidis Gagatis, lapidis hæmatitis, thus syriaci,
& coriarii, acaciæ singulorum fescuncia, lapidis pyritis ignem non
expertis, magnetis cœrulei coloris, aluminis scissi, mannæ thuris, sin-
gulorum vncia, picis brutæ vnciæ quinque, cochlearum cum testis un-
cia, argenti recrementi quod helcysma dicitur, vnciæ quatuor, gallæ,
squamæ stomomatis, æris singulorum vncia, bituminis vnciæ sex,
Myrsinati quod satis est. Vino astringente arida excipiuntur, Medi-
camento tam spisso vt digitos non coinquinet, vtitor. Quod si iace-
re non sustineant, triangula ipsos fascia crassiore, quæq; intestina pos-
sit constringere, tuto deligabis. A cibis instantibus abstinendum, vi-
no copiosiore, crebris balneis, valido motu, nempe cursu, saltu, clamo-
re, & id genus aliis.

Ad aquosum ramicem qui hydrocele dicitur,
vt humor collectus euacuetur.

PIPERIS grana centum, lauri baccae octoginta, nitri drach-
mæ viginti, ceræ drachmæ quadraginta, olei heminæ dimidio ex-
ceptis vtitor. **ALIVD** præstantissimum. Lapidis asii floris drach-
mæ sex, vix passæ acinis vacuæ drachmæ duæ. cumini æthiopici
drachmæ octo, nitri rubri tantundem. Trita imponito, fouens vespere
& mane, quidam vero adiiciunt etiam sulfuris drachmas octo.
ALIVD. Calcem viuam balnei sordibus exceptam cum cerato
impones, & paululum nitri calci miscebis. **ALIVD.** Radicis
brasicæ crematæ cinis adipe suillo veteri liquefacto exceptus indu-
citur, per triduum soluitur. † Ne autem humoris magna fiat collu-
uies, hoc vtere malagmate, Ceræ libris duabus & semisse, picis trientem
te, guttæ ammoniaci triente, aluminis liquidi fescuncia. Proficet etiā
medicamentum diagiron hoc est ex populo nigra & reliqua ex-
trahentia.

LIBER III.

† Antiquus codex, πρὸς δὲ τὸ μὴ πάλιν συναλλογῆν ὑγροῦ γενέσθαι,
Ne autem rursus humor colligatur.

De inflammatione testiculi scrotiq; & aliis ipsorum
affectibus.

Cap. liiii.

Scroti inflammatio hisce agnosceretur notis. locus primo cōtactu
indolescit, feruor, duritiesq; intensa apparent. Testiculo autem
inflammationem sentiente non ex leui tactu dolent affecti, sed inni-
xis validius digitis rubor & durities ipsius per summa minor exta-
re videtur, impressis autem digitis durities in alto occurrit, & febris
nonnunquam oritur. Itaq; testiculorum inflammationibus proprie
conuenit sanguis ex talo dimissus, communiter autem omnibus ca-
taplasmata & cerata. Imponi igitur debent ex lomento diluta vini
mixtione cocto cum uuis passis pinguibus acinorum expertibus cu-
mini, vel hastulæ regiæ radix incocta, contritaq; miscetur tenuissi-
mæ parti polentæ æquali, vice cataplasmatidis adhibetur vel lini se-
men ex diluto vino, vel scœnugræcum ex mulsa, vel lilii radix ex
mulsa aut recentibus vini flocibus cum polentæ polline. Vel fene-
cion, & coriandrum viride cum uuis passis quibus acini sunt exem-
pti. Sin multus infestat ardor, foliis alterci cum triticea farina, aut ci-
cerum obducuntur. vel arundinis foliis, vel cucurbita cruda. Si vetu-
stior est morbus cum duritie, cucumeris syluestris radix in mulsa co-
cta, leuigataq; cum lolii farina admouetur. Item hoc efficax est auxi-
lium, vuarum passarum quibus acini sint exempti, vnciæ quinq; ci-
cerum subseruefactorum fescuncia, cumini vncia, sulfuris vnciæ no-
uem, nitri vncia, resinæ vnciæ tres & semisis. contrita omnia cum
melle in cataplasmatidis formam digerens, vtitor. cerata autem hæc
sunt, olei cyathus, colophonix vnciæ sex, plumbaginis, cumini, vua-
rum passarum, lomenti singulorum triens, ceræ sextans. Plumbago
cum oleo adusq; aliquantulam spissitudinem incoquitur. deinde ce-
ra resinæq; inditur. Sublata ab igne semifrigida, uuis passis contritis,
farinisq; superfundito. **ALIVD.** Olei anethini & rosacei, ceræ, re-
sinæ piceæ, singulorum quincunx, cumini vnciæ duæ & semisis,
stercoris asinini fescuncia. cuminum teritur cum stercore asinino, ce-
ratumq; refrigeratum miscetur vnaq; leuigatur, deinde in panniculū
illitum admouetur, lana superaccommodata. olei omphacini, vel bu-
tyri, vel resinæ æquali modo vtitor. Quod si a sudoribus vlcera in
scroto excitentur, gallam detritam, vel alumen inspargito, pingui
aut hircino felli & perungito. Porro ad testes aphtæ vlcere pres-
sos, terram cimoliam cum aqua prius illitam, finito siccescere, ca-
lidaque aqua abstergito, myrrhum siccam, & smyrni paulum in
puluerem redactum applicato. Si caro in testiculis excreuerit,

N 4

exercē
dos pēi
pitFlau.
Veg.&
Polyb.
more
spartano
rū, apud
quos uir
gines
quoque
vrsibus
exerce-
bantur.

PAULI AEGINETAE

cinis sarmentaceus nitro & aqua maceratus curat inductus. Pruritus scrotum irritante, nitrum, pedicularia, Græci staphisagriam appellat, alumen liquidum, aceto cōtritum, rosaceoq; illinitur in balneo. Vbi laueris, candidus oui liquor cum melle parti inungetur.

De seminis profluuiio & veneris insomniais. Cap. lv.

medita
tionēs
quoque
Vene-
reæ dicitur
huic
morbo
plurimū
obfunt,
itaq; tra-
ducenda
mens ad
aliā co-
gitatio-
nē. com-
munis
aut hōi
& fœmi-
næ is
onirog-
mus vt
test. Ari.
Is mor-
bus a li-
bidino-
so gene-
re satyro
rū dictus
quāquā
iplos g-
dam esse
negant.
Porro il-
lud Pla-
tonis te

Seminis profluuium quod græce γονόρροια appellatur, est inuita-
tione præter voluntatē excretio, quæ continue naturalibus non
intensis, ex retētricis naturæ facultatis imbecillitate prouenit, in qua
ex usu est conquiescere, lumbos pubemq; hapsō ex vino & melino
vel cœnanthino contegentes, mox cataplasmatibus obducere ex pal-
mulis, malis cōtōneis, cœnante, acacia, hypocistide, rhu, & similibus.
Insidere oportet lentisci, rubi, & id genus aliorum in vino decoctio-
nibus, vel etiam, aquis cibisq; vti siccantibus, post prima morbi tem-
pora ad exercitatoriam rationem deducere, qua totum corpus, par-
tesq; affectæ confirmentur. Cæterum quomodo seminis paretur fœ-
cunditas, libro primo, vbi de sanitate tuenda agitur, abunde tractau-
mus. Vbi etiam illorum qui venerem exercere nequeunt, scripta est
curatio, item quæ ad veneris insomnia proficiant. porro iuuabit ge-
nituræ profluuiio laborantes, & lectus frigidior, & dextri lateris, uel
sinistri incubitus, item medicamenta frigida lumbis substrata, qualia
sunt coriandrum, cicuta, cerussa, portulaca, omnia vero ex aceto.

De satyriasis. Cap. lvi.

Satyriasis est naturalium palpitatio, quæ cuidam seminis vasculo
rum inflammatoriæ affectioni cum intentione superuenit. Hæc
palpitatio nisi finiatur, in seminariorum vasorum resolutionem, aut
conuulsionem delabi consuevit, ac qui conuulsi fuerint, celeriter in-
tereunt. obeuntes autem ventre inflantur, & frigidum sudorem emit-
tunt ac mulieribus quoq; sed raro hoc mali accidit. sanguinem igitur
protinus dimittere conuenit, victu vti tenui, & abstemio, eumq;
assumere quotidie, valenter nunquam sed paulatim. Laudatissimum
igitur est remedium, beta, malua & mercurialis momentum, & ius
esculentum cochlearum, nil mali fuerit etiam ex simplicib. clysterem
ab inferiore parte iniicere. Quæ vero vrinam mouent, medicinæ ca-
uendæ sunt, lumbis refrigerantia quoq; admouere oportet, vt solani
succum, aut portulacæ, aut alterci, aut cicutæ. Necesse vero est, colem
& inter anum, scrotumq; locum refrigerantium, quibus leniendi vis
inest, aliquo demulcere, nempe argenti spuma cimolia creta, cerussa,
aceto dilutis, aut aqua, aut vino dulci, aut sapa. supino cubitu conque-
scere nocuum est. Rursus confert bibere nymphæ radicem, ridem,
& adiantum. Rutæ venæ vero succi potus profuerit, & seminis
profluuiio laboranti, & cui naturalia sunt arrecta. Cibus datur frumē

taceus modicus, fittis indicitur. At si prorogatur vitium, cucurbitulæ cute ferro incisa defigendæ sunt. Si plenitudo adsit etiam hirudinibus vacuare, & ventrem cruda ordeifarina oblinere, alienum non est.

De priapismo.

Cap. lvii.

PRiapismus est firmum genitalis incrementum, quod in longum latumque intumescit, citra veneris appetentiam. flatulentus nimis est spiritus qui particulam in tumorem attollit, ex humoribus crassis, & viscosis modici caloris opera procreatus. Notum vero est cui libet, particulas non esse calcificandas, sed leniter refrigerandas cerato rosaceo, cum aqua confuso, item chamæmelino cerato in genitali & lumbis imposito, victus & medicamenta exhibentur, quæ extenuare citra manifestum calorem possunt. Applicabuntur etiam quæ naturali modo operantur, experimentis ac usu probata. Nymphaea igitur potui dabitur, viticis semen, rutæque viridis obsoniis mixtum. Sed per initia id non assumi debet, ut quod vehementer calefaciat, verum post aliorum extenuantium usum. Si vacuatione uti libeat, per vomitum id facies. Nam per aluum factæ, vicinas particulas sæpe fluxioni oportunas efficiunt. Exercitium frictioque flatibus discutiendis recte adhibentur. Nulli prædictorum venus prodest, nisi quibus ex huius abstinencia semen abundare coniicimus.

De particulis inefficacibus.

Cap. lviii.

Qui hoc vitio laborant, non ruunt in venerem, eoque pusillanimes sunt. Causa horum est, particularum resolutio, vel seminis inopia. Cum igitur ea quæ semini generando sunt, libro primo inter præcepta salubria exposuerim, tum quæ simplici virtute ad venerem incitant, nunc valentiora adicere oportet. Communiter igitur medicamentis quæ a lasitudinibus reficiendis, acopa dicuntur, ad resolutionem inscriptis, hic quoque utendum est. Priuatim stellio concretus, in pulveremque redactus cum oleo magno dextri pedis digito illinitur, & venus exercetur, ubi cessare voles, digitus abluatur. Iam medicamentum ex stellionibus varia constans mistura efficax est. Potui vero dantur quæ incitant, quale hoc primum est. piperis, baccarum pini, petroselini, ceruini genitalis ramenti, terebinthinæ pares portiones. melle excipiuntur. **ALIVD** Cicerum crudorum, baccarum pini, singulorum vnciæ duæ, seminis erucæ, piperis, singulorum vncia, mellis datur quod drachmas duas impleat cum vino. Item satyriace dicta ex multis composita congruet, atque id genus alia. Inspicere præterea oportet reliquas morbi causas, & conuenientem ipsis correctionem accommodare.

Pudendorum & ani remedia.

Cap. lix.

nendum
maxi-
mā sen-
tiēdi uir-
tutē mē-
bris ge-
neratio-
ni dica-
tis inge-
nuisse na-
turā ad
sobolem
ppagan-
dā, adeo
ut pudē-
dum mu-
liebre
aīal ap-
pellaue-
rit Plat.
est quo-
que in fa-
cie mor-
bus qdā
hoc no-
mine
στυγία
ob hu-
moris in-
cocti flu-
xum in
quasdā
oris pas-
tes. ex
quofa-
ciē cuius-
dā satyri-
ppemo-
dū habe-
re videt.
Arist. in

PAVLI AEGINETAE.

Naturalium aniq; vlcera citra inflammationem oborta, medica-
mentis indigent, quæ vehementer reficcant, cuiusmodi sunt ex
charta combusta, anethum vstum aridum, cucurbita concremata. At
ficcis recentibusq; vlceribus, etiam aloë præsens est remedium, si ari-
da in puluerem redacta applicetur. Porro omnium lenissimum est,
& nihilominus efficax pompholyx. At si humidiora euenerint vl-
cera, piceæ cortex per se lapis hæmatites. sin etiam alte descende-
rint, manna prædictis miscebitur. Si pascendo serpant, lenticula cum
malicoriis inducetur, vtendumq; est Coraco ex oxymelite appella-
to, & bithyno, adhæc, eo quod ex charta vsta componitur. Rimas
autem naturalium sedisq; Græci vocant rhagadas, iuuat resina fric-
ta, cum rosaceo contrita, vt sordium fiat spissitudo, adiecto etiam lu-
teo oui, opioq; vel hederæ foliorum combustorum cinis cum rosa-
ceo in plumbea pila tritus admouetur. Iam pastillus ex œnelæo, &
lapis phrygius admodum probata sunt remedia ad rimas, tum sordi-
da circa ani orbem vlcera, præsertim quæ elidi nequeunt. **ALIVD**
simplex quod etiam acrimoniam obtundit. Cadmiæ combustæ, elo-
tæq; vnciæ duæ, rosarum vngue ex foliis desecto, vnciæ sex. puluis
inspergitur parti vino prius abstersæ. Ad condylomata vero faciunt
chalcitidis, œsypi, medullæ ceruinæ, rubi foliorum æquales portio-
nes cum cerato, idem præstant pastilli ex œnelæo. Quod si in cole
intra genitalis foramen vlcus delituerit, pus, vel sanguis citra vrinā
redditus fatebitur. Curatur primum aquosa mulsa collutum, mox la-
cte, postea collyrio Asteri lacti mixto, aut pastillo Leuco, aut is qui
vocatur dialotarion in plumbea pila subactus demittitur, vel etiam
penna tincta perlinitur. inde tenue linamentum tertile vinctum im-
ponitur. Præstantissimum vero est etiam quod capit gallæ, pompho-
lygis, amyli, & aloës pares modos, rosaceo, & plantaginis succo le-
uigatos.

plātago
κρό-
γλωσσον.

Ad naturalium dolores.

BVTIRI, resinæ, paribus portionibus pulchre liquatis obdu-
cito, vel ex seminis linis succo, æquum myrrhæ & resinæ frictæ pō-
dus leuigatum imposito.

Ad intumesc. entia pudenda.

Vitis foliorum tenerorum triginta numero, cerussæ drachmæ qua-
tuor trita applicantur. Cæterum fotu ex aqua marina frigida co-
les vtitor & quiete, penemq; deligato. Carnosas naturalium excre-
scentias, quas Græci thymos vocant, compescit, nec finit rursus auge-
scere cinis palmitum cum aceto cataplasmatibus modo illitus, item fa-
licis corticis combusti cinis. In vniuersum & thymus, & myrme-
cia, & verruca pensilis quæ dicitur acrochordon per medicamenta

valenter exulcerantia eliduntur, his autem quæ exedunt, emoriuntur. Proprie contra hæc vitia proficit, elaterium cum sale impositum, grosfi cum aceto, nitro & farina. Liqueor fici illitus, smaridis caput falsum crematum in cinerem, ærugo cum sulfure viuo combusta, thymalli liqueor illitus, ocymi folia cum atramento sutorio, vel helio tropii maioris semen cum vino cataplasmatibus modo applicatum.

Ad ani inflammationem.

CERVSAE vnciæ quatuor, pompholygis vnciæ, vel cadmiæ teneræ, thuris singulorum vnciæ, sereos succi hemina diluuntur, succus autem paulatim affunditur, donec absumatur. Deinde ceratum ex vnciis duabus ceræ, & rosacei libra confectum, ubi deraferis, miscetur, valideq; emollitur. Demittitur autem instrumento quod a pure trahendo πρὸν λακὼν Græci nominant, & superdeligatur, facit autē & ad ani fissā cum inflammationem sentiunt, item aduersus sedis exulcerationes, cum ardore, aut rosione infestantes.

Ad sedis erysipelata.

MEDICAMENTI, quod ab herbærum succis diachylon appellatur, libra, rosacei quantum satis est, panis puri libra, croci vnciæ, opii vnciæ, crocus & opium passo macerantur, panis aqua. Deinde leuigatis ipsis, medicamen diachylon, & rosaceum admiscetur emolliturq;. Vtile est etiam ad podagras calidissimas. **ALIVD**. Arcet etiam ani inflammationem cerussa cum vino rosaceoq; in pila plumbea, & cochleari plumbeo trita inunctaq;, vel cerussam & oui candidum rosaceumq; in eadem pila leuigata, dum sordium spissitudinem habeant, perungito.

Hedricum ad ani dolores.

ALTERC I folia tenera, portulacæ folia tenera, micas panis in vino tinctas, ouorū tostorum lutea pari pondere, rosacei quod satis est. ubi locū rosarū & meliloti decocto foueris, cataplasma imponito.

Hedricū optimū ad ani inflammationes, eiusdemq; excrementas.

CERVS SAE, spumæ argenti, suffiminis ammoniaci, bdellii, singulorum scrupula sex, terebinthinæ vnciæ, ceræ semuncia. Arida succo solani, alterci, vel portulacæ conteruntur. Quæ liquantur, ubi illis adiuncta fuerint, excipito. Et emollitis rosaceo, vititor. Iam medicamen phicotiche. & dia molibdenes adhæc dialotarion. Præterea pastillus dia halicabu & dia rodon ad ani inflammationes genitalemq; laudata sunt remedia.

Ad excrementas ani.

EXCRESCENTII S si inflammatio adest, utendū generatim iam commemoratas, & proprie hoc pastillo, cerussæ quadrans, pompholygis vnciæ, argenti spumæ sextās, mastichæ scrupula sex,

pruritu quoque hæc partes sedis & ascaridibus plerūq; laborare solent, qd' prauis humoris vestigia iter excrementa laetitia ibi inhaerescunt, & uellit mordacitudo locū.

PAULI AEGINETAE

alterci succo excipiuntur. Si careant inflammatione, cupressi galbulorum combustorum cinis loco dolenti, vino prius absterfo inspargitur, vel cucurbitæ aridæ corticis combusti, vel palmularum nucleorum cinis similiter, vel testarum ouorum, & fœniculi cinis, vel succi mali punici foliorum, æqualis modus. Vino albo deterfa pars diebus septem eluitur. callosa autem tubercula calce & auripigmento cum aceto acri trito recte etiam in sole perungis.

De hæmorrhoidibus.

O R I S venarum, quæ quod sanguinem fundere solita sint græcis αἱμορροΐδες appellantur, iusto largius inanitis, habitum in aquâ subter cutem resolui contingit, & affectos, infelicitèr contabescere, periculum vero est, etiam ne largum sanguinis profluvium accadat, quemadmodum ne idem in totum supprimatur, unde laboriosa est curatio. Quare cum plures sint hæmorrhoides, vnam purgationis gratia relinquere oportet. Quædam vero superius existunt, non apparentes, eoque difficilem curationem recipiunt. Cæcæ autem nihil quidem excernunt, sed dolorem mouent acriorem. hæ itaque succo cyclamini illito adaperiuntur. Contra eas vero quæ immodice fundunt sanguinem, spinæ ægyptiæ, foliorum sambuci, artemisiæ, singulorum vnciæ quinq; sideritidis vnciæ quatuor, coquuntur in aquæ heminis octo ad dimidias, inde herbæ prouiciuntur. aquæ vero miscetur puluis hic, cretæ sutoriæ, aluminis rotundi, singulorum drachmæ octo, argenti spumæ drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, misyos drachmæ duæ, fereos tantundem, vbi puluerem decocto solueris, septies quotidie irrorato. Insecuto die pari modo aliam confectiorem mensura æqualem superfundito, sic tertio. Et si reliquæ aliquæ remaneant, quarto die acu compunges, si sentiat æger, aut cruor emanet, decoctum similiter facit. pulueris vero partem dimidiam miscebis. Cum foueris, puluere attingito, vt exacte adurantur. panis ob inflammationem, instar cataplasmati inducetur. **A L I V D.** Panis purus in garum primæ notæ tinctus, vsusq; in nouo fictili, & pertrititus applicatur, ano prius vino abluta. Facit etiam ad excrescētias. **A L I V D.** Sereos drachmæ duæ, chalcitidis drachma, misyos tantundem, atramenti sutorii quod chalcantum dicitur drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ nouem, æris combusti drachma, cretæ sutoriæ drachma. sicco utitor. Cibi erunt iis qui supramodum inaniantur, pauci sanguinis efficaces, & minime recrementitii, quique siccant, & astringunt, cuiusmodi est chondrus ex posca lotus, oryza & alia. Ex oleribus conueniunt intybus, cichoreum, portulaca, inter vina, quæ astringunt. In hæmorrhoidibus autem obcoecatis, his contra rursus uictus proderit, potissimum uero lolliginum, sepiarum, multipe-

portula-
ca αὐ-
δ' ἑξ' αὐτῶν.

darum, torpedinis, selachiorumque esus probe conveniet, hæc enim sanguinem commouent, item quæ mensibus ciendis sunt, hisce congruunt.

Ad procidentem anum.

ERICAE fructus, gallarum, cerussæ, acaciæ, hypocistidis succi, picæ corticis, thuris, myrrhæ minæ, paria pondera. Sicca ad-
moueto, ano uino prius austero deterfa. **ALIVD**. Recrementi plumbi, rhus syriaci, singulorum drachmæ octo, rosarum floris drachmæ quatuor, myrrhæ minæ drachmæ duæ. Vtitor sicut priore.
ALIVD. Picæ corticis, mannæ, spumæ argenti, singulorum drachmæ octo, cupressi orbiculorum siccorum, plumbaginis singulorum drachmæ duæ, utitor quemadmodum præceptum est. item urina ipsius ægri calens adhuc superfusa adiuuat.

De uteri affectibus & primum de mensium purgatione.

Cap. IX.

Mulierum plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucis uero ante tertiumdecimum, aut duodecimum. plerisque autem post quartumdecimum erumpunt. Tēpus cuique purgationi præfinitum non est, ordinatumque, multis ad duos tresue dies, haud paucis usque ad quintum profluit, aliis etiam ad usque septimum, raro ad duodecimum purgatæ sunt. Porro desinunt mēstrua aliis anno quinquagesimo, paucis autem usque ad sexagesimum durant. Nonnullis a triginta quinque annis, præsertim obesis, menses cessare incipiunt. morata igitur purgatione, lauandum est circa statum mēstruale tēpus, ac præsumetur potui, aut sesamum, aut capitatum porrum cum pipere, & ruta simul incocta. Potio autem ex passo cretico erit, cuius heminæ mensura pota ambulationibus mēstrua dimoueantur. Cibus sit, lolligines, sepia, polypodes, & quæ eiusdem sunt generis quippe sanguinem proprie commouent.

De mensium suppressione.

SUPPRIMITVR menstrualis purgatio interim toto corpore male affecto, nonnunquam uero locis peculiari uitio conflantibus ex frigidityte insita, aut ictu aut intemperie ab origine seu acquisita malignitate, magna uero parte ex abortu uel principaliore quadam parte primaria affecta nempe iocinore aut uentriculo aut thorace aut id genus aliqua longo morbo uitata. At suppressio complures affectus, & longos solet procreare. Cum igitur propter aliquod interaneorum affectum primarium purgatio circunciditur aut morat, ex usu maxime fuerit id quod primario afficitur curare, inde uteri habere rationem. Notæ uero quibus hæc deprehenduntur in superioribus sunt expositæ. Cum uero nihil illorum adfuerit cō-

quō car-
dere a-
nus dici-
tur sicut
uulua,
hoc est
quum re-
misso or-
gano p-
cidisse
quasi ui-
detur.

ga orus
que ad
quinqua-
gesimū
annū ge-
nerāt sal-
tē usque
ad qua-
draginta
quinque
annos.
Arist. s.
de aīal.

PAULI AEGINETAE

ad co-
gnosce-
dam to-
tius ute-
ri naturā
proficit
lectio li-
bri deci-
mi Ari-
stote. de
animal.

stat palam primario affectu vterum occupari. Itaque si ætas non pro-
hibet, aut habitus, aut aliud quippiam, venam oportet incidere, idque
non ante statum mensium tempus, sed vbi iam præterierit, de cæ dies
superadiciantur. Detrahetur autem sanguinis, neque plus duabus li-
bris & dimidia, neque minus vna, si quidem venam diuiserimus.
Sin autem non, hiera diacolocynthidos purgari debent, duarum drach-
marum pondere, in sex mulsæ cyathis. Si febris adsit, hiera quidem
vbi non expedit, verum sanguinem mittere in primis febriculæ die-
bus est opportunum. A purgatione reficiendæ sunt mulieres diebus
pauculis, in sequentibus autem, exercendæ obambulationibus, infe-
riorum frictionibus, & balneo. Cibi congruunt distribui faciles, &
liquidi, olera, dulcia omnia, pisces saxatiles, ex auibz teneriores, la-
ctis potio, ex melle confectiones, μελιττώματα vocant, vinum te-
nue, album, non adeo vetustum. carnes inidoneæ his sunt, & legu-
mina, præter ptisanam. Vbi statum mensium tempus propinquum est,
dantur ex marinis selachia, & malachia, vt dictum est, item ostraco-
derma, hoc est testaceam cutem sortita, capitata porra, cum ruta &
pipere cocta, eorumque ius potui datur, infernæ partes vinculis, tribus
quatuorve diebus constringuntur. Cum instat tempus purgationis,
tollitur deligatura, myrrhæ obolus bibitur, aut fabæ instar, vel casto-
rium ex passo, aut mulsæ, vel decoctum artemisiæ, aut saluæ post bal-
neum ex passo, & absynthii. Absynthites autem vinum per totius
curationis decursum potatur. Vbi accesserit iam menstruale tempus,
si nihil, aut nulla mentione dignum fuerit excretum, ex talo sanguis
detrahendus est. Post septimum, aut octauum diem, purgatione ex
hiera vtendum est, secundum quartum diem, dropax inferiori ven-
tris regioni, lumbis & feminibus applicetur, atque aquæ potu tri-
duum vsa, sinapi cum æqua panis macerati portione adusque æqui-
noctium admoueat, deinde lauet, in secuto mense ficus siccata in vicē
panis misceantur decocto fœnugræci, maluæ, pulegii, rutæ, & arte-
misiæ. In sinum vero demittetur, susinum, aut amaracinum, pessusque
inferatur enneapharmacus, aut libanius. Est autem pessus lana con-
cerpta, & in rotundam, digiti humani formam redacta qua medica-
menta contineantur. Hæc igitur curatio plerisque ad purgationem
abunde fuit. Sin autem vehementioribus indigerit medicamentis,
hæc sunt, iris illyrica cum vino pota, iunci angulosi, atque radix, ca-
ssia, iunci rotundi flos, & nardus, helenii radices decoctum, myrrhæ
ad fabæ Græcæ magnitudinem cum passo ex dimidio mulsæ cyatho
pota, atque dictamni decocti cyathi duo, item ammoniacum, & sa-
gapenum. Quæ minus stomachi vitis sunt opportunæ, etiam opo-
panacis paululum in globulos redactum percocto melli intinctum,

iuncus
angulo-
sus κύπε-
pis.

assument. Iam vero consueta nobis semina menses mouere possunt, sed minus, foeniculum, cuminum, apium, daucum, creticum, seseli ami, sison, cicer, fructus cedri, ac omnia quæ urinam prouocant. Commo de etiam sinui muliebrium imponuntur myrrha, absynthii aut lupi- norum decocto trita aut rutæ succo leuigata, bdelliumq; similiter, sty- rax syluestris oleæ gummi aut rutæ succi, itidem, aut longa aristolo- chia in collyrii formam concinnata. Per similitur etiam magni cen- aurei radix aut veratri aut liquor scammoniae, & cucurbitæ sylue- tris medulla per se, & artemisia applicata cum ruta insuper & gal- banum suffumigatum. Eadem vero & foetus solent educere.

De immoderata purgatione vteri & sanguinis
profluuiio.

Cap. Ixii.

Modicæ purgationes mulieribus oboriuntur, interim mensibus
Ladauctis consarctimq; ac concitatus erumpentibus, interim ob le- gitimum partum quæ plerumque etiam sponte sua cessant. Crebro au- tem abortus causa, vehementi laborant profluuiio vt subinde pericu- um accedat. Imprimis igitur extremi artus ab alis & inguinibus rinculis excipiuntur. Posca nō frigida potui datur, muliebria ex ea- dem fouentur, & iniiciuntur locis multæ lanæ ex vino oleo vel ro- aceo uel melino uel myrteo expressæ. Cibus dabitur chondrus lo- us ex posca, vel oryza, vel alica, vino autem abstinebitur, & hydro- malum austerum, aut omphacomeli, aut huiusmodi quippiam ipsis exhiberi debet. Balauitium in posca propinari, vel hypocistidis, vel acaciæ succus, vel lycium, vel samius aster, vel succus immaturæ uuæ iccus, vel rheon, uel lenticulæ ex Italico fictili combustæ cinis, aut esamum editur in posca maceratum, quoad molle delicatumq; eua- erit, insinuati vero pessī per naturalia, sanguinis fluorem sistunt, hy- pocistidis succus, aut acaciæ cum manna in aceto contritæ. Mirifice uxiliatur spongia in uino, aut liquida pice demersa, pessarii modo dhibita, uel combustæ ipsius cinis cum aceto, uel posca eodem mo- lo insinuatus. Similiter etiam suberis in Italico fictili concremati ci- is. A foris autem imposita iuuant astringentia epithemata, & cata- olasmata ex palmulis, & cotoneis, quæ malicoria receperint, aut fa- eam glan dem, aut rubi surculos, aut lentisci folia, balauitium, aca- iam, hypocistidem, gallæ modicum, alumen. Maxime uero hoc, aurocolla madescit posca quousque soluatur. deinde in linteolum ua- idum illinitur lumbisque agglutinatur. Efficacia ad hoc sunt & glu- nantia emplastra ueluti Armonia, Icesios, Athene, Meline, Indica, & similia. Pessulis quoq; ad sanguinis profluuium uti oportet. Gal- æ interius leuigatum, & thuris lachryma aqua diluta naturali-

PAULI AEGINETAE

bus inferitur, uel cytini, uel mala punica dulcia similiter, uel polygonum tritum. Composito autem, aluminis scissi gallarum interioris, acaciæ succi, mannæ, singulorum uncia quatuor, ouorum tostorum lutea quatuor, arida leuigantur succo plantaginis, miscenturq;. Cum uisus exigit, excipiuntur in pessum ex lana, & in rosaceum intinguntur, insinuantq; naturalibus. Iam cucurbitulæ leues magnæ frequenter subter mamillas affixæ abunde retrahunt. Infusus autem profusio sanguinis laborantibus conuenit, ex marino iunco, Græci uocant oxychoenū, capitibus myrti, rosis, rhamni foliis, rutæ furculis, æqua li pondere in aqua coctis insidere iubeto. A L I V D. Mali punici dulcis radicis corticis, myrti, cupressi corticis singulorum tres partes, gallæ pars una, aquæ quod satis est. Infundito autem per uterinū clysterem succum plantaginis, aut sereos, aut polygoni, aut solani, aut perdicis herbæ, aut psylli, aut hypocistidis, aut acaciæ, eaq; lana aut digito aut specillo, aut pinna in longitudinem figurata, aduicium imponatur. Insuper pastillus Andronis per uterinum clysterem infusus cum quodam ex succis commemoratis, aut uino astringente efficacis est remedium.

De fluore muliebri.

Cap. lxiii.

ad co-
gnosce-
dā uul-
uæ natu-
rā & ge-
neralia
quā ip-
sius eue-
ta lib. 7.
Arist. de
hist. aīal
confit
plurimū

Vluxe fluor, totius corporis quod expurgatur est destillatio. Talem uero speciem id quod euacuatur, repræsentat, qualem etiam humor in corpore superans obtinet. aliud rubrum, ueluti sanguinis sanies, aliud candidum, pituitæ soboles est, pallidum aliud, quod bilem testatur, aliud uero aquosum. at si sanguis purus, sicut in uenarum sectione efferatur, attendendum est accurate, ne quædam in uulua erosio sit excitata. his notis fluor deprehenditur, loci continue madent humoribus, colore uariantibus, laborans decolor est, cibum non sentit, eumq; fastidit, in obambulatione difficulter spirat, oculos habet prætumidos, nunc cum dolore, nunc citra illum, aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida aut pura. Toti igitur corpori auxiliantur quæ citra manifestum calorem exiccant cum affectus sit humidus frictio totius corporis, & unctio ex melle abunde cocto medicamina dantur urinam cientia utpote, aqua cui asarum & apium sit incoctum. uacuatur etiam totum corpus per aluum prætereaportulaca commanducata succusq; ipsius potus præsidio est. Item balauitium rubi fructus & flos, quercus liber qui cortici ligni subiacet & tunica glandis putamini subiecta. Equisetum maxime sistit rubrum fluorem potum ex aqua aut uino. Vel hypocistis, lentisci fructus torrefactus cum uino sumptus, samius aster, lemnia sphragis, coagulum leporis aut hœdi aut ouis aut uituli aut cerui uinacea trita myrti uua immatura sicca piceæ cortex. & quæ ad uuluam sanguinis

nis profluuiū laborantem dicta sunt, non admodum efficacia. Vbi vero cū labore fertur, per syphonem vteri, clysteremue alicū succū, aut ptisanā, aut tragi, aut oryzæ demittes cum aliquo medicamentorum quæ dolorem sopiunt, αὐτόδυνα Græci vocant, & in accessionibus quidem lenire oportet, cum autem remittit, circuitū enim nonnūquam habet, habitum corporis mutare noxium humorem euocando expedit variis gestationibus, obambulationibus, vociferatu, inunctionibus, cucurbitulis, dropacibus ad partes superpositas vinculorum iniectionibus, frictionibus, psilothris, smegmatis, sinapismis, vomitibus a ridicula victus ratione viribus recolligendis dicata, balneis, vino, vario ciborum genere.

De inflammatione vteri, & declinatione. Cap. lxiii.

Inflammatio vulvæ, pluribus ex causis oboritur. nempe ex ictu, mensium retentione, frigore, & inflatione, adeoque ex abortu, & quoque finistram partus editionem. Comes inflammationis vulvæ est febris acuta, dolor capitis, tendinis basis oculorum, brachialis, digitorum, & colli deorsum retractio, declinatio ad opposita, stomachi ex consortio dolor, oris vulvæ conniuentia, pulsus exigui, crebrique. Et si languida fuerit inflammatio, haud valido ipsius vteri dolore torquentur. Sin vehemens, & ipse totus pulsatilem cruciatum percipit, vndiquaque inflammatione obsessus. si pars ipsius illam sentit, in ea magis dolor intenditur. nam si posteriora ipsius solum laborant inflammatione dolor lumbos inuadit, stercus languone compresso, retinetur. si priora, dolor inferiorem ab umbilico ventris regionem occupat, & stillicidium, aut urinæ difficultas vesica pressa excitatur. lateribus inflammationem expertis inguina tenduntur, & crura grauantur. Extrema ac fundum vteri parte inflammata, in umbilico dolor potissimum cum tumore infestat. Cum vero os vulvæ inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoque immisso os occurrit durum rigidumque. Itaque in curatione primum vsui ventris regionem & lumbos per hapsū ex lana puriore citra deligaturam adhibitis. Cibo abstinetur triduum, secundum quod sanguis ex cubito mittendus est, si nihil prohibet. alendæ sunt chōdro ex aqua mulsā, vel pane, vel ovo scorbili, vno die interposito. Post quintum, cataplasma superaccommodatur, polline farinaceo, semine lini, foenugræco, ex mulsā, in qua papauerum capita decocta, reiciātur, & oleo. at si inflammatio erysipe latis naturam sortita excādecit, meliloto in passo cocto tritoque ouorū tostorū lutea adiecto cū rosaceo, vel melino, vel crocino, & cataplasmatibus modo adhibeto, aut palmulas vino temperato seruefactas, cum polentarum polline,

spasmatē quoque uterū laborare. Aristot. scribit iis vbi. cōcipere & foeminae prohibetur, si spasma habuerint. Fit autē spasma ī vtero vel inflammatione extēta vuluā, uel quā a partu copia humoris plurima infedēt, neque ostiolo aperto se eiecerit. quā tūc a beatēfione humoris spasma oriē.

PAULI AEGINETAE

& quoddam ex enumeratis vnguētis leuigato, applicatoq; in morbi declinatione ceratum nardinum, aut cyprinum iniciendum est. Per totum vero morbi decursum, etiam infessus vtiles sunt ex decocto foenugraeci vel seminis lini, maluae, artemisiae, & oleo. In iis autem quae non sustinent calorem, ex aqua calida rosaceo superfuso, pessos autem in usionesq; adhibere conuenit ex œsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, vnguento susino, & cera thyrenica. in quibus autem calorem ferunt, etiam pessus qui ab aureo colore chrysus nuncupatur, ipsis conueniet, item enneapharmacus, rursus in quibus non tolerant, ex ouo, rosaceo, adipe anserino, vel gallinaceo adaptabitur. Porro ad inflammationes magis furibundas emplastro dia chylon quod est ex herbarum succis in vase fictili cum rosaceo liquefacto miscetur succus plantaginis, vel sereos, vel cichorii, vel intybi. Aut hoc vtere, adipis anserini, vel suilli recentis drac. quatuor cerati rosacei, vel susini sextante, ouorum tostorum luteorū vncia, croci drachma, myrrhae tribus obolis, opii obolis duobus, vel loco opii, papauerum capitum decocto, si dolor multus ex cruciat, lachrymae papaueris instar lenticulae cum lacte muliebri, & succo foenugraeci in pello subiiciendum exhibeto. At si inflammatio cum duritia infestat, tetrapharmacum rosaceo solutum, applicatur, vel infunditur. Si a naturali sede vulua declinauerit, per accessiones similem inflammationibus curationem recipiet. vbi vero remittitur dolor, & declinat, leuioribus vtendum. Quod si malum inueterauerit, noxia ex alto euocantibus vtendum, quae metascritica dicunt. Extrinsecus autem duritiae oborta, malagmatis pugnandum, nempe dia melilotu, hoc est ex fertula campana confectio, item Mnasei, lcesi, melinae Serapionis, aut pyrinæ, victus autem per initia tenuis adhibetur. Vbi paulum declinauerit malum, ægrotantes ad balneum ducentur, varioq; magis cibo & pleniore nutriendi.

De vuluae abscessu.

Cap. lxxv.

Inflammatione in abscessum transeunte, diutae quidem notae intensiores erunt. Præterea vero inordinatae febrium cum horrore accessiones obueniunt primis quidem temporibus intensae, cum doloribus. ad vltimum, vbi suppurauerit, aliquantulum remittunt. Postquam vero erumpit vomica, dolores acriores subinde visi sunt ceu lancinantes & punctus modo incidere, febriculæ vehementius infestant. Atq; vrina nonnunquam retinetur, nonnunquam stercus, impedimento ab affecta vteri parte facto. Alias tumor in pube eminet, & veluti exundationis sensus cum abscessus maior fuerit. At

quod in expositis locis est, etiam instrumento ad perspicendum in-
 iecto, aut digitorum tactu deprehenditur præterquam quod dolo-
 res ob neruolam oris vuluæ membranam acriores vrgeant, sicut in
 fundo sinūq; minus doloris percipitur, & digitis quidem tumor nō
 occurrit, os autem gracilius ostenditur. Suppuratio itaq; celerius ad-
 iuuanda est cataplasmatibus ex fœnugræco, semine lini, farina hor-
 deacea, aut frumentacea, cui ficus coctæ adiciantur, inter im & ster-
 tius vtendum. Item pessulis ex terebinthina, mirrha, æscypc, butyro
 conueniunt. Abscessu autem rupto, si ad vesicam pus euaserit, la-
 ctis & cucumeris seminis potu vtendum est, sin ad longanionem
 ruptus sit, lenticulæ & malicorii decoctum indetur aluo. At si in si-
 num pudendi eruperit, mundum quidem a pure, rosaceum infunde-
 tur, aut caudidum oleum, aut tetrapharmacum regale, aut butyrum
 recens. sin autem offeratur sanies tenuis, fœtida, ceu ab vlceribus de-
 pascentibus, magis astringens erit enema ex myrto, palmulis, & lē-
 ticula. Si vero humoribus etiam excretis, inflammatio diuexet, per-
 sistere in cataplasmatibus, & infelsibus, ratio est. Cæterum si in vuluæ
 ostiolo abscessus sit obortus, neq; rumpatur, partibus, quæ puri in-
 cumbunt, extenuatis, ad puris excretionem, que manu administra-
 tur, diuertere consilium est, vt in chirurgica pertractabimus.

De vteri exulceratione.

Cap. lxvi.

EXulceratur subinde vulua ex infelici partu, aut fœtus extractio-
 ne, aut eius corruptela, vel ex medicamentis acribus, vel fluore,
 vel abscessibus diruptis. si igitur prompta in conspectum uenerit
 exulceratio, instrumento locis inspiciendis idoneo deprehenditur.
 sin alte defederit, ex iis quæ excernuntur. Humor enim diuersus ex-
 cernitur, ex inflammato quidem ulcere, paucus, cruentus, aut fœcu-
 lentus cum magno dolore, ex sordido autem copiosior, et sanies cū
 minore cruciatu, depascente, fœtidus niger cum doloribus uehemē-
 tioribus, aliisq; inflammationis signis, iam quæ laxant medicami-
 na irritant, contraria leuant. Cum purum ulcus est, humor pau-
 cus, æqualis, odoris expers, crassus, candidus, cum sentie ndi faci-
 litate habetur. Si inflammationem experitur ulcus, iis quæ ad il-
 lam scripta sunt, utendum est. Sordidum, ptisanæ cremore cum mel-
 le illuendum est, aut terra pharmacum iniiciendum cum susino, uel
 mulsa, in qua fœnugræcum sit decoctum, aut malua, aut fursures,
 aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro quo magis expurge-
 tur, etiam marrubium, aut eruum, uel melli adiuncta erui farina
 uel iris, uel alumen rotundum, uel aliquid simile inspergatur. Hæc
 ipsa etiam extrinsecus ex mulsa macerata, instar cataplasmatibus

malicor-
 rium
 αδ'ι'ογ.

PAULI AEGINETAE

illinuntur. Peculiaris prodest hoc medicamentum. Crocus primæ notæ leuigatur cum lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cum adipe anserino inungitur linteolo. verum quod infra ponitur, isto quoque efficacius dolores discutit. Capita papaueris in passo temperato madescunt diebus tribus, deinde incoquantur, donec intabescant, postea feruntur una cum rosæ foliorum drachmis quinque, croci drachmis tribus, iure capitum papaueris admisto, inde ceræ cum rosaceo liquatæ drachmæ duæ ipsis superfunduntur, ac in pessulo subiiciuntur rosaceo perunctis. Salutare est etiam medicamen ex oris, croco, rosaceo, adipe anserino, cerui medulla præparatū. Item Aegyptia citra æruginem mirifice ad exulcerationes cōducit † ubi autem pascendo serpunt vlcera cum inflammatione quidem obducitur panis tepida maceratus, ex hydromelite, oleo, althæa, fœnugræco, palmulis pinguibus. Iniiicitur autem plantaginis succus, solani, polygoni, & sereos primum per se, mox cum vino austero aut aceto. At citra inflammationem, si vrgeat depastio valentiora iniiciuntur, veluti decoctum malicorii, rosarum, summitatis olæ, cupressi, malorum cotoneorum, rubi, myrti, lentis, rhammi, rhus coriarii ex vino astringente. postea vero aluminis, acaciæ, lycii, hypocistidis. ex eisdem vero decoctis parabitur etiā infusus. Si nihil proficitur non alienum fuerit medicamen ex charta cū posca primum demittere, deinde cū aceto, aut Antheram, aut chalcitidem, aut atramentum sutorium, ex eisdem liquoribus, & quæ dysentericis congruunt, cibus dādus boni succi, modicus. Purgato vlcere, ægrotans balneorum ciborumque varietate sollicitari, vinoque refici debet, quo caro statim procreetur. Pessi loco subiicitur medicamentum diamorion, hoc est ex moris, remissum cadmia, vel ladano, vel plumbagine. A foris autem emplastrum, quod cicatrici ducendæ est, abdomini coxisque imponitur. Quemadmodum enim cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas per latentes meatus traducetur.

solani
σολανου.

† Hic locus sic legitur in antiquis codicibus. νομῆς δὲ οὐ σῆς σὺν φλεγμονῇ μὲν καταπλαττέου ἄρτω καθαρωῶ πεφυραμένω δι' ὕδρος μέλιτος, ubi autem est nomen cum inflammatione inducere cataplasma oportet ex pane puro subacto ex hydromelite.

De cancro.

Cap. lxxvii.

Cancrorum vuluæ alii cum exulceratione, alii citra ulcus inuadunt. ubi igitur exulceratio non est, tumor in vuluæ ostiolo reperitur durus, inæqualis, prætumidus, colore sæculentus, subruber, interim subliuidus, ac uehemens dolor exercet inguina, abdomen, iunum ventrem, & lumbos ad manus contactum, uariamque

medicinam ex candescunt. Exulcerat o autem cancro, præter dolores, durities, tumoremque, vlcera erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte, sordida, labris prætumidis, albicantia, turpem humorum colluuiem concretam habentia. Quæ vero pura videntur, sæculenta, liuida, subrubra, & cruenta apparent, sanies inde manat continuo tenuis, aquosa, nigra, aut ruffa, grauius olens. Interdum vero & sanguis defertur, aliaque notæ in vulua inflammata expositæ. Itaque affectus nulla medicina sanatur. Quemadmodum etiam Hippocrates pronuntiauit, lenire tamen est infesibus ex scœnugræco, malua, ac cataplasmatibus similibus. Insigniter autem leniunt, solanturque in accelsionibus malua, aut althæa in malsa intabescēs, & rosacei paululo leuigata, & applicata. Ad hæc cataplasma ex ficis ficcatis melilotis, ruta, thure, buniade herba diligenter cum oleo contusa. Item quod constat palmulis in passo coctis, cui adiecta sint ouorum lutea, polentaque, vel ex papauere cum coriandro, aut polygonio, aut seri. Hæc in doloribus vsui sunt, Postea ceratum iniiciatur ex rosaceo, aut myrteo, aut œnanthino, aut melino, cum palmulis in passo coctis. proprie vero conuenit præparatū ex amurca in vase æneo collecta, quæ torrefacta leuigatur, & rosaceo cerato, adusque emplastri spissitudinem excipitur, hæc quidem extrinsecus conferunt, intus autem oleū quoque lenit, ubi fuerint exulcerati, item lac muliebre infusum. Pari modo succus plantaginis tepidus. Sin cruentum sit, succus polygoni cum thuris modico dolorem sopit. Ad hæc pessuli ex croco muliebri lacte, lachryma papaueris, & œsypo. Omnibus autem efficacius est etiam ad sedis affectus medicamentum quod recipit, Argenti spumæ Italicæ lotæ selibram, thuris masculi, œsypi, adipis suilli recentis, butyri recentis, ceræ thyrenicæ, singulorum sextantem, rosacei trientem. Argenti spuma ex sereos succo trita, liquatis iniicitur. Cibus dabitur qui facile in corporis membra queat distribui, bonique succi, vinum paucissimum, aquosum, acrium esus, & alimenti copia vitanda est, vt quibus cibi prompte corrumpantur.

De scirrho & duritie.

Cap. Ixviii.

Scirrhum cōtrahit vulua, alias repente, vt nulla causa euidēs præcesserit. plerūque vero eundem inflammatio mouet, quæ nec soluta nec in abscessum mutata fuerit. At scirrhorum genere comprehenditur etiam durities, quam σκληρώμα Græci vocant, circa vuluæ ceruicem potissimum obueniens, tumorem quidem pari modo repræsentans, sed minus tactui renitentem & cum mediocri dolore. Comitatur autem hos quoque vteri in opposita declinatio † & tumor qui ratione lepressionis vehementer renititur, cum grauitate, motuque difficili, non crurum modo, sed totius etiam corporis, atque obeundis actioni-

laborat
ideo plu
ribus
morbis
vterus,
q natu
ra co cō
gerit va
rietatem
humorū
multifor
mē, qui
morbis
materiā
facile
suppedi
tāt. tū ēē
ga vte
rus est
tanq si
nus ma
ris lacu
nosus, in
quā oē li
mi ge
nus &
cadaue
rosa cor
pora, li
gna, &
proflu
uiū spu

PAULI AEGINETAE.

bus pligritia. sequitur nō probe curatas, malus corporis habitus, aqua inter cutem repræsentans. Per initia igitur sanguis educi, aut purgatio ex hiera Archigenis, assumi debet. Deinde cataplasmata ex caricis, œsypo, nitro, ablynthio, & cucurbitulas cute ferramento incisa ad mouere consilium est. Malagmata vero hæc, Polyarchion, & diaspermaton hoc est ex seminibus confectum, & quod baccis lauri cōstat. Infellus ex caricarum decocto, artemisiæ, pulegii, althææ, pessullos ex terebinthina, galbano, myrrha, iride, œsypo, dropace, aquas naturales sulfurosas, bituminosasq; usurpare commodum fuerit, si vires constant, etiam helleborismus conuenit.

† Vetus liber, ὅγκος πρὸς λόγον τοῦ πλήσεως ἰσχυρὸς ἀντίτυπος, idest, tumor ratione plenitudinis vehementer resistens.

Pessulus emolliens.

CERAE ponticæ, nardini vnguenti, singulorum quadrans, irini, gleucini, cyprini singulorum vnciæ duæ, adipis vrsini anseriniq; butyri, œsypi, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, singulorum vncia.

ALIVD. Polii drachmæ duæ, myrrhæ drachmæ quatuor cum vino Mendefio tritum irinoq; imbutum subiicitur. ALIVD. Ceræ thyrrenicæ, adipis vitulini, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, mellis attici, olei veteris pares modos. MEDICAMENTVM noxia euocans quod Græci dicunt meta syncreticon, & ad inflationes, vix passæ candidæ sine acinis, vnciæ tres, rutæ viridis foliorum vnciæ duæ, aquæ marinæ sescuncia, cymini drachmæ quatuor, mellis quod sufficit. Inunctum vero pessulum cyprino oleo immergito, & subiicito. Præterea Chrysus ab auro sic dictus pessulus Libaniusque, & Enneapharmacus affectui sunt vtilis, verū Titianus his magis accommodatur.

De mola.

Cap. lxi.

μύλη

Mola quoq; induratus est tumor, interim in vuluæ ostiolo, interrim etiam per totam ipsam preminet, tactu lapidis duriciem refert, ita vt ea & quæ superiacent deorsum trahantur, corpus emacietur, color prauus appareat, cibi fastidium vrgeat, menses supprimantur. Mamillæ inturgescant, vt in quibusdam per initia de foetu concepto sit suspicio. Insecuto autem tempore discernuntur, nonnullæ vero aquæ inter cutem præbent opinionem, sed hoc intercedit discriminis, quod tumor durus sit, nec sonus fiat cum digiti iniiciuntur, quem admodum in morbo hydropico. Cum autem intenditur, in aquâ subter cutem reuera degenerat. Nonnunquam etiam insanabilis magna ex parte affectus redditur, quibusdam & sanguis erumpit. Itaque decumbere in domuncula angustiore minus luci exposita, modice frigida cubili immobili, omnibus ex æquo confert, sed ita vt pedes ha-

Aristo.
x. de ani
mal. ait
esse car-
nem, cui
adue-
niūt qua
si oīa q̄
partum

beant clariores quietosq. Nam motum quamlibet fluxionem concitat. Ac tumores duritiaque iis remediis quæ in scirrhis & duritiis, vuluæ dicta sunt, persanabimus. Porro hydropicas suffusiones, illis quæ in capite de aqua intercute comprehensa nobis sunt sanguinisq. eruptionem, vt etiam fluorem muliebrem curabimus. Cæterum sunt qui molam carnem asserant informem, ipsis vuluæ tunicis adhærescētem, fœtus modo in lucem ædi. Atque hæc morbi species victus ratione laxante tractabitur, quo citius excutiat.

De inflatione vuluæ.

Cap. lxx.

Inflat vulua ex frigore, vel corruptione fœtus, vel ex ægro paritu ostiolo coniuente, vel sanguine in grumum intus coacto.

Alias spiritibus in concauo ipsius spatio conceptis, alias in raritatu bus vuluæ corporis, quas tumor pubis & imi ventris comitatur cū duricie & dolore punctorio, qui ad septum transuersum vsque & stomachum inguinæq. pertingit, ac sonitus digitorum impulsu tympani modo redditur. Auxiliatur ergo primum sanguis demissus, si nihil obstat, mox in accessionibus inedia, fomentaq. ex oleo rutaceo adhibentur, infusus ex rutæ pulegii, artemisiæ, cassiæ decocto, similibusq. cataplasmata ex semine apii, cumini, anisi, ameos, farina lolii. Adhæc cucurbitulæ, tum leues, tum cute incisa affixæ. At si diutius vitium se prorogauerit, purgatio ex hiera picra utilis est, dropaces, sinapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incumbentem si cōtingat, auferet, leniter ipsum dissipās, rursusq. admouebit cataplasma, ex ficu, nitro, & absinthio. At epithemata mollientia erunt, Polyarchien, dia spermaton quod est ex seminibus, & diadaphnidon, ex baccis lauri præparatū. Præterea pesfi ex ruta, melle, & nitro. Maxime vero hic conducet, ficuum pinguium contusarum drachma, cumini drachmæ duæ, aphronitri drachma. ac acrimonie causa, in lac prius immergantur. Iam emollientes pessuli sunt huic vitio accommodati.

De vuluæ strangulatu.

Cap. lxxi.

Strangulatus vuluæ ad superiora recursus est, quæ principalissimas partes in doloris consortium perducit, vtpote arterias, quas vocant carotidas, cor, cerebrique membranas. Comitatur affectas, cum accessio propinqua est, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, aspectus oleosus. Cum iam inflat strangulatus, grauis sopor premit, quæ cataphora dicitur, mens desipit, sensuum instrumenta deprehenduntur, impediunturq. vox obmutescit, crura contrahuntur, deinde maxillæ rubere incipiunt, faciesque repletur. Cum remittet, humiditas quædam ad tactum ex

comitatur.

Multo tū tpe durat, et emittit in lucē.

Hæc vulua ex ali

quo praua habi

tu concipit haud

secus, q̄ vua hy-

penemia aues ip-

sæ. Nam dicit fœ

mina quoque

exave-

movēda

quum in ventum

evanes-

scit, qd̄ concipe

re debet.

quod ex

ficcitate

loci pro-

uenit. de

hoc quo

que mor-

bo in 4.

de gene.

animal.

loquit.

PAULI AEGINETAE

mouet
morbus
p. perio
dum, q
rata qua
dā lege
causae
materia
les mo-
tum sim
plicem
vniuersi
sequitur.
quemad-
modum
alibi de
hoc qdā
attigi-
mus. &
Alex. in
probl.
qdā de
hoc di-
sputat.

locis mulieribus praecedit, vtriusque strepitus, ac aliquod ex interaneis progreditur, ipsaque vulua paulatim laxatur, atque sic mens ipsis, & sensus redit. Caeterum morbus iuxta circuitum mouetur, sicuti comitialis, idque nimirum vulua repleta, aut seminali, aut alia materia, qua intus computruerit, ac multae rursus a morbo sese recolligunt, nonnullae vero in ipsis accessionibus perierunt subito, quibus pulsus quidem crebriores, & inordinate intercidunt, deinde etiam in totum abolentur. Modicus vero humor superficiem irrorat, respiratio primum languida est, mox in totum abscinditur. Porro vitium hoc hyeme & per autumnum magis infestat iuuenulas ad venterem procliuēs, steriles & potissimum si ex medicina sumpta fuerint infœcundae, itē alias perfrictiones expertas. In accessionibus igitur summa deligare conuenit, crura tota, corpusque totum perfricare, ut animo destitutae sese recipiant, item quae foedioris sunt odoris, naribus oportet admo- uere. Exempli gratia linamentum ex lucerna extinctum, castorium, picem liquidam, cedriam, lanas & lacinia combustas. Quidam vero & matulam naribus admouerunt cum vrina veteri, vel deiectione cucurbitulas adglutinare vincit inguinibus & imo ventri cum multa flamma, & leues & cute incisa. Quod si longius accessio se produxerit, etiam quae flatibus educendis sunt, proficiunt, ut quae colica dicuntur, ano subiecta nempe cuminum, nitrum tum melle. Item stercus clystere subducere profuerit, ne illorum appositu sedes premeatur. In vuluam vero vnguenta odoratisima infusa, ipsam solent detrahere, sicut amaracinum, malabathrinum, ac sinapi, partim naribus offeratur, partim applicetur pedibus. Deinde inclamabit aliquis ipsas voce asperiuscula, excitabitque, & ea admouebit, quae per sternuta- menta euocant, ex castorio, struthio, & pipere. ubi accessio conquie- rit, vomitum cogere, cibum nullum aut paucum praebere oportet. A septimo die, purgatio ex hiera diacolocynthidos dabitur, post triduum cucurbitulae defiguntur lumbis & ilis. Mox castorei potione ute- mur, nunc artemisiae decocto, nunc ex mulla, in quibusdam enim hoc vel solum ad integram morbi curationem abunde fuit. Incessus por- ro & pessus mollientes his adiunguntur. Atque haec ad accessiones proficiunt, verum ut totum corpus reficias, a sanguinis dimissione auspicatus, ad purgationem ex hiera transgredieris. Inde picram ex aloë factam exhibes drachmae pondere cum tribus aquae mulsae cy- this, diebus continuatis, vel interpositis mensura duarum drachma- rum, cum senis aquae mulsae cyathis. Iam dropacismos, cucurbitulas, & sinapismos utiliter applicas, nec non acopa ex euphorbio. Pos- tea exercitiis uti, frictione & vocis exercitio prodest, denique & aquis naturalibus.

De vuluæ procidentia.

Cap. lxxii.

Vulua procidit raro quidem, sed multis occasionibus, vel enim ab alto delapsa, & in coxas firmata, membranis, quæ interaneū id continent, ruptis, aut extractione secundarum simul ipsam extrahentium, vt quæ eidem adhærescant quemadmodum in partu difficili, vel indiligentius imperitiūque extractio fœtu, vel ex vulnere, vel aliqua animi perturbatione, scilicet nunciato filiorum interitu, aut hostium insultu, aut periculosa nauigatione, aut eiusmodi quadā causa. Vt cum tota corporis mole soluta, uulua simul sit deuoluta vel ob resolutionem, imbecillitatemq; particularum, vt in declinantibus ætate potissimum accidit. Procidit autem iuxta os ipsius. Quidam vero & totam vuluam prolabi memoriæ produnt, quod a vero longe abest. Qua enim ratione sursum redacta queat affirmari? Conuenit igitur fœcibus clystere prius euacuatis, vrinaq; excreta, quo vulua vndiquaq; sit libera, laborantem figurare supinam, vt coxas habeat sublimiores, popliteq; flexos cruribus diuaticatis. Deinde hapsum capere ex lana, figura & crassitudine sinui muliebri proportionalem, tenuiq; linteo circundare, & in succum acaciæ, vel hypocisti dis vino dilutum demergere, tum vuluæ inferere, & citra violētiam totum quod procidit sursum agere, quoad tota moles in sinu factus subsederit. inferna ab umbilico regio spongia in posca expressa extrinsecus contegenda est. Mulier iacebit extensis adaptatisq; inuicē cruribus, vt alterum alteri incumbat. Inde cucurbitulæ agglutinabuntur cum flamma copiosiore umbilico & vtriusq; iliis, naribus odorata admouebuntur olfactanda. Tercio die lana sinui iniecta, mulier infideat in vino nigro austero modice tepido, vel in decocto myrti lentisci & malicorii. his probe peractis, lana ingesta tollitur. Altera inuicem prioris eodem humecta medicamento inseritur. Cataplasma ta a foris imo ventri superiniiciuntur ex palmulis, polenta, vel lentisula & malicorio cum oxymelite, ac tribus diebus interpositis rursus hæc fient, quoad perfecte curationem absolueris. At si processu temporis id quod prolapsum est, putredinem fuerit expertum, id ipsum auferetur, nullius metu pericula. Etenim vuluavniuersim ablata, vbi computruerat, mulierem superuixisse commemorant.

De muliebrium locorum clausura, quam phimon appellant.

Cap. lxxiii.

LOci muliebres circa ipsorum os clauduntur. vel ex præcedente lexulceratione, vel in schirrum durata inflammatione. Curabuntur insesibus qui emolliant, ex hydrelæo & scœnugræci decocto, cōsimilibusq; cataplasmatibus & pessulis. Porro si malum inueterauerit, suffimentis vaporibusq; iis qui ex aromatibus consunt vtendū erit.

Pla. scri
bita aīal
cē uuluā
ideo q
sursum
deorsum
ve. perre
ptās val
de fre
mit & ī
latera in
uadit, es
seq; ma
ximo
sensu p
ditam. et
ea sua
aptitudi
ne dif
fluere
huc &
illuc. p
labi ue
ro totā
rō dissua
det dele
bi &
sursum
allabi fa
teī et ip
se Arist.
vii. aīal
Theo-

PAULI AEGINETAE.

Iam vero soluit etiam hoc vitii cum nihil aliud sit quā vuluæ ostio
li astrictio, pessulus ex æsypo, nitro, resina, & terebinthina.

Vt sterilis mulier concipiat. Cap. lxxiiii.

quia ge-
neratio
foetus est
ea tēpe-
ratura
maris et
foeminae
ad id a-
ptissima
Arist. in
libris de
gene. &
x. de ani-
mal. ad
prolem
generan-
dā parē-
tes mo-
dico ui-
ctu bo-
noq; uti
debere
Arist. p
cipit in
probl. et
qua no-
cte ope-
rā Vene-
ri daturi
sunt, ni-
hil pene
edere.
Hebetur
quoq; in
re rustica
apud
M. Var-
ronē pa-
Communiter itaq; ambobus congruit, & viro & mulieri vni-
uersum corpus conseruare probe temperatum, laboris, cibi, bal-
nei & reliquorum omnium mediocritate, & quod inter ea maximū
est, curare ne habitu sint obefiore. Neq; enim pingues liberis procreā-
dis sunt idonei, eo quod genitalibus mutuo se contingere haud pos-
sint commodē, tum quod momentum seminis emittant. Neq; tamē
nimis extenuati, liberis operam dare feliciter queunt. Iuuabunt autē
ipsos omnia calefacientia & leniter infantia, vinum itaque calidum
modice sumptum. Et ex oleribus, eruca, hoiminum, erisymum & cō-
similia, ruta vero & calamintha omnino vitanda sunt. At si humo-
rum quodam vitio foemina non concipiat, hos expurgare, aut pro-
ba victus ratione emendare expedit. Proprie vero mulieribus conue-
niet, curam locorum genitalium quam fieri potest maximam habe-
re, & menses sine vllō impedimento emanare. Cum igitur propin-
qua est purgatio, cibi potusq; quam maxime licet, mediocritatem, cu-
ra habebunt. & ex iis quæ purgationi irritandæ sunt, aliquid assu-
ment, cuiusmodi sunt odorata olera & acria, vtpote scandiæ, erith-
mon, fœniculum, apium, smyrnium. Porro vuluæ intemperiem cor-
rigere oportet, frigidiores itaq; notat menstruorum retentio, victus
frigidior, & crassi succi, stupidum quid in ventris parte inferna lum-
bis, & cruribus oboriens. Quæ vero penitus refrixerunt, ne venerē
quidem appetunt. Quare conuenit cum aliis remediis, tum fomentis
omaibus & iis quæ constat suffitibus, calorem reuocare. Nec abs re
fuerit, castoreum bibere, & ex seminibus odoratis, cuminum, anisum
pulegii comam, iuniperi fructum, pipere singulis adiecto. at fomenta
ipsarum vuluarum, partim vapores erunt qui inferius per sellam assu-
mentur, partim aqua calida ad collutionem iniecta, in qua decocta
sit saluia, artemisia, ruta, iuncus odoratus angulosus, pulegium, aco-
rum, seminaq; odorifera, hæc singulatim etiam inferiori ventris re-
gioni ab umbilico applicantur. Præsidio est, & polyarchi epishe-
ma. Item inferioris ventris coxarumq; fricationes nihilominus con-
ducunt. Insuper in pessis subiiciuntur ex myrrha, ruta, galbano & ca-
storeo, vbi prius aqua mulsa, aut marina vuluam foueris. proficit etiā
ad hæc pessulus gone appellatus. Calidiores locos fatetur corpus to-
tum calidius, menses pauci & laboriosi, genitaliaq; mulieris exulce-
rantes, corrigunt modice humectis & frigidis, cuiusmodi sunt olera
quidē lactuæ, maluæ, blitū, cucurbita, cucumis, pepon, a triplex, por-
tulaca, aliq; cibi cōsimiles. vesicæ abdomini & lumbis frigida appli-

tant cataplasmata, succiq; illinuntur. At humiditatis vitio fecunditatem frustrari indicat in coitu, vulua humescens, tenuius & copiosum menstruum. His victus utilis est ficiior, labores, superiorum perfricationes, vomitus, cibi fici & mediocres. Profuerit & vuluam acerbis medicaminibus continere, quale est lentisci decoctum, myrtorum rosarum, rhus, item mali granati floris, rubi ramusculorum tenerioru, & gallæ. Sicciozem vero vterum contrariis curare oportet, balineis dico, inunctione, & alimento humido, olerosoq; mediocri vino & non nimis veteri. Quod si a crasfioribus succis concipere impeditur, siquidem rodens aliquis fuerit, mulierem probe purgare conuenit medicamento quod cuilibet humori proprium est. maxime autem picra ex aloe, mox sero lactis aluum ducere, & victum probiorum deligere. Pituitosos autem humores laboribus vacuare, sudoribus, & vomitu, vel per inferiora. Cæterum ex medicamentis epithymum quoq; euphorbium, piper, dauci semen, petroselinum semen, omnia contrita drachmarum duarum pondere potui recte dantur. Hoc & ventrem probe ducit, ac vuluam calefacit, quemadmodum sæpe iam menses eruperunt etiam iis quæ purgationem non sunt expertæ. Postquam vero vterum emendatum esse constiterit, menstruis bene respondentibus, tunc venus est ineunda, purgatione definente. Iam vero, quoniam spiritus similiter in vulua inclusi conceptionem impediunt, notas ipsorum ex capite de vuluæ inflatione sumemus. Medetur autem parciore primum victu, mox cuminum, anethum, apii semen, rutæ, anisi & pleraque aromata præstamus, partim potanda, partim subiicienda. Conniuentes locos aperiemus iniectionis clysteriis odoriferis, fomentisq; ex malua, semine lini, foenugræco, & oleo. Nonnunquam etiam melle, validioribusq; artemisia, cunila, calamintha, pulegio, & anthemide. Præter hæc conuenit vti terebinthina, nitro, cucumere agresti, elaterio, casia, picis sero. Quibus autem os hiat, victus, fomenta, medicamina ficiiora astringentiaq; grana mali punici, lentiscus, rubi radices, myrta, & quæ humidiori vuluæ congrua sunt adaptantur. Peruersiones autem fomentis instaurare ac dirigere oportet, item iis quæ molliunt, insertis. venus autem a tergo exercita, ad concipiendum videtur conducere.

De vuluæ scissuris, condylomatibus, & hæmorrhoidibus.

Cap. lxxv.

IN vuluæ ostio rimæ, quas Græci rhagadas vocant, ex enixu violento fiunt. Primum sane latent cum recentes adhuc ex partu sunt dolores, postea vero paulatim percipiuntur, alias manus tactu, alias in coitu. quando & propter affricationem cruorem reddunt. deprehenduntur autem sinu adaptato, etenim diruptiones scissu-

stores ita uencas, quas ad admissu rā parāt, a cibo cohibere, quod macræ rectius cōcipiūt. Causas aut cōcipiēdi uel sterilescēdi cognosce ex x. de hist. animal.

PAULI AEGINETAE

reque in ostioli circuitu oculis patent. In quibus manuum operationem rodentiaque medicamina vitantes, simplicioribus infesibus, pessulisque utemur. prodest etiam tetrapharmacum dilutum. At si calum contraxerit, medicamento quod charta constat, ex rosaceo utendum. Sin autem ipsius vim non tulerint, iridem illyricam terebinthina exceptam imposito. vlceribus iam cicatrice obductis, conueniet ex cadmia præparatum, aut aliquod ex iis quæ sedi consecrata sunt, veluti quod dia lythargyru, hoc est argenti spuma inscribitur. Cû vero scissuras veteres in condylomata degenerare contigerit, similibus excindi, adque cicatricem duci debent. Cæterum hæmorrhoides vuluæ os, & ceruicem infestant, quæ in partibus instrumento ad perspicendam vuluam accommodato exploratis, deprehenduntur, inde quod ex crescentia in accessionibus appareat dolorifica, cruenta & subrubra. At ubi remiserint, fluxio citatur citra dolorem subliuida & fœculenta. In his igitur cum morbus remittit, vossella modo fieri queat, præhensas amputare oportet, sin minus, certe medicamentis ipsas destringere, partim attingentes sicco malicorio cum galla aut huiusmodi aliquo, partim iis quæ in vulua sanguinem fundente exposita sunt vtentes, quæ etiam profluuiis, & hæmorrhoidibus conducunt, eo potissimum distinctis, quod vulua continuo cruore manet per remissionem non solum in menstrualis purgationis tempore.

† In antiquo lib. hæc est scriptura, ἀ καὶ τὰς δι' ἀρρώστιας αἱμορροΐδας, id est quæ ob imbecillitatem sanguinem fundentibus, &c.

De partu difficili.

Cap. lxxvi.

Difficilis partus accidit, aut vitio parientis, aut foetus, aut secunda drum aut foris aduentientium. parturientis quidē, si crassa obesaque sit, aut vulua tota exigua, aut dolorum imperita, aut timidiuscula, aut inflammationem in locis genitalibus aliaue particula experta, aut alio quodam modo laborans, aut natura imbecillis vt foetū nequeat propellere, aut si ante tempus pariat. At foetus vitio, si vel inusitatae magnitudinis existat, vel exiguus & modicæ grauitatis, vel magni capitis, vel monstrosus, ut, biceps, vel mortuus, vel viuus quidē, sed imbecillis, vt foras non possit procedere, vel si plures foetus sint. Nam Herophilus, quinque ædidisse mulierē, memoriæ prodidit. Vel si figuram naturæ contrariam obtineat. Naturalis siquidem figura est foetui, prima quidem, qua manus femoribus porrectæ sunt, & caput nusquam inclinans ad os vuluæ recta dirigitur. Proxima huic, ubi in pedes conuersus est. Aliæ omnes præter has a natura abhorrent. Obsecundas, quod velamentum intus est, partus redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquam opus est propter subtilitatem abrumpatur, humore siquidem euacuato, infans præ sicci-

adhibenda i primis docta obstetricæ est adiuvandus put ex Arist. et Ter. nō est, cui commit tas primo par- ra mulie rem.

LIBER III.

111

tate ægre deu oluitur. Ab externis difficultas oritur, aut frigore, quod vuluam densauerit, aut calore immodico, qui vires dissoluerit, aut ex quodam fortuito accidente. Si igitur ex astrictione, aut veluti foetu adfirmata pariendi oriatur difficultas, laxatione prius opitulandum, infundendo largiter oleum dulce, & calidum, cum de cocto foenu-græci, aut maluæ, aut seminis lini, aut etiam oua, quod leniendi facultate prædita sint. Deinde & pubem cum abdomine & lumbis cataplasmate obducere, quod semine lini constat, aut aqua mulsa, aut hydrelæo, in sesibusque similibus prodest. Insuper laxationes balineis moliri, nisi febris, aut alia quædam occasio impedierit, mouereq; parientem sella in aere calido mediocriter, Nonnulli etiam conquassationes validas, sternutamentisq; ciendis idonea adhibuerunt. Timidissime spiritum comprimat, & ad inguina depellat. Animo deficiens iis quæ deliquio abigendo sunt, naribus admotis recreabitur. Alleviata mediocriter, cibo modico refocillabitur. Obesam mulierem in lectulo resupinam figurare oportet, vt ad femina genua succlinet, inflectatq; quo vulua ad abdomen tendens, e directo ostioli habeatur, quod ceratis, aut pinguetudine delinire digito oportet, & sensim aperire. Atque si morbus aliquis particulas male habeat, etiam huic prospicere. Ad hæc stercus detentum molli clystere emoliri, & secundas clausas diuidere, aut digitis, aut ferramento quod πολυκόπαν νοπτάρ- cant, in ipsis occultato, sinistra manu præcedente, ac humorem quem μόν ex Aristot. dam oleosum in vuluæ spatium interius clysterio indere. Verum vbi de aial. foetus præter naturam figuratus fuerit, naturalem reddere figuram decet, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, partim in rectum agendo. Et si quidem manum pedemve præmiserit, non attrahere membro prehensum oportet, magis enim affirmatur, vel luxatur, vel etiam abrumpitur, verum digitis humero infantis, vel coxæ affixis rursus in conuenientem locum id quod præmissum est, deducere. Porro si cum firma adhæsiōe, totius infantis indecora fuerit si infans figura, sursum prius ipsum ab vteriore sublimem detrudere consilium in utero est. deinde prehensum rursus ad os dirigere. Postremo si plures uno post. 7. uel 8. infantes deferantur, iterum a superiore, infernaq; parte referes. sic vt omnia sensim & citra contusionem fiant, oleo locis perunctis. Tem- pū quo in sellam collocabitur parturiens est, cū uulua os dehiscens, iterierit, digito occurrit, & quod præruptum est, procumbit. Verum si non interire procedat, quod infans mortuus sit, aut alia de causa, ad extractionē & ma- quam Græci ἐμβρυοελκίον appellant ueniendum est. tres ait Aristot. opus at

De coxarum morbis. Cap. lxvii.

Coxarum dolor ab articulari morbo nihil differt nisi quod ip-

PAULI AEGINETAE

extrahē
di foetus
interem
pti inter
pia diffi
cillimū
esse Hip
po. testis
est.

flus causa, nempe crassus pituitosusq; humor in sola coxarum com-
page, articuloq; concretus insideat. Dolor ipsis gibba in natibus re-
gione inguinibusq; ad genua vsq; in plurimis autem ad summū vsq;
pedem pertinet. Per initia igitur ægro nobis oblato, fœcibus clystere
vacuatis, vena in cubito secanda, cum sanguinis detractiōe, si autē
vetustas vitium occupauerit, ex talo partis affectæ imminutionē san-
guinis moliemur. In accessionibus fotu hoc vtendum, Cyprini cya-
this octo, aceti cyathis quatuor, nitri cyathis duobus, cachrys cya-
tho vno. Succidis lanis calida admoventur. Deinde applicabitur ip-
sis farina lupinorum amarorum cum oxymelite, aut farina lolii, cum
resina, cucumeris sylvestris radice, nitro, calamintha, cachry, baccis
lauri. Iam calamintha sola vtiliter ex oxymelite, aut aqua mulsa ad-
mouetur. Emplastro vero hoc quod leniendi facultatem obtinet, vten-
dum est. Cerae drachmæ cētum, terebinthinæ drachmæ viginti quin-
que, æruginis drachmæ sex, myrrhæ, galbani, iudis, singulorū drach-
mæ sex, cedriæ drachmæ quinque. Propinabitur ipsis liquoris cyre-
naici quantum eruus implet, aut castorii drachma cum opopanacis
tribus obolis. Porro radicis capparis cortex potui datus, & cata-
plasmatis admixtus est remedio. Cum autem dolor multus exerceat,
etiam medicamenta a dolore leniendo ἀνὸς δυνάμει dicta locum habent,
vt pote quod ad Philonem refertur, & quod duplici pipere constat.
Hoc autem enema inferetur, mellis cyathus vnus & semis, olei tan-
tundem, aquæ cyathi duo, nitri drachmæ octo, terebinthinæ drach-
mæ quatuor. His calidis iniectis, anus debet foueri, vt longiori tem-
pore ea retineantur, muccosa vacuat, nonnunquam, & sanguinem,
quando etiam magis opitulatur. At si malum perseueret, quod rarum
est, iterum frequentius eo vtendum est, in vicem aquæ, centaurii deco-
ctum admiscendo. Sanguinem vero trahit & thlaspi semen per infe-
riora inditum, succus elaterii, & medicamentum ex ipso factum, vel
quod ipsius radicibus constat. Item oleum sicyonium, salforum pisciū
muria, & oliuarum colymbadum probe per anum ingeretur. Cucur-
bitulæ coxendici multa cum flamma, cute prius incisa defigendæ, in-
terim quoque hirudines. Quod si his malum non finitur, ad purga-
tionem eundem est, aut ex hiera, aut colocynthidos partis internæ
probe contritæ drachma offeretur in aquæ mulsæ cyathis duobus,
aut paulo amplius, aut minus, pro laborantis virtute, & alui facilita-
te dabitur. In aqua vero mulsa ruta decoquatur. Puls etiam ex cucur-
bita sylvestri confecta recte hos expurgat. In quibusdam vero & vo-
mitus a radiculis citatus per initia profuit. Cum morbus se remiserit,
dropaces ipsis applicantur, acopaq; ex euphorbio sunt vtilia. præ-
sertim quod a varietate vocatur πογγίλον, item balinæ naturales his

accommodæ. Si desiderantur, in aliis lauabunt balneis, commemoratisque vtendum est acopis, & compositis nitris, medicamento Asclepio, & eo quod ex euphorbio, adarce, nigro veratro, castoreo, pyretro, pipere, pedicularia, quam staphida agriam uocant, simili pondere confit. Secundum balineas inspergentur picis aridæ viciæ tres, sulfuris ignem non experti uncia duæ, cuti adhuc calidæ, quæ charta etiâ contegetur. At si ne hæc quidem profecerint, uel reliquis morbi remanentibus, congruum erit & sinapi cum caricis, uel etiam per se illitum. In totum uero hos restituit sanitati, iberidis herbæ usus, quam lepidion quoque, alii agrio cardamon hoc est, s. luestre nasturcium appellant. Quæ uero apud nos fruticosa nascitur similibus lauri folijs & multo amplioribus, respondere, multa experimenta testantur, non solum in coxarum, sed in aliis quoque diuturnis affectibus, per æstatem uero longe sunt efficaciora. Atqui si folia tunc non produxerit, cortex ipsius radice contanditur cum adipe suillo, ut emplastri speciem repræsentet, inde linteolo densiori illitum locis maxime dolentibus imponitur, nempe toti in natibus gibbo & femoribus, si neque tam diu quoad cuticula superior nigrescat, aut ex toto lueat. Postea ipsum auferes, lotoque ægrotanti ceratū impones, opopanacis drachmas quatuor, quæ aceti cyathis duobus dissoluuntur, excipiunturque cerato cyprino. Quod si talium adurentium usus abominentur, emplastris uti resectoriis oportet, e quorum numero hoc quoque est, cere, resinæ pitynæ singulorum drachmæ duodecim, terebinthinæ, columbarum syluestrium stercoris, foculæ vini combustæ recentis, singulorum drachmæ sex, galbani, sesquidrachma. Atque ex reficientibus est, quod læna appellatur. vtilia uero sunt quæ ex lixiuio & nitro præparantur. Iam nonnulli iis vsi sunt potionibus quæ ad annum continuantur, in quorum grege habetur medicamentum diatesaron vocatum, chamædryos pondo, gentianæ deunx, aristolochiæ rotundæ deunx, rutæ seminis ficci sextarius. hæc tusa cretaque dantur quotidie cochlearii mensura ieiuno & probe concoctione obita, ex duobus aquæ frigidæ cyathis ad annum, donec morbus finiatur. Eadem promittit medicamentum dia hepta, idest ex septem confectum, & quod ad Proclum authorem refertur. Exercitia absoluuntur, inambulatione, continuis, flexionibus, saltatu, & cursu. Cibus mediocriter tenuis & concoctu facilis conuenit, porro si malum nulli ex commemoratis cedit, alias in suppurationem convertitur, alias neruis qui artus conuincunt, laxatis, membrum, luxatur. Quare cum vitium longius se prorogat, articulum tribus quatuorve locis vrere oportet, vt in chirurgica dicitur, ac complusculis diebus vlcera ad aperta, sine cicatrice seruare.

PAULI AEGINETAE

Depodagra & articulariis morbis. Cap. lxxviii.

canes
quoque et
boves et
equæ
phorba-
des po-
dagra la-
borant.
Iō apud
hīsto. &
uenato-
res & i
perato-
res p lo
ca frigi-
da cal-
ceari du-
cuntur
animan-
tes, ne
frigus
pedis ob-
sit.

est enim
sympa-
thia cor-
poris &
animi,

Non sola particularum corporis imbecillitas, podagricos articu-
lariosque cruciatus excitat, quoniam accessiones sine ullo tempo-
ris intervallo urgeret quatenus infirmitas imbecillibus articulis sem-
per incumbit. item ne humor quidem solus hos dolores creat quan-
doquidem non solis vitium articulis infidet, sed utrumque & humor a
natura alienus & particularum imbecillitas morbum adfert articu-
larium. quoties enim alitrix particularum facultas imbecillior cibo-
rum g auatur copia ex qua cruditates enascuntur humor superans in
quodcumque articulamentum quod antea imbecillius euaserit se con-
fert & artubus sese insinuans colligantes nervos distendit dolorem
excitat neque enim nervos per quos motus dispensatur arbitrarius af-
fectu primario, inflammatio intestat, quoniam oporteret etiam me-
dios internodiorum locos, ipsam occupare, utpote tibias medias aut
femora aut cubitos, aut brachia. attamen afficiuntur iidem nervi le-
ge consortii, quod cum articulis ineunt. Quousque igitur & solus hu-
mor pedum articulamenta molestat, podagra vitium nuncupatur.
Vbi vero causa in omnes corporis articulos compulsa fuerit, ægri-
tud Græci, nos articularios morbos appellare consuevimus. Quo vi-
tium nomine, vertebrae, humeros & maxillas comprehendimus, om-
nemque articulum, quicumque morbo implicatur. Nonnulli vero aures,
dentes, guttur, & nonnunquam iecur, lienemque articulariis doloribus
conflictari pronuntiant. A quibus nisi de subito vitium in artus sese
recipiat eructetque, periculum breui tempore laborantes occupauerit.
Sed humor superans qui iuncturis sese inserit, nunc biliosus est, nunc
sanguineus, alias atra bile vitiosus, plerumque etiam pituitosus, crudusque,
copia alimenti, aut cruditate, aut otio congestus, verum vetustate in
articulis crassescit, & glutinosior euadit, sic ut in duritiem contuma-
cissimam, quam Latini tophum, Græci poron appellant, occallescat.
Interim vero diuersa humorum colluuie, vitium contrahitur, ob quod
ægre dignosci, & difficulter medicamentis elidi potest, vel etiam pe-
ne nullo remedio sanescit. Cæterum hoc mali frequenter antecedit
improbis labor, vehemens ambulatio, equitatus creber, usus vene-
ris intempestivus, insueta frigida potio, frigidorumque, vel multorum
noxiorumve ciborum usus, multus vini usus. Iam aliqui prolapsu,
uel deturbatione, uel propulsu, uel distorsione, uel id genus aliis, pri-
ma morbi fundamenta iecerunt, materia quidem præcedente in cor-
pore, quæ antea conquiescebat, nunc autem a causa primaria est com-
mota. Moerores autem, curæ, peruigilia, & reliqui animi affectus,
non modo mouent, sed ipsi quoque noxios succos, siue primario, siue
ex accidenti procreant. Variæ igitur, ut a me dictum est, affectus
causæ

causæ habentur. Sed deprehendi tamē facile humorum noxam inferentium discrimina possunt, tum suis coloribus, tum iis quæ superueniunt denotata. Siquidem biliosa defluxio præter colorem pallidum & rubidum, caloris sensum doloremq; acriorem efficit & proptinus in cutem sine magno tumore erumpit, incandescitq; calidis impositis, sicut e contrario iis quæ refrigerant remittitur. Hoc sane cū aliis omnibus magna ex parte, tum maxime iis quia bilioso humore originem habent euenire consuevit. Subinde febris in ipso accessionum statu accedit, quando & sitis conficit. Pari modo in melancholicis, color partis nigrior reddet in pituitosis, ex albidus et aquæ subter cutem similis apparebit, ubi dolor altius delitescit, & tardius in tumorem sese attollit, quemadmodum si sanguineus humor redundet, cruentus color emergit. Verum ut singula exactius dinoscas, superior victus ratio reliquaq; consulenda tibi veniunt. † Rectior est hæc scriptura veteris codicis, προσυνηγμένης μὲν ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἡρεμονύσῃ τῆς ὕλης, id est, materia ante coaceruata in corpore &c.

Curatio biliosæ defluxionis articulis conceptæ.

INITIUM curationis si flaua bilis articulos exerceat, magisq; ipsius qualitas, vacuatione noxii humoris tentabitur per medicamenta purgantia, quale est maxime quod ex rhodomelite tepidatur, tum quod malis cotoniis constat, item antidorum ex hierapicra, & aloe catapotia. Per accessiones vero a foris vtendum rosaceo cum oui ruteo, & vini momento, particulam sensim infricando, herbæ autem admoventur quæ refrigerant, vt solanum, portulaca, altercum, semperuiuum, palustris lenticula, seris, papauer, polygoniū, rosarum folia, & confimilia. Et nunc per se illinuntur, nunc cum micis panis posca imbutis adhibentur, vel hordeacea farina cum rosaceo instar cataplasmati superaccommodatur. At in Erysipacea inflammatione articulorum manifesto lenietur cucurbitæ recentis cortice imposito, aut peponis, aut cucumeris carne, & perse, & cum pane. Item perdicii foliis & hederæ cum pane vel tenuiore parte polentæ. Ad hæc psyllium farinæ hordeacæ incoctum, ardentes inflammationes mirandum in modum solatur. simili modo & rosaceum ceratum cum quibusdam refrigerantibus succis illitum, & quod ex fabarum lomento componitur. habet autem hoc pacto, ceræ vnciæ quinque, chamemælini, rosacei, singulorum vnciæ duæ & S. fabacei lomenti semuncia, ouorum lutea quinque. A L I V D cataplasma. virentes maluæ coctæ teruntur, psyllium priuatim in viscū redactū admiscetur, † deinde ouorum luteis admixtis, oleoq; chamemælino applicantur. Si vero tantus vrgeat dolor, vt laborans par esse ferendo

inter quatuor succos ismarime ueni uice in corpe fungit, quā Stomachi humore hūc a natura animanti datū ad virtutē roboris excitandā tēstantur. Tenedū tū est τὸ ἄχαλον μακροβιον, cui bilis minus impetrat, illum animatē longiorē ætatē agere.

PAULI AEGINETAE

do nequeat, medicamento ex croco, glaucio & opio vti conueniet, quæ in posca tritave sublinentur, vel cum micis forma cataplas-
matis obducuntur. Galenus autem, huius meminit, lachrymæ pa-
paueris drachmas quatuor, c. oci drachmam cum bubulo lacte, vel
caprillo trita, vel panis micam iniicito, & emolliens rosaceo ex-
cipito, ac vtitor cataplasmate, aut opium crocumq; pariter trita in
lacte, cerato rosaceo excipito. Contulerit etiam eadem parte in ac-
cessionibus ceratum ex turpene pisce confectum, item oleum ex
eodem expressum. Persimilis est hoc efficacitæ, micarum panis aqua
vel posca maceratarum & semperuiui, vel portuculæ, vel solani
vel palmularum carnis & papaueris capitum seminis, pari portio-
ne, ouorum tostorum luteorum & rosacei quod sufficit, accommo-
dato in cataplasmate. Verum his quæ membris torporem inducunt,
narcotica Græci vocant, diutius non erit insistendum, vt doloris
vehementiam solum lenierint. siquidem largior ipsorum vsus, sic
insertum constringit humorem, vt in tophaceam duritiem quos
græci πώγους appellant occalescat, ac diurnas motus difficul-
tates pariat. Ab eorum igitur vsu quæ dolorem arcent vel medi-
camento e succis herbarum facto, diachylon vocant, ex chame-
mælinio resolutum vtendum erit, vel eo quod dialthæas appellant,
vel huius generis alio. Posteaquam vero partem affectam quæ
refruxerit recalciferis, roboranda erit palmulato medicamine quod
diaphænicinen dicunt, cum oxyrhodno, vel vino & rosaceo so-
luto. At si emplastra detrectent grauenturq; acaciæ succum ex
posca, vel lycium adiecto croco & glaucio, & succo perditii ex
posca, delinere conuenit. Victus autem ratio refrigerans humi-
dusq; erit, vt hordei cremor, ex condro sorbitiones, ex oleribus,
malua, lactuca, intybis, auium cohortalium maxime pulli, piscium
saxatiles, eriacius pectines, & eius notæ reliqui. Vitanda omnia
calfacientia, & quæ pallidam, aut flauam bilem generant, vinum ve-
tus, fuluum, & nigellum, & cibi repletio. balineis vtendum aqua
potulenta factis, si nihil prohibet, etiam cum defluxiones ipsæ in-
festant, & cum absunt quantum ad causam pertinet. Temperan-
dum ab iracundia, inedia, acrium esu, temulentia, immodico labo-
re, & veneris vsu.

† Vetus codex, εἰ τὰ προσημειωθέντα ἀλβανὰ, id est, deinde al-
bo ouorum admixto. quæ lectio huic loco magis conuenit.

Curatio si sanguis artus infestet.

IN quibus sanguineus humor redundat, protinus sanguis mitti
debet, ac non in his solū, sed etiam in pituitosioribus, aut melancho-
licis Siquidem in his quoq; succus venis plurima parte cōtinetur,

qui copia sua potius quam qualitate offendit. statim igitur cū quis morbum experiri primum cōperit, sanguinis missio erit tentanda, nam quos iam fluxio frequēter infestavit, si plus inde noxæ, quā auxiliisentiut. præsertim quibus corpus est natura frigidius, aut etiā imbecillius. Post sanguinē detractū, nisi solus ille superauerit, momento temporis interposito, etiam purgationem ex hiera antidoto moliemur, aut Iuliani oxymelite, quippe hæc magna commoditate purgant, qui vero ab huiusmodi medicamentis vacuantibus abhorrent, catapotia quæ sequuntur deuorabunt, aloes, colocynthidis, id est cucurbitæ syluestris, veratri nigri, scammonix, singulorū vnciam euphorbii, nitri, singulorum semunciam, succi brasicæ, quod ad ea capienda satis sit. Dantur singulis pro virium ratione, melius proficiet, si cotoniorum succo excipiantur. Aliud catapotium quod & in accessionibus, & remissionibus exhibetur podagricis, qualiscunque etiā humor articulos affligat. Recipit aloes selibram, agarici, croci, singulorū semunciam, costi, spicæ nardi, iunci odorati rotundi floris, opobalsami, casix singulorū vnciam, scammonix sextantem, epithymi quadrātem cum semisse. Modus mediocris instar duorū scrupulorum, summius quaterni scrupuli. Iam vero ex armaniaco lapide catapotia, mirifice purgant, ac proprie articulariis doloribus congruunt, tum inter fluxionū principia, tum in decremento, tum in remissionibus, sed quoniam nonnulli scammoniam ceu stomacho noxiā fugiunt, dabuntur ipsis præsertim cum pituitosa subluues torquet, hæc cataptoria, colocynthidis medullæ, veratri nigri, bdellii, gummi, aloes, singulorum vncia, nitri alexandrini, euphorbii, singulorum semuncia, dantur quaternis scrupulis. Ego in vicem gummi epithymi adiciebam. Sunt qui in omnibus articulariorum viciorum accessionibus, purgatione ex hermodactylis ipsi aluum sollicitauerint, sed attendendum est, quoniam hermodactylus stomacho facessit negotium, anxietatem et cibi fastidium mouet. Quapropter in his vti consilium est, qui obeundarum actionum necessitatem habent. etenim breui post duos plurimum dies defluxionem ex toto finiunt, sic vt consuetis muniis obeundis sint idonei. Notus mihi est qui non hermodactyli substantiam, neque aliquod ex ea compositum medicamentū, sed herbæ ipsius decoctum cum aliquo consueto medicamine, vtpote aniso, vel apio decoquens ipsum, potui adhibuerit. ac mirum est quam resoluta sæpe aluo defluxionem sedaret, verum quia, vt nuper retuli, stomacho inimicum est, iis postea quæ stomachum confirmant virescens colligunt, mediocri calfactione os ventriculi corrigere oportet, iis autem quæ ex hermodactylis fiunt, multo laudatius

PAULI AEGINETAE

uerbena
ca περι-
σπείων.

uerbasci
φλόμον.

laserpi-
tio· σι-
λφίω.

esse medicamentum Alexander prodidit, quod ex coronopodio te-
peraretur, quod & eandem vacuationem praestet, & dolores so-
piat, praeterquam quod stomacho noxam non inferat. Ceterum
loco inducentur cataplasmatibus modo in pituitosis, si mediocri do-
lor afficiat, viridis brassica, apium, cunyla, verbenaca recta, sin acris
dolor affligat, farinae foenugraeci parteis treis, pollinis loliacei, fa-
rinae cicerum, singulorum partem vnam. ex aqua mulsa, aut vino
tenui cum modico cyprino, vel nardino conuenit applicare, maxi-
me per hyemem, item cinis crematae radices brassicae, eiusque caulicu-
lorum cum axungia inductus, multis fuit praesidio. Sed sciendis
doloribus recens adhibenda axungia, discutiendo autem humori
vetus salsa auxiliatur, bubulum etiam stercus cum hordeacea farina
in aqua mulsa coctum prodest, vel per se recens & liquidum, vel
cum foliis brassicae. Similiter caprillus finus per se, vel cum hordea-
cea farina coctus in posca. Quoniam vero nonnulli ex iis quae co-
traria esse videntur remedium senserunt (etenim diversorum humo-
rum mistura dignotionem postulat) commemoranda iam harum
materia est promiscua. Itaque iuuat sylvestris attritplex & satiuia cum
pane applicata, aut verbasci folia cum bulbis et pane trita, vel cum
polenta, vel cataplasma ex hordeacea farina cruda. At in quibus
obscura morbi est origo, haec semel experiri abunde fuerit, modo
ad consimilia transgrediendum est, modo contrariis pugnandum.
Neque tamen eisdem diutius immorari consilium est, si nullum ex
eis solatium perceperint. Haec quotidie in artis operibus fieri vidi-
mus, ut idem medicamentum vni articulo profuerit, alteri in eo-
dem aegrotante similiter inflammato non modo non opituletur eo-
dem tempore, sed aliquando (quod maxime est mirum) offende-
rit. Quippe vnus idemque saepe articulus, ex eodem remedio nunc
iuuabitur, paulopost eiusdem appositu, inflammationem concipiet.
Nunquam igitur aliquis cum glutinosus crassusque humor superat,
calidioribus leuabitur auxiliis. Verum cum acris aut feruida humo-
ris qualitas praecellit, tum refrigerantibus solatium inflammationis
paratur. Nec miraculum est si materies natura frigidior inflamma-
tionis tempore, & feruore aestuet & incandescat, ut bilis, si ita contin-
gat, admistionem omittat. Porro tophos in artubus impedit coale-
scere lupinorum farina cum oxymelite, vel posca, vel laserpitio, aut brio-
niae radice cum pane. Iam hoc quod sequitur citra noxam mitigat, & me-
diocriter discutit, lycii, ammoniaci, thymiamatis, singulae vnicuique cum
vino veterrimo & oleo omphacino, tritae coquuntur, & e lometo
fabarum, quod sufficit, adiicitur, coctae mediocriter modo cataplasma-
tis applicantur. Post inflammationis statum, tumore relicto ap-

LIBER III.

195

plicandi bulbi per se, vel cum polline polentæ, ad ruborem vsq. hoc enim modo efficacem vsum exhibent. Quod si nihil hisce cataplas-
matis leniuntur, fotibus & superfusionibus erit certandum, maxime
si tumor extrema occupet, chamemæli & meliloti, aut centaurei de-
coctis. Nonnullis etiam cappari decoctum abunde fuit auxilii, hoc
tamen quod infra scribitur, omnibus præstat efficacia. Thymus, origa-
num, satureia, & calamintha, in aceto quam acerrimo cocta, eiusdē
aceti imbre affectæ partes, non semel, aut iterum, sed frequenter in die
fouentur cum fiducia. Hoc præsidio permulti pristinam valetudinem
recuperarunt, quibus non pituita solum, sed flaua etiam bilis fuit in-
festa. Non desunt qui & subsequens medicamentum salutare sint
experti, illicis glandes in farinam redigunt ac diu coquunt, hoc deco-
cto extremos artus per fluxionum initia longo tempore aspergunt.
At quæ interius partes habentur, spongiis fouent & per hæc mate-
riæ impetum repellunt. Idem & bile vitiosis artubus conuenit, quem
admodum ex calida aqua sine aliquo decocto superfusio. Porro do-
loribus qui intenso frigore, aut humoribus inter articulorum ossa im-
pactis contrahuntur, valens hoc est remedium. Olei veteris sesquili-
bra, nitri alexandrini, resinæ terebinthinæ singulorum libra, euphor-
bii vncia, iris sextans, scenugræci farinæ sextarius vnus & dimi-
dius. his autem ea quoque quæ aduersus coxendicum cruciatus scri-
pta sunt, pulchre nimirum opitulantur. multi siquidem aduersus hu-
iuscemodi perfrictiones cum morbus declinauerit, sinapi cum sicca-
tis ficiis vfi sunt, tum aliis quæ extrinsecus ruborem excitant. Alii ve-
ro medicamentum ex cantharidibus admouent, verum hæc in po-
sterum officium, nisi aliquo etiam moliente vtantur, vt, diastrutheon
& pyxide, & basilio, aut diacletes, aut dia ægiru, aut bromio, aut ly-
siponio, aut valentioribus acopis. in quibus etiam nerui consensus,
potissimum & infarctus humorum eueniunt. At ex mulæ lotio, in
morbo statu præsertim, & in frigidis defluxionibus fouere commo-
dum est. Pariter conuenit etiam ex utroque veratro pastillus cum
mollis & fungosus tumor articulos implicat, & fomentum ex sale
torrido, aut etiam aliter e marina calida per spongas artus perfudis-
se vincit. item emplastra ex sale præparata, vel ex lixiuia, & nitro,
hisque consimilia cataplasmata, post vigorem morbi auxilio sunt,
victus ratio fici or minimeq. excrementitia competit, item inedia,
vel parciores cibi, frequentibus balneis abstinendum. At si lauent, ni-
tro aliisque pulueribus vtentur deterforiis. Vbi dolor declinauerit,
exercitiis se credent, & frictionibus maxime articulorum, in natu-
rales balineas descendant, aut etiam arena contexti incalescent. Vo-
mitus a radícula cibisque assumptis mouebitur. Qui ad hoc se com-

satureia
θυμὸς

olei ve-
teris li-
bra una
& dimi-
dia legit
Aldi te-
xtus. &
scenu
græci se-
xtarius
cum di-
midio.

PAULI AEGINETAE.

mode habent, etiam veratro nigro vacuentur per vomitum, vel etiam per aluum inferiorem purgentur.

Quomodo sanguine infestati artus curentur.

QUI ex sanguine dolorem articularium conceperunt, post sanguinis initio morbi detractio, remedia commemorata loco dolenti sunt inducenda, si biliosior quidem acriorque sanguis redundet, eisdem quæ in flava bile diximus, certandum, si frigidior, pituitosiorque, aut melancholicus humor coaluerit, et iis quæ post illa subdidimus præter nimis actia, curationem tentabimus, at si vitium in vetustatem incidit, his quoque locus erit. iam hoc cataplasma in principio proficiet. Malicoria, & rhus cum polenta ex vino detrita obducuntur. ALI V D. Brassicæ folia cocta accurate conteruntur, acetiflores cum duobus coctorum ouorum luteis, & rosacei momento, adiciuntur, leuigataque simul loco iniiciuntur. subinde ea mutando. Cibi assumentur qui extenuant & parum nutriunt, carne igitur & leguminibus & vino copiosiore nigro abstinendum, si autem fieri possit, etiam ex toto vinum circuncidendum, Plurimos siquidem noui, qui prorsus abstemii omnes sanitatem consecuti sint. Alii siquidem per morbi initia omnino liberati sunt. alii in posterum rarius & minori dolore accessiones perceperunt. Quapropter nisi contrarium hinc accidat, aut futurum inde aliquid metuant, perpetuo vitam agent abstemiam. At qui per imbecillitatem, aut perfrictionem aliquid subsecuturum opinentur, ad biennium usque abstemii, inde ad pristinam consuetudinem reuersi, modicum dilutumque continenter bibent. Oportet autem abstemios in vicem vini decocto anisi, aut alicuius confimilis seminis uti, fructibus pomaceis reliquisque refrigeratoriis abstinere, tum veneris usu. Qui vero per medicamenta, quæ per annum bibuntur, morbum prorsus tollere voluerunt, multis sane quibus pituitosus & excrementitius humor articulis incubuerit, opitulati sunt. verum qui calidioribus siccioribusque constarent naturis, hos in subitam mortem præcipitarunt, quod materia ad intestinum, aut renes, aut costas, aut pulmonem, aut principem quandam partem se contulerit. Satiùs itaque est biliosiore præditi habitu, aut copioso sanguine refertis, vini usu interdiceret, quod nullus ex eius abstinentia, in commemorata vitæ pericula inciderit, frigidiore autem & excrementis pleni, ex viperis theriaca uti debent, hyeme frequentius, concoctione bene obita, per æstatem rarius. vel enim morbo liberabit, vel certe leuiorem reddet, nulli ex prædictis particulis officiens, quoniam vero nonnulli nos etiam commemoratis uti antidotis cogunt, non te lateat id quod ex damafonio constat & quod ad Agapetum refertur, item quod atacton & octoidon dicitur, et quod

malicoria λέμματα των ροίων.

Accusat pene hos, qui ægris per annum potui dant aliquid vel ligni vel cuiuspiam radicis. Quæ quidem res periculū creat

LIBER III.

Proclo inscribitur, item quod ex scordio, aut corallio componi soli plerisq-
tum est, alia pleraq- non mediocriter proficere, omnium vero securis magisq-
simum est longoque usu probatissimum, diacorallii, siquidem concre-
tas iam in tophum duritias discutit. horum omnium vires & modum
usus, & quid in his cauere debeat volumine, quod compositis medi-
caminibus dicatum est, reperies similiter aduersus articulares dolo-
res, medicaminum quæ psilothra vocant, misturam usumq- in eodē medi-
habitu, nempe pituitosiore. Alii vero qui a toto se morbo vindicare
volunt, integras vulpes oleo incoquunt, quo articularis morbis me-
dicantur. Non desunt qui viuas lebetibus magnis iniiciunt, alii tantum
emortuas. Pari modo et hyænas percoquunt, oleum hinc conficiētes, quod
discutiendi vim habeat. deinde eo balnei solia complēt, in quæ postquam
descenderunt, immorari ibidem diutius præcipiunt. unde sæpe factum, ut
non modo artuum tumores, sed etiam vniuersum corpus euacuaretur.
4 Vetus liber, τοῖς ἐπ' ἐκείνων, id est iis quæ in illis dicta sunt.
+ Veteres libri habent hoc loco ὅσοι δ' ἐδὴ ἀδένειαν ἢ κατὰ συ-
ξιν ὑποπτύσσοντες τι φάνοιντο, ac qui per imbecillitatem aut perfri-
ctionem expuere aliquid videntur.

De tophis, quos græci poros vocant.

QUONIAM & tophi subinde in articulis creantur modo
ob humoris qui ad eos decubuit crassitiem, terrestremq- duritiam, mo-
do propter immoderatos discutientium resiccantiumq- medicinarum
usus, sine earum mistura quæ emolliendi virtute pollent, sciendum ve-
nit ea esse conuenientiora, quæ mollientem simul & discutientem na-
turam sortiuntur. itaque emolliunt adipēs vetusti, medullæ, ammo-
niacum, bdellium, oleum bene vetustum & styrax. Discutiunt autem
& resiccant, nitrum, sal, lixiuium, adarce, euphorbium & confimi-
lia. verum ad concretos in articulis tophos proprie facit vetustissi-
mus acerrimusq- caseus cum suillæ carnis præpinguis ac veteris de-
cocto contritus & superimpositus. siquidem sua sponte topho dehi-
scente quotidie humor qui intus coierat, eructatur. Valet etiam me-
dicamentum diapernes, usu probatum, quod duplici modo præpa-
ratur. item quæ dia stactes dicuntur. iam hoc peculiariter facit quod
recipit spumæ nitri, resinæ terebinthinæ, lixiuii quod calcem ad-
iectam habet, propolis, singulorum triens, ceræ bes, colophonix
libra, olei scuncia, mixtis utitur, tum in tophis, tum in abscessi-
bus, iam quod ex cynabari temperatur, mirificum est ad tophaceos
tumores, aliaque complura, sed ægre paratur. Quod vero dia le-
ptocaryon dicitur, præterquam quod probatum, etiam facile con-
quiritur, non solum valentioribus, sed teneris quoque corporibus
accommodatum, si assumat medicamenti ex melle, vel ex ane-

PAULI AEGINETAE

none confecti partes duas ad illius partem vnam, quæ si desideren-
tur, etiam eius quod cerusa constat, subinde æqualis modus ipsi misce-
tur. ALIVD. Ad tophos, sandaracham contritam querneio visco
excipito, & vtilor. ALIVD. Proficit etiam ad fistulas, & ægylo-
pas, olei sextarius, spumæ argenti vnciæ octo & semis, auripigmen-
ti vncia. Argenti spuma, oleumq; tantisper incoquitur dum manus
non inquinet, postea tritum auripigmentum aspergitur, & priusquã
vstionem senserit medicamentum ab igne tollito, ac vtilor. Ex asil-
lapidis flore confecta, vbi morbus intermiserit imponuntur, quæ ad
omnium articulorum nodos concretos accommodata toto morbo
liberare, nonnulli veterum testatum nobis reliquerunt. Et ex salis
flore præparatum medicamen si in morbi declinatione similiter im-
ponatur, tumorum reliquias discutere experimenta fidem fecerunt.

Quomodo quis a podagra se tueatur asseratq;.

PODAGRAM quæ iam constiterit, articularium ve dolo-
rem, sine prædicta medendi ratione aboleri longe difficillimum est.
At eam quæ nondum creata est præcauere, facilius, si quis cibis de-
mat, & eis vtatur quæ prompte in membra digeruntur, excremen-
tisq; vacant, item vino moderatiore & exercitationibus satis se cõ-
mittant. Quod ad præsidij partem attinet, sal minutim in oleo tritus
& articulis affricus, omnes qui se ab hoc vitio vindicare volunt,
magnifice iuuat, nisi præter modum sicca intemperie sint præditi,
eoq; illitu, & mane, & vespere per totum vitæ curriculum, & vbi
inflammationes inclinauerint, vtendum est.

Ad perniones qui tum pedum plantas tum cal-
ces infestant. Cap. lxxix.

Perniones vlcera sunt, quæ ex frigore hyberno in digitis manu-
pedumq; contrahuntur, Græci chimethla nuncupant. Itaque te-
pidam aquam marinam superfundere oportet, vel betæ decoctum,
vel lenticulæ, vel erui, vel hastulæ regix radice. A superfusione, len-
ticulæ coctæ vinoq; detritæ admouentur, vel ficus ex oleo leuigata
imponitur, vel alumen & farina pari modo, in vino pertrita applica-
tur, aut floces vini subaridæ, aut bulbus recens vino tritus adglutina-
tur, aut allia in oleo fricta, proiectaq; & cera oleo mediocri liquefa-
cta imponitur, aut malicorium incoctum vino, & in tenuem reda-
ctum puluerem, cerato rosaceo exceptum inducito, prius locum de-
cocto lupinorum irrotans, aut mannam, sulfurq; ignem nõ exper-
tum, cum melle cocto imponitur, at alterci succus continenter illi-
tus, ab inflammatione & doloribus vindicat.

Marcellium ad perniones.

RAPAE fatiux radice excavata, conicitur in capacitatem

regix ra-
dicis
ασφο-
δελου

ipſius ceræ ſextans, olei lentifcini quantum ſufficit, cocta in duplici ſextans
 vaſe ex marina aqua, aut muria, aut lupinorum decocto, hoc quidē γογγύλη
 ſuperfundito, ceratum vero in rapa liquefactum frigidum imponito.
 At in exulceratis pernionibus, thuris, aluminis ſciſſi, minii, refinæ te
 rebinthinæ ſingulorum par modus, adipe ſuillo diluta inducuntur.
 Verum ſi inflammatio exulceratos perniones male habeat, medica
 mento vtendum hexapharmaco quod recipit olei vncias nouem,
 taurini adipis & fellis, ſingulorum libram, argēti ſpumæ vncias ſex,
 colophonix, vncias quatuor, mellis vncias ſex.

Ad digitorum rimas totorumq; pedum
 quæ rhagades dicuntur.

PICE liquida delinuntur, aut cancro fluuiatili, aut marino ſu
 per carbonem cremato, teſta abraditur, & cū oleo trita vt mellis ſpiſ
 ſitudo ſit, abſterſis prius ſciſſuris inſtillatur. Proſicit etiam ſcillæ me
 dulla oleo ſeruata, item cum terebinthina leuigata, nec non cornu termin
 caprillum uſum, ex ceptumq; adipe caprillo, ſed callos circumpur
 gare oportet, & ſic medicamenti vti. thina
 quoque
 quidam
 legunt.

Ad ſciſſuras calcaneorum & plani pedum, anthera.

CALCIS viuidæ drachmæ decem, ceruſæ drachmæ viginti,
 ceræ tantundem, aut triginta, porcina pinguedinis recentis vnciæ
 ſeptem, colophonix vnciæ nouem, ſucci lini ſeminis cyathus, olei
 dulcis vnciæ quadraginta, teneram plantam efficit vt aliud nullum.
ALIVD. Adipis caprilli, ceræ, olei ſingulorum pari menſura uti
 tor. **ALIVD.** Malicorium aceto incoctum diebus quinque appli
 catur, deinde loco vndiquaq; purgato calx viua cum oleo, aut ſordi
 bus imponitur. **ALIVD.** Scilla cocta oleo, ipſa quidem fricta
 proiicitur, oleo vero in quo tamen terebinthina liquefacta ſit vtitor.

Ad attritus calcanei ex longo decubitu.

CERAE, olei, argenti ſpumæ, mellis, pares modi, proficiunt in
 omni exulceratione, plantæ pedum, calcanei, ſupernæ partis, & in
 ternæ digitorum, magiſq; ſi vlcus vngui ſit propinquum.

A ſordida plantæ vlcera emmoton, facit
 etiam genitali exulcerato.

AMVRCAE cyathus, aceti cyathus, cocta vaſe æreo donec
 melleam ſpiſſitudinem habeant, & trita ſeparatim, proſunt. Itē ſqua
 mæ æris drachmas duas, mannæ tantundem, lanarum ſuccidarum
 mollium, quantum manu comprehendere poſſe, inuolutarum tedæ,
 uſtarumque cinerem totum excipito, & vtitor, in vulneribus qui
 dem vino diluens. in naturalibus autem & pedum plantis paſſo.
ALIVD. Amurcæ, mellis deſpumati, paria pondera, hoc etiam
 cicatrices tollit.

PAULI AEGINETAE.

Ad intertrigines, ex calciamentis.

P V L M O agninus, suillus & caprillus benefacit, verum coria ex veteribus calceamentis combusta, si inflammatio vrget, nihil quidem adferunt praesidii, sed illa finita, multum, vel cepa cum gallinae adipe copiosior adicitur, vel galla combusta inspergitur, vel acacia aceto diluta illinitur.

Ad clauos callosq.

Cap. lxxx.

nigra ce
ra fex
ex aluea
ribus a-
piu huc
morbū
tollit &
purulēta

Claus prius vndiquaque purgatis, inducitur medicamentū quoddam ex edentibus, quae septica Graeci vocant, aut ærugo rasilis, aut sandaracha, aut syringiacus pulvis, aut collyrium syringiacum loco gummi, ammoniaco exceptum. Est autem clauus teres figura callus, candidus, clauorum capiti similis, qui in omnibus corporis partibus, sed pedum plantis, digitisque praecipue nascitur. Tollitur autem longiori tempore, etiam si quis excedentem clauī partem continue abradat scalpello, aut pumice affricet, similiter etiā callos. Proficat lupinorum crudorum concrematorum cinis cum melle, aut misy, liquida pice exceptum, melanthion cum vrina pueri venerem non experti, vel oui luteum, fabarum lomento cum aceto incoctum. At hoc subinde expertum est, cantharidum, atramenti sutorii, castorei, par modus singulorum, excipitur terebinthina, vt emplastri fiat spissitudo, clauoq; prius circunciso, imponitur. **ALIVD.** Feculae, calicis viuae, visci, singulorum pares portiones, cum stillaticia lixiuia, vel vrina pueri venerem non experti.

ἀφθόρον
purum
græcivo
cāt, tā eū
q. nō pa
rit q. q.
veneris
ab alio,
q. q. non
infert. q.
græcorū
licentia
hisce a-
moribus
licebat
operam
dare.

Ad vnguium vitia, & primum de reduuiis.

Cap. lxxxi.

Quin et
Græcia
libidinē
adeo ad
mittebat
vt Pau-
lus quo

Reduiæ, Graeci paronychiam appellant, abscessus est qui ad radices vnguium coit, cum parua adhuc est, & prima habet rudimenta, galla cum melle eam reprimat, & confirmari prohibet, vel Musae pastillus, vel Heræ, ex aqua. At vbi caro iam præter naturam excreuerit, eo curatio dirigenda est, vt per rodentia medicamenta absumatur, rumpaturq; valet autem ad reduuias, tum aurium sordes, tum lœum. Suppuratas autem reduuias, acu adacta humorem emittere, spongiāque aqua imbutam imponere oportet, vel lenticulam applicare ex aqua tritam, aut palmulatum cum vino, vel resas virides, vel siccas, aqua maceratas tritasque, vel polentam cum aqua, efficax est reduuiis etiam lupinorum farina melle, vel mulso macerata. Exulceratis reduuiis opitulatur hoc medicamentum. Aeruginis, argenti spumæ singulorum drachmæ quatuor, sarcocollæ tantundem, super linamentum ex vino & spongia imponitur. Conuenit autem carnem vndiquaq; ab vngue diducere.

De pterygiis.

LIBER III.

118

PTERYGION carnis incrementum est, aliquam vnguis que hic partem operiens, ex reduuia, aut alia huiusmodi causa proueniens, noster aduersus quam auripigmentum & manna pari pondere inspargitur, quodā super autem, linamentum ex vino & spongia imponitur. **ALIVD.** in loco Chalcitidis squamæ, malicorii æquales partes. Excipiuntur sicō to- quum re sta & melle, parte affecta, lupinorum decocto prius aspersa. Quod cta cum autem siccum est in vngue circuncidito. scemina

Ad digitorum pterygia putrida, item ad pudendorum vlcera.

LACHRYMAE thuris drachma, squamæ drachma, æru- ginis rasæ drachmæ quatuor, mellis cyathus, teruntur in sole do- mus, mo nec subflauescant. Et loco vino prius irrorato per splenium indu- re. n. pi- euntur. sciū ho-

Medicamentum quod subito pterygia deficcat persanatque.

SORYOS combusti drachmæ duæ, thuris tantundem, æru- ginis rasæ drachma, cum melle contrita, ipsi pterygio inducuntur. partibus antio- Valet etiam ad reliqua maligna horum locorum vlcera, nigritias & ribus im- putredines. **ALIVD.** Squama æris, palmularum carne excepta, plexi ho- aut ficorum vtitor. **ALIVD.** Columbæ sterus cum polentæ pol mines p- line ex passo coctum pertritumq; calens imponitur, item squama per mia ue- se inspersa, pterygia deficcat. Oportet autem crebro, angulum vnguis querunt, pterygion pungentem, ne increseat, scalpello superimmissio, adi- more se rare a- mere. uerso in

Ad vngues contusos.

MYRTHI, & mali punici foliis teneris vngues obducito.

Ad cruentos vngues.

FARINA pice mista imponitur.

Vt vngues qui laborauerunt abscedant.

SULFVR tritum adipe suillo exceptum iniicitur.

Vt scabri vngues, abscedant.

VISCI quercini, sandarachæ, scenugræci singulorum pondo sextans, cantharidum, thapsiæ singulorum uncia, aceti quod satis est. **ALIVD.** Propolis attritæ, ceræ, bituminis, singulorum drachmæ duæ, sulfuris ignem non experti drachma, oleo non inquinat, in vsu calefactum vnguibus applicatur. **ALIVD.** Picis liquidæ, ceræ, colophonix, terebinthinæ, guttæ ammoniaci, sulfuris viui, aphronitri pares portiones, ne manus inquinent. **ALIVD.** quod separat scabros vngues sine exulceratione. Bituminis, auripig- menti, sandarachæ, sulfuris viui singulorum drachmas quatuor, resina excipito & vtitor, dissoluens per dies septenos. **ALIVD.**

que hic noster quodā in loco quum re cta cum scemina copulari nō possu- mus, mo- re. n. pi- sciū ho- nesto partibus antio- ribus im- plexi ho- mines p- mia ue- neris ac- quirunt, more se- rarū a- uerso in- guine vt- ineamus sceminā absq; no- xa, pce- perit.

PAULI AEGINETAE

Erui farina, felle ouillo, vel vrina ouilla imbuta vtitor, vel calce-
ua cum oleo, vel chia cum opobalsamo, vel visco, atramentum su-
torium, sulfurque viuum quod satis est, exceptum, pelli illitum su-
perinducito, vel herba pedicularia, cum aceto trita vtitor, vel
resinæ terebinthinæ drachma, sandarachæ duplicata, por-
tio simul radici vnguis imponitur, diligentiq; fascia
illigatur. Cum autem vnguis exciderit, cera-
tum myrteum, cui medicamenti ex resina
paululum adiectum sit, super-
accommodatur.

FINIS III. LIBRI PAULI AEGINETAE,
Ioanne Guinterio Andernaco Medico Interprete.

119
PAVLI AEGINETAE

LIBER QVARTVS,

IOANNE GVINTERIO

ANDERNACO MEDICO

INTERPRETE.



De elephantia.

Cap. I.



ECTE mea sententia † Cappadox Aetius
memoriae prodidit, auxiliorum vim morbis
fortiorem esse oportere, eoq; elephantiam nun
quam curari, vt qua nulla potentior medicina
reperiatur. Si enim cancer veluti elephantiasis
quædam vni obortus particulæ inter morbos
insanabiles vel ab ipso Hippocrate relatus est,
quanto magis elephantia, seu totius corporis

cancer aliquis, ab omni abhorrebit remedio? Cum enim atra bilis,
ex qua huic affectui origo est, duplici modo generetur, (vel enim ex
melancholico sanguine, sæculentiorq; & veluti eius limo, vel bile
flaua, vtriusq; nimium vltis, nascitur) subrubicundam quidem elephan
tiasim mitiorem quodammodo, vt autem verius dixeris, minus ma
lignam, prima ipsius differētia procreat, reliquam vero, & malignio
rem in qua totum corpus scædatur vlcerebus, & extrema decidunt,
altera flauæ bilis supra naturæ modum adustæ soboles, producit.

Quapropter morbo iam victis manus ad mouenda non est. At si re
cens adhuc malum est, vt nihil ex summis deciderit, nulla autem in
festarit exulceratio, neq; tamen eminentiæ tuberosæ plurimum exur
gant, sola autem facies aspectu ingrator, deformiorq; sit quodam
modo, eaq; non admodum indécora appareat, curationem experie
mur. Nonnulli siquidem haud pauci, sola capitis adustione multos
qui hoc inceperant vitio corripere, ne vincerentur, inhibuerunt. Proti
nus ergo inter initia sanguis mitti debet, et magis vere, in quo potis
simum hæc lues & nascitur, & intenditur. paucis diebus interposi
tis, nouem decemve, pulte diacolocynthidos ipsos purgabimus, non
semel, verum subinde, ex ratione virium quantitatem medicaminis
adaucturi. Item ex hiera purgatio his est idonea. Rursus interposi
tis circiter decem diebus, lactis sisilis serum dabitur, neq; minus tri

mali
gniores
morbi
ex adu
sta flaua
bile pro
uenire so
lere, ob
id causæ
videli
cet, quia
quasi ex
gemina
bile con
stant.
prius ex

PAULI AEGINETAE

bus heminis, neq; amplius quinq;. Insequenti tempore non fisto, aut recens multo lacte nutriuntur. Ob quæ si morbus remittat, eodem uti cibo debent, si remanet, lacte abstinebunt, acribus autem assumptis vomitus cietur, a radícula, aut cibis. Proficit & ex albo veratro post hæc purgatio, bis quidem, si fieri potest, vere, semel per autumnum adhibita. Malo uictis neq; sanguis mitti, neq; ueratrū exhiberi debet, cum materia neque ex cute in altum deriuari, neque hinc torres vir etiamnum minui possit. sed ea quidem ad uentrem, & intestina degineo sã ducenda est. Medicamentis autem noxia euocantibus utendum, guine, si metasyncritica dicunt, & summam cutē desiccare, & astringere oportet. Leues igitur cucurbitulæ uentriculi ori & præcordiis agglutinantur. Histori- buntur, eadem membra etiam dropace delinentur. Modico tempore, scri- ris processu rursus ad superiora reuertendum est, a purgatione quam ptu testa- præstat hiera, incipiendo, prætermissa sanguinis detractio, ut quæ tuq; legi plus noxæ, quam præsidii esset allatura. Atque hoc circuitu ad terminus, ablu- nas uices quaternas uel per annum uti expedit, uere potissimum & ti hunc autumno. potare his prodest aceti cyathum, cum cedrini liquoris cyathum, & brasicæ crudæ succi cyathis duobus. mista dantur mane & lepræq; et uelperi. Vel syderitidis herbæ folia torrida denarii pondere in uini cyathum, uel cornu ceruini drachma, & scillitici aceti quantum cyathum abege- thus implet, quotidie post matutinam obambulationem potui exhibetur. Quæ- betur. reliqua uero pro ratione temporis his offeruntur, uel scillæ lore & uir- tæ drachmæ quinque in mulsâ, uel melle. eclegmatis modo, uel liginis isan- quoris cyrenaici ad erui magnitudinem, melle & butyro subacti, uel guine eboris ramenti drachma semissis cum uini cyathis duobus, uel cumi deos pla- ni æthiopici drachmæ tres cum melle, instar eclegmatis. His am- cari ma- plius iuuat theriacorum pastillorum drachma in uini primæ notæ gisq; rea- cyatho leuigata epotaq;. Similiter etiam scilliticorum pastillorum lia inter drachma bibitur. Et calaminthæ succum ceu efficacissimum potu au quosdam xilium commendant. incipiendum dicunt a cyathis ternis ad usque se- populos nos. Cæterum omnibus his efficacior est theriace ex uiperis, tum uetus opi potui data, tum extrinsecus illita. Cum autem uiperarum copia da- nio plura tur, nihil æque proficit, ac uiperarum carnes comestæ, albo iure ex co- secula p- profiore aqua, sale, porro, & anetho decoctæ, usque dum spinæ dissol- mansit. uantur, sed capitibus ipsorum caudisque digitos quatuor prius ampu- Ita char- tatis, interaneisq; ipsorum ablatis & cute. Item theriaci sales eadem taginen- per se promittunt, cum obsoniis assumpti. Tali enim ipsorum usu ac- ses et col- cidit, nonnunquam squamas, † uel ceu uulpis pellem quandam ex- chi scy- cute elephanticorum decidere.

† Aldinum exemplar habet καππαδοκην ἀγερῶν, Cappadocem
dā græc., Arctæum, quæ lectio rectior mihi uidetur.

LIBER III.

120

† Vetus codex, συμβαίνει ποτέ λεπιδας ἢ δῖόν τινα λοπὴν, quo loco legendum arbitror, ἢ δῖόν τινα λοπὸν. est autem λοπὸς τοῦ κρομμύου λεπύρον, idest, cepæ tunica, vt sit sensus, veluti cepæ tunicam & tenuem illam pellem.

Victus ratio talis erit.

A S O M N O manu molliter permulceatur, aluoq; deiecta gestetur, vocem exerceat, deinde perfricetur & uario exercitationum genere utatur, nunc saltu, nunc magis, alteribus, & folle. Postea sudore, quem illinc contraxit, absterfo delinetur adipe ursina, aut uulpina, aut hircina, aut amis alicuius, aut butyro recenti. pauxillo temporis interposito in lauacro perungetur succo fœnu græci, aut ptisanæ cremore, aut ammoniaci momento, quod aceto subegeris. A balneo detersus perungetur oleo lentiscino aut cœnanthino, aut myrtheo. Vinoque modico cum alumine, vel ammoniaco, ut sordium sit spissitudo. Rursus teneris panniculis abstersus dimidia hora conquiescat. Inde potu aquæ ad uomitum sollicitetur, digitis in os, aut pinnis demissis. post vomitum detur potui vinum absinthites, aut origanites. Cibus erit panis hordeaceus, uel maza ex polentis. Inter olera, beta, lactuca, raphanus porra, brassica aquis binis edulcata, & capparitis. Ex marinis ostrea sumuntur, pelorides, erinacei, pectines, tellinæ simul cum betis incoctæ, fassamentum uetus ceu in medicamento uicem adhibetur. Vino autem per totum morbi curriculum & uenere similiter abstinentum. At cum uires ex purgationibus lacescitæ recreantur, pauxillum duntaxat uini tenuis & aquosi assumitur. quando & acria circuncidi debent, exceptis condimentis. Recteque ipsi datur prisana, oua, chondrus elotus, lac, mel cum pane, malua, rumex & fisanum, piscis molli præditus carne, Ex iis quæ uolatu fiunt, probis donata succis, Inter fructus, ficus, uua, & uua passæ, ex dulciariis mellitis conferunt, quæ pini nucleis, aut amygdalis frictis, & cnico, constant, iis qui bis quotidie cibum capere solent. graue autem his est molestumq; semel duntaxat eum assumere. Interiorum cura habita, sine gmatibus in balneo utendum ex decocto betæ, aut fœnu græci cum aphronitro, aut sapone, aut myrobalano, interim & psilothris. Abstergit itidem portulaca cum aceto detrita, tenue semperuium, rumicis radices aceto incoctæ, alumen cum sale. Item sandarachæ par modus ex uino, & oleo lentisci. Huc spectat medicamentum, ad utiliginis speciem quæ alphos dicitur, accommodatum, ex alexonio, nitro, myrtho, sulfure, fici agrestis foliis siccis, cum aceto tritum, illitumq; id præstat quod ex sepiæ testa cōcremata sit, pumice, nitro, terra cimolia extorrefacta, gummi, galla omphacitide pari pōdere siccū in-

ciæ nationes humana hostia diis faciebāt. Sciēdū autē cā laminā sero lactis ebibitā sana re hunc morbum & chæradas strumas simul illā tā insperfamque. Philoso phi tamē hoc ex theriaca efficacissimū omnium esse contendunt.

alii legunt myrrha p myrto

PAULI AEGINETAE

auripig
menti
ἐπε-
νοῦ.

quare au
tem qui
dā mor-
bi conta-
giosi

spersum, aut ex aceto infricatum. Hoc autem mirabiles habet effe-
ctus, rumicis radicum fasciculus qui manu comprehendi possit, nitri
drachmæ quadraginta, thuris vigintiquinq, sulfuris tantundem. ex
aceto Aegyptio illinitur. Similiter hoc efficax est, quod recipit auri-
pigmenti drachmas decem, sulfuris ignem non experti drachmas
octo, costi drachmas duodecim, calcis viux drachmas quatuor, ce-
ræ totidem, baccarum lauri aridarum drachmas duodecim. Hæc ma-
cerantur populi albæ foliorum succo, aut crasso decocto. Vbi mellis
spisfitudo est facta, illinuntur. A L I V D. Radicum rumicis fascicu-
li duo, aceto incoquuntur, & in pilam coniecti conteruntur læuigan-
turq. Deinde alcyonii libra, aphronitri vnciæ octo, sulfuris ignē non
experti libra, cochleæ testarum combustarum triens, † chamæleon-
tis cum radice triens. Omnia simul læuigantur, donec sordium fiat
crasfitudo. Deinde illinuntur per æstatem in sole frequenter, hyeme
in balneo vsq; ad desudationem. Item Aesculapii aridum smegma
pulchre his conueniet, ac omnia quæ communiter dicuntur smegma-
ta, imo etiam ea quæ alphis dicata sunt, proprie huc pertinent. quem
admodum & quæ nunc aduersus illa prodidimus. At tumidas emi-
nencias si inflammatione tententur, aut exulcerata sint, delinentur ly-
cio indico, vel glaucio, vel aloe vel Andronii pastillo, aut polyidæ
sphragide. Cataplasma ipsis aptabitur ex chondro cum succo poly-
gonii, vel plantaginis, vel parietaria trita. Insuper melissæ herbæ vi-
ridis folia cum axungia tunsa, applicataq; mirabiliter proficiunt. Et
enim rubor in partibus excitatur, sed ex facili remittitur pane appli-
cato, aut cerato ex amygdalino atq; color naturalis redit. Ex ulcera-
tis recte accommodantur emplastra, tum ex diphryge præparatum,
tum ex vino melinum. Adde Coracion, quodq; constat ex oxyme-
lite, & pastillum Andronii, pompholygem, & cadmiam. indicium
vero est totum morbum mitescere, si prima vlcera cicatricem reci-
piant. Ad spirandi vero difficultatem eorum qui elephantia labo-
rant, aselli sub aquariis degentes, quinq, aut sex, ex aquæ mulsæ cya-
this tribus potantur. Iam vero quædam ex iis quæ ad ægre spiran-
tes inscribuntur, ipsis quoq; communiter competunt. Aquarum na-
turalium vsus adhiberi debet, ceu maxime necessarius, præsertim alu-
minosarum, ferrumq; resipientium. & si fieri potest, frigidarum. Con-
ferunt ipsis si etiam bibantur, nec non marinæ arenæ vsus. Eandem
habent efficaciam omnia quæ desudationes mouent. Quoniam ve-
ro affectus hic, non minus ac pestilentia contagiosus est, quam lon-
gissime ab vrbibus remoti ægri, in locis mediterraneis, frigidis &
vbi sit hominum si fieri possit, infrequentia habitabunt, inde vero ad
confinia migrabunt, † tum ipsorum causa, tum illorum potius, qui, vt
vero

LIBER IIII.

127

vero simile est, ipsis incident. Quippe & aere fruentur commo-
diore, & alios hac lue non inficient.

+ Vetus liber habet, χαμαλέοντες μέλαντες τοὺς ῥίζης, id est, cha-
mæleontis nigri radicis vnciæ tres.

+ Hic locus sic legitur in veteribus libris, διὰ τε αὐτὸν καὶ
τοὺς ὡς ἐκὼς ἐνδύομένους συχνότερον, id est, tum ipsorum causa,
tum illorum potius qui (vt vero simile est) frequentius incident.

De lepra, & scabie, quæ psora dicitur.

Cap. η.

V Terq; affectus, cutis aspritudo est cum priritu, in qua corpus
absumitur colliquaturq; originem ex melancholico humore
trahens, sed lepra altam cutem orbiculatim depascitur & piscium
modo squamulas ex se remittit. Scabies vero summa infestat potius
varie figurata, furfuracea q; remittit, in quibus sanguinis dimissio ad-
hibenda est, si corpus magis plethoricum videatur. sin minus, pur-
gatio certe ex iis quæ atræ bili vacuandæ sunt. Extrinsecus autem
vtere iis quæ atræ bili vacuandæ sunt. Extrinsecus autem vtere cō-
muni utroq; veratro, calcemq; habe elotam & ficcā, in ipso autē
vsu, aqua diluens ad sordium spissitudinem illinito. **ALIVD.** Sal-
uæ, oleæ æthiopice lachrymæ, singulorū mdrachmæ octo, cappa-
ris radicis corticis, gummi, singulorum drachmæ quindecim. Inun-
guntur ex aceto ad solem, proprie vero lepras disiciunt anemone
applicata, item vitis albæ radix. Composita vero hæc, lolii farinæ
choenix, cardamomi albi drachmæ quatuor, nitri spumæ drachma,
atramenti sutorii drachmæ octo, hastulæ regie radicis mediæ drach-
mæ quatuor. Aceto pertrita, & in cerati spissitudinem coacta il-
linuntur, parti prius nitro detergæ, vbi solueris (solues autem tertia
die) & frigida aqua elueris, rursus inungetur. **ALIVD.** Hastulæ
regie radicis succi vnciæ sex, sulfuris ignem non expeti, mannæ,
singulorum drachmæ decem, nitri drachmæ octo, aceto subacta il-
linuntur. Ad scabiem peculiariter facit, ex simplicibus herba pecu-
liaris, staphis agria dicitur, lupini amari, cardamomum cum aceto,
lilii radix cum melle, resina terebinthina, sulfur, cicer, caprillum ster-
cus. Inter composita, misy & chalcitis pari modo ex vino humi-
diores scabies delinuntur. **ALIVD.** Rhododaphnæ tenera folia
in olei sextario simul incoquito, donec arescant. Ac vbi proieceris,
oleo adiuge ceræ dealbatæ vncias tres, postquā soluta refrigerataq;
fuerint, sulfuris viui vnciam inspergito. ad solem, vel in balneo per-
ungito. nonnulli simul cum rhododaphne et etiam scillam coquūt.
ALIVD. Medicamenti διὰ χυλῶν, hoc est ex succis herbarum
confecti vnciæ duæ, ceræ tantundem rosacei vncia argenti spumæ
vnciæ tres, cerusæ totidem, liquidæ picis vnciæ sex, stercoris argenti

sint, qui-
dam nō
sint, re-
quire in
probl.

saluæ
ἐλελίσ-
φακον.
aliter de
narii tre
decim.

hastulæ
regie
ἀσφο-
δέλου

PAULI AEGINETAE

unciae duae, serici tantundem, aceti quod siccis laeuigandis sufficit.

ALI V D. Cerusae semuncia, amyli tantundem, plumbi vncia, lota-
riorum rubrorum vel anchusae, unciae duae, ceræ unciae sex, rosacei
unciae nomen. Anchusa probe cum rosaceo coquitur, deinde reliqua
adiiciuntur. **ALI V D.** Oua decem, uel quot ad usum opus est,
aceto quam acerrimo macerantur, quousq; putamen ipsorum tene-
rascat, lutea in eodem aceto coquantur, laeuiganturq; rosaceo, & re-
liquo aceto etiam argenti spumæ modicum ad sordium spissitudi-
nem coactum illinitur. **ALI V D.** Ouorum quæ in aceto com-
maduerint, lutea tria, rosacei unciae sex, sulfuris uiui unciae tres, laui-
gatis prius cum aceto luteis & sulfure, ceratum adicito. Argenti
spuma uero oxyrodino detrita, ut emplastri crassitudo fiat, acriores
scabies exterit. Iam uero ex lapatho smegmata, & ex iis quæ ele-
phanticis faciunt, plura communiter tum ad lepras, tum ad psoras
conueniunt.

De Impetiginibus

Cap. iij.

Impetigines ex serosis tenuibus, acribusq; humoribus, crassio-
ribus aliis mistis contrahuntur, celerrime in scabiem, & lepram
transeunt. quapropter remedia ualide siccantia requirunt. Corpo-
re igitur toto, si opus fuerit euacuato, simplicia quidem ipsis con-
ferent, cicer, ueratrum, erinaceus saxatilis, pix cerato, resinæq; mista,
crocodili terrestres stercus, atq; sturnorum, cum oryzam solam ede-
rint. Pleriq; hoc solo impetigines mentum infestantes, alismæ par-
ticulam, aboleuerunt. Tritici multum capitur, incudiq; ignitæ cul-
piam imponitur, & quicquid inde humoris defluit, calens adhuc im-
petiginibus illinitur. Puerorum impetigines, hominis salua cõti-
nue defricantur. His opitulatur pruni gummi illitum. In vetustatem
incidētibus viticis folia cum aceto detrita applicantur, vel cappæ-
ris folia similiter. Composita uero hæc, sulfur cumthuris lachry-
ma, aut cum ammoniaco, subactum aceto illinitur,

Pastillus ad impetigines.

GL V. TINIS fabrilis drachmæ quatuor, thuris drachmæ tres
aceti cyathi dimidium, aceto soluta illinuntur. **ALI V D.** Chalci-
tidis, gummi, singulorum drachmæ octo, sulfuris ignem non exper-
ti, misyos, singulorum drachmæ sex, squamæ æris acaciæ, singulorū
drachmæ duae, aceto delinuntur. **ALI V D.** Sulfuris uiui, nitri spu-
mæ, singulorum drachmæ quatuor, cathyros grana sexaginta, laui-
gantur ex aceto. Sola uero pars vitiata inungitur, sed ita, ut quæ in-
tegra est, non coinquinetur, exarsacta, aqua frigida eluitur.
ALI V D. Veratri albi drachmæ octo, farinæ lupini, buccinorū
combustorum, nitri, singulorum chœnix. Arido medicamine defri-

centur. Porro impetigines, quas *ἀγρίους*, id est, feras appellant, mediocriter siccantibus remediis non discutiuntur, acrioribus autem irritantur. Adhibere igitur oportet medicamenta abunde quidem efficacia, sed quæ non valenter erodunt, quale est istud, Glaucii, thuris, alcyonii, bituminis, sulfuris, gummi singulorū vncia aceto inungit. **ALIVD.** Picem aphricanam cum aceto coctam liquatamq; illino. **ALIVD** ad impetigines & pruritum. Atramenti sutoris, sulfuris viui, nitri, thuris pari modo, in impetiginibus quidem, aceto adiecto, in pruritu autem, vino vtitor. **ALIVD.** Leichenicon, ab impetiginibus curandis nuncupatum, Guttæ ammoniaci, erui farinæ, lupini farinæ æquales portiones aceto illinuntur.

De Pruritu.

Cap. iij.

P Ruritus qui senibus accidit, ex toto nunquam consanescit, verum lenitur infra positis remediis. in reliquis ætatibus, si ex praui humore contrahitur, qui nimirum biliosus, aut pituitosus putris vel etiam fallus est, per ipsius vacuationem tollitur. Porro cognoscitur ab ætate, temperamēto, victus ratione, anni tempore, regione, & reliquis his consimilibus. Si igitur in venis simul cum sanguine redundare videatur, a sanguinis dimissione auspicandum est. Sin autem qualitate magis peccet, congruis eo medicamentis vacuato, ad externam curationem diuertemur. Lauandum itaq; prorsus ieiunū est, nonnunquam & modico cibo sumpto, iterum lauandum, quippe vitiū vix inhumescit, detergitur autem fœnugræci decocto, aut betarum, aut furfurum, aut malux agrestis & satiuæ, aut ptisanæ. Præter hæc, farinæ etiam fabaceæ, vel lupini, vel myrobalini, vel smegmatis ex pepone præparati, quod *πετυγκτόν* appellant, si inueterauerit, lauatio similiter quidem conuenit, fotus autem ex saluix decocto, myricæ, mercurialis, origani, pulegii, baccarum lauri, cucumis sylvestris radicis, capparis, lixiui, & oxalme. Deinde resparguntur arido nitro, vel cum fœcula aceti, vel quod recipit nitri spumæ sextarium, thuris, sulfuris viui singulorum libram, cimolix libram semissem. Vel hoc, Aphroniti, sulfuris viui, alcyonii combusto, pari modo. siccis vtitor, vel cum quodam ex supra dictis decocto. Si autem placet, etiam veratrum siccum inspergito, sine pingui addito, Illinitur autem cum oxelæo herba pedicularia contrita, vel sulfur, vel sandaracha, vel omnia, vel sinapi cum myrobalani expresso, & oxelæo, vel vtere cochleis combustis leuigatisq; melle, vel rumicis radicibus, vel smegmatis inde confectis, vt in capite de elephantia comprehensum est, aut quibnsdam ad scabiem efficacibus. Si aut exulceratio partes exercuerit parygro, vel diapompholygos

quia eratū duplex est vel in q̄tate v̄t in quali-
tate κα-
τά τὸν
ποιοῦν κα-
τά τὸν πο-
σόν.

PAULI AEGINETAE

Aristot. appellato medicamine vtendnm, vel ceræ vncia liquefacta in cypri
 q̄ ait i ni cyatho, cui sulfuris adiecta sit vncia. **ALIVD** ad pruritus. Ne
 v. de ge cum agnarum rancidarum vncia, sulfuris tantumdem, apii succo le-
 ne. aial. uigatis vtitor in balneo, membra affatim defricans. Hoc solum mul-
 εντηκα- tis tum scabiosis, tum alio pruritu detentis, abunde fuit. Item apium
 λουμέ- per se viride tusum infricatumq; in balneo vehementer auxiliatur.
 νη λδκλ Similis effectus est perdicioni, & acerna resina cum rosaceo soluta,
 λδκλ illitaq;. **ALIVD.** O yzæ puræ & nimis candidæ, vnciæ tres,
 ρινόν- tusæ cretæq; aceto quam acerrimo læuigantur, donec sordium fiat
 ται αι- spissitudo, adiciaturq; priuatim sulfuris viui detriti vncia. mixtis
 τριχες. perbelle in balneo vtitor, diutius defricans. At in iis qui superfluita-
 i morbo tibus magis redundant, pari portione illorum temperata, præstan-
 quoque tius remedium reddetur.

De Leuca.

Cap. v.

Leuca, cutis quædam ad albidius mutatio est, quæ viscosa, gluti-
 nosaq; pituita contrahitur. Quoniam vero non quælibet leuce
 canipili curatione recipit, notas ipsius tales habeto. Acu per summa leucem
 nascunt. pungito, sed cute non penitus, & siquidem sanguis emanauerit, sa-
 Hoc aut nabilis est, sin lactea humiditas desperata est. Vel panniculo laneo
 ex eo e, asperiore infricata cutis, siquidem rubicundior euaserit, medicinae
 qd mor locus est, sin idem color remanet, non confanescit. Et quæ plura cor-
 bus hic poris loca obsidet, leuce, difficilius tollitur, quam quæ pauca detur-
 orit pel parit, item vetustior, quam recēs minus in medicina spei habere cen-
 le corpo senda est. Nonnulli igitur adustionem quæ ferramento candente ad-
 ris xgro ministratur, in leuca probarunt, sed ita vt hæc vel sola valetudini
 tante ex sufficeret. Alii vero dolorem inde cicatricemq; secuturam veriti, vt
 pituita quæ non minus ac leuce indecora sit, medicamentis crustam indu-
 alba ad centibus, qualia & cicatricem aiunt concolorem efficere, vñ sunt.
 extrema Alii, & horum inefficaciam repudiantes, tincturis vti maluerunt,
 erūpēte, imposituræ potius quam auxilii rationem habentes, quæ sane om-
 cū q pel nium maxime vitari debent, quod affectus celeriter renascatur. Ita-
 le simul que subiectis vti medicinis consilium est, ad arcæ, seminis, rotis ma-
 pili æ- rini, sulfuris viui, singulorum paria pondera, tusa et in cerniculo pri-
 grotant uatim creta, deinde simul cum aceto in puluerem sat multis diebus
 et cane- detrita, in solle illinuntur, non cumulate, ne cutis exulceretur. Pro-
 scūt. Dif cedente autem tempore t veratri & gallæ similiter momentum ad-
 fert tñ ca iicitur. **ALIVD.** Fici nigræ surculis, aceto maceratis, contritisq;
 nices misceto, aphronitri, sulfuris ignem non experti, myricæ fructus, pa-
 hæc a ca rem singulorum modum, vbi nitro cutem defricaueris, perungito,
 nicie se- soli q; exponito, animum attendens ne exulceretur. Archigenes
 lectu- is quod autem fici foliis, calcis viuz eo quod satis est, mixto similiter vsus

LIBER III.

181

est, vel infricatas (inquit) leucas, albo veratro, donec sudore diffuente reliquo corpori concolores fiant, illinito synopide, vel mediade, vel acu transfixa punctas quoad cruor emanet, illinito synopide, cum aceto, vel prius absterfis, vt est comprehensum, perungito, fici liquore recenti, & folio eiusdem affatim infricato.

In veteri libro hæc est scriptura, λευκὸν ἑλλεβορέον, veratri albi.

De Alphi albo, & nigro.

Cap. vi.

Alphi cognato leucis modo generantur, sed illæ quidem altius cutem mutant vt pilos quoque sibi similes procreent. Alphi autem summam cutem infestant, quanquam & ipsi cum vetustatem sentiunt penitius recedunt, vt etiam albos pilos producant, idque humoris qui subest ratione. Etenim ex pituitoso humore albi ducunt originem, nigri autem ex melancholico, vtrisque igitur commune prodest auxilium, elcta calx aqua soluta, aut dracunculi radix, cum aceto applicata, simili modo vtrunque veratrum eisdem efficax est, item lupinorum amarorum decoctio superfusa, eorumque farina, ex aceto, vel oxy-melite inducta, iam capparis radicis cortex cum aceto, liliique radix cum melle, cæpa ex aceto in sole illita, crocodili terrestris simus idem præstat, pari efficacia & sturni excrementum, cum oryzam duntaxat ederit, sepiæque testa concremata. Compositum vero hoc præstans est, Alcyonii, nitri, singulorum sextans, veratri albi, sulfuris viij, singulorum vncia. Nonnulli vero & flores vini combustas adiungunt. **ALIVD.** Sulfuris ignem non experti, nitri spumæ, singulorum drachmæ quatuor, seminis toris marini grana septem, teruntur cum aceto. solum vero alphi perungito, sed ita vt integram partem non attingas. siccatum medicamentum aqua frigida eluitur. **ALIVD.** Farinæ lupini, buccinorum, & nitri singulorum chœnix, veratri albi, drachmæ octo. Arido pars defricatur. **ALIVD.** Erui farinæ libræ duæ, erucæ seminis, amygdalarum amararum, cucumis sylvestris radicis, singulorum libra, mulso simul leuigata delinuntur & hora interposita per spongiam abluuntur. facit etiam ad ephelidas, varicosas, & cutis sordes.

Ad Alphos albos experta.

SULFVRIS ignem non experti, sextarii duo, calcis viuz candidæ, vnciæ quatuor, albumina ouorum quinque, olei nardini, & aceti momentum. sulfur primum in puluerem cogitur, mox oleum nardinum ei superinfunditur, rursusque leuigatur, deinde acetum instillatur, & iterum teritur, calcem vero priuatim lotam semel, bis, terve sulfuri adiciamus, vna cum ouorum aquato, & denuo conterimus. collectus humor effunditur. pauxillum vero relinquentes, vt vnguentum queat illini, in hunc modum vtimur. **ALIVD** probatum.

Q 3

canescit
ætas an-
nis cōse-
cta ob i-
becillam
calidi vir-
tutem. in
hoc autē
morbo
canicies a
vitio æ-
græ pi-
tuitæ na-
scit, nō a
lōginqui-
tate æta-
tis. Illud
tū recte
dici solet
morbum
esse sene-
ctutem
quādam
ascititiā.
senectutē
vero,
morbum
esse natu-
ralem. ait
quoque
Afer Ter-
senectus
ipsa mor-
bus est.

PAULI AEGINETAE.

Sulfure viuo, fici foliis aridis, aphronitro, alcyonio, terra cimolia, myr-
tho, ex aceto vtitor. **ALI V D** Archigenis. Fici foliorum quæ in
vmbra exaruerint, sulfuris, aluminis singulorum æqua portio cum
aceto inungitur, aut foliorum fici, drachmæ quatuor, nitri drachmæ
duæ, alcyonii combusti tantundem, aceto in balneis illinuntur. Prius
tim nigros exterit efficaciter sandaracha, cum sulfuris dimidio, sed
cutē nitro prius defricata, in sole perungitur. albos vero tollit atramē-
ti sutorii, æruginis, æqualis modus, nitri duplicatus, sine pingui infri-
catur, illiniturq; vel cachrysos, sulfuris viui adarcæ æquæ portiones,
ex aceto pertritæ infricantur, illinunturq; cum inaruerint abluito, lo-
cum perficans. Idem facit & leucis.

Ad Stigmata, ex commentariis Archigenis. Cap. vii.

Stigmata curabis, si quod matulæ adhærescit, cum aceto quā acet-
rimo illinas, vel calcis viuæ partem vnam, nitri tostifului dimi-
diam, cum aqua in sole illinit. At vbi exulcerationem fuerint exper-
ta, cicatricem tanquam vlceri inducito. Cito vero iubet confriatæ
nitro prius cuti terebinthinam illini refinam, linamentisque ligatam
sex diebus relinqui, septima deinde solui, & acu pungi stigmata, &
sanguinem qui fluere spongia detergi, interiectoque breui temporis
spatio, tenui sale conficare locum. Tum imponi ad dies quinque me-
dicamentum quod recipit, thuris, nitri, calcis viuæ, ceræ singulorum
drachmas quatuor, mellis octo. Quum enim a partē medicamen-
tum deposueris, nigrum in eo offendes. **ALI V D** vnguentum. Pi-
peris drachmæ duæ, rutæ drachmæ quatuor, sandarachæ drachmæ
quatuor, auripigmenti drachma, mellis quod satis est, cuti prius nitro
infriatæ illinitur, item alius priori consimiliter peractis, per triduum
soluitur, & nigræ absterfa, rursus inungitur. Exterit enim (inquit)
diebus viginti, tam integre, vt nec exulcerationem, nec cicatricem re-
linquat. **ALI V D** quod Criticon dicitur. Thuris drachmæ qua-
tuor, nitri drachmæ duæ, atramenti sutorii drachmæ quatuor, ceræ
drachmæ sex, piperis drachmæ tres, calcis drachmæ tres, thapsiæ to-
tidem, auripigmenti drachma vna & semis, sandarachæ drachmæ
tres, mellis quod sufficit, vt ere quemadmodum superiore. Oribasius
tradit ranunculū applicatum, vel capparis folia stigmata exterere.
At si altius fixa non discutiantur, modicam vero cutem attingant,
crusta ferramento frigido excitata tolluntur.

De Exanthematis.

Cap. viii.

Exanthemata generantur, ex crassis in cute impactis humoribus
magisq; adhuc in superiore pellicula cum densa est. In quibus igitur,
si etiam in alto humorum copia subfiterit, primum purgatio ten-

tanda est. Nam si hoc neglecto, prius discutere aggrediaris, obstrues ipsos potius quam per cutem euacuabis. Sin autem nullæ in alto debiteant humorum colluies, per cutem vacuare oportet, nec procul at trahere, si aluo, aut vomitu vacuationem moliri velis. sed humorum qui cuti impacti sunt, curationem medicamentis experire, quæ exurunt, calfaciuntq; maxime quum lata sunt exanthemata, siquidem ex frigido admodum, crassoq; humore, talia sunt procreata. Lauri igitur tenerorum foliorum, rutæ & mannæ, æqualem singulorum portionem detritam, & lachrymam thuris oleo subactam delinito, vel betam teneram incoctam, tritamq; inducito, aut ceræ drachmas octo, sulfuris tantundem, salis drachmas sex. Arida in pollinem coacta, & olei cyatho dimidio superfusa, omnia simul incoquito, factoque emplastro vitior. Sed coctioni sedulo assistendum est, vehementer bonum remedium existit.

Ad epinyctida.

Cap. ix.

Epinictides vlcuscula sunt, sua sponte erumpentia, pustularum specie, & subrubra, quibus disruptis, cruenta sanies defluit, per diem que non magnopere excruciant, per noctem vero, graui magis quam pro ratione vlcis, dolore torquent. Itaque liquor laseris aqua solutus imponitur. nam citra rosionem desiccatur, aut cicuta in læuorem detrita inducitur, aut brassica cruda cum aqua, aut apium cum polenta trita applicatur, aut alterci folia, cum melle pertrita admouentur, aut solanum per se, & cum cotiandro viridi, aut oliuæ foliis vitior cum aqua coctis, aut vuas acinis exemptis, leues splenio illitas imponito, vel adianthum ex melle tritum. Vitari debet acrium, acidorum, & salforum efus, fomenta, balneum & insolatus.

De pustulis, quæ Græce phlyctænæ dicuntur. Cap. x.

Pustulæ quæ non sua sponte rumpuntur, sed graui dolore excruciant, acuta perforari acu debent, vt humeris colluies, habeat emissarium. Deinde humore leuiter expresso cutis præposita finitur, donec impleatur. At si vulnus conuiueat, denuo pustula perforanda est similiter & exprimenda, tum cutis assecta seruanda, quandiu id quod sub ea exulceratum est, ad cicatricem peruenerit. Priusquam igitur pustulæ aperiantur, cocta lenticula cum aqua leuigata inducitur, vel mali granati virgulta, cinere calido tepesacta imponuntur, & loci attinguntur. Quod si ruptæ fuerint, & vlcus excitatum, adeps suillus liquefactus & argenti spumæ detritæ mistus, in lin-teumq; illitus admouetur, vel lili radix in aqua cocta tritaque cum cerato imponitur.

obstrues
ipsum po-
tius in-
quit ex-
co, quod
quidam
dum im-
pruden-
ter ea
quæ ex-
pellit
natura,
tollere

quam-
primum
volunt,
adhibi-
tis reme-
diis intro-
agunt.
& in ma-
ius peri-
culum
incidit.
Sapiens
enim na-
tura vt

suis præ-
sidiis
defun-
gatur,
expe-
ctare
medi-
cus do-
ctus im-
primis
debet,

Q

secundū
illud ἢ
ἐπει
φύας.
Mox
quum ip
sam natu
rā lāgue
scētē vi
det per se
sibi auxi
liari non
posse, tūc
medicus
psto esse
debet.
Itaq; Pla
tonici di
cunt dei
ministrā
esse natu
rā, natu
ræ medi
eum.

PAULI AEGINETAE

Ad epinyctidas, & phlyctænas.

ARGENTI spuma & sulfur ignem non expertum pari por
tione cum aceto applicantur, item myrtus in læuorem redacta, sordiu
illitione cum oleo & vino, benefacit, tum his, tum calidis eruptio
nibus, & papulis feruentibus, gliscentibus capitis vlceribus, furuncu
lis incipientibus & adustis medicamentum, & quod molybdæna, &
quod ouis præparatur.

Ad Ambusta.

Cap. xi.

Ambusta medicamentis indigent quæ modice abstergant, non
euidenter calefaciant, aut refrigerent, Itaque terra chia, cimolia,
cretica, omnisq; leuis terra illita cum aceto non admodum acri, vel
aqua, præclare facit, prohibetq; pustulas excitari. item oui albumen
crudum statim impositum, lana molli exceptum. etenim refrigerat
leuiter & citra rosionem desiccatur, idem efficit atramentum scripto
rium illitum, vel lachryma thuris aqua diluta, vel lenticula cocta tri
taq; vel eruus applicatur. At ex aqua calente vstiones priusquam pu
stulæ oriantur, oliuarum salsarum aqua continue superfundantur, ip
sæq; oliuæ salsæ cum polenta contritæ inducuntur, aut alumen scissi
le, pertritum cum aceto illinitur, aut fel taurinum cum aqua copioso
re liquatum inungitur, aut lixiuium superfunditur, garo, aut muria fo
uetur, aut bulbi liliorum, aut hyacinthi, aut narcissi cum rosaceo tri
ti, & in sordium spissitudinem coacti delinuntur. Marcellus autem
hoc compositum tradit. Panniculi melle imbuti & hordei farina in
uoluti, combusti q; cineris mittuntur drachmæ octo, cerusæ drachmæ
quatuor, butyri drachmæ octo, ceræ, seui caprilli, rosacei, singulorum
drachmæ sedecim. At pustulis iam excitatis, thus cum polenta tritu
aceto applicatur, aut calcem viuam cerato mixtam, illitamq; linte
lo imponitur, iam quod spherion dicitur medicamentum, ambustis
utile est, partes exulceratæ porris contritis obducuntur, aut portula
ca contrita cum polentis, aut columbæ fimi linteolo inuoluti com
busti q; & oleo diluti cinere vtitur. Mirifice proficit pini aut piceæ
cortex, aut adianthum aridum, læuigatumq; , aut myrthi folia com
busta, pertritæq; insparguntur. efficax autem vnumquodq; horum
est, & si cum cerato componitur, item quod rubræ anchusæ radicis
ficæ, & in læuorem confusæ trientem recipit, ceræ albæ dodrantē,
rosacei vncias duodeuiginti, iam quod cerusa constat cum modica
ceru i medulla, laudatum est remedium.

Ad eos qui flagris cæsi sunt.

Cap. xii.

Cerusæ argenti spumæ æqualis portio, ceræ quadrupla cum sus
sino, aut rosaceo, emplastri modo inducitur, primo die priuatim
sussino solo vtitur, vel croci drachma, tragacanthi tantundem, ouum

Integrum, sine putamine, vnita cæsis imponuntur, item pellis ouis recens excoctæ calens adhuc circumdata, quolibet efficacius die vno & nocte perfanat.

Quo modo pili adustis renascentur. Cap. xiii.

Pili ambustis nascuntur, si fici folia in fictili tosta, cum cerato in emplastri modum imponas, aut caricæ drachmis octo, samplici drachma, tritis cum oleo donec cerati fiat spissitudo, vtitor, vel detrimenti lapidis drachmas centum, æris squamæ drachmas decem cū aqua subactas in pastillos cogito, in vsu partem vnam cerati partibus octo diluito.

Ad abrafa, quæ apolyrmata Græci dicunt. Cap. xiiii.

Abrafa & superficiem infestantia vlcera, primum aut vino, aut acetō, aut muria aceto mixta quæ oxalme dicitur, astringes. Deinde medicamentis, ad cicatricem ducendam vttere, tum liparis, tum ex albis emplastris trypheris. Summe autem facit quod cerusæ partē vnam recipit, ammoniaci dimidiam, myrtei quod satis est. Ammoniaco ex aqua in læuorem trito cerusa miscetur, myrtheumq; superfunditur, vtitor liparā. Vel lapidis detrimento, squamam æris admisceto, & myrtheo in læuorem coactis vtitor, aut cimolia, & argenti spuma, ex vino, recininoq; & myrtheo tritis vtitor.

Ad abrafa, intertrigines, inueterata vlcera, senilem teneramq; cutem.

ARGENTI spumæ chrysididis drachmæ quinquaginta, cerusæ drachmæ viginti, resinæ siccæ ex picea drachmæ duodecim, olei sesquicyathus. Argenti spumæ oleo incōctæ reliqua adiiciuntur, rudicula agitatis, vel etiam in pila emollitis vtitor, sed cutem abrafam ab vlceribus non oportet amputare, sed medicamentum ei inducere, sic enim glutinabitur, vel nigrescens. At vlceri, quod eroditur, fordidumq; est, si carne nudum hiat, vix cicatrix obducitur. Cæterum abrafa tuetur ab inflammatione, thu rubrum, si illinatur læuigatum, cum melle, aut lentisci coma cremata, & cum melle imposita.

Ad abrafa, flagris cæsa, & articulorum contusiones medicamentum, quod dolorem leuet anodynū appellatum.

ARGENTI spumæ, cerusæ, singulorum vnciæ decem, ceræ vnciæ sex, olei puri, aut rosacei sesquilibra, amyli vnciæ duæ. Ad eadem valet Pelation quoq; ex helysmate, idest, recremento argenti paratur, item medicamentum quod ouis constet.

De formica & verruca. Cap. xv.

Vtrumq; vitium, cutis excrecentia est exigua, callosa, & plerūq; figura teres, sed formica, quæ Græce myrmecion dicitur, latiore basi, & similem si quis non trectet mordentis formicæ sensum indu-

PAULI AEGINETAE.

cit. Verruca autem, quæ Græcis vocatur acrochordon, angustiore, ut chordæ summo assimilata, pendere videatur. Hos igitur tumores, elaterium cum sale infricatum tollit, thuris lachryma cum aceto, grossi cum aceto, farina, & nitro, liquor fici illitus similiter facit, tithymalli, smaridis caput salsum concrematum, ærugo cum sulfure ignem non experto combusta, ocymni folia cum atramento sutorio, sarmentorum adhuc viridum viscorum quod distillat, fimus ouillus cum aceto, hircinum sel illitum, heliotropii magni semen, cum vino applicatum, ruta cum nitro & pipere, nitrum cum vrina pueri venerem non experti, sterco bouis gregarii in aceto.

† Huius loci duplex est scriptura, vna in vulgatis codicibus, καὶ πρὸς τὰς ἀποφύξεις ὁμοίαν ἀιδνωσι, idest, si quis deradat sensum mordentis formicæ similem inducit, altera est, πρὸς τὰς ἀποφύξεις, idest, si quis constringat.

De Ganglio.

Cap. xvi.

neruorū
inversio

Ganglium neruorum concretio est, ex icu, aut lassitudine oboriens, in pluribus quidem corporis partibus, præcipue vero motui dicatis, nempe manu summa, & pedibus. Quo in vitio Archigenes calcem viuam vna cum adipe anserino, & terebinthina, imponendam censet. Doles vero medicamento, quod lapidem achatem recipit, vititur. At Oribasius, eo quod subsequitur, cerusæ, resinæ e pinu, olei veteris, singulorum vncia, ammoniaci suffiminis, galbani, singulorum tantundem, ceræ uncia quatuor, aut pilam plumbeam (inquit) crasfiorem vertebræ modo, ganglio ampliorem imposito, deligatoque, pondere siquidem longiori temporis spatio ipsum dissoluit, atque hoc nos utimur.

De inflammatione.

Cap. xvii.

in fine
verba
duo in
quodam
codice
adiun-
tur, ἡ ἕ-
ξαι νοὶ
μαστικῆς
imperf-
cti sen-
sus.

Omnes ex æquo tumores calidos, quibus dolor, seruatorque adest, nostri inflammationes, Græci phlegmonas appellare consueverunt. Verum pro diuersa quæ ipsos facit, materia, hi quoque euariant. Cum enim sanguis probus, & crassitie mediocris, in particulam aliquam subito confluerit, ac propter copiam impactus inhæserit, inflammatio proprie appellata nascitur. Cum vero flaua bilis in parte aliqua substiterit, herpetem, vbi & sanguis, & bilis flaua simul incubuerint, erysipelas excitatur. At cum sanguis, qui influit, calidus impense, & crassus fuerit, carbunculos mouere solet. Itaque ab inflammatione quæ peculiariter phlegmone dicitur, & multis semper accedit, incipiendum esse iudico. Tumor rubens, dolorificus, tangenti renitens, & calidus ex sanguine, ut a medicum est, probò originem trahit, qui, sanguinem dico, nunc ex toto fertur corpore, nunc in aliquam particulam copiosus incumbit, sic ut a vasis nequeat contine-

si, exciditque aliquid roris modo in ampla partium quæ intercedunt, spatia. Sæpe vero vitium hoc vulneribus, fracturis, vlceribus, aliisque pluribus externis causis superuenit. Cum itaque inflammatio repente euestigio particulam quampiam sine manifesta causa præcedente obsederit, totum vero corpus, parti contagium transmittat, vniuersum quidem id, sanguinis dimissione, vacuari oportet. quod autem inflammationem experitur, superfundere ac obducere medicamentis, quæ non calefaciant, humectentque, sed illuiem humoris repellere sint idonea. At quod iam in affectam partem se receperit, euacuatur. Itaque illinitur cataplasma quod constat semperuiuo, mali punici corticibus, vino incoctis, rhu & polenta. hoc & similibus, cum dolor vehemens non vrget, vtendum est. Vbi vero particula fluxionem cum dolore ampliore senserit, ne sic quidem calens aqua oleumve adhiberi debet, aut ex farinis cataplasmata, vt quæ fluxionum vitiis omnia sint inimica, doloris tamen vehementia leniri eo quod constat passo, rosaceo, ceræque modica, & lanis sordidis quæ æsypi multum contineant. Per æstatem quidem frigida, hyeme tepida excipiuntur, applicanturque, sed ita vt superiores quoque affectis partibus loci, spongia vino austero imbuta, aut posca frigida comprehendantur. cæterum miscentur cum cataplasmatibus vtiliter etiam herbæ. Parietaria igitur ad omnem inflammationem accommodata est, tum per initia, tum in augmento, consimiliter glaucium, atriplex, malua, lactuca, cucurbita, calidis illitæ, benefaciunt & tribuli vtrique inflammationibus ex influxu coctatis. brassica vero durescentibus valet. At vbi immutatio his oboritur, nec pus subsidet, curationem tentabis emplastro, quod ex chalcitide conficitur, aut quodam persimili fluxionibus dicato, lannam vero puram vi no austero imbutam extrinsecus medicamento superaccommodabis. Atque hac ratione inflammationibus ex humoris defluxu contractis medeberis. Eas autem quæ occasione cuiusdam feruntur acceptæ, si calefacias, humectesque, non offenderis, ac si vsus quandoque postulauerit, scarificare ipsas, conueniens erit. At si ob defluxionem ortas inflammationes scarificatione diuiseris, præsertim per initia, malum quoddam haud mediocre ægrotanti accerses.

De exterioribus corporis abscessibus. Cap. xviii.

Quod si fieri non posse tibi videatur, vt suppurationem impedias, panem hydrelæo incoctum delines, aut farinam horiacem consimili præparatam modo, particulam iure radicis althææ incoctæ fovebis. At si tumor ad suppurationem contumax est,

PAULI AEGINETAE

haud se- aut ægre discutitur, cataplasmate ex ficis siccatis vtere, oportet autē
cus fieri ficus dulces pinguesq; incoctas aqua eliquescere, ac ius ipsarum in te
abscessus nuis mellis speciem cogi, farinamq; hordeaceam adici, & si quidem
in corpo tumor discutitur minus autem ac conuenit, cum ficis siccatis inco-
ribus cre ques hyssopum, oryganum ve, si voles magis intendere, salem deco-
dēdū est, cto iniicies, diligenter animum aduertens, ne siccando nimium pars
q̄ i terra in scirrhum occalescat. Tale si quando videris, cucumis syluestris ra-
marique dicem, aut althææ, aut bryoniæ aqua simul decoques. valentior autē
obtinēt & discutiendo promptior, dracunculi radix est, ipsumq; medicamen-
enim vt tum, quod dracunculo constat, valide huiusmodi vitia difficit. Non-
Aristot. nunquam igitur solum hunc decoques nonnunquam & ficus sicca
quoque tas admiscebis, farinamq; simul cum adipe. Iam anethinum oleum
placet crudos humores, incoctosq; tumores, & cōcoquit, & discutit. Item
corpus, pix duros ac crudos tumores vniuersos cataplasmatibus indita conco-
nōstrum quit, magisq; liquida. **M E D I C A M E N T V M** compositū,
quidpiā + quod abscessus iam coctos expellit. vt subinde pus in splenio repe-
simile riatur, nondum vero coctos in totum discutit. Lapidis pyritidis drach-
vniuerso mæ duodecim, ammoniaci triti tantundem, lomenti drachmæ sex,
Tota nā exceptum pice liquida, pellicq; illitum imponitur Splenium vero nō
que ma- prius aufertur quam sua sponte deciderit, sed medicamentum nō mul-
ris vni- to ante præparari debet, vt quod confestim siccet. In his autem si
uersitas tumor non dissipatus fuerit, & pus sub eo delitescat, parte scalpello
p̄ alias diuisa, id ipsum vacuabitur, cura deinceps adhibita ne oleū, aut aqua
atq; alias admoueat, verum si vulnus abluere interim oporteat, aqua mulla,
terre par posca, vino & mulso vtendum est. Si vero inflammatione conficte-
tes habet tur, ex lenticula cataplasma inducitur. vbi inflammatio abest, alio
abscessus quodam emplastro medicamēto in huiusmodi sectionibus vtemur.
quosdā, i quinetiam eo quod constat chalcitide. **Cæterum** super ipsis iniicitur
quos su- spongia lanave vino austerio imbuta, vulnere autem nullum pingue
peruacua medicamentum accommodatur, quale est tetrapharmacum. nam ve
aquarum hementer postulat siccessere.

reiciat. + Hic locus est expressus in veteribus lib. τὰ μὲν δὲ πεπεμμένα
Item & τὰν ἀποσημαίων ἀπόνως ἢ ξηδούν δύνατον, id est, quod abscessus iam
terra in coctos nullo negotio expellit.

Quæ abscessus rumpant.

QVONIAM nonnulli abscessus ferramento diuidi non su-
stinēt, tentanda sunt & medicamenta, quæ ab extra hēdo dicta sunt
epispastica, narcissi radix in pollinem detrita, ex mulla cum irino
egerit vi cocta applicatur, vel tenera arundinis radix, minutim detrita cū mel-
rus suū. le, quod si dura fuerit, mullæ prius incoquetur, vel arisiolochiam cū
Corpus melle applicato. rumpit autem picis aridæ & propolis creticæ par-
autē no-

modus, cicatricemque inducit.

Dionysia ad abscessus mirabilis, item ad mammas & inguina, epispastice, quæ per latentes meatus discutit.

O L E I veteris, aquæ singulorum libra, hydrelæum incoquitur paulatim mox, aphronitri vnciæ sex adiciuntur, misyos vncia vna vel duæ, incoquantur donec manus non inquinent. Deinde miscetur mannæ thuris, ceræ, terebinthinæ, singulorum vnciæ sex.

Ad neruicos abscessus.

C E R A E, colophonæ, butyri singulorum libra, picis aridæ, mellis, singulorum libræ duæ, vnciæ sex, æruginis vnciæ tres, visci quod satis est. **A L I V D** epispasticum. Suffiminis ammoniaci se- libra, ceræ, terebinthinæ, singulorum triens, sulphuris viui quadrans nitri quadrans. Smilion autem medicamē appellatum, & quod por- ris constat, valide tumores iam mutatos rumpit. Quod lini seminis succum recipit, percommode discutit, mutat, rumpitq. At mitiori- bus abscessibus medicamenta congruent etiam ad parotidas inscri- pta. Atq; hæc de abscessu, qui ab inflammatione emanat. Galenus autem memoriæ tradidit abscessum nulla præcedente inflammatio- ne constitui, quæ ex probo sanguine habet originem. Statim siquidē ab initio (inquit) humor aliquis alias specie alius, in parte quadam collectus, vicina illi corpora excoriat tempore, & a subiectis diri- mit. Sane inueniuntur in huiusmodi abscessibus cum scalpello sunt diuisi, omnigenæ, tum humorum, tum solidorum quorundam corpo- rum species. Etenim stercore, vrinæ, grumo, humori mel referēti, mu- cosq; ad hæc ossibus, vnguibus & pilis, consimilia corpora repe- riuntur, imo & animalcula subinde inuenta omnibus prope quæ ex putredine subnascuntur simillima. Præterea in abscessibus potissimū inueteratis, qui humorum ex loco in locum decubitu prouenerint, colligi tradit, quæ lapides, arenas, testas, ligna, carbones, lutum, sor- des, amurcam & fæcem repræsentent. Quare absolutior exteriorū maxime corporis abscessuum significatio compendiose tradenda est tum eorum qui medicamentis discuti non possunt. Abscessus itaque est carniū seu partium carnosarum, nempe musculorum, venarum, arteriarum corruptio, mutatioq. In genere abscessuum nonnulli tuni- ca comprehenduntur, vt atheromata, steatomata, melicerides. Alii si- ne tunica constituuntur, quæ generis vocabulum vsurpant, vnde ser- mo hic noster procedit. Porro abscessuum, generationem plurima parte inflammatio præcedit, de qua disceptatum est. Interim proti- nus ab initio, quemadmodum nuper dicebamus enascuntur. Comi- tes abscessuum sunt, igneus loci feruor, tumor eminens, ruberq; ma- gis ac antea, durusq; cum dolore pūctorio, pulsu & grauitate, vt ali-

strum ab alimento more flu- minis la- bente su- stentari quis est, qui ne- sciatis.

Quocir- ca mate- riam, quo alimur, esse quod dam flu- men veri simile ē. Idq; sen- tit Philo- sophus i lib. de ge- neratio- ne et cor- ruptioe. Sicut & aqua ma- ris nō ea dem nu- mero, sed specie ē. Natura igitur sui prouidēs superua- cuū quod que enit in qdam loca, quæ deinde ipoperā te eo hu

PAULI AEGINETAE

morum
fluxu
vastitu-
dinu &
lacuna-
ru qua-
rundam
facie su-
scipiunt.
Illud
quoque
natura

quid ex particula suspensum esse videatur. Quod si vero locus infl-
gnis extiterit, febris accedit & rigor inordinatus. noctu potissimu
dolor fatigat, & febricula. Est cum inguinis inflammatio, proximis
in glandulis excitetur. Vbi vero abscessus in totum fuerit absolu-
tus, magna parte decrescit, punctus obueniunt pruriginosi, & leuiter
stupidi, tumor in mucronem acutum magis fastigiatur, tactu lenis, ce-
densq; superficies in vertice auellitur. Dico autem haec de his qui fo-
ras rumpuntur. Si igitur vel medicamentis, vel sua sponte rupti fue-
rint amoto medicamine, curationem tentabis, parte iam pure va-
cuata, sin aliter accidat, aperire ipsum in eum modum oportet, quena
in chirurgica explicabimus.

deside-
rat, si po-
test, uti
extre-
mis par-
tibus po-
tissimu
absces-
sus fiat,
duplici
de cau-
sa, tu ga-
medias
partes
taq; no-
biles spi-
ritu se-
des tuta-
tur, tu q;
ipsa in
medio
corpore
uiges ha-
bitansq;
vitiosa
oia ad
extrema
usq; pro-
pellit.

De Gangraena, & Sphacelo.

Cap. xix.

Cum inflammatio, neque discutitur, neque in pus mutatur, sæ-
pæ in gangrænam, & siderationem, quæ Græcis dicitur spha-
celos, incidit, de quibus iam sermonem instituimus. Gangrænas
enim appellant, cum membrum aliquod ob inflammationis, qua con-
flictatur, magnitudinem emoritur, neque iam confirmatas sic dicunt,
sed quæ etiamnum fiunt. Eius mali vis est, ut nisi celerrime succur-
ras, facile affecta pars, quatenus vicina comprehendit, mortis habi-
tum repræsentet, & hominem iugulet. Vbi vero membra sic vitia-
ta in totum sensu fuerint destituta, affectum non amplius gangræ-
nam, sed iam sphacelum nuncupant. Quin & ossibus hoc mali ac-
cidit, cum caro ipsis circumdata, praua scatens sanie, ipsa hac imbue-
rit, ac putredine consumpserit. Cum itaque membrum ex toto, vita,
sensu motuq; priuatum est, confestim præcidi oportet quam proxi-
me sanæ parti. Gangrænam vero curamus, sanguine ex parte vitia-
ta affatim emisso, vel enim vena incisa sanguis corruptus, cum vena
amplior in ipso membro appareat, detrahendus, vel cute totius cor-
poris diuisa, multis altisq; plagis. vbi vero sanguinem emanare per-
miserimus, medicamentum aliquod putridis consecratum induci de-
bet, quale est, farina erui, aut lolii, aut lomētum, ex oxymelite. Quod
si valentius imponere cogites, saltem adiicito aut pastillum Andro-
nis, aut eius generis aliquem, Faciunt ad gangrænas, & vetustæ nu-
ces, cortex autem ipsas expurgat, item liquor tithymalli tempestiue
& mediocriter adhibitus. Opitulatur ipsis & lupinorum amaro-
rum decocti ius superfusum. Nonnulli vero vbi putridam partem
præciderint, quo securius mali radicem euellant, candens ferramen-
tum adigunt. in quibus sale cum porro vtendum est. Vt autem cru-
stæ citius decidant, cataplasma deinde accommodatur ex pane, vel
hordeacea farina, vel triticea ex hydrelæo incocta. Item medica-

menti cephalici pulvis ex melle, tetrastapharmacum, & Macedonicum ut appellant, vtiliter imponitur. Iam panis cum apio tritus, aut ocymo, sic iris vel panax, vel aristolochia, vel acorum cum melle, vel thus, crustas probe separat. Idem præstat Macherionis medicamentum, & Isis linamento illita ex melle. In teneris autem corporibus abunde est etiam erui farina ex melle.

Ex Oribasii commentariis ad Gangrænas.

AE R V G I N I S rasæ, minii, aluminis scissilis, singulorum par modus, aqua detritus gangrænis illinitur, scalpello vndiq; exasperatis. Item lolii farina cum raphano & sale, nonnunquam etiam acetovua passa acinis vacuata, cum cortice ex sale & oxymelite. Ad hæc nucum iuglandium medulla, myrthi folia vino incocta, trietaque ex n.elle, raphanus cum aceto, crustas etiam ad ossa vsque rumpit.

De Herpete.

Cap. xx.

Cum bilis flaua nullo mista humori excreta in particulam quampiam decumbit, malum herpes nuncupatur. Si quidem substantia crassior sit, acriorq; totam cutem adusq; carnem subiectam exulcerat, vocaturq; herpes exedens. Si vero tenuior & minus acris callidaq; pustulas exiguas, per summam cutem milio similes excitat, ob quam similitudinem, herpes miliaris dicitur. At Oribasius autore, pituita cum flaua bile mista, miliarem herpetem creat. Corpore igitur toto medicamine quod ducendæ bili est, euacuato, loco affecto refrigerantia siccantiaq; inducuntur, principio capreoli vitis, rubi, & plantaginis applicantur. postea vero lenticula his miscetur, interim & mel & polenta. Item cataplasma, quod ad inflammationes ex confluxu inscriptum est, exempto semper viuo. Verum exulcerata pastillis, inunguntur, passo, aut uino tenui & austero non ueteri, aut posca aquosa solutis. inducitur & glaucium, eiq; consimilia ex aqua. Cum autem nihil proficit acetum admiscetur. + succo autem plantaginis, aut solani, aut uino diluta magnifice auxiliantur, aut lini semen torridum oleo uinoq; incoctum, inq; læuorem redactum imponitur, aut terra cimolia, solani subacta succo perungitur, & argenti spumæ uncie quatuor, porri succi cyathi dimidium, betæ succi tantundem, læuigata illinuntur, at inueteratis iam huiusmodi ulceribus, Musæ pastillus & Andronius efficax est. **ALIVD** ad herpetem pustulosum. Recrementum plumbi ex uino austero læuigatum illinitur, superiniiciuntur betæ folia uino incocta, uel ceræ triens myrtei uncie sex, stercoris plumbi triens, uino diluta illinuntur, at ubi id quod serpit repressum fuerit, cerato ex recremento utitor, aut lēte cocta cū melle partem obducito. Ad herpetem vero qui sub cute affli-

exedit, quod flauæ bilis acrimonia salsa uerhemeter rodit. at que ex remissione ne uirum suarū minores quoque ex portione exulcerationes affert.

PAULI AEGINETAE

git, retrimentum plumbi, rutæ læuigatæ succo excipitur, aut ceratū, myrteum in vicem rutæ. **ALIVD.** Lanæ veteris illotæ, circa tedam combustæ drachmæ duodecim & semissis, ceræ drachmæ viginti quinque, recrementi plumbi vncia vna. S. seui caprilli curati lotiq; ex aqua drachmæ vigintiquinque, myrthei vnciæ quinque.

ALIVD ad herpetas acute depalcentes, corii mali punici dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantundem, lanæ illotæ circa tedam combustæ drachmæ tres, ceræ drachmæ duodecim, cerusæ drachmæ octo, thuris, aluminis scissi, singulorum drachma, vino aut myrtheo excipiuntur.

† Hic locus sic legitur in veteribus, καὶ χυλῶ δὲ ἀρνογλώσσου ἢ σφύχνου διῆς, καὶ ἐψήσας οἶνω μεγάλως ὀνήσεις, idest, & succo plantaginis aut solani, & vbi ex vino coxeris multum iuuabis.

De Erysipellate.

Cap. xxi.

Galenus tumorem ex feruente & tenui sanguine conflatum priuatim quidem & proprie erysipelas appellauit, cū vero ex amobus, sanguine & bile constat, vtiq; ab eo quod in mistura superat nomen vitio indidit. Etenim vbi sanguis excelebat, inflammationem erysipelaceam, vbi bilis flaua præpollet, erysipelas inflammatorium dixit. Verum communius tumorem ex sanguine & bile calidioribus factis conflatum, Erysipelas appellauit. Vtro autem modo dicas, nihil adeo ad præsidiorum vsum interest. id vero scire oportet erysipelata quæ capiti potissimum oboriuntur, plus facessere negotii, adeoq; esse periculosa, vt nisi efficax consequantur auxilium, interim quoq; affectos strangulent. Quod simul ac fuerit deprehensum, protinus ab initio vena in cubito præsertim humeraria debet incidi. sin autem hæc non appareat, eā quæ se conspectui obicit. At si quid sanguinis dimissionem impediat, purgatione vtendum ex medicamento quod bili ducendæ est. Hac sane & in aliarum partium erysipelatis vti, vel clysteriis efficacioribus oportet, tum ipsis illinere quæ influentem materiam refrigerantium virtute repellunt, collectam vero, calefacientium mediocriter & humectantium discutiant priusquam particula liueat, aut nigrescat, adhibita semper cura vt perliquida inungantur, ita vt frequentius immutentur, primis per spongas molles ablutis, siquidem multus particulae feruor celeriter in vaporem erumpens, hæc desiccet. Cæterum requirunt erysipelata per initia, vt dixi, quæ refrigerent cum humiditate, non astringant, quale est semperuium, portulaca, psyllion, lenticula palustris, seris, cucurbita, solanum, altercum, lactuca, glaucium, item apium, & rhamni folia per se vel cum pane inducta, item ceratum ex aqua admodum frigida. His miscetur etiam opii aliquid, lachrymæ papaueris, cicutæ & mandragoræ.

goræ. Iam composita medicamenta inducuntur, fietq; ceratum, ceræ dealbata, rosacei quadruplo admixto ex oleo omphacino sine sale confecto, his in pila emollitis, aquæ frigidæ superfunditur, quantum potest recipi. Si vero aceti tenuis & pellucidi momentum temperes, præstantius medicamentum habiturus es. Item polenta cum herba quadam frigidior ex iis quas enumerauimus affatim membrum refrigerat. Idem efficiunt palmulæ pingues cum horum aliquo mixtæ. Ad hæc pars etiam delinetur cerusa, vel terra cimolia, aut singulari cum solano, aut argenti spuma cum rosaceo, aut chalcitide cum oleo passq; aut cerusa cum aceto & lycio, vel acacia cum aceto. Cum feruor remittit vtendum simplicibus quidem, sulfure viuo & menta cum oxyrhodino, aut ruta cum absinthio, aceto & oleo, aut argenti spuma cum porri & betæ succo, compositis autem, priuatim in capite hoc pastillo. Argenti spuma, cerusa, croco, sulfure ignem non experto, opioq; cum passo. Communiter autem omnibus, minio sinopico, chalcitide, misy tosto, ærugine rasa, atramento sutorio, alumine scissili pari pondere ex aceto vtitor. A L I V D. Sulfuris viui, cerusæ, opii, acaciæ paribus singulorum portionibus ex aceto. Cataplasma ad erysipelata, herpetas, abscessus, parotidas et ambusta. Althææ nouellæ foliorum tenerorum libra, cocta in hydrelæo perbelle teruntur, adiectoq; rosacei triente, argenti spumæ, cerusæ singulorum vnciiis duabus & semisse, iterum læuigantur cum succo coriandri, aut semperuiui, aut solani, deinde micis panis adiunctis vt emplastri formam inducat, illinitur. Hoc autem emplastro vtitor quod recipit recinini pondo, myrtei pondo, vnguenti quincuncem, argenti spumæ trientem, æruginis rasæ sextantem. Aerugo & argenti spuma aceto læuigantur. Ceratum ad erysipelata & ambusta. Ceræ albæ triens, rosacei quadrans, oua sex, perdicii herbæ triens. Vbi vero inflammatio membri conquieuerit, aut vetustatem experiatur, cataplasma illi, priusquam liueat, ex cruda farina ordeï est imponendum. Quod si liuor iam occuparit, cute scarificatum incisa, cataplasma induci, locusq; perfundi ex aqua calida dulci debet, sed & marina & muria interim conducet, quinetiam ipsi cataplasmati talis aqua, vel acetum vel muria cum aceto misceatur. Deinde commemoratis medicamentis compositis cura adhibita vti licet. Nam si inflammatio remaneat, aut in pus, aut in putredinem conuertitur.

De phymate, bubone & phygethlo.

Cap. xxxij.

Vtore Galeno, bubo, phyma, & phygethlon, glandularum affectus sunt, bubo quidem inflammatio, & phyma autem glandulæ inflammatio ad suppurationem spectans. Aliorum vero quorundam sententia communiter omnes, qui a natura abhorrēt, ceu abscessorii

R

PAULI AEGINETAE

tumores quaecumque corporis partem obfideant, phymata appellantur. Siquidem Hippocrates in hunc modum scribit. Quibus phymata urinarium meatum exercent, hi abscessu in vomicam erumpente liberantur. At bubones qui prolapsu, aut aliis ulceribus, aut doloribus contrahuntur, periculo vacant, febribus autem superuenientes, qui plurima parte ex pestilentiali lue solent incidere, deterrimi sunt siue femora, siue alas, aut ceruicē inuaserint, Verū priores initio, quē admodum inflammatio, quaelibet, auxiliis repelluntur, quæ refrigerant astringuntque, vel spongiis ex posca impositis, vel lanis oleo crudo vinoque imbutis, vel rosaceo, vel melino, vel lentiscino, vel myrtheo, deinde iis quæ digerunt utendum. At si corpus vniuersum succis æquabiliter redundet, prius ipsum vacuari conuenit. vbi iam inanitum est, ulceris in quo id prouenerit, cura haberi debet, sicuti in capite de ulceribus explicabitur. Glandula si inflammatione tentetur lanis oleo quodam laxante, irriguis, recte lenitur, totumque ipsis mēbrum inuoluitur. Cum tumor ad suppurationem spectauerit, non prompte diuidere, sed medicamentis quæ cerati speciem referunt, discutere nitemur, cuiusmodi potissimum est ex petano confectum. Item quod ab herbis dicitur botanicon, si per hæc non discutitur, rumpere adgrediemur, aliorum abscessuum modo similiterque illis mederi. In iis autem qui ob febres aut omnino humorū abundantiam procreantur, cauere debent repellentia, ne materies penitus detrusa cursum repetat, sed ab iis quæ discutiunt, statim curationem incipere consiliū est. Si autem nihil prohibet, nempe aut ætas aut uirtus, sanguis prius e cubito dimittetur. deinde loco fomenta inducuntur ex decocto chamæmeli aut anethi, aut eius generis alicuius. Reliqua medicamentorum sylua, maxime ex iis quæ tertio uolumine ad proatidas dicta sunt, transferenda est. Item ex illis quæ nuper contra inflammationes prodidimus, quē admodum etiam phygethli curatio, tum hinc tum ex remediis erysipelati accommodatis petetur. Aster atticus herba quæ & bubonion, quasi dicas inguinariam, ea ipsa de causa vocant, non solum illitus, sed etiam cōtactus, bubonibus auxiliari creditur. Phymata autem priuatim discutit adianthum si illinatur, atriplex, parietaria, althææ radix vino incocta, ammoniacum cum melle emollitū, inductūque, viscus cum resina, ceratoque. Rūpit aut abscessum propolis, lupini amari ex aceto illiti, cucumis syluestris radix, terebinthina excepta, capparis radix similiter, nitrum cum fermento aut ficis.

† In antiq. codicibus quādam legunt quæ in vulgatis exemplaribus desunt. Phygethlon enim ita describit, φυγεθλον δὲ τὸ φλεγμονώδες ἐρυσιπέλας, ἢ ἐρυσιπελακτώδης φλεγμονὴ τοῦ ἀσένου. id est Phygethlon autem est erysipelas phlegmonodes, vterque erysipelatodes phlegmone glādula.

LIBER III.

130

De furunculo, qui dothien appellatur.

Cap. xxiij.

Furunculus, tumor est abscessum præ se ferens, qui ex crassis humoribus in carnosissimis partibus concipitur, mitis quidem, cum in sola cute coit, perniciosa autem, malignusque ubi subter actis radicibus in superficiem erumpit. Dissipatur autem furunculus, ut iticum mansum & impositum, mastiche ægyptia, vix passæ quibus acini sint exempti cum sale tritæ, ac admodum hunc aut diffusiunt aut rumpunt, vel siccæ fici hydromelite incoctæ imponuntur, vel resina fici mista inducitur, vel ipsæ fici siccatæ cum fuerint pingues dissectæ, vel fermentum cum nitro, vel lini semen cum melle, vel alteri folia, trita cum butyro. Composita vero hæc proficiunt, quod ex fermento, quod polline farinaceo constat, & quod priuatim a furunculo græce dicitur dothienicon, fomenta autem adhibentur ex spongiis mollioribus continue calenti aquæ intinctis, deinde sic medicamenta iniunguntur.

De terebintho.

Cap. xxiiij.

Oribasius terebinthum sane phymatis speciem esse affirmat, in cuius extrema parte pustula nigra incubit, hac rupta id quod subiacet abrafo simile apparet. ubi scalpello diuiseris, pus inuenitur. Dioscorides autem Alexandræus literis mādauit terebinthos cutis esse ex crescentias, rotundas, nigrouirides, terebinthi fructum referentes, atque has aliis phymatum tumoribus similiter curari cæset, auxilia ex supra comprehensis huc transferenda.

De carbunculo.

Cap. xxv.

Cum sanguis magis melancholicus effectus inferuescensque aliqua se parte receperit, carbunculus fieri solet, quod vlcus est crustaceum plerumque a pustula ambustis consimili, interim vero & sine hac incipiens. Cæterum inter initia, quibus hoc malum instat, in partícula omnino pruritus sentiunt, deinde pustula, nunc una, nunc plures tenues exoriuntur, miliorum quorundam instar, quibus perruptis similiter crustaceum vlcus prouenit, quale ferramenta candentia excitant, modo crusta ipsa cinereum colorem, modo nigrum præferente, sic ut inferiori carni continua adhærescat, & quodam modo affixa sit depascaturque. Reliqua autem caro circumposita, ferundam refert inflammationem, quam Græci phlogosim appellant, & colore nigrescit, splendetque bituminis & picis modo. talis autem est bilis exacte atra. Verum carbunculi, qui carnem inuaserint, confestim circumscribuntur, qui membranas, nervosque occupant, diutius remanent, luemque subiectis corporibus impatiunt, ut etiam inflammationes quæ erysipelatis naturam recipiant, in ipsis excitentur. plerisque itidem in suppurationem conuersi sunt. multis febres simul

R 2

PAVLI AEGINETAE

accedunt. Iam vero carbunculi ex causis populatim grassantibus excitantur. Curatio ipsorum, nisi admodum fuerint exigui, a vacuatione sanguinis e vena ad animæ defectionem vsq; dimissi, tentanda est, mox scarificatus recte accommodatur, plagis obfucci crassitiam altioribus, particulæ laboranti inducuntur, quæ modice reprimunt dissipantq;. tale est cataplasma, quod ex plantagine & cocta lente cōstat, quod recipit panis furnacei micam. Est autem panis, nec omnino a fursure purus, nec nimium eius habens, super ipsum vero vlcus valens aliquod medicamentum imponitur, cuiusmodi est Andronis, Pasionis, & Polydæ, diluiq; id vino aliquo dulci, ad sordium spissitudinem debebit. Item massalioticum aridū, vel & ipsum similiter dilutū. Item radix dracunculi, vel aristolochæ, vel liquor filphii, vel cyrenaici, singula ex aceto probe delinentur. At quæ erysipelatis naturam referunt, supra comprehensis ad id vitii remediis perungentur. Quæ vero partes consortii lege affici putantur, succidis lanis ex œnalæo madefaciendæ sunt. Vbi iam ardor acquieverit carbunculis iniiciuntur cerata cephalica, diluta, illataq; in linteolis. generosissimum est quod herbis, tum illud quod nitro constat, item arida vlceribus depascentibus dicata, per se, et cum rosaceo. Cum autem durities remanet, utemur melino Serapionis, operam adhibentes vt quam celerrime carbunculi suppurent. Quod quidem fiet, si diebis noctu semel tum cataplasmata tum medicamenta mutes. At quo radicitus carbunculos diuellas, dirimasq; ab adiacentium commercio, malum punicum acidum, minutatim concisum in aceto coques, vbi intabuerit, in læuorem dereres, linteosq; illitum induces, cum sic cessit, aceto humectabis. Item nucis auellanæ veteris vel etiam non veteris medulla carbunculos maturat rumpitq;. Hoc præstant & cupressifolia, tum germina, nouelli & molles galbuli cum polenta, vua acinis vacua, ficus siccatae vino incoctæ, papaueris ceratidis flores, liquor filphii, cum ruta & mellis momento, pix liquida cum vuis passis, & suillo adipe.

Ad carbunculos vehementer efficax.

ARGENTI spumæ libra, olei veteris libra & semissis, auripigmenti vncia. Oleo cum argenti spuma dum manus non inquinat incocto, sublatoq; ab igne, auripigmentum adiicitur, rursusq; medicamentum coquitur donec nigrescat, tritis in pila vtitor in linamenta filatim carpta illitis.

Ad gangrænas, vlcera vetera, chironia, strumas, podagram, priuatim vero ad carbunculos, præsertim eos qui palpebras infestant.

OPII, acaciæ, misyos tosti, squammæ æris, singulorū drachmæ

duæ, atramenti sutorii drachma, alterci feminis drachma, tritis ex aqua vtitor, probefacit & tetrapharmacum quod quintam thuris partem contineat. Aduersus naturalium carbunculos, chalcitidis, atramenti sutorii, singulorum drachmis octo, aphronitri drachmis duabus, ex aqua tritis vtitor. Valet stercus quoque ouillum, torridum cum melle. In Alexandria Serapiade quæ orchis & triorchis dicitur viridi, cum micis panis, cataplasmatibus modo vtuntur ad carbunculos, omniaque crustosa. Vbi vero crusta exciderit, communis vlceris modo curabis.

De cancro.

Cap. xxvi.

Cancer in qualibet corporis parte oriri consuevit, siquidem in oculis, & vulua, quemadmodum in ipsorum capitibus expositum est, aliisque pluribus particulis, sed præcipue in sceminarum mammas accidit, quoniam natura fungosæ & inanes, crassissimam atræ bilis, vnde hoc vitium contrahitur, materiam prompte possunt excipere. ex eo enim humore cum referbuit, cancri proueniunt. atque si acrior illa fuerit, cum exulceratione. Quapropter colore magis quam inflammatione nigricant, sed ita vt tantam caliditatem non experiantur. Venæ autem quæ circa sunt intumescunt, intendunturque, cancri animantis pedum modo, vnde & appellationem hanc vitium est sortitum. Nonnulli vero inde sic nuncuparunt, quod difficillime ab his partibus quas obsederit, euellatur, quemadmodum cancer aquaticus animas. Hoc malum plane propter succi crassitatem non confanescit, utpote quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat, vel quod etiam mitiora negligat remedia, vehementioribus autem irritetur, exandescatque. Prima sane cancri initia prohibere, ne aualescant, licet si melancholicus humor prius vacuetur, quam in affecta particula radices subter egerit, impactusque sit. vacuatio quidem primum tentanda est, sanguinis dimissione, si nihil prohibet, mox purgatione, per initia quidem ex simplicioribus petita, quale est epithymon, quatuor drachmis, & S. in sero lactis, aut mulla exhibitum. Deinde ex hiera, quæ nigrum ueratrum recipit. Loco autem dolenti inductum subsequens remedium, sine dolore facit exulceratis, solani succus linteo molli duplici in eum tincto imponitur. Extrinsecus autem lana molliuscula, & ipsa succo imbuta circumdatur, cura adhibita, ne hæc ficescant succo, continentius superfuso. Iam vti diutius poteris in cancris exulceratis medicamento quod pompholyge constat. Nec inepta sunt, quæ tertio volumine de vuluæ cancris prodidimus.

ratio est,
quod in
humor
cum pro
xima
quoque
parte
coale-
scit, eaque
in ruinam
secum tra-
hit im-
pressis
radici-
bus.

PAULI AEGINETAE.

Ad carcinode, malignaq; tum ad sedis tuberosa vlcera;
item ad naturalium vel testiculorum, vel mam-
marum inflammationes.

IN plumbea pila pistillo plumbeo lemniam sphragidem ex po-
sca, & mulsa, vel lacte conterito, vt nigrescat, vel rosaceo, vel imma-
turo oleo, succove semperuiui, vel cotyledonis, vel lactucae, vel psyl-
lii, vel vuae acerbæ tritam similiter nungito. Crebrior victus ægro
dabitur, ptisanæ cremor, lactisq; serum, ex oleribus malua, atriplex,
blitum, cucurbita, piscium saxatiles, omnis generis aues præterquam
palustres.

Archigenis ad carcinode, & maligna vlcera.

CANCRO RVM fluuiatilium crematorum, & cadmiæ
par modus in pollinem coactus inspergitur, aut cærorum cinis vna
cum cerato inducitur, item erysini semen detritum cum melle accom-
modatur.

De molli & laxo tumore, qui œdema Græcis
dicitur. Cap. xxvii.

CVM de tumoribus qui succis calidioribus contrahuntur, disputa-
tum sit, iterum de contrariis agemus, ab eo quod Græcis œdema
dicitur, exorfi. Quemadmodum enim ex biliosa fluxione, erysipe-
las, ita ex pituitosa, œdema latus quidam atq; indolens tumor exci-
tatur. Equidem scimus aliter quoq; œdemata prouenire, nempe in pe-
dibus, in aquæ subter cutem affectibus, habitu corporis contabescen-
te, qui phthoe Græce dicitur, & malo, qui cachexia. Atq; in illis qui-
dem tumor hic affectus qui hominem premit accidens est, nullam
seorsum, curationem propriam postulans. Satis enim est, si quidem
curatione egebit ipsa tum crura perfricare oleo cum sale, aut etiam
oxyrodino sal habente. At si ex pituitoso humore in particulam in-
fluente œdema constitit, abunde quandoq; est spongia posca imbuta,
cum ligamento leuiter stringente imposita, quæ ab inferiori parte in-
cipiens, supra finiat. Esto autem spongia, modo conductura sit, re-
cens, si huius copia non est, eam, cuius erit facultas, detergebis, expur-
gabisq; nitro, magisq; aphronitro, & lixiuio. Quod si per hæc tu-
mor nõ subsideat, paululum aluminis iniicies, commodum autem est
tenerrimum ellychnion, posca madēs impositum, bonum est, & glau-
cium. Quod si in vetustatem œdema inciderit, parti oleo prius inun-
ctæ spongia ex lixiuio imponitur, eiusq; violentiore constrictione
curatur. discutit autem, ac comprimit tumores latus cedentesq; quæ
libet terra illita, magisq; Aegyptia, tum isatis domestica.

De inflatione.

Cap. xxviii.

hoc apud
Gal. tan-
tum est.

Inflatio ex flatuoso spiritu nunc sub cute, nunc sub membranis, quæ ossibus circundantur, & musculis, collecto, enascitur. Porro is colligitur aliquando in ventre & intestinis, itemque in medio horum spatii & membranæ, quæ peritonæos dicitur, ut in aquæ subter cutem genere, cui nomen est tympanias. Differt quoque hæc ab œdemate, quæ pressa digitis, fossulam non repræsentet, & sonitum tympani modo edat. Membrorum autem densitas, tum spiritus simul crassities efficit, ut idem spiritus non dissipetur. Vnde curandi ratio huc dirigenda est, ut membra rarefacias, crassioremque spiritum extenues, quod medicamenta tenuissima & potestate calida præstant, atque in ventre quidem & visceribus oleum tenuius quod rutam habet incoctâ, aut aliquod ex calidis seminibus, qualia sunt, cumini, apii. Interim vero & cucurbita iustæ magnitudinis citra cutis incisionem umbilico bis, terve defixa, inflationem discussit. Musculis autem ex contusione, quemadmodum propulso inflatis particulas calidis nimium, & acris excandescere contingit. Quare per initia medicamenta quæ magis leniant adhibenda. Vbi facta est inclinatio, ea quæ discutiunt. Utendum igitur sapa, cum olei momento, ac ex lanis succidis calida excipiantur, vel etiam ceratum ex œsypo admiscetur, cura adhibita ut caliditas permaneat, frigus enim non conducit. Vbi iam æger lenitus, sopitusque est, acetum admiscetur, & nitrum, aut aphronitrum, deinde & lixiuium. Postremo emplastris utendum quæ discutiendi vim habent, quo inflatio subsidat, quale est quod sequitur. Sordes balneorum subferuefactæ percolantur primum, ut puræ evadant, & rursus lebeti iniiciuntur, tritaque calx restincta farinæ modo etiam inspergitur, dum luti fiat spissitudo, ac utitor. Hoc efficacius est medicamentum ex sycomoro compositum.

De intortis & contusis. Cap. xxix.

Articulis intortis, contusisque faciunt lanæ succidæ, aut spongiæ oxelæo imbuta impositaque, item bulborum elixorum pars tenerior cum melle, viticisque folia, sal, nitrum tostum, læuigata cum cerato inducuntur. Iam superfusio aquæ dulcis, aut marinæ calentis utiliter adhibetur. Vbi vero inflammatio, & dolores conquerint, intortæ partes etiam recte perfricantur.

De carne contusa, & sanguinis subter cutem coitu, quod

Græce ecchymoma dicitur. Cap. xxx.

Carne a graui quodam corpore, quod extrinsecus superinciderit contusa, venisque exiguis indidem diuortium expertis. sanguis profunditur per subsultum, quod Græci κατὰ διαπύδην appellunt, unde sub cute collectus, ecchymoma dictum efficit. Certe inquam, non diuisa, tanquam tumor tactu mollis & cedens,

PAVLI AEGINETAE

comitatur, liuidus, & magna ex parte indolens. Eo igitur animam tendimus vt sanguinem qui continetur dissipemus, idq; confestim priusquam nigraverit. Per initia sane nonnihil ex astringentibus, iis quæ discutunt, admiscere oportet, eo quod tunicæ venularum contusæ densationem requirant, inde etiam solis discutientibus sine astringente utemur, ac scarificatis initio ecchymomatis, ita subsequentem curationem accommodabimus. Ad inueterata autem ecchymomata, raphanus applicatus prodest. Quippe discutit ea ubi erodere incipit, aut raphani succus, cum micis panis inductus. Cæterum ecchymomatis species sunt, suggillata, & liuores ex ictu, hyposphagmata dicuntur. Item sanguinis inter ungues concursus ex percussu proueniens, de quibus priuatim tertio volumine dictum est. Verum de unguum vitis, in parte chirurgica differemus.

De ruptis & auulsis.

Cap. xxxi.

Ruptio cum ecchymomate prorsus accidit, curatur autem medicamentis mediocriter calefacientibus, quale est ex nigris populis acopon, aliaq; huic cõsimilia. At altioribus rupturis magis acris magisque incidentia accommodantur. Talibus sane & cucurbitulæ, usus proficit. Ergo si euocatum celeriter per halitum ecchymoma totum est, facile dehiscens ipsa caro coalescet. Sin longiore spatio fordes copiosa succreuerit, ruptum deinceps coire non potest, sed tantum prope ipsius labra admoventur. quo fit vt leui momento ea facile separentur, & medius inter ipsa locus superuacuo humore repleatur, nihilq; aliud, quam assidue nouum quodammodo ecchymoma creetur, primo persimile, nisi quod citius quam illud dissipetur, vtpote ex tenui magis sanie nunc constans, cum per initia e sanguine ecchymoma esset. Conuulsum autem fibris quibusdã lacescitis distractisque leniri tantum desiderat, quoad dolor sopiatur, quippe conglutinari nequeunt. Itaq; Aristolochia rotunda ruptis cõuulsisque, si quid aliud, idonea est, similiter centaurei maioris radix eiusq; succus, rheum, coctus, bdellium cum oxymelite pota.

De schirris.

Cap. xxxii.

Exactus quidem scirrhus, tumor est præter naturam sensus expers, & durus, non exactus autem vix sensibilis est. ac qui sensu ualeat sanari non potest, qui ægre sentitur, vix sanescit, si quidẽ humor unde huiusmodi vitium contrahitur glutinosus crassusq; est, qui particulis quæ scirrho obducuntur impactus solui contumaciter repugnat. Est cum statim ab initio constituitur, augetarq; , plerumq; verò a medicis qui erysipelata & inflammationes vehementer refrigerauerint, astrinxerintq;, originem sortitur. Quod si quis ea quæ valenter discutuntur medicamenta, partibus scirrho obductis admoveat,

hunc paucis primis diebus, manifesto scirrhus decreuisse videbitur. Cæterum quod de affectu restat, id reddit insanabile. siquidem totum quod in eo subtilissimum erat dissipato, quod reliquum est desiccatum, ceu lapidosa concretio relinquetur. Quapropter convenit discus-
 forum aliquod medicamentum, & emolliens habere, quod non vali-
 de calefaciat atq; deficeat. Huius autem generis sunt medullæ omnes
 magisq; ceruina, & vitulina. Ex adipibus commendatur, leonina,
 pardalis, ursina, deinde taurina. Inter aves anserina, & gallinacea &
 phasianica, sicciorq; caprilla, & hircina. Ad hæc ammoniacum sus-
 simen, bdellium maxime scythicum, styrax qui humentior est & pin-
 guis, ac Aegyptiaca mastiche. In aliis sane particulis scirrhum ex-
 pertis his seorsum utendum est, tum iis quæ inde componuntur, ve-
 rum in tendonibus & ligamentis, lapis igni candens, aceto acerrimo
 extinguitur, & siquidem haberi potest, pyrites, sin eius copia nō est,
 molaris, in quo pars affecta commoueri debet, ut vaporem ascenden-
 tem recipiat, atq; inde rursus medicamen quod emolliat imponitur,
 oleo tamen tenui non aqua quotidie ab initio per totum morbi curri-
 culum pars affecta perfunditur, interim oleo in quo althææ radix ac
 sylvestris cucumeris sit incocta. A balneo autem in totum ægri absti-
 nebunt, vel certe frequenti, sed postea quam scirrhus emollitus fuerit,
 ammoniacum pinguisimum aceto quam acerrimo maceratum par-
 ticularum sat multis diebus inungitur. Deinde rursus emollienti medica-
 mine utendum, quod receperit galbanum, & opopanacem, eaq; pin-
 guissima. eiusmodi vero sunt potissimum, ex petasone confectum,
 & quod ad Amythaonem refertur, & strumis dicata medicamenta.

De strumis.

Cap. xxxiii.

Strumæ glandulæ sunt scirrho induratæ, quæ in ceruice, alis &
 singuinibus maxime nascuntur. Curatio earum, cum illa quam
 in scirrhis tradidimus, communis est. Priuatim vero lupinorū ama-
 rorum farina ex oxymelite cocta applicatur, ea quoq; phymatis pro-
 ficat, vel bouillum stercus aceto incoctum inducito, id etiam tumo-
 res scirrosos omnes dissipat. probe autem discutit strumas calx vi-
 ua melle, vel gymnastiorum sordibus excepta, vel oleo, vel adipe suis
 lo, aut calcis nitriq; par modus, nasturtii, & scœnugræci quadruplum
 cum melle, malagmatis modo imposita duritias dissipant, in pus cō-
 uersas rumpit loliacea farina cum fimo columbæ & semine lini vi-
 no incocta, grossi sylvestres, & satiui, aut nasturtium album detritum
 cum pice liquida malagmatis forma applicatur, aut cucumeris sylue-
 stris radice sicca, lauri foliorum siccorum concrematorum cinis cū
 terebinthina inducitur, aut pediculariæ herbæ, & nitri æquale pon-
 dus, crucæ duplum cum resina ignicitur, aut stercus caprillum boni-

calamin-
tha etiā
superfu-
sa, cū se-
ro lactis
sanat
hunc
morbum.

PAULI AEGINETAE

lumve aceto incoctum, aut erui farina in vrina pueri veterem non experti macerata exceptaque, pice, cera, & oleo liquefactis, aut anguem mortuum in ollam coniectum gypsoque oblitam in fornacem mittito, concremati cinerem æquali foenugraeci pondere misceto, melle excepto utitor, item quod aspidibus constat medicamentum, mirificæ virtutis est, tum quod ex struthio conficitur, tum quod cucumeri syluestri, tum quod cedrio liquore confit, strumas ad suppurationem perducit, aut diffundit hoc, myrrhæ drachmæ decem, ammoniaci thymiamatis drachmæ septem, visci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis drachma, in pila contunduntur. Ad strumas mammarum duritiasque proficit subscriptum medicamentum, visci elaborati, resinæ siccae, ceræ, singulorum pondo, galbani quadrans.

Ad strumas exulceratas, & sine vlcere.

CERAE, resinæ pityinæ, adipis suilli insulsi, marrubii, æruginis rasæ, singulorum scilicet libra.

Medicamentum ad strumas, quod dicitur chæradicum.

OLEI veteris pondo dua, ceræ pondo, colophonix triens, nitri, tantundem, alia duodecim membranis detractis in oleo per triiduum macerantur. deinde cocta cum fricta fuerint, pronctuntur, eliquatis oleo postquam ab igne amoueris, nitrum tenuissimum inspergitur, rumpit etiam abscessus. ALIVD. Cineris e ficu vnciæ duæ, aluminis scissi vncia, aphronitri tantundem, picis liquidæ vnciæ septem.

Exedens chæradicum.

ALVMINIS scissilis, sandarachæ, singulorum drachmæ quatuor, squamæ æris drachma, auripigmenti tantundem, arido strumas conspergito, at si cancri naturam induerint, rosaceo maceratis bis die utitor.

De steatmate, atheromate, & meliceride.

Cap.

xxxiii.

Cum hæc quoque inter abscessus, quemadmodum in illis dicebamur, habeantur, singula propriam appellationem a similitudine rerum quæ in tumoribus continentur, sortita sunt. Alii siquidem ipsorum veluti pingue quiddam seu adeps subest, alii melli simile quippiam, alii quasi tenuis pulicula. Consilium igitur curationis est commune, ut quod tunica illa contineat, discutiatur, aut medicamentis totum exedatur, aut sectione auferatur. Quidam enim ex his tumoribus triplici hac ratione curantur, ii nimirum qui liquidiores humorem continent, qualis est meliceris, aliqui duplici tantum ut atheroma, quod & sectione auferitur, & medicamentis exeditur, steatoma

LIBER IIII.

134

vero nec discuti, nec exedi potest, sed manu duntaxat curatur. Quo modo autem vnumquodque horum agnoscas, in parte chirurgica edocebere. At medicaminum, quæ dissipandi vim habent, materiam, ubi actum est de strumis, reperies. Priuatim vero meliceridas hoc dissipat, vix passæ acinis exemptis octo, squamæ drachmæ tres, parte fomentis prius lenita imponitur. A L I V D. Ladani, bdellii, galbani, ammoniaci thymiamatis, propolis, terebinthinæ, singulorum æqualis portio in pila contunditur, facit etiam strumis, parotidibus, furunculis, phymatis. At Archigenes contra meliceridas commendat aphronitrum & veratri partem duplam, cum cerato duriore imposita, exedentibus autem in cute circumdata, uti non licet. Hac igitur prius meliceridas, atheromata, vel etiam strumas medicamentis adurentibus detegere oportet, simplicius illorum est quod recipit calcem viuam, saponem & lixiuium. Varium autem magis, quodque recoditum seruari potest, capit calcis viux drachmas quatuor, sæculæ quæ est fex vini combusta, nitri liquidi tosti singulorum drachmas duas, minii drachma, lixiuium teruntur, ubi mellis liquidioris crassitudo facta est ter feruefacito, ut mediocrem spissitudinem habeat, pyxide plumbea reponito, lixiuiam super distillans ne subito exarescat, valet quoque ad verrucas, myrmecias, pterygia, clauos, callos, cicatrices supercrescentes, sæcula bimestri non vetustiore cutem delinito, ubi arescere inceperit, spongia elotam rursus perungito, ubi nigruerit denuo ablues medicamentis crustam inducentibus, postquam autem crusta deciderit, exedentia adhibentur. Medicamentum exedens valide citra rofionem, squamæ æris drachmæ quatuor, sandarachæ drachmæ duæ, veratri nigri tantundem, cum rosaceo vtiator. A L I V D. Squamæ, sandarachæ, vrticæ seminis torrefacti pari mensura cum rosaceo vtiator. A L I V D. Erynaceorum combustorum, sepiæ testæ, auripigmenti æquale pondus ex rosaceo, quæ ambiunt partes orbiculatim omnes prius delinito cerusa cum oleo. Itæ efficax est cõpositio ex calcis viux partibus duabus, chalcitis parte vna, auripigmenti parte vna.

De fauis.

Cap. xxxv.

FAuis qui Græcis cerion dicitur, tumor est qui in cute foramina habet, per quæ humor crassitudinem mellis referens excernitur, recte igitur ipsi imponuntur vix passæ cum ruta, aut fici folia molissima cum melle, aut nasturtium cum I. ni semine ex melle aut cucumis domestici radix cum melle, aut sulfur viuum cum cerato, vel terebinthina. Cæterum variam magis fauorum curationem moliere, si quæ tertio volumine de manantibus capitis vlceribus dicta sunt, in hunc locum transferas.

De simplici vlcere.

Cap. xxxvi.

PAULI AEGINETAE

quia res
alienige
na pro-
priae &
natiuae
partis
symphy
sin im-
pedit.

etiam si
in mu-
sculorū
capiti-
bus vlc-
era insti-
tuta in-
vint.

Q Voniā simplex vlcus continui solum est diuisio, si quis par-
tes diductas fascia orbiculatim circumdata cōmittat, vtique
citra aliquam aliam molitionem coalescent. Cum vero alterum vl-
ceris os in obliquum spectauerit, inde deligaturam tentare & in cō-
trarium ducere oportet, cum vtraq; illius labra eo vergant, a duobus
principiis incipiendum est, & ora sic adducenda. Nam cum nihil in-
tra oras inciderit, nempe pilus aut arena, aut oleum, aut sordes, aut id
genus aliud, omnino vlcus concresecet. quod si magnum sit, adeo vt
diductae partes in totum praedicta deligatura committi nequeant, fu-
turis ipsae prius adducentur, deinde sic deligatae, glutinatoriis, vt vo-
cant, praesidiis vtemur, quae collectam humorum subluuiem desicca-
re & consumere queant, aliam, ne influat, prohibere.

Quae vlcera glutinare possint. Cap. xxxvii.

Q Vercus folia applicata vlceribus glutinandis sunt. Item salicis,
brassicae, oleaginis fruticis quae chamælaea dicitur & fructus &
folia & cortex, succusq; austerioris plantaginis, papyrus, posca aut
vino imbuta & in orbem circumdata. Recentia vlcera glutinant pi-
ni & piceae folia, cortexq; recens ligamenti modo circumdatus cum
aqua aut posca, aut vino caseus recens laeuigatus, extrinsecus impo-
nuntur, folia rumicis aut vitis, aut betae, aut lactucae. At ex acido la-
cte caseus qui oxygalactinus dicitur, vulnera quoq; ampliora com-
mittit, pira syluestria quae achrades dicuntur, fluxionem reprimunt.
equisetum si applicetur, etiam si nerui fuerint praecisi. isatis satiuia in
duris corporibus vlcera etiam si musculorum capita affligant, idem
praestat, cupressi folia, germinaq; & nouelli galbuli mollesq; etiam
duris corporibus proficiunt, sed miscendus est pollen farinae, qui a pa-
riete propinquo mola assumitur, myrrha cum aqua illita, vel lachry-
ma thuris, terraeq; lumbrici etiam neruorum praecisiones glutinant,
pentaphylli folia cum melle, alia combusta applicata. Inueteratis vl-
ceribus anagallis prodest cum cerato. hordeum combustum, & ce-
russa cum myrthei cerati triplicato pondere. Ad capitis vlcera valet,
myrrham aridam inspergere non madefactam, quippe celeriter con-
trahit, vel aloen aridam, vel aristolochiam tritam & mellis ex vino
incoctam dum mediocris fuerit spissitudo, in linteam illinens appli-
cato. Composita autem ad glutinandum sunt Barbara, Chryse, Nico-
lai, item dia iteon quod salicibus, diadictamni quod dictamno con-
stat, atq; alia his cōsimilia quae magnis potissimum vulneribus glu-
tinandis sunt.

Si dolor & inflammatio vlcera exerceat. Cap. xxxviii.

S I dolor & inflammatio vulnera obsideat, vsus est medicamento
in quae desiccant, atq; inflammationem arcent. Ex liquidis

LIBER IIII.

135

igitur laudatissimum est vinum, deinde posca. Si vero etiam cum for-
dibus inflammatio infestet, mulsa aquosa conuenit. Ex iis autem me-
dicamentis quæ siccandi potestate prædita sunt, communiter quidem
conferent, inflammationibus dicata, si oleosa acriq; excipias, priua-
tim hoc proficit, malum punicum dulce vino incoctum tritumque
applicatur, mirabile nimirum & multiplici vsu commendatum est
remedium, facit enim tum ad capitis, tum naturalium vlcera, tum ea
quæ toto corpore excruciant, oculorumq; inflammationes. At si ery-
sipelas, aut eiusmodi quippiam vlceri accesserit, iis vtendum præsi-
diis, quæ aduersus illa inscripta sunt.

Si maturari, & ad suppurationem perducine-
queant.

Cap. xxxix.

Recentia quidem vlcera, & quod inflammatione adhuc occupen-
tur, non suppurantia, concoquit maturatq; ex simplicibus, aqua
temperata superfusa, farina triticea, vel chondrus, vel panis, vel glu-
tinum librarium, cum terebinthina obducta, item cera, crocus, lachry-
ma thuris, pix, rosaceum, adeps suillus, vitulinusque. Inter compo-
sita vero tetrapharmacum quod linteolis illinitur, rosaceo subactum.
Vetera autem & callosa maturant, simplicia quidem vua passa do-
mestica, styrax, galbanum, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrû, ma-
stiche, ægyptiaca, & cæspum. Composita vero ex recinino, dictum
aceron, idest, absq; cera, quod ad Galenum authorem refertur, si lin-
teolis illinitur, oleo veteri aut recinino solutum, item quod a duplici
colore dichromon dicitur, pari modo & basilicum, similiaq;.

De cauis vlceribus.

Cap. xl.

Cauum vlcus carnem quæ periit, restitui postulat. cuius genera
dæ materies sanguis moderatus est, & probus. Huius igitur
mediocritatem ex alimento sufficienti conciliabimus, temperiem ve-
ro probam ex bonis ciborum succis, & proba particulæ in quo vl-
cus est temperatura. At in recremento quod euacuatur, tenue qui-
dem, humidum vlcus reddit, crassum vero, sordes, circum ipsum co-
lescentes, eoq; medicamentis eget quæ modice siccant purgantque.
Eiusmodi sunt lachryma thuris, hordeacea farina, eruorumq;, fabarû
lomentum, iris, aristolochia, cadmia, panax, & pompholyx. Quod
si nihil medicamentum ad creandam carnem inductum proficit, ad
aliud sic digrediendum est. At si plusculum sordis sit, humidiusq; vl-
cus, sciendum venit medicamentum intra modum desiccasse, inten-
dendumq; esse ipsum mellis mixtura. sin purum & absq; humore cer-
nitur, vltra, ac conuenit desiccavit, ac oleo pleniore dilutum ceratum
inducere oportet. Accidit nonnunquam carnem a medicamento va-
leantior colliquari, vt sordidum humidumq; vlcus appareat, quem-

PAULI AEGINETAE.

admodum ab iis quæ minus ac par est, deficcant. Verum hoc vlcus dum consumitur, cauum magis euadet, labris prætumidum, rubens præterea & inflammationis particeps. sæpe vero æger manifestam erosionem percipit. Alterum illud quod a parum siccantibus remediis humescit, nihil horum succidaneum habet. Putrilago igitur lignorum, & potissimum eorum quæ moderata astringendi abstergendique virtute donata sunt, quemadmodum & vlmus, purgant vlcera, puraque iam facta, carne replent, vel anemonæ appositæ. item piceæ cortex derasus, tritusque cum cerato & linteolis illitus cauis vlceribus auxiliatur, & præsertim recentibus, vt quæ carne destituta reficiat, repleatque. Composita vero, vbi pura quidem sunt vlcera, accommodantur, quod ostreis constat, quod Manathoni adscribitur ex vini sæcula, & quod ex aloë conficitur, quod Melitera appellatur aridum, & quod amyli, mannæ, thuris, alicæ, erui, pares portiones recipit. similiter quod e thure confit, & aphroditarium. Sin autem sordibus magis scateant, cephalica appellata arida conueniunt, & quæ linteis illinuntur, vt Trophos dictum, Isis Athene, ex attractili de præparatum, italicumque, & quæ experientia comprobauit.

Quæ sordida vlcera purgent.

Cap. xli.

Sordida vlcera siue caua, siue plana fuerint, probe purgat aristolochia cum melle, terebinthina cum pari rosaceo & melle, vel loco rosacei butyro, iris illyrica ex melle, oliuæ colymbades applicatæ. Ad ea vero quæ neruosis obueniunt, terebinthina cum butyro liquefacta, sordidis nimium & depascentibus benefacit marrubium cum melle. hoc etiam crustas decit. Composita autem remedia hæc sunt amurcæ coctæ, mellis despumati, aluminis phorimi, hoc est liquidi, paria pondera. **ALIVD.** Serapiadis herbæ, quæ & triorchis dicitur, siccæ, iridis illyricæ, marrubii sicci, aristolochiæ, singulorum drachmæ octo, erui farinæ drachmæ decem, arido vititor & cum melle. Insuper ad sordida vlcera facit tum Aegyptia, tum ex sale cerata liquefacta, tum Indice, tum Athene, tum viridia diluta. Ad hæc, quod pumice constat, & ex eruo, sicca, pastillusque melanchlorus, hoc est, nigro viridis, similiter etiam Criogenes appellatus.

Ad vlcera vermes.

Cap. xlii.

Ad vermes qui in vlceribus procreantur arcendos, primum quidem est, vt humiditatem putredinemque eorum opificem tollas. Cæterum necant vermes communiter quidem omnia quæ ad aurium vermes inscripta sunt. Ad eos autem qui vlcera infestant, Archigenes commendat cerusam, poliumque, pari modo cum pice liquida illitum.

LIBER III.

Quomodo caro vlceribus supercrescens exedatur.

136

Cap. xliii.

Supercrescens vlceribus caro medicamentis quæ valenter excant tollitur, cuiusmodi est diphryges inspersum, squama æris, omniaq; testacea combusta, & erinacei concremati vtriq; cum toto corpore. Verum hæc modice purgant, & supercrescentia continent. Afæ vero petræ flos, validior est, hoc magis fori, chrysocolla, chalcitis, misy, combusta minus rodunt, item æris flos, similiter ærugo omnibus est valentior, sales autem concremati, humentes & flaccidas carnes consumunt, sic etiam linamenta carpta e panniculo, muria acriori imbuta & resiccata, quæ si imponantur, mediocres carniū supercrescentias exedunt. Aerugo, cum æris squama interea refertur quæ valide excrecentia supprimunt. Composita Rhodia (vt dicitur) arida, psaron, ad hæc, xanthon, sine morfu retinent. At maximas carniū excrecentias, adusque penitiora crustis obducunt, pastilli Faustiani, triti inspersiq; & medicamentum, quod a solis æstu heliocaes dicitur, aridum. Adde his quod recipit calcis viuæ, squamæ æris, & mannæ thuris, pares modos. Idē ea quæ nimium excreuerunt, fungisque respondent, cū melle, purgat, cum cerato, carne replet.

Arida compositio ad carnem compescendam.

A R G E N T I spumæ, chalcitidis, æruginis, plumbaginis, singulorum æqualis portio. **A L I V D** vehementer reprimens citrationem, valet quoque ad pascentia vlcera, & præsertim gingivarum vitia, quas epulidas vocant, necnon ad dentium candorem. Calcis viuæ pondo, auripigmenti selibra, hoc auripigmentum siccum, inquam, ex aqua detritum calcis viuæ, cadmiæ modo lotæ adicitur, in puluerem reductis siccis vtitor, ex pastillis autem, tum qui Pantolinus dicitur, tum qui ad polypum inscripti sunt, pulchre coercent, sic emplastra viridia & præcipue id quod ex sale Cappadocico præparatur, similiter, & isis summe carnem supercrescentem in vlceribus continet.

De vlceribus serpentibus, & putridis, & phagedæna.

Cap. xliiii.

Supersusiones vtilis sunt vlceribus depastis, putridisq; ex aceto, vlcera serpere
sto lenticulæ, malicori, balauitii, lentisei, myrti, spinæ ægyptiæ, aut potissimum et sal
aliquo ex iis quæ astringunt & siccant. Cataplasma his ipsis exhibetur ex farina erui, alumine liquido, panis filiginei mica, gobio vesca flaua
teri, aut alio fassamento veteri carnis illotæ, terebinthina liquida parabile p
ri pondere detritum, vel aristolochia, vel recininorum foliorum genita te
succus æqualis, æruginis pars dimidia, ex aqua vt mellis sit spissifratat
Hippo.

PAULI AEGINETAE

ad perd. ipſa enī
mari ſer
pit quā
eos. At
bilis atra
alius
agit ra-
dices ſu
prema
quali fa-
cie cutis
dereli-
cta. Ita
que vl-
ra quæ
ab ipſa
pſiſcū
tur, chaſ-
mata me-
teorolo-
gicelicet
appella-
re. Cau-
ſa etiam
in prom-
ptu eſt,
quod ip-
ſa haud
terræ di-
ſpar ver-
git in cē-
trū ani-
mantis.
at flauē-
cēs bilis
vt ait
Proclus
ignis ſpe-
ciē præ-
ſe ferens

tudo illinitur, ſi cruſta non deciderit, elaterii parem modum ærugini
admiſceto. putridis efficaciſt fori ſi tritum inſpergatur. Et ſuper lina-
menta carpta arida, vel ariſtolochia rotunda, vel gallæ, æquo ponde-
re cum oleo illinuntur, vel cucumis ſylueſtris radix, vel braſſicæ, vel
betæ, vel cucumeris folia, illigata calidis cineribus reconduntur. Vbi
vero emollita fuerint, cum ſale trita imponuntur, valenterq; repur-
gant, vel oleæ ſummitates in vino decoctæ cum melle inducuntur,
vel chalcitis applicatur, vel apii ſemen contritum, vel lini ſemen læ-
uigatum, cum atramento ſutorio inducitur, vel thymum, vva paſſa,
& ficus incoctæ applicantur, aut ſici folia in læuorem trita cum mel-
le, aut nitrum, cuminum & farina ex melle, aut cucumeris ſylueſtris
radix, aut ſcilla cocta ex melle, aut ſoreos drachmæ duodecim, chal-
citidis drachmæ decem, miſyos drachmæ quatuor, cum dimidia ace-
ti acerrimi hemina, læuigantur donec aſcant, exceptis vteris, ſpecil-
lum intingens, ac vlceri circumadigens, ſuperq; duplex, linteolum
ex œnelæo imponis. ſin inflammatione ſint occupata, altercum cum
polenta, aut braſſicam cum melle obducito.

Ad putredines quamlibet partem occupan-
tes, & vlcera quæ depaſcunt.

CALCIS viuæ, chalcitidis, ſingulorum drachmæ duæ, auri-
pigmenti drachma, hoc quoque ad digitorum pterygia & phagedæ-
nas efficaciſt. Item naturalium carbunculis cum melle vtiliter adhi-
betur. In reliquis vitiis arido vtitor, ſuper ſplenium ex reſina in-
ducito.

Ad omnia quæ depaſcunt vlcera, quæq; os infeſtant, item
ad ſanguinis profluuium, & carnem excreſcentem,
aridum, compeſcens, longe vtiliſſimum.

CHALCITIDIS, miſyos, vtriuſque crudi, drachmæ vigin-
ti, ſquamæ ferri drachmæ ſex, gallæ omphacitidis drachmæ octo.

Ad ſerpentia vlcera & putredines.

SALIS drachmæ duodecim, aluminis qualiſcunq; combuſti
drachma, ſquamæ, pumicis combuſti, ſingulorum par modus, va-
let & ærugo rafa cum miſyi combuſto, pice liquida excepta, ſqua-
mæq; ferri cum oleo.

Ad vlcera pudendorum depaſcentia.

HAE C & meleterion dictum nomis proficiunt. Item dia oxy-
myſines, hoc eſt ex acuta myrto, item ex charta medicamē aridum
omnibus nomis efficaciſt. Accedit huc coracion ex oxymelite, pa-
ſtillus Andronis, & qui huic reſpondent. Eadem vero hæc medica-
menta phagedænis quoque cōgruunt, nam & ipſa vlcera ſunt quæ
depaſcunt, exeduntque.

Ad

Ad flaccida humiditate vlcera foetidaq̃.

LE MNIA sphragis ex aceto, vel oxymelite, vel posca, vel vino subacta, ad luti spissitudinem illita beneiacit, aut cupressi folia, germina & galbuli teneri, aut cucurbitæ aridæ concrematæ cinis, aut platani corticis combusti, aut anethi cremati similiter, aut lanarū sordidarum vistarum, aut plantago. aut isatis per se, vel cum polenta, vel peucedani radix arida.

foras p
rumpit
latere ne
scia.

Quomodo cicatrix vlceri inducenda sit **Cap. xlv.**

Si carnem vlcerū quæ cicatrice indigent, siccemus, astringamusq̃ adeo, vt non modo id quod præter naturæ modum superfluum est, discutiamus, sed etiam illud quod naturale est, attingamus, superficiem vlceris cuti similem reddemus. Ad hoc autem sunt idonea, galla acerba, & mali punici cortices modice siccantes. Quæ vero præter astringentem sine morfu exicant, ea quoq̃ cicatricem inducunt, veluti myrrha, argenti spuma, ostreaq̃ concremata. Nam hæc quoq̃ si inspergantur, arida, sepe cicatricem inducunt, pini cortex cum cerato myrteo, hederæ flos cum cerato, lilii radix cum rosaceo, resina ex pinu arida, pumex tostus, squama æris pari portione, siccis vtitor idem etiam reprimat, vel pumici trito, mannæ thuris & diphrygis singulorum miscens paululum, vtitor, vel argenti spumæ partē vnā diphrygis dimidiam cum cerato instar splenii impones. Vetera autem ad cicatricem ducit uiscus, cum lachryma thuris, ærugo cum diphryge æquali, ceratoq̃ myrteo, vel centaureum minus recens applicatum. At humidiora cyperi radice obducito, sedis autem naturaliumq̃ vlcera, præsertim si inflammationem experiantur, aloë persanat læuigata, arida, vel ex aqua aut squama æris, aut chrylocolla in sole cum cera emollita inducitur.

Aridum ad cicatricem inducendam.

OSTREORVM drachmæ duodecim, pollinis thuris drachmæ sex, cadmiæ drachmæ quatuor, facit & Nomis.

ALIVD. Aristolochiæ, drachmæ sex, pini corticis drachmæ sex, pollinis thuris tantundem, pumicis, colophonis, irridis, singulorum drachmæ quatuor. **ALIVD.** Cornus ceruini combusti drachmæ quatuor, pini corticis vnciæ sex, cerusæ vnciæ quatuor, æruginis ratiæ vnciæ nouem, cadmiæ drachmæ octodecim. **ALIVD.** Cyrinorum, atramenti sutorii, singulorum drachmæ sedecim, squammæ æris, aluminis scissi singulorum drachmæ octo, gallæ drachma.

ALIVD. Cerusæ, argenti spumæ, singulorū drachmæ octo, recrementi plumbi, gallæ, myrrhæ aridæ singulorum, drachmæ quatuor.

Ad cicatricem inducendam.

ALV MINIS scissilis vncia, trita in aquæ sextario mace-

S

PAVLI AEGINETAE

ratur, ubi solueris, aqua linamenta imbuis, & ficatis vteris.

Emplastrum ad cicatricem inducendam ex simplicioribus.

C E R A E drachmæ quadraginta, argenti spumæ drachmæ tri-
ginta quinque, diph. ygis drach. octo, myrtei heminæ dimidium, effi-
cax est his quoq; Palmulatū, quod phoenicine dicitur, item ex cad-
mia, tum myrsinatū, & consimilia. Ad ea vero quæ cicatricē vix
recipiunt, ceræ myrtei singulorum drachmæ sex, cadmiæ drachmæ
sex, plumbi, thuris, singulorum drachmæ duæ, aluminis scisilis, æris
combusti singulorum drachma, æruginis rasæ drachmæ duæ, die in
terposito soluitur.

Diu inueteratis & ægre ad cicatricem venientibus.

C A D M I A E, chrysocollæ, aluminis scisilis, singulorum
drachmæ octo, æruginis, squamæ æris, singulorum drachma, resinæ
pityinæ drachmæ quadraginta, ceræ drachmæ centum, myrtei quod
satis est. A L I V D. Ceræ resinæ pityinæ, singulorū vnciæ sex, cad-
miæ tantundem, chalcitidis crudæ vnciæ tres, myrtei quantum satis
est, vino læuigatur cadmia cum chalcitide, quando caniculæ fidus
oritur, latiore vtere splenio, quod platysma dicitur, super id linamen-
tum carpum & spongiam ex vino inducito. A L I V D. Aeris
combusti, aluminis scisilis, singulorum vnciæ duæ, salis ammoniac-
ci drachmæ duæ, ceræ vnciæ sex, colophonix tantundem, myrtei
vnciæ duæ, arida in sole diebus viginti ex aceto læuigantur, ubi
mellis facta fuerit spissitudo, cera eliquata refrigerataq; emolliendo
miscetur. Valet etiam ad hæc medicamentum ex pumice, item lsis,
& id genus alia.

De maleficis vlceribus dolosisq; cacoethe Græci vocant, alias
chironia & telephia. Cap. xlvii.

elegant-
ter &
docte
Græci
medici
morbos
nuncu-
pant vel
ab in-
uentore
reme-
diorum,
sicut a
chiro-
I Nueterata & quæ vix cicatricem recipiunt vlcera, alii chironia
appellarunt, ceu Chirone medicinæ peritissimo indigentia, alii te-
lephia, quod in tali vlcere Telephus consenuerit. Inspiciendum igitur
venit, num & totum corpus vitioso redundans succo huiusmodi
fluorem ulceri transmittat, ac qui superat humor, convenientibus ua-
cuari debet remediis. Si uero uarix cruribus ulcere infestatis illū im-
pertiat, etiam hic auferri debet, sicut in parte chirurgica explicabi-
tur, aut venæ sectione ipsos vacuabimus, abunde sanguinē detra-
hētes. deinde loco inducemus auxilia quæ sine morlu reficiēdi vin-
habent. simplicia igitur ex pumice, diphryge, squama, ærugine, calce
mediocriter lota, alumē scisile tritū inspergit, hyssopi drachmæ qu-
tuor, vix passæ tantundem, nitri drachmæ duæ, loco prius melle illi
to applicantur, squamæ æris drachmæ decem, aluminis drachmæ
duæ, cum ceræ drachmis decem emollitis in sole, imponuntur.

LIBER III.

138

Composita hæc sunt. emplastrum ad chironia.

CER V SAE vncie octo, aluminis scissilis vncie duæ, squamæ æris drachmæ duæ, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasæ, malicorii, singulorum vncie duæ, calcis viuæ vncia, ceræ libra, myrti libra vna & semis arida vino te. untur. hoc medicamento protinus ab initio callum excindit, & reconditum seruatur, postremo autem in vsu emollitum myrteo, cicatricem inducit. **ALIVD.** Argenti spumæ libra, olei libræ duæ, chamæleontis nigri, radicis aristolochiæ, gallæ omphacitidis, singulorum vncia, galbani, guttæ ammoniaci, lachrymæ thuris, singulorum vncie duæ, præparato radicibus viridium arundinum agitans. Archigenis ad chironia, tum malefica vlcera quæ tibus mammæsq; obsident, item strumas & parotidas. Adipis bouilli libræ tres, terebinthinæ quincunx, pollinis thuris septunx, terræ sardæ dictæ, qua scriptores vtuntur quincunx, his quæ liquari possunt in arida coëctis vnitisq; vtitor. **ALIVD.** Archigenis, ceræ triens, olei omphacini, pollinis thuris, vel eius lachrymæ, diphrygis, squamæ singulorum drachmæ quatuor, arida cum aceto læuigas, vbi mellis spissitudo facta, terato misces, & vteris diluto quod linteolis possit illini. **ALIVD** ad mulierum dolosa vlcera, & aliorum qui tenera carne præditi sunt, Ceræ tyrrhenicæ drachmæ octo, adipis taurini, terebinthinæ, plumbi combusti, lotiq; singulorum drachma, vtitor per linamenta ex rosaceo vel myrteo diluens.

Ad cicatrices nigricantes.

Cap. xlvij.

Cicatrices nigras tollit oleum in quo bryoniæ radix candida & nigra incocta sit, dum succum reddat, impositum, calamintha ex vino cocta, argenti spuma cum rosaceo albo lota, ex impetiginibus cicatrices, tum alias, & concolores efficit asini adeps illitus, ærucæ semen ex felle caprillo, bubulo, & ouillo, perunctum cum argenti spuma, ouillus calus combustus, ex vino austero tritus, gutta ammoniaci cum suillo felle illita. Composita vero, argenti spumæ, mentæ, lachrymæ thuris, pares portiones cum melle. **ALIVD.** Nitri, suffiminis ammoniaci, sulfuris viui, myrti, paria pondera, ex aceto albo, aut vino, aut aqua, minutim detrita modice illinuntur, ne exulcerationem excitent. **ALIVD.** Cimolæ cretæ, columbarum fimi, saponis, thuris, æquales modi ex aceto. **SMEGM A** ad cicatrices nigras, Cimolæ cretæ drachmæ octo, aphronitri drachmæ quinque, veratri albi drachmæ quinque, glandis vnguentariæ expressi drachmæ quatuor, in balneo cicatrices abstergit.

S 2

ne, a
quo
Achil-
le me-
dendi ar-
tem ac-
cepisse
Home-
rus pro-
dit. vel
ab his,
qui hi-
ce mor-
bis la-
borant,
vt Tele-
phus.
κακονδῆ
autem
huius-
cemo-
di no-
minant
ex eo,
quod
negli-
gentia
homi-
num no-
bis fa-
miliaria

PAULI AEGINETAE

De sinibus.

Cap. xlviii.

reddita
fuit. Mo
dus dice
di trāsta
tusex di
sciplina
morali.
Nā sicut
vitia vir
tutesq;
& habi
tu nobis
innascū
tur, vel
quod nō
colui
mus vir
tutē, vel
quod vi
tia ī sinu
nostro
fouemus
ita mor
bi corpo
ris huius
cemodi
naturam
habent.
Neq; le
cti no
biscū ve
terascūt,
curati p
uiliq; v
fugātur,
vel ad
leuitatē
redigun
tur.

Cum adiacens vlceribus cutis, diutius subiectis corporibus nō
coalescit glutinaturq;, nostri sinum, Græci colpon nominant.
Si igitur ad superiorem partem porrectus sit, facile sanies per os
emanat, atque ideo prompte conglutinatur. Si inferius ipse spectet,
sanies vicinam aliquam partem intus erodit, ac nisi emissariū quod
dam collectionis scalpello prius feceris, nihil promouebis, neque
carne ipsum replendo, neque conglutinando. Quod si artus ali
quos nempe cubitum, aut femur sinus occupet, poterit vtrique decli
uis figuratus citra diuisionem ex aduerso factam coalescere. Etenim
in cubito cum oræ flexuræ ipsius vicinæ sunt, summam manum
elatus protendens, sinum ad effluxum conuertis. At in femore si
propter genu sinus desinat, decliui figura posito, iuxta poplitem
mollem puluinum subiicis, quo inguina genu humiliora sint. Si igitur
sinus carne impleri nō desideret statim fistula quadam recto per
uia foramine cui vesica illigata sit, ad saniem quidem quæ sinui
inhæret abstergendam aquola mulsa potabili, elui debet, verum vt
coalescat, vino aut mulso, deinde ad glutinans medicamentum tran
scundum. Sin cauus sinus carnem requirat, primū medicamenti, quod
charta constat, aridi paululum cum multo rosaceo inferi conuenit.
deinde carpto linamento os obturari. Inde emplastrum lsis aut Ma
chæronis, aut simile quoddam vna cum rosaceo cerato liquidiore so
lutum iniicitur. Vbi vero carne mediocriter sinus fuerit repletus,
conglutinans quoddam medicamentum impones, quemadmodum
& recens cruentum vulnus curabas. Huius autem generis sunt, Bar
bara, Dichroma, & scyrha, id est, fulua appellata. Maxime vero
omnium quod ex resinino, & metallica sine cera præparatur ful
uum Galeni emplastrum conueniet. Post medicamentum, spongia
recens ex mulso, aut vino circumponitur, & quam fieri potest mol
lissime, deligatura a sinus fundo incipiens in ipsius os desinet, lin
teorum vero circumductus fundum sinus sine dolore constringat, pau
latim vero solvatur vsq; ad sinus oras, emplastro extrinsecus sinui
circundato, sed ita iuxta oras descisso, vt sanies queat excerni, quod
fiet paruo quodam alio emplastro superimposito ex eodem medica
mēto obeffluxum laxo, fines id adusq; solutionem, qua tertio quoq;
die facta id ipsum auferes mutabisq;, quod toti sinui circumdatum est
relinquens. Nota vero erit an sinus ima coaluerint, si sanies prope
emanet pauca, & concocta, aut si nequaquam effluat, insuper eodem
in sinu si neq; dolor aliquis sensibilis, neq; tumor, sed tota regio cō
tracta, sicca, & doloris expers appareat. At si pus etiam maturum
in ore modicum conspicias, multo magis de sinu conglutinando

sperandam est. At si primo alterove die sanies quædam tenuis e' sinu ex cernatur, nihil adeo de glutinatione despera, quippe medicamento virtus humorem tenuem & ex subiectis partibus frequenter extundit, vnde partes siccæ mediocriter factæ cocunt, & glutinantur. Tertio vero die aut quarto ab initio si cruda per os sanies euaserit, scito suū non coisse, eodemq; medicamento non insiste, nam cum propter humiditatem quampiam, ut uerisimile est, a parte decidat, non alienum fuerit etiam mutare.

† Antiquus codex habet, ἐκ τῶν ὑπερκειμένων, id est, ex superpositis partibus.

De sinibus laceris detritisq;.

VBI abscessus tarde sectus fuerit, vel medici imperitia, uel eius qui curatur timore, & cutis sinui obducta tenuis, diruptaque, quod Græci ab attritis uestium laciniis rhacodes dicunt, nec fieri potest, ut prædictis collutionibus adimatur, glutinante vtendum medicamine temperatura liquido, uiribus autem sicco. tale est palmulatum dictū ex chalcitide, ueteri dilutum oleo, ut neq; admodum sit durum, neq; manus intinctas inquinare desierit, deinde uino mediocriter vetusto maceratum, postea orbiculatim cum decenti deligatura impositum. Conuenit autem laceræ ut comprehensum est, cuti, potissimum mel, quoad emplastri spissitudinem habet coctum impositumq;. Præstiterit autem post illitionem lacero in sinu factam, myrrham in pollinem coactam, cribro suspensio ei inspergere, uel aloen, uel thus, uel simul omnia. Expertus autem sum, tenue centaureum in hunc usum mirabile esse medicamentum. succedit huic symphytum, deinde iridis illyricæ radix, postremo erui farina. Nonnunquam uero inter coquendum ea melli insperguntur, cum cacabus ab igne tolletur. Melius autem fuerit, si lebate iam a flamma amcto hæc fiant, deinde diligenter agitemus, ubi medicamentum tepidum euaserit, sinui imponatur, illigeturq; sicut expositum est.

De fistula.

Cap. xlix.

Fistula sinus est callosus, qui magna parte ex abscessibus nascens, ab arundinearum fistularum tralatione appellatur. Si itaque in os defluat, curari sine manu haud potest, nisi temporis spatio, squama ultro uel os deciderit. Si uero in os non finiat, medicamentis quæ callos elidunt & conglutinant persanabitur. Itaque callos excindunt hæc quæ subiungam. Spondylii radix circumrasa impositaq; fistularum, callos eximit, item ueratrum nigrum duobus tribusve diebus infertur idem præstat. Ad hæc amurca cocta & in collutionem adhibita, iam sory crudum uel concrematum cum uini diluti momento ad collutionem injectum, item sory & crocomagma cum hydromelite,

lege potissimum libros Gal. qui de locis affectis conscripti sunt. li enim

PAULI AEGINETAE

libri maxime omnium necessaria rii extiman-
 tur. Plæ rosq; autē mortales hac tempe-
 state fistulis laborare a medicis accipio.
 siue q; bis die cibū sumimus
 grauem unde po-
 stea natura imbecilla
 facta p cannales
 & riuos quosdā
 exonerat mare
 suū. Siue quia æ-
 tas nostra ut
 lautis epulis
 possit sufficere,
 amat de industria

vel elaterium terebinthina exceptum in penicilla cogito, imposito-
 que, vel laserpitii radice succum infundito. Id quod sequitur callos
 consumit, æruginis drachmæ duodecim, ammoniaci drachmæ duæ,
 excepta aceto in longum inducuntur.

Collyrium quo fistulis exterendis vtor.

G V T T A E ammoniaci, atramenti sutorii, æruginis, misyos,
 chalcitidis, gummi pari modo excipiuntur aceto. A L I V D. ex
 his quæ Heliodori chirurgica scribuntur. Cadmiæ, misyos, atramen-
 ti sutorii, æris combusti, gummi, singulorum drachmæ quatuor, chal-
 citidis crudæ drachmæ tres, excipiuntur pueri veneris non experti
 vrina, & singuntur collyria ex quibus vno fistulæ imposito, panis
 mica aqua madens extrinsecus superaccommodatur, mutaturq; sæ-
 pius donec inflammatio conquirit & crusta exciderit. A L I V D
 quod in Alexandria accepi, Anchusæ radicem, misyos tosti, chalci-
 tidis, æruginis, aluminis scissi, atramenti sutorii, aloes, singulæ vnciæ
 cantharides quinque, aceto trita in collyria coguntur. A L I V D.
 Atramenti sutorii drachmæ duæ, chalcitidis, æruginis, singulæ dra-
 chmæ, excipito ammoniaco & vtor. Cum autem callus fuerit ex-
 tricatus, ærugine cocta cum mulla purissima octupla in collyrii for-
 mam redacta, repurgatur. Vbi vero callum eliseris, iis quæ carnem
 procreant vti opportunum est.

Collyrium ad carnem generandam.

A L O E S, myrrhæ, ammoniaci, ouorum putaminum combu-
 storum cineris, æquale pondus, aqua detritis omnibus collyria for-
 mantur, imponunturq;. A L I V D. Myrrhæ, aloes, thuris, malico-
 rii, æqualis modus aqua excipitur, quidam vero taurino felle, carnes
 etiam oleo quod immaturis vuis expressum est eluuntur. Notus mi-
 hi est, qui cedrino liquore fistulas collueret, ac mirum quanta res fe-
 licitate successerit. Postquam vero carnes prodixeris, glutinatorio
 vtendum medicamine, quomodo in aliis sinibus præcipitur. At cum
 fistula arctior, longaq; fuerit, Galenus ait, neq; callum adhuc, sed for-
 diciem tantummodo contraxerit, primum lixiuiam demissi, deinde
 eandem tantisper inibi permittens dum sordes excidisse sperassem,
 medicamentum applicaui. Est autem id quod recinino oleo constet
 superius commemoratum.

De vlceribus disruptis.

Cap. I.

N Onnulla vlcera cicatrice obducta, frequenter haud magno
 poris interuallo, iterum inflammatione tentantur rumpunturq;
 siquidem osse quodam affecto, interdum caro circumdata ex facili ci-
 catricem recipit, ac sana ex toto esse videtur, verum cursu humoris

valido paulatim ex osse in alto contabefcente, tum inflammatio, tū huiusce-
pus oboritur, quod cicatricem deradit. Curatio igitur eiusmodi vl- modi hu-
cerum tantam requirit siccitatem, vt os affectum decidat. Huius morum
autem sinus concauos prompte replebunt, papaueris syluestris sicique diuerti-
folia cum polentæ subtiliore parte læuigata, atque ex vino appli- cula
cabis, vel alterci semen, & atramentum futorium pari pondere con- moliri.
trita imponentur, vel peucedani radix de subito squamas ossium Et ple-
separat. riq; etiā
ditissi-
mi &
clarissi-
mi ho-
mines
uel ada-
perto
crure uel
brachio
perfora-
to uel fi-
stula quæ
dam glo-
riantur,
perinde
quasi in-
de deri-
uato os
prauo
succo cæ-
tera opti-
me con-
uale-
scant.
Id quod
vitio
maxime
dandum
est. pestē
enim te-
trumq;
odorē se-
cū ferūt,

De articulorum vlcibus.

Cap. li.

Cum articuli carnosus partibus sicciore existant, exulcerati sic-
ciora medicamenta requirunt. Probe igitur facit pastillus Poly-
dæ ex vino subactus, donec sordium fiat spissitudo. Item quæ simili-
ter huic desiccant medicamina. Item marina, muriaq; frequenter irro-
ratos, melius affici conspeximus. Quare in articulis iis vtendum est
quæ maiori etiam siccandi virtute pollent.

Quæ spicula, aculeos, spinas, & consimilia edu-
cunt.

Cap. lii.

Aculeos, arundines, insuper spicula & spinas extrahit vtrunque
Anagallidis genus, aristolochia rotunda, ammoniacum cum
melle, alterci semen læuigatum inspergitur, arundinis radix con-
tusa mellisq; mista in linteolum largum illinitur, imposita de subito
educit.

Si ex vena, arteriaue, & naribus sanguis pro-
fluat.

Cap. liii.

Particulis sanguinem fundentibus, figura ei quam in finibus ex-
posui contraria, recte adhibebitur, nempe quæ sursum vergat, ne-
que id tamen immodice, nam periculum est, ne dolore oborto, vas
rursus sanguinem profundat, cum nihil æque sanguinis profluuium
excitet, inflammationesque augeat, ac dolor. Cum itaq; sanguis erum-
pit, statim digitum ori vlcis vasculi iniecit, innitens leniter pre-
mensq; citra dolorem, nam simul & sanguinem continebis, & gru-
rum vulnere induces. Quinetiam si altius deliteat vas quod sangui-
nem emittit, diligentius perdisces, & situm ipfius, et magnitudinem,
item vena sit, an arteria, deinde si exiguum vas existat, aliquo ex his
quæ sanguinem reprimunt vtendum est. Optima vero eius generis
sunt, quæ obruendi vim obtinent, vnde Græcis emplastica dicuntur,
ex resina fricta, farinæ triticæ polline, gypso composita, similiaque,
oui candido macerata, & cum leporinis pilis imposita, at si amplum
vas existat, hamo ipsum attollere conaberis, & mediocriter cir-
cū ferūt,

PAULI AEGINETAE

qui hisce morbis comitibus utitur. Fugere venerē crapu- lasq; im- primis oportet, ex quibus morbi tales proficiuntur. Quotus n. quisq; morbus est, quem a natura homo habet, ipsa enim *μὴδὲν μάττω ποιεῖ*. cum ages, sanguine represso, siquidem vena extiterit sine funiculo sanguinem his ipsis medicaminibus sistere tentabis, si arteria, alterum e duobus facies, a funiculo circumposito, aut toto vase praeciso sanguinem coercebis. Est, cum magnis quoque venis funiculos circum- dare cogimur, quemadmodum nonnunquam easdem totas transuer- sim nimirum amputare, in cuius rei necessitate venit, in venis quae a penitioribus recte sursum feruntur, praesertim per arcum quoddam spatium, aut principes particulas, sic enim utraq; pars utrobique & re- flectitur, & vulnus a vicinis corporibus premitur contegiturque, tutius autem fuerit utrumque facere, funem quidem radici vasis circumdare, quod autem inde procedit abscindere. his sic peractis, vulneri celerrime car- nem inducere, priusquam funiculus a vase decidat, si enim subito car- nem contraxerit, & locus alibi inanis reperitur, id quod graece vo- catur aneurysma sequitur. Dignosces autem num vena an arteria san- guinem profundat inde, quod huius flauior tenuiorque sanguis exis- tat, & cum pulsu vacuetur, illius autem nigrior, & sine pulsu. Sub- sequens igitur est omnium optimum quae nouimus ad carnem indu- cendam medicamentorum, quo etiam ad cerebri membranarum haemorrhagias uti securissimum est, item ad colli vulnera, ipsarumque venarum iugularium quas sphagitidas Graeci vocant, etenim & ha- rum sanguinem citra vinculum cohibet. Recipit autem thuris lachry- mae pinguisimae partem unam, aloes in mollioribus quidem corpo- ribus partem dimidiatam, in durioribus aequalem, ac in vicem lachry- mae thuris, tenuissimae eiusdem partis tantundem, cum oui albo sub- igitur, dum mellis fiat spissitudo. deinde leporis pilo mollissimo ex- cipitur, mox vasi ipsi, tum vlceri vniuerso copiosissime imponitur. Deligandum vero extrinsecus est fascia ex tenui linteo, cuius fasciae primi quatuor aut quinque amplexus super ipsum vas quod profluit, iniiciuntur. hinc ad radicem ipsius distribuentur, postea ubi tertio sol- ueris die, si tuto adhuc medicamentum vlceri adhæreat, aliud rursus orbiculatim circumdabis ac veluti contegens iterum deligabis, quem- admodum prius. at si sponte sua primum reiecerit linamentum, vasis radicem digito leniter comprimens, ne videlicet quippiam confluat, hoc quidem sensim auferes, alterum vero impones, atque hoc modo quoad carne obducatur vas, curabis, ita ut semper accluius particulae figura sine dolore seruetur. At quae crustas generant, quoties illae de- cidunt, nudam magis partem quam naturaliter esse debet, efficiunt, multisque iam ex iis quibus crusta decidit, sanguinis profuuium quod ægre supprimi queat superuenit, quanquam & his utendum est cum magna vrget necessitas. Maximam vero necessitatem vel crustam inducentibus medicaminibus, vel ignitis ferramentis utendi puto,

ubi ex erosione putrescentis alicuius profluvium sanguinis concita-
tur. Quinetiam cum in huiusmodi affectibus totum quod putredine
expertum est exciderimus, tutius est vel ipsius quasi radicem adure-
re vel medicamentis quæ crustam faciunt uti, hoc autem maxime
tum in pudendis, tum in sede fieri consuevit. At scopus crustam gene-
rantium medicamentorum erit calor cum astringitione, quemadmodum
in chalcitide, misy & atramento sutorio habetur. Quæ autem ex cal-
ce viua conficiuntur, vehementiora quidem his sunt, cæterum quia
calx non astringit, crustæ citius ab ipsis decidunt, hæere autem ip-
sas longe est utilius, quippe ad basim earum caro supernascitur, effici-
turque vas profluentibus veluti operculum, at huiusmodi sanguinis
profluvium isatis sativa si inspergatur, probe coercet, vel gallæ com-
bustæ. Porro ipsa ferramenta ignita ex aceto aut vino restringere
oportet. In uniuersum sanguinis profluvium sistunt, simplicia qui-
dem, aloë, thus, eiusque pars subtilior, terra samia, ærugo ferri, lanarum
crematarum cinis tenuissimus similiter, sterqus asini & equi, bitumē
modicum, malicorium, diphryges, galla, myrtus arida, alumen omne
tum crudum tum combustum, resina fricta, vitis cortex, aut folia ari-
da, platanorum galbulorum pollen tenuissimus, maxime cum humo-
rem concretum deposuerit, priuatim autem ex naribus profluvium
imposita reprimunt iunci acuti semen, vrticæ foliorum succus, chalci-
tis, anthyllis concremata, pili leporis, ferulæ medium vstum cum ace-
to, & sterqus asinum siccum vel humidum, succus porri cum thure,
ellyphnio exceptus, composita vero ad quodlibet sanguinis proflu-
uium hæc quoque faciunt, spongia recens in liquida pice merfa & bi-
tumine circumlita, olla recenti concrematur, cineris partibus duabus,
miscetur plumbi & stammeos, singulorum pars vna. **ALIVD.**
Thuris lachrymæ, eiusque partis tenuioris, sulfuris ignem non exper-
ti, æqualem modum inspergito. **ALIVD.** Chalcitidis drachmæ
viginti, lachrymæ thuris vel tenuioris eius partis drachmæ sedecim,
resinæ frictæ, gypsi, combusti, singulorum drachmæ octo. **ALIVD**
crustas inducens sanguinemque reprimens. Chalcitidis, æris combu-
sti, atramenti sutorii, misyos tosti paria pondera, item Rhodia dicta,
& Xanthe probe sanguinem cohibent.

† Hic locus sic rectius legitur in vet. τοῦ δὲ φλεβὸς μελάντερον
τὸ καὶ παχύτερον, & c. venæ autem nigrior & crassior sine pulsu.

† Rectior est scriptura in veteribus lib. ὄνων ἐξηρά ἢ ὑγρὰ. idest,
Ononis ficca vel humida. Quid autem sit Ononis, Dioscorides &
Galenus docent.

De neruis conuulneratis. Cap. liiii.

Neruis vulneratis aut punctis, ex sentiendi quod obtinent, acu-

PAULI AEGINETAE.

mine, inflammatio & dolor immodicus accidit. Quare & febres et
convulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium ob commercii
quod nervi cum cerebro obtinent. Interim vero in aliis quoque am-
bientibus particulam vulneratam locis inflammationes, & absces-
sus ex ipso nervo vulnerato ob coherentiam solent accidere. Ratio
igitur est, cutis vulnus apertum inglutinatumque relinquere, quo per id
sanes effluat. At si punctus in conspectum non veniant, etiam dua-
bus lineis sibi continuis incidere praeterea oportet. Remedio autem
est, si corpus plethoricum sit & magna vrit inflammatio, primum a
sanguinis demissione auspicari, si vero vitiosis repletum sit humori-
bus, etiam purgatione utendum est. Medicamenta vero vulnere ap-
plicentur quae dolorem leniant, & effluxum saniei patefaciant, non
facta praesertim diuisione. Itaque aqua calida, quanquam reliquis in-
flammationibus sit accommodatissima, vulneratis tamen nervis est
inimica, ac praestiterit eos oleo subtili, quod astrictionis sit expers,
ad sensum calido irrorare, neque enim frigida neque tepida admodum
tuto adhibetur. Verum ex medicamentis idonea est terebinthina re-
sina, per se quidem, in pueris & mulieribus & iis qui molli sunt car-
ne, cum euphorbio autem emollita, in duris corporibus, & si nonnun-
quam duriora contigerint, cum oleo quodam subtiliore. Cataplasma-
ta vero in nervis, qui inflammatione tentantur & putrescunt, adhibe-
bis hordeaceam farinam, aut fabaceam, aut eruinam, in lixivio, cum
oxymelte coctam. Si putredine careant puncturae nervorum, recte
cerato uteris, quod recipit ceræ quadrantem, euphorbii vnciam, aut
columbini fimi in duriusculis corporibus, olei sextantem, interdum
etiam terebinthinae vnciam, ut autem emplastri figuram induat me-
dicamentum, vnciae vni euphorbi, sex vncias singulorum sequen-
tium, ceræ, resinae frictæ, olei, picis liquidæ iniicies. At si in vicem re-
sinae propolim pinguissemam indideris, multo id reddes praestantius,
atque hoc ad nervos punctos laudatum est remedium, idem & a ra-
bioso cane morsus efficax est. Aceti sextarius, picis pinguis libra, opo-
panacis quadrans, opopanax aceto solutus magis laeuigatur, pix li-
quefacta mixtaque coquitur, medicamentum compunctis nervis ido-
neum est, ut quod os puncturae non sinat connuere, quemadmodum
nec in his qui a rabido cane morsus sunt, vlcus in cicatricem coalesce-
re, sed efficax solis duris corporibus, si autem in pueris, aut molli car-
ne praeditis, punctura affectis, uti cogites, licet ipsam ex digerente
quodam amaracino, aut opobalsamo, aut oleo veteri liquefacere. Con-
uenit etiam medicamentum basilicum quod nitrum recipit, aut cal-
cem viuam, aut euphorbium, aut sulfur viuum, aut sylvestris colum-
bae fimum, aut opopanax, aut sagapenum, aut liquorem cyrenais

LIBER III.

144

aut castoreum, ac in medicamento libram, dictorum alicuius uncia debet iniici. Facit autem bene nervorum vulneribus & præsertim puncturis, quin & in agro ubi nullius copia datur, propolim recentem pinguemque vulneri poteris inducere, aut fermentum maxime vetustum, per se aut cum propoli mixtum, vel cum liquore tithymalli, cataplasmatibus utendum. ex oxymelite factis, aut lixiuio cum lomento fabarum, aut eruorum farina, aut cicerum, aut lupinorum amaro, aut hordeacea, aut subtiliore polenta, idque non solum dum inflammatione tentati sunt, sed iam inde ab initio protinus. Cæterum quæ relaxant cataplasmata in nervorum vulneribus semper vitare oportet. At si nervus non punctum, sed plane cassim vulneratus fuerit, cute etiam quæ interueniebat diuisa, ut nudus appareat rectusque, non transuersim dissectus, commemoratis ex euphorbio & tam acerbis nullis utere, quippe nudus cum sit nervus, vehementem ipsorum vim ferre nequit. Quare calcem quæ sæpius æstiuo tempore lota sit, & oleo liberaliore intincta, assumes. Proficiunt hic & quæ ex pompholyge confecta sunt, item quod melle constat, rosaceo largiore liquefactum. Sed ea adhibenda cura est, ne quid ex iis vulnus contingat. quandoquidem nervus ipse & sensibilis maxime est, & temperamento suo frigidus, & principum corporis partium primati continuus, imo ne oleo quidem eiusmodi vlcus irrorare convenit, hinc enim sordidum redditur. Abluenda igitur a vulnere sanies est molli lana specillo subunctorio circumuoluta. Quod si omnia ex animi sententia processerint, etiam vino dulci madefacere citra periculum licebit. sed in robustioribus Polydæ pastillo in linamentum illito cum sapa calida uti. postquam nervum denudatum contexeris, linamenta extrinsecus circumducere oportet ex medicamento quod angustis vulneribus faciat, nempe eo quod euphorbio præparatur, aut fimo columbatum, sed ita ut etiam sanas partes ampliter comprehendat. Quum vero transuersum nerui vulnus est, maior conuulsionis metus impendet, ac quæ ad curationem vulneris spectant. hic quoque sunt eadem, quanquam nonnulli in vulnere adhuc recentis futuri vti sunt, ac medicamento aliquo conglutinatorio, verum summas non summæ nimium cuti, sed altius moliri convenit, ne quæ in imo sunt inconglutinata dehiscant, rursus cura adhibenda est, ne ab acu nervus compungatur. Cæterum in summa sciendum erit, in nervorum vulneribus medicamentum natura calidius quod puncturis medetur, diuisionem nerui non posse curare, ut qui rosionem ipsorum feruoremque sustinere nequeat, neque quod diuisionibus medetur, puncturis conuenire, non enim virtus ipsius alte quum angusta est cutis diuisio, penetrat. Victus itaque adhibebitur tenuior, lectus mol-

PAVLI AEGINETAE

lis, oleumq; calidum alis, capiti & ceruici superfunditur, at si in crure neruus vulneratus sit, inguinibus inferioribus ventris partibus, & locis vicinis, balneo in totum donec inflammatio inclinauerit, abstinendum est, quum aquæ contactus nequaquam, vt dixi, ipsis conueniat. Quoniam vero nonnulli citra id manere consuetudinis gratia non sustinent, siquidem læsa particula in manu fuerit, conandum est quatenus fieri potest, ipsam aqua seu calida, seu multo magis frigida non madefacere. Si pes vulnus acceperit, quoniam fieri nequit vt nõ madescat, vbi lauacrum ingressuri sunt, emplasticum aliquod medicamentum vulneratæ parti superaccommodabis, iterum extrinsecus linteos multiplicatos plures oleo imbutos inticies, iterum fasciam ex linteo a foris deligabis, deinde rursus in ipso balneo fasciæ oleo prius superfundes, cum æger in solum descendet, vbi lauerit, omnia quæ imposita sunt abiicies, ac prædicta totius curationis ratione vteris. Contusi vero nerui vbi simul cum his cutis cõtusa exulcerataq; fuerit, cataplasma ex fabarum lomento & oxymelite postulant, nonnunquam adicitur erui farina & iris. At si dolor contusioni adest, picem liquidam admisce, sin autem citra cutis cõtusionem euenerit, magis discutiens adhibebitur, nempe oleum calens, anethinum dico, superfusum continue, aut rutaceum, aut irinum, aut amaracinũ, Quod si totus neruus præcisus sit, periculum quidem nullum sequetur, verũ particula debilis manebit. Curatio autem eius communis est cum ea quæ aliis vlcerebus accommodatur, hæc quidem ex simplicioribus remediis in neruis conuulneratis curatio abunde est. quidam vero cõpositis vti consueuerunt, cuiusmodi sunt, ex metallicis confecta, Barbara appellata, Cissinum, ex senecione præparatum, melanchloron, Indice, Harmonia, & Athene, quorum & compositionem, & vten- di modum septimo libro reperiēs. Sed quia nonnulli præpotentium etiam sumptuosius ad neruorum vulnera remediis vti volunt, Galenus literis prodidit, ad puncturas neruorum hæc, cinnamomi, dictamni, fœniculi, singulorum vncia, amaraci sextans, ceræ bes, opobalsami dextans, terebinthinæ vncia. A L I V D. Liquoris cyrenai civncia, ceræ quadrans, opobalsami libra. Ad denudatos neruos hoc valet. Ceræ vnguentariæ quadrans, vnguenti spicati aut foliati, aut nardini libra, pompholygis, spicæ nardi, amomi, phylli, singulorum vncia, atq; hæc supra spem respondere Galenus pronunciauit.

De articulorum contractione seu ligatione, quæ
anyclosis dicitur. Cap. lv.

Articulos ex humoribus infarctis ac neruea quadam tensione contractos, detentosq; ancylas, & ancylotes appellare consue- runt. In quibus remedio opus erit quod emolliat relaxetq;. Commu-

niora igitur his remedia conueniunt, quæ in particulis scirrho induratis ac adeo quæ in resolutis commemorata sunt, propria vero magis, irroratio ex hydrelæo, in quo decoctum sit lini semen, fœnugræcum, althæa, laurus, cucumeris agrestis radix, ipsumq; oleum sicyonium. Vbi his artus irrorati fuerint, accommodantur primum acopa simpliciora, cuiusmodi ex nigra populo, ex abiete, Bromium, quod ad Basileum refertur, Pyxis, deinde Aristophaneum, & quod Afanito attribuitur. Validissima, Lisoponium appellatum, & Pœcilum, emplastra, quod Amythaoni adscribitur & Anicetum. Laudatissimum vero quod recipit bdellii, adipis vitulini, suffiminis ammoniaci, iridis illyricæ singulorū drachmas sedecim, opopanacis, galbani, cacherios, styracis, thuris singulorum drachmas octo, piperis grana centum sexaginta, ceræ libram semissem, resinæ terebinthinæ tantūdem, irini sedimenti quod satis est, & vini quantum sufficit, tunditur hoc medicamentum. Est & acopon non inefficax dissolutum irino, aut cyprino, aut laurino. Inter acopa vero & emplastra, medicamentum medium est diapternes variis confectum misturis. Verum acoporum vsus molli adhibebitur & continua frictione, ita vt simul affectum articulum experiare, an flecti possit, & extendit.

De articulis relaxatis.

Cap. lvi.

Laxantur subinde articuli ob longos febrium morbos, colicos et resolutorios, præsertim vbi calidior ipsos humidiorq; intemperies occupauerit, atq; motus inde impeditur. Succurrit his acaciæ succus aqua dilutus & parti superfusus, aut rubi, aut myrti, aut lentisci, vel vلمي radicum corticis decoctum congruet, aut malicorium applicatum, aut myrti folia, cum cerato myrtheo imposita. Nam colligantes nervi firmari desiderant facultate quæ astringat deficcetq;. huiusmodi igitur medicamenta articulis imponi debent, cuiusmodi ex salicibus est & oxyra, palmulatum quod vinum astringens, aut acetum assumpserit. Multi vero eiusmodi impotentiam a frigore fieri putantes, deinde calidioribus vsi præsidis, maiorem noxam intulerunt.

De lumbricis.

Cap. lvii.

Tres sunt vniuersæ lumbricorum differentię, prima teretum secundum crassitiem, altera latorum, tertia eorum quos ascaridas nuncupant. Origo omnium generum est ex cruda, crassa, pituitosaq; materia & putredini accommoda, qualis in pueris alijsq; voracibus colligitur, non autem ex calida, acri, aut melancholica substantia. Hæ siquidem alimenti naturam egressæ, lumbricis procreandis ineptæ redduntur. e contrario autem, biliosa potissimum recrementa etiā hos perimunt. At si quando flaua bilis vna cum lumbricis infra, aut etiam vomitu eruperit, ipsos quidem intestina obsidere, humorem

hoc idē
testatur
Arist. in
v. de hi-
sto. aīal.
Sciendū
tamē ne
gare Ari-
stote. &

PAULI AEGINETAE.

physios vero biliosum ventriculi os aut aliam quampiam particulam occu-
peripate pare scito. Cuiusq; igitur ipsorum differetiae speciem, generationem,
ticos gi locum, notas, curationemq; exequemur, a rotundis exorisi.
gni lum
bricos i

De rotundis lumbricis.

TERETES igitur lumbrici speciem habent omnibus per-
spiciam, quod sane aliis frequentiores sint, in gracilibus plerunq; in-
stestinis consistunt, & superiorem ventriculum subeunt, ideoq; frequē
uerofate ter per os reiciuntur. quibusdam & e naribus redditi sunt, atque hoc
ri. Illud genus infantibus peculiare & plurima parte cum febricula, sed per
quoque febrium initia orti, substantiam ex subiecta corruptione retinent, in
sciendum statu, ex malitia morbi, in declinatione, toto ad melius mutato. Ete-
nim Hippocrates memoriae mandauit bonum esse indicium teretes
lubricū lumbricos prodire cum morbus ad iudicationem tendit, qui subito
quibus- etiam intereunt. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos con-
dā genti tinent, rosio intestinorum & ventris, tussis exiguae cum siccitate ir-
bus natu ritantes, nonnullos comitatur singultus quoque, & somnus cum pal-
ra esse fa ritatione, neq; sine ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamo-
miliarē. re expergescunt, & iterum sopiuntur pulsus inaequales & febres au-
Nanque gescunt inordinate, quae cum extremorum perfrictione, tertiam, in-
& aegyptii terim quartam, die vel nocte accessionem sine rationem habent. In-
bes et ar fantes autem etiam mandent lingua maniter exerta, & dentibus stri-
menii, sy dent, oculis conuiuent, voluntq; conuiescere, excitantibus ipsos in-
ti, cili- dignantur, & oculi apparent, genaeq; rubescunt, ac rursus liuent, atque
cesq; lū- haec paulatim & ex intervallo. Quibusdam nausae & rosionis cau-
bricis la sae stomacho peculiare creantur, atque aegri cibum respuunt, com-
borant. pulsi autem ad cibum nauseabundi vix quod assumitur deglutunt,
alix gen vel etiam assumptum reuomunt, plerisque vero aliud descendit cor-
tes no la ruptos cibos egerens, & tympani modo inflatur. Reliquum cor-
borant. pus sine ratione contabescit, neque esurie, neque euacuatione modica
& alix suborta. At qui non in omnibus omnia quae iam commemorau-
affligan- mus signa inquirere oportet, sed nonnulla ex eo quod praepollet, in-
tur. terim & plurima. Haec autem eueniunt, dum animalia per intesti-
na serpunt roduntq; febris autem calor vapores sursum cerebro trans-
mittit prauos, ex putrida in ventriculo collecta humiditate exhalan-
tes, in quibus amborum partim similiter curam habere conuenit &
febris & lumbricorum, partim de febre parum solliciti, lumbricos
de corpore eximere conuitemur. Multi siquidem nulla lumbrico-
rum cura habita, exesi ab ipsis sunt, & conuulsi interierunt. Alii pro-
dunt se lumbricos vidisse, qui ex inguinibus aegri eruperint. Cae-
terum occisos hos omnes prius educes, occides autem, amaris potif-

finum vsus remediis. Cum igitur febris & lumbricorum commu-
 nis sit curatio, conuenient auxilia simpliciora, potui igitur dabitur
 chamæmelorum decoctum vel myxariorum, vt appellant, vel ip-
 sa myxaria decocta esuidantur, item sercos succus, aut coriandri
 semen cum aqua calida vel cum posca, vel myosotidos herbæ deco-
 ctum, vel cornus ceruini ramentum, vel minium synopicum tenuis-
 simum, ac olei immaturi amarissimi paulatim cochlearia duo ab-
 sorbeant, qua enim amarum est, lumbricos occidit, qua lubricum,
 detrahens ipsos cum stercore reddit. At si inflammationem disten-
 tionemq; viscera experiantur, cataplasmate vtendum est, quod lini
 semine, farina loliacea, absynthio & bryoniæ radice constat, ex
 hydromelite vel etiam humido fotu ex oleo chamæmelino, vino,
 absynthii semine, & aloe, præcordiis accommodato. Vbi vero
 non vehementer febres molestant, miscenda est myxariis mentha
 & exhibenda est. Cum ad integritatem ventum est, efficaciora quo-
 que vsurpantur, quale est decoctum seriphi vel calaminthæ, vel fili-
 cis, vel cardamomi semen, vel mali punici acidæ radicis ius ad tertias
 redactum, vel fricti cumini, vel nitrifolii, singulorum scrupula tria,
 vel sandonicum vel abrotanum, vel etiam ambo simul, cum melle in
 catapotia coacta, vel lupinorum amarorum scrupuli terni vel brasfi-
 cæ, vel erucæ semen læuigatum, vel absinthinum, quod etiam solum
 frequenter abunde fuit. Dantur autem & terna lotæ aloes scrupu-
 la, quod remedium est laudatissimum, in validioribus illota quoque
 aloe vtimur. quia vero infantes aloem cochleari non admittunt, supi-
 nis fasciola ipsis detentis, ore aperto per clysterium quoddam vali-
 do munitum canali inuitis aloem quam penitissime transmissam ini-
 cimus. Atque hæc mirifica medendi ratio in pueris est, qui difficul-
 ter possunt tractari, quibus etiam cibos subinde sorbiles, quemad-
 modum iis qui cibum auersantur, infundimus. Cæterum & cyphi
 & masuaphium recte dabitur, item cornu ceruinum combustum
 cum pipere & melle vel oxymelite, reliquaque ex oxymelite ipsis
 dare conabimur, præstiterit autem si acetum scillinum fuerit, præ-
 sertim ætate prouectioribus, aut sinapi cum oleo & aceto ad co-
 chlearis magnitudinem. At qui lumbricis, cum alui profluuium in-
 festantur, præbent plantaginis succum, ipsamq; plantaginem ari-
 dam assument, ex æquo enim vtrique, & fluori & lumbricis effi-
 cax est. Cataplasma his accommodabitur ex farina ordeis cruda,
 filici, absynthio, farina lupini, sandonico & abrotano. Iam vero &
 malicorium acacia, galla, vel balaustium admiscebitur. Quoniam
 vero nonnulli subinde amaras potiones ceu ingratas respuunt, ex
 iis quæ modo comprehensa sunt, dabuntur non manifesto amara.

PAULI AEGINETAE.

pro aca
cia legi
tur catia
i aliquo
codice.

His accedent insuper chamæpitys, marrubium, helenium, bacca lau-
ri, acacia, thymus, pulegium, carpesium, iuncus odoratus angulosus,
polypodium, iris, cnicon, erythrodanon, spina ægyptia cum pipere,
singula sex scrupulorum instar, item decoctum menthæ, mori radi-
cis iuccus decoctumve, petroselinum reliquaq; odorata semina. ex-
trinsecus autem inducitur aloe cum melino & vino. hoc & appeten-
tiam excitat, quæ vix magno negotio recipitur, miscetur autem sæ-
pius aloe absinthium, aut felle taurino, cum amaris quibusdam prædi-
ctis vmbilicum impleto, aut oleum ex rhododaphne factum sæpe
delinetur, aut liquor cedrinus & solus & cum cerato, toti ventri im-
ponitur, aut pix arida trita inspergitur, vel mentha, vel melanthium
cum rosaceo, vel etiam seriphii decoctum ipsis admiscebitur, vel fra-
xini persicæ folia in pollinem detrita applicamus. Utendum vero
est & medulla cerui, vnguinis modo, in vmbilico, inferiore ventre
& lumbi, ceratumq; adiungetur, si res postulet, hoc, Aloes, absinthii,
farinæ lupini, seriphii, melanthii, singulorum scrupula sex, ceræ vncia
& semis sis, chamæmelini quod satis est, felle taurino arida læuigan-
tur. Porro ab inferioribus partibus mullam inuicere sæpius expedit,
quo lumbrici mellis dulcedine illecti deorsum descendant, si autē pu-
trefacti in alto corporis non excernantur, sed potius vapores sursum
mittant, educendi sunt, aut aloes, aut medicamenti amari ex ea con-
fecti potione, quandoquidem etiam in aliis mediocris alui vacuatio
non expers est præsidii.

† Integra huius loci scriptura est in antiq. codice. ὁ φθαλμοὶ κοῖλοι
φαίνονται, oculi caui apparent.

De latis lumbricis.

Iatus lū-
bricus
maxi-
me ad-
nascitur
intesti-
no au-
thore
Arist. in
v. de hi-
sto. aīal.

L A T V S lumbricus mutatio est (vt ita dicam) adnatæ in inte-
riori intestino membranæ in materiam animalis modo mobilē, quæ
sæpe tota redditur longitudine incredibili, vel pars ipsius excernitur,
dissolutus vero, non coalescit. & nunc in iis etiam qui feбри carent,
abundat, nunc febricitantibus accidit, ex longo morbo continuas sto-
machi rosiones inferens, ac impotentem ciborum appetentiam. Nā
quod animatum euasit, in intestinis obiectum rapit alimentum, vt
alio statim opus sit, & nisi assumpserit, intestina rodantur, His occu-
patos comitatur corporis gracilitas & pulsus inæqualitas, cum in-
æqualitate, at quod certissimum est indicium, cum recrementis non
nulla semini cucurbitæ similia excernuntur. Curatio concordat, po-
tio enim ex acribus petita, & aliorum esus, tum filicis vel centaurei
decoctum, & potum & ab inferioribus partibus inditum, vel cala-
minthæ vel dictamni, vel puleg. i, dabitur autem in aluum & muria.
Præbibere vero hoc medicamentum quod sequitur, neq; iis qui aliis
lumbricis

lumbri-
cis in-
festan-
tur, in-
utile est,
si febre po-
tissimum
vacauerint.
Nitri rubri,
piperis, car-
damomi pares
portiones, dan-
tur terni scrupuli cū
vino aut aqua calente. A L I V D eclegma. Piperis, baccarum lau-
ri purarum, cumini Aethiopici, mastiches, pares modi, mellis quod
satis est, datur cochleare vnum mane, & dormituro. At si efficacius id
fieri desideres, nitri quoq; rubri parem portionē adicies. A L I V D,
helenii, suffiminis ammoniaci, piperis in alio filicis, singulo ū drach-
mæ quinq; cum oxymelite calido, tempore interposito dabitur eu-
phorbii drachma, vel duæ prouectoribus potui. A L I V D. Filicis
acetabulum, nitri drachmæ duæ, datur vnum cochleare aquæ eua-
cuatione prius facta, satius autem erit si etiam scammonii momētum
assumat. A L I V D. Mali punici acidi radicū corticis in summo
decorticati drachmæ quatuor, piperis tātundem, cardamomi drach-
mæ sex, mariubii drachmæ duæ, melle dantur, porro prius assumpto.
Verum vt ex toto affectus discutiatur, theriacem quoq; exhibebis,
si valida febris non prohibet.

De ascaridibus.

Cap. Iviij.

A Scarides, vt modo etiam diximus, specie lumbricorum continen-
tur, vermibus similes quæ in extremo longanone & musculi
anum stringētis σφιγτης Græcis dicitur, initio reperiuntur, vehemē
sem locorum horum pruritum excitantes, generant speciem hanc
praua alimenta perfrictio, & ciborum corruptio. Vacuari, igitur de-
bent in infantibus, glandibus ex melle, cum salis momento, vel nitri,
in prouectoribus, acri muria, aut decocto cetaurei, cum nitro & mel-
le, aut cucurbitæ spluestris, aut absinthii, aut chamæleontis, aut an-
chusæ, aut cnici, aut hysopi, aut pulegii, aut calaminthæ, aut lupino-
rum, secundum clysteres sublinetur longanon, simplicibus quidem,
acacia, aut hypocythide cum nitro, aut rhu syriaco cum alumine liqui-
do, at quibus aluus astricta est, lemnia sphragide, cum vino, compo-
sitis autem Andronis pastillo, similibusq;. Cedrinus autem liquor ip-
sis iniicietur per clysterē multis peruium foraminibus, quales ab vte-
ro metrenchytæ appellantur, aut carnem fassam commode impositā
deligamus, quamdiu sustineri possit, eamque frequenter mutare oportet.
Cæterum communiter omnes quos lumbrici male habent, pili
ichneumonis iuuant, suffiti. Cibi præscribentur ipsis probi succi, &
qui facile in mēbra digeruntur, nec lumbricorū effectricē causam ad-
augent, nec vires superari permittunt, propter quas & vinū aquosum
exhibebimus, frequentius aut nutrire ipsos ob hoc ipsum oportet, ne
alimenti expertes lumbrici rosiones pariant. dabitur autē cibus, tum
præcipue quum potissimum nutriti magis fuerint. At si alui proflu-

equi
quoque
et came
li canes-
que asca-
ridibus
infestāt.

T

PAVLI AEGINETAE

uium fuerit, sciendum est lumbricos magis abundare, cibo non distri-
buto, ac iam sorbiles ægris cibi dantur, admixtis quibusdam etiam
astringentibus, verbi gratia, piris, aut malo cotonio, aut malis puni-
cis, præcipue acidis, a foris autem ventri remedia continentia indu-
cuntur, de quibus supra dictum est.

De dracunculis.

Cap. lix.

hic liber
videtur
habere fi-
ne mor-
borum.
De ma-
gicis aut
morbis
nihil fe-
re medi-
ci docti
p̄cipiūt,
ga aliā
curatio-
nem po-
stulant.
Et dubi-
tatur
etiam nū-
an ueræ
magiæ
sint.

IN India & superioribus Aegypto locis dracunculi generantur, ceu
animalia quædam lumbricos imitantia, in partibus musculosis, pu-
ta brachio, femore, tibia, in pueris etiam latera sub cute perreptant, et
palam mouentur, deinde cum diu extremum aliquod dracunculi re-
manferit locus suppurat, & cute ipsius ad aperta, initium ipsius progre-
ditur, cum trahitur, dolores mouet, præcipue abruptus. Quapropter
nonnulli dicunt plumbeam molam ex dracunculo suspendendam ne
vniuersim, sed particulatim molis pondere decedat. Alii vero hos
damnant quod nihilo magis pondere molis plumbæ dracunculus
abrupatur, & dolores varios concitet. iubent partem in aquam di-
mitti calidam, quo dracunculus tepesfactus foras prorepat, deinde di-
gitis ipsum membratim extrahere. At Soranus neque animal pror-
sus, sed nervosi cuiusdam substantiam esse putat, quod opinionem mo-
tus solum præbeat, siue autem hoc sit, siue quod prius dictum est, So-
rano & Leonidæ, aliisque visum est, calida superfusione & cataplas-
matis concoquentibus in his uti ex mulla, farina triticea, aut hordea-
cea. Est cum emplastri vsum eiusdem potentie probant. Conuenit au-
tem & quod ex bacis lauri & quod ex melle constat, emortui
siquidem horum vsum dracunculi, nimirum quod contine-
tur corpusculum excidit. Suppuratione autem facta,
nisi exciderit, cutis diuidenda est, ubi denuda-
ueris, quod continetur auferes, & cutem
linamento penetrabis, ac deinceps
eam curandi rationem ad-
hibebis, quæ puri sit
maturando.

FINIS .IIII. LIBRI PAVLI AEGINETAE,
Iohanne Guinterio Medico interprete.

146
PAULI AEGINETAE

LIBER QUINTVS,
IOANNE GVINTERIO
ANDERNACO MEDICO
INTERPRETE.



Quomodo quis ab omnibus communiter virulentis be-
stis se tueatur.
Cap. i.



DE VIRULENTIS bestiis præcipientes,
ab iis quæ in omnibus huiusmodi communiter
proficiunt, exordiemur, ita, vt quomodo quis ab
illarum iniuria se tueatur, prius expediamus. Si
igitur aliqua necessitate quapiam coactus, loco
feris frequenti obdormiat, vbi potissimum sala-
mandræ aut phalangia, aut serpentes aliqui abun-
dent, horum cauas latebras allio in aqua detricto,

aut aliqua ex herbis quas exponemus, obturare conuenit. Suffitus au-
tem recte excitantur ex cornu ceruino, caprarum ungulis pilisve, la-
pide gagate, bitumine, bdellio, galbano, cupressi aut cedri rasura, me-
lanthio, peucedano, viticis foliis, nepita, sagapeno, castorio, cachrys
radice, cunila, aut ex reliquis grauius olentibus aliquo. Culces autē
proprie persequitur suffitus ex atramenti sutorii, melanthii syluestris,
seminis cumini, paribus modis. item simus bubulus eisdem fugat.
Ad hæc etiam ignes incendere crebriores vincit, fugiunt enim ma-
gna parte feræ eorum splendorem. Cæterum torum substernere ex
hastula regia, nepita, vitice, pulegio, polio, cunila bubula, abrotano,
expedit. At si toto huiusmodi toro vti non datur, stratis saltem im-
ponenda sunt. Iam vero animum adhibere oportet iis quæ coquun-
tur, aquæ & vinorum cadis, vt exacte sint operculati. Focus autem
non sub arboribus quibusdam excitabitur, præsertim pinu aut picea.
in his enim salamandræ, & erucæ lethales crebræ versantur, quæ ab
ignis tepore calefactæ, decidunt in obsonia aut alia vasa, si non fue-
rint operta. Qui vero tutiores esse volunt, iis cōuenit etiam ceratum
corpori oblinere liquidius, ex cera, rosaceo, galbano modico, scobe
ceruini cornus exigua, vel etiam æthiopico cumino. peculiariter au-

adhibe-
dus ad
hæc ma-
xime
Nican-
der, cu-
ius libra
cū hoc
præfer-
tim li-
bro con-
gruunt.
Tenēdū
autē id
ante oīa
perniciō-
sis simos
eē mor-
sus harū

T a

PAULI AEGINETAE

rum fera tem malux folia cum oleo detrita si illinantur, ab apum & vespari
rum, prae morfu praeferuant.

fertim si † Hæc ita leguntur in antiquo libro, περιξ γούν τῆς πρώτης ἀν-
alia aliā τὰ τιδέναι, idest, circum lectum saltem ipsa ponere oportet.

comede Communis omnium qui a virulento quopiam morfi vel
xit. velut icti sunt, curatio. Cap. ii.

QUod si feriri aliquem aut morderi a venenato animali contigerit, homo adhibendus est qui vulnus exugat. non tamē eum ieiunum esse oportet, verum etiam vino os colluisse, & oleum in eo continere. Deinde particulæ commorsæ, si admittit, cucurbitulam cū multa flamma adh bere oportet, sicut vicinæ etiam partes scarificentur. Nam virus vna cum sanguine, & spiritu rursus ita extrahitur. Item exulcerata adurere ac crusta obducere, adeoq; præcidere conueniet, si fera quæ momordit, lethalis fuerit, quales aspis, cæastes, viperæ, simileq; aliæ sunt quemadmodum Galenus memoriæ pro dicit, vitonitorem quendam a vipera morsum, vbi feram cognosceret, falce læsum digitum statim abscidisse, atq; in totum periculo liberatum. At si venenum per corpus fuerit dispersum, sanguis statim demittendus est, præcipue si is qui percussus est, plethoricus existat exhibere cum cibis edendum piper aut allium conducit, potui, vinum validum, recentibus vaporibus, & conuenienti naturæ caliditate, corporis temperamentum replere, deinde iis oblinere, quæ commorsam partē possunt calefacere, & vellicare. Imponetur itaque cinis brasicæ aut fici aceto mistus, aut lixiuia, aut garum, & cæpe cum polenta aut pane, item porra abunde cum sale, aut pix liquida cum sale, calida, aut cedrus, aut simus caprillus. Conuenit autem ipsis acetum calidum quoque superfundere, in quo nepita sit incocta, aut acetum & aquam marinam aut acetum cum muria. Cæterum locis affectis gallinæ, & magis galli gallinacei, aliave animantia per medium dissecta, calida imponi debeat. Nam virus transmunt euocantq; & dolores mitigāt. Emplastra quoque vtiliter applicantur, tum hoc quod sale, tum illud quod cachry & adarce constant, in totum, quæ acrioris sunt potentia. Omnes vero communiter & morfi, & icti a quocunque tandem virulento animali, præterquam si interiora omnino offensa non sint, potabunt serin, aut ericen, aut astragalon herbam cum aceto, aut bitumen, aut paliurum similiter, aut veteris rhu decoctum, aut mustelæ inueteratæ drachmæ duæ ex vino sumptæ, præsentī sunt remedio, vel marinæ testudinis sanguis, aut castorei drachma cum diluta vini portione, aut roris marini tantundem, aut sicyonis radicis aut porri succus, aut chamæpitys, aut smyrnium, aut cinnamomum, aut aristolechia, aut viticis semen, aut cupressi pilulæ, aut seseli, aut piper,

LIBER V.

747

aut trifolii semen, aut baccæ lauri, aut cancer fluuiatilis tostus aut elixus, item composita hæc Theriace utilis est.

Theriacæ aduersus virulenta & lethalia venena, viperæ morsus, & scorpionis ictus.

BRYONIAE, opopanacis, iridis illyricæ, roris marini radicis, zingiberis, singulorum drachmæ quatuor, aristolochiæ drachmæ quinque, lachrymæ thuris, rutæ syluestris, singulorum drachmæ tres, farinæ crui drachmæ duo, finguntur pastilli vino, danturque singuli qui treis obolos pendeant, ex eodem vino. Cæterum purgatio omnibus conueniet, desudationes, & theriacæ ex viperis assumpta.

De rabiosi canis morsu, & metu aquæ, quæ hydrophobia dicitur.

Cap. iiii.

EXordium sermonis a rabiosi canis morsu capere, quam ab aliis maluimus, quod animal & secundum prouentu, & contuberna le homini existat, rabieque sæpius corripiatur, & ægre cauere possit, ac periculum ab eo sit inuitabile, nisi multis aliquis & conuenientibus usus fuerit præfidiis. Rabiunt canes plerumque in æstu vehementiore, ut autem Lycus memoriæ mandat, interim etiam per frigora maxima, rabidi autem & potum & cibum auersantur, siti premuntur, neque tamen bibunt, anhelant præterea non parum, aures inclinant, saluam & copiosam & spumantem ædunt, muti in totum sunt, & veluti insani, ut ne domesticos quidem agnoscant, infiliunt itaque sine latratu omnibus pariter & bestiis, & hominibus, mordentque. ubi momorderint, statim quidem nihil molestiæ adferunt, præterquam ex vulnere dolorem, postea vero aquæ metum, hydrophobiam Græci appellant, faciunt, qui cum conuulsione, totius corporis rubore, præsertim faciei sudore, & anxietate accidit, aquam fugiunt, & dum vident, & dum admoventur, nonnulli etiam omnem humorem, alii canum ritu delatrant, & obuium quemque dentibus appetunt, morsuque suo in alios eandem affectionem transferunt. Porro accidentium, aliorum quidem causa manifesta est, occupatis scilicet veneno partibus vniuersis, metum vero aquæ nonnulli ex immodica fieri siccitate dixerunt, quasi humida ipsorum substantia in contrarium penitus habitum mutata. verum Rufus talem melancholiæ speciem ipsis oboriri pronunciauit, veneno humorem illum imitato, quemadmodum alios melancholicos nouimus alia timere. quæ causa superuenit etiam iis qui dicunt canis qui momorderit imaginem in aquis opinari se videre. At ex iis qui hoc vitio sunt occupati, nullum, præterquam vnum aut alterum, superuixisse, ex historia dicimus.

T 1

Theriacen maxime approbat Nic. & peripatetici. Namque Aristotele. & Alexander summa bonitate ipsam commendat.

quæ huius morbi causam in prob.

rufi magis consona ratio est, quia omne venenum frigore riget.

PAULI AEGINETAE

Ideo hi
ab hu-
more vi-
tato opi-
nionem
aio com-
bibunt,
quālibet
et aquā
venenu-
esse. ob-
idq; eā
fugitāt.
Sciendū
āt mor-
su canis
ictos
aīantes
in rabiē
agi oēs
præter
hoīem.
Iisdē aut
remediis
interis ad-
uersus
morsum
leonis.

eosq; non a rabioso cane morsos, sed ab hominē, quodam morso vititi adeptos. At ante affectus huius occupationem multi etiam quos ca- nis momordit, seruati sunt. hinc igitur curatio auspicanda est. Quo- niam vero subinde, eo quod tunc aquæ metus non inuadat, (magna enim ex parte circa quadragesimum fere a morso diem solet ingruere, quibusdam & post sex menseis, proditum est nonnullis post septē quoq; obuenisse) nonnulli canem qui momorderat non rabire arbi- trati sunt, properatunt vulnere cicatricem inducere, vnde ipsi causam huic affectioni dederunt. hac autem probatione vsus deprehendes, morsus rabiosi ne canis fuerit, an non. Iuglandibus nucibus concisis vulnus diligenter obstruitur, sequenti die ablata, gallinaceo, aut gal- linæ in cibo apponentur, ac primum sane non attingent, fame autē urgente si edant, rem considerato. Nam canis qui momordit si non fuerit rabiosus, viuent, si rabidus, sequenti die peribunt. atque tunc ad vulneris dilatationem properandum est, iterumq; post paucos dies ea- dem probatione vtendum, & si non perierint gallinacel, tunc vlcus ad cicatricem perduces, nullum veritus periculum. Hanc itaq; proba- tionem Oribasius tradit. Quod si ex commemoratis indiciis accu- rate canem rabire cognouerimus, statim iis medicamentis quæ ape- riundi vim habent, vtēmur. Primum igitur ex aperiuntibus est, quod pice, aceto quam acerrimo, & opopanace constat, in capite de neruo rum vulneribus explicatum, at si qui morsum accepit, delicatiorem cutem habeat dilui, ipsum irino debet aut balsamo, aut eiusmodi ali- quo, vel vlcera prius fomentis adiuta, allio obduces. hoc quod sequi- tur etiam crustam facit.

Aridum ad crustam in canis rabiosi morso excitandam.

SALIS fossitii drachmæ octo, chalcitidis drachmæ sedecim; scillæ tantundem, rutæ viridis drachmæ quatuor, æruginis rasæ toti- dem, marrubii seminis drachma, vtitor primum arido vt crustam in- ducat, deinde cum rosaceo, vt crustæ excidant. Cæterum partes affe- ctæ ad dies quadraginta duos, vt minimum, sine cicatrice seruentur.

Cataplasmata quod oras vulneris latas in ra- bidi canis morso seruat.

CEPÆ cum sale & ruta inducuntur, aut laserpitium cum sa- le, aut salsamentum vetus, aut cinis sarmentaceus cum oleo, aut allia; aut sambuci folia, aut mentha, aut apiastrum, singulatim, aut cum sa- le, aut iuglandes nuces, cū allio, sale & melle, aut cinis fici, cerato ex- ceptus. vulnus autem aqua abluetur, in qua decoctum sit chamæme- lum, & syluestris lapathi radix. Nonnulli & ferro candenti vlcus adurunt. Cæterum potui assument commorfi, simplicia quidem, ly- cerum, absynthium, liquorem sulphur, chamædryn, scordium et polium,

sambuci
drachmæ

composita autem hæc, cancrorum fluuiatilium, sarmentorum vitis al-
bæ, in cyprio vase, aut æreo combustorum, cochlearia duo, gentianæ
radicis læuigatæ cochlear vnum, cum vini meri veteris cyathis duo-
bus, ad dies quatuor potui dato. aliqui vero & perdicis sanguinis
duo cochlearia addunt. Capiēs autem cancrōs dum luna increscit,
priusquam sol exoritur. iis autem qui eodem die non biberunt, du-
plicem portionem exhibeto, interim & triplicem. Iam theriaca ex
viperis recte datur. Purgare expedit medicamento ex cucurbita syl-
uestri, ita vt quotidie id exhibeas, cum decocto elelisphaci, aut sideri-
tidis heraclæ, quam & dialysen appellant, nonnulli vero & iecur
canis qui momordit, edendum dederunt. Cæterum victus ratio talis
adhibenda est, quæ simul veneni vireis hebetet extinguatq; simul et
descensum ad interiora prohibeat. quæ duo præstare potest, vini dul-
cioris vetusti & meraci, lactisq; potio. idem efficiunt allia, porri &
cepæ in cibo sumpta. At si per initia ob impedimentum aliquod non
præsumpta quæ retulimus remedia fuerint, carnis præscisio, vel cucur-
bitulæ vel vstio non adhibenda est, vt quum iam venenum penitus
secesserit, medicamentis autem quæ euocent, Græci metasyncritica
vocant, vt consilium est, aquæ metu videlicet non oborto. purgatio
ex hiera & scisili lacte petetur. item sudoris euocatio, dropacismus
& sinapismus, toto corpore particulatim adhibebitur. omnium ta-
men efficacissima deprehensa est purgatio quæ fit per veratrum.

Ad morsus canis non rabiosi.

Cap. iiii.

Canis non rabiosi morsus, quum & ipsi virulentæ cuiusdā sub-
stantiæ sint participes, statim aceto irrorans, lata manu mor-
sum ferito, insuper nitrum cum aceto tritum ex alto in partem fundi-
to, deinde spongiam recentem aceto, aut ipso nitroso aceto madidam
imponito, triduo id ipsum superfundens, tandem enim consanescet, uel
erui farinam oleo maceratam imponito, aut spongiam recentem, aut
lanam succidam aceto & oleo imbutam accommodato, aut rubi fo-
lia cum aceto tunsa inducito, aut cepam tritam cum melle, vt orga-
ni comæ, salis, cepæ, pares singulorum modos cum melle, vel marru-
bium nigrum, quod & balloten dicunt, cum sale. ad feruidos autem
iam morsus, erui farina melle macerata admouetur. peculiariter enim
his efficax est, inflammatione conflantes, argenti spuma trita ex
aqua oblinito.

Die vespis & apibus.

Cap. v.

Apium icu dolor sentitur, locus rubescit, propinquæ partes tu-
ment increscuntq; aculeus in vulnere relinquitur. In vespis au-
tem similia quidem, sed intensiora omnia sunt, nec aculeus relinqui-
tur. Remedio sunt aduersus vtraq; lutum, & bubulus simus, illita, &
quunt

dubie
forfan
versus
locus is.

PAULI AEGINETAE.

apes aculeum, aut siculneum, aut læuigata mori arboris folia, aut malux, aut farina leu, quia ordeacea ex aceto imponitur, quinetiam muria aut marina aqua fo- no exer uere conducit.

tu habet

De phalangiis.

Cap. vi.

Proten-

sum igitur

ac de

bile red

ditu im-

primunt

ac relin-

quunt cu

iteftino.

de hoc

Arist. 4.

& v. de

hif. aial

quia vis

horum

animan

tiu frigi

da nimis

est ac p-

sens.

Phalan

giu repti

le aial

& vipe

ra.

Phalangiorum morsu, locus ipse quidem rubescit, & veluti pun- ctus per ambitum apparet, non autem tumet neq; incallescit, sed leniter rubidus frigore & pruritu vexatur. Comites notæ percusso- rum sunt perfrictio, tremor, corporis grauitas, sudor frigidus, dolor validus, pallor, continua vrinx excernendæ incitatio, quibusdam & vrinx difficultas, colis intensio, oculi hument, inguina & poplites in- tenduntur rigentq; conuulsorio modo, valida stomachi rosio vrget, lingua sermonem manifesto non explicat, vomitus aquæ vel aranea- rum textis similium erumpit, sunt etiam quibus per vrinas, & al- uum eadem descendunt, demissi igitur in aquam calidam dolore libe- rantur, ac rursus valide indolent. Auxilio est, si extrinsecus cinerem ficulneum cum sale læui ex vino maceratum, imponas, aut radicem syluestris punicæ tritam, aut aristolochiam, cum farina ordeacea ace- to madefactā. Iam & vlcera fouere marina aqua calidior, aut apia- stri decocto, conducit, eiusdemq; folia imponere. ad hæc balneum fre- quentius vtile est, atque his potionibus medici vti, abrotani semine, anetho, aristolochia, agresti cicere, cumino æthiopico, cedri baccis læ- uigatis, platani cortice, trifolii herbæ semine, myricæ semine, singulo- rum drachmis duabus cum vini cyatho & viridium cupressi foliorū aut pilularum decocto, vino temperato. Ferunt nonnulli & cancro- rum fluuiatilium succum cum lacte & apii semine datum, periculo subtrahere.

De aranæ ictu.

Cap. vii.

Est quoddam etiam aranearum genus quod percussu validos do- lores circa media præcordia excitet, item ruborem, & vrinx dif- ficultatem, nonnunquam & suffocationem. Leuantur autem ictu hi- sce remediis, cumini syluestris thebaici, aut viticis seminis, aut albæ populi foliorum potu, vel allhis solis assumptis & vino meraciore su- perbibito iuuantur.

De scorpionis ictu.

Cap. viii.

Scorpione ictis locus quam primum inflammari incipit, duratur, rubet, & cum dolore circumtenditur, nunc feruor, nunc frigus v- cisim inuadit, acceditq; dolor qui itidem modo decrescit, modo in- tenditur. comitatur ipsos sudor, horroris sensus, tremor, extremorum perfrictio, inguina his attolluntur, particula intèditur, sæpe etiam fla- tus cum sonitu per sedem erumpunt, pili rigent, cutis fit discolor, do- lorq; tota cute affligit, ceu acus spiculo excitatus. His auxiliantur

protinus, lac ficulneum instillatum vulneribus, ipseque scorpio qui per
cus sit minutim contritus, vulnerique impositus, sibi remedium est. post
hæc est sal tritus cum lini semine salutariter imponitur, item althææ
herbæ semen, succurrit & sulfur viuum resina terebinthina exceptum,
similiter etiam galbanum splenii modo dilatatum impositumque, ne-
pitaque læuigata & applicata, & hordeacea farina in vino parata et
in rutæ decocto exhibita. auxiliatur his etiam trifolii herbæ semen
læuigatum insectumque. Ad hæc, potiones hæc conueniunt, aristolo-
chicæ drachmæ duæ, præsertim corticis cum vino, gentiana tusa, pu-
legiumque abunde decoctum, item baccae lauri numero decem læuiga-
tæ, nepita cum posca largiter incocta, cyperis cum vino, ruta simili-
ter, lac ficulneum & laserpitium, si adsit, si desideretur, parthico liquo-
re vtendum erit. benefacit etiam trifolii ocimique semen epotum. idem
præstat argenti spuma subito ictui præter opinionem imposita, om-
nium autem horum vicem præstat balnei continuus cum inulto sudo-
re vsus vini potio plenius diluta. Porro composita hæc potari de-
bent, sulfuris viui fabæ Aegyptiæ instar cum piperis granis octo, in
dimidia vini hemina, vel liquor laserpitii cum cancro detricto in vi-
no, aut melanthii, cum iniæthiopici, viticis seminis, pares portiones
cum vino.

Ad scorpionum periculosorum & phalangiorum ictus.

F E C I S drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ quatuor, rutæ syl-
uestris seminis drachmæ tres, castorii, crucæ seminis, singulorum drach-
mæ duæ, excipiuntur sanguine hirudinis marinæ. datur quaterni obo-
li cum vini meraci vel aceti cyathis tribus. **A L I V D.** Pyrethri, ari-
stolochiæ, singuli trientes, piperis drachmæ duæ, liquoris laserpitii
drachma, exhibetur ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem.

De scolopendra terrestri & marina.

Cap. ix.

E T si scolopendra momordit, communiter quidem locus affe-
ctus in orbem liuescit attolliturque, aliquando feci similis, rarius
autem ruber apparet, exulceraturque statim ab ipso morfu adeo vt
vix magno labore curari queat. præter hæc etiam toto corpore pru-
riginis sensus percipitur peculiariter autem iis qui a marina scolopē-
dra impetiti sunt, aquosus pellucidusque tumor interim efficitur, a ter-
restri, rubens. Plagæ igitur imponi debet sal bene tritus vel ruta
læuigata, aut cinis aceto maceratus, aut scilla. Fouendus locus est
muria cum aceto. Archigenes autem oleo calido liberaliore fieri
id iubet & prædicta sic imponi. Potui dabitur aristolochiæ cum
vino, aut serpillum, aut calamintha, aut syluestris ruta, aut trifo-
lium, aut succus radicis hastulæ regiæ dimidiæ heminae mensura
cum vino.

quare sit
venena
ab his ani-
matibus
sanant, a
quibus et
illata
sunt,
physici
subtiliter
quærit.
cuiusmo-
di extat
apud
Nic. Dif-
ferre aut
plurimū
morsus
aiantiū
secūdum
discrimi-
na regio-
num sci-
re debe-
mus. si-
cut in
pharo et
in pro-
pinquis
locis
scorpio-
nes venæ
no carēt
Aristot.
viii. de
animal.
Ideoque
lectio la-
brorum
Arist. de
animal.

PAULI AEGINETAE

& Aec-
liani Ni-
candrig-
ad hunc
librum
perdiscē-
dum plu-
rimum
vsum cō-
ferunt.
Scire
nanque
in pri-
mis o-
portet
naturas
animan-
tium &
eorum
venena
postea
discere.
Maxi-
me autē
liber v.
qui agit
de infe-
ctis, ho-
rum ani-
mantū
discipli-
nam con-
tinet.

Ad stellionis transmarini morsum.

Cap. x.

Sesamo trito cataplasmatibus modo obducito.

De fele.

Cap. xi.

Quia fele mordentur, valide quidem dolent, & locum affectum liuidum habent, sed statim cepæ & allia ictui applicata, auxiliantur. insuper eorundem elus, vino meraco superassumpto, remedio est.

De mure araneo.

Cap. xii.

Vbi vero mus araneus nocuit, sequuntur dolores pulsatiles, & in singulis dentium eius animalis ictibus, rubores, pustula insurgit sanioso humore plena, propinquæ partes omnes liuent, cute pustulæ disrupta, album vlcus apparet. nam ad membranas neruofas deraditur. ad hæc, excidunt etiam partes ex cæ depastione oborta, his quæ serpunt simili, præter ea etiam intestinorum tormina comitantur, vrinæ difficultas, & frigidi madoris vndique eruptio. Auxiliatur ipsis galbani splenium per se impositum, vel tritum cum aceto, vel ordeacea farina, cum oxymelite applicata, ipseque mus araneus qui momordit dissectus, ad motusque sibi est remedio. aduersatur etiam pyrethrum illitum, vel mali punici dulcis corium incoctum, vel malua syluestris vel allia cōtrita, vel sinapi læuigatum cum aceto, item ex calida muria totus conducit, deinde ordeum vsum ex aceto applicatum. Potui propinabitur abrotanum ex vino coctum, aut silybrium, aut serpillum, aut eruca, aut galbanum, aut elelisphacum, aut teneræ cupressi pilulæ cum oxymelite, aut pyrethrum cum vino, aut chamæleontidis radix, aut hoedi agnive coagulum, aut gentianæ radix, aut verbenaca, quæ etiam imponitur cataplasmatibus modo, ipsumque murem qui momorderit, exacte detritum cum vino bibunt. Efficax hoc etiam quod sequitur, myrrhæ drachmæ sex, aristolochiæ corticis drachmæ quatuor. porro ad muris aranei & scolopendræ morsum, sal cum liquida pice recte applicatur, aut cedria cum melle, aut allium cum fici foliis & cumino, aut calaminthæ folia, vel ordeum etiam cum aceto.

De viperæ tumore tum foemina.

Cap. xiii.

In viperæ tumore maris tum foeminae morfu similitudine animalium virus iaculantium, dolor loci statim ab initio sequitur, mox totius corporis, apparent etiam in morfu duo foramina paruo inuicem spatio discreta, fluitque ex his sanguis humorque saniosus, deinde oleosus, postremo etiam æruginosus, quem nonnulli virus viperarum esse dicunt. præter hæc tumores iuxta morsum subrubri liuidique assurgunt, corporis color perit, vertigines oculorum, stomachi resolu-

tio, & animæ defectus oboritur, quibusdam etiam vomitiones bilio
 sæ, urinæ angustia, insuper pustulæ in commorsa parte erumpunt, ve
 luti in ambustis, item depastio ipsam inuadit, ad viciniam procedēs,
 gingiuarum his cruentantur, accedit etiam tremor, sopor, & frigidi sudo
 res. minori autem cum periculo liberari, quos vipera mas, quā quos
 foemina momordit, videntur, ex his ipsis minus periclitantur qui ci
 bum præsumpserunt. In curatione autem præstâtissimum remedium
 est, allii esus, & vini meraci potio, adeo, vt si aliquis vti sustineat, nul
 lum præterea remedium desideret. eduntur etiam vtiliter & porra
 & cepæ & salsamentum quam acerrimum. Sunt qui & ranas in ci
 bo elixas dederunt. benefaciunt & hæc quæ sequuntur cum vino
 singulatim pota, testudinis marinæ sanguis rescicatus cum cumino
 syluestri, coagulum leporis, aut hinuli tribus obolis, ceruini genitalis
 sicci, anchusa tenui folia tota, hanc autem nonnulli etiam collo suspē
 dunt, porri succus dimidiæ heminæ mensura ex mulsâ, apiastris folio
 rum succus, syluestris ruta, gallinarum cerebrum, panacis radix cum
 vino incocta, agarici drachma, iuniperi baccæ, hastulæ regiæ radix,
 pistacia trita, viticis semen, mustellæ inueteratæ ficcataq; drachmæ
 duæ, echini radix succusq; cancri fluuiatiles aut marini per se, cumq;
 herba pedicularia, sale & polio, aristolochiæ radix cum myrrha, gen
 tiana, baccis lauri, æquali modo melle excepta, atq; hoc quod subiun
 gam mirifice efficax est.

Oribasii ad, viperarum morsus.

ANISI acetabulum, piperis drachmæ quatuor, aristolochiæ
 corticis, opii, castorii, myrrhæ, singulorum drachma, passo læuigata
 in pastillos instar fabæ Græcæ cogito, & pro viribus cuiusque exhi
 beto, cum ternis diluti vini cyathis. ALIVD, ex Lyci commenta
 riis medicamentum viperæ morfibz præsentaneum. Myrrhæ, casto
 rii, piperis, sandarachæ, singulorum drachma, anethi seminis acetabu
 lum, læuigata ex passo dantur. ALIVD. Ex Archigenis com
 mentariis. Cancros viginti cum farinæ triticeæ quod satis est, in pi
 la diligenter contundito, admixtaq; nepita & salis momento, pa
 stillos fingito & ficcato, in vsu, cum lacte applicato, vnumque cum
 mulsâ potato. At si fluuiatiles cancos desideres, marinis vtitor, ex
 trinfecus autem plagæ inductus caprarum fimus ex vino strenue au
 xiliatur, aut lauri folia cum oleo incocta, aut baccæ lauri, aut nepita,
 ericæ, ruta, apium, abrotanum, galbanum in splenio adhibitum, origa
 num viride læuigatum, gallinacii pulli dissecti, † & protinus calidi
 impositi, farina erui cum vino macerata crebro emplastri forma illi
 ta, raphani cortex læuigatus, scilla cocta, farina hordeacea ex oxy
 melite, cucumeris syluestris folia cum tenuissimo farinæ ordeaceæ

eruunt se
 neclutē.
 serpētes
 dicunt
 hyeme
 cæcos
 esse ex
 gelici
 dio. vere
 autē ma
 rathro
 gustato
 recipere
 lumen
 assuera
 re. Fœ
 minæ
 potro vi
 rulento
 rum ma
 gis viro
 sæ sunt.
 Nullum

remediū
 homini
 datur vi
 peræ ma
 sculæ oc
 currenti,
 quum in
 foemina
 coitu fu
 gam fa
 cit. Te
 studinē
 dicitur
 vorata
 vipera
 origano
 gustato
 lanari.

PAULI AEGINETAE.

non inuē
to autem
mori illi
co. Ari-
sto. in li-
bro de
mirab.
aud.

polline, sex vini similiter cum farinæ polline, ruta cum sale & mel-
le, surfures in aceto coctæ, cinis cum aceto, cedrinus liquor cum sale,
pix liquida cum sale. Foveri debent trifolii decocto aut pulegii, aut
muria aceto adiecto. Quum autem subcruentæ pustulæ euaserint, ip-
sas scarificabis, ita ne excories. deinde multa aqua foueto, lenticulam
coctam cum melle obducito, dum consanescant. At ex viperis an-
tidotum proprie his & potum & plagæ impositum efficax est.

† Melior est vetus cod. ἐπιτιθέμενοι θερμοὶ καὶ συνεχῶς ἐπαλ-
λαττοῦμενοι, id est, calidi impositi & frequenter permutati.

De amphibæna & scytale.

Cap. xiii.

antidoti
proficere
aiunt καὶ
τὰ πλὴν
ἀντιπύ-
ταιον, si-
cut etiā
magica
antidota
magis re-
pugnan-
tia ex cō-
tra patiē-
do qui-
dam in-
trodu-
cunt.

Consimilia ex horum moribus eueniunt, eademq; ipsis auxi-
liantur, quare peculiarem aliquam descriptionem sortita non
sunt.

De dryino, Galeni hæc præfatio.

Cap. xv.

Dryinus in quercuum radicibus vitam agens, tam malefica para-
taq; ad nocendum vi est, vt calcatus solum, pedes hominis cute
nudos relinquat, totisq; cruribus tumorem laxum quem oedema vo-
cant, copiosum excitet. Ad hæc quod multo magis est mirabile, fe-
runt omnes eorum pariter manus excoriari qui curationem vitii ad-
ministrauerint & si quis vlciscendi studio interemerit, dicunt hunc
præue admodum olere, illoq; suo foetore omnium aliorum odorum
sensum auferre. Ictis ab hoc animali tumor circa locum vitiatum cū
rubore excitatur, pustulæ in circuitu assurgunt, aliquando aquosa sa-
nies emanat, stomachi erosio vexat, & torsiones. Congruit ipsis ari-
stolochia vino pota, item trifolium herba, radixq; hastulæ regię cō-
similiter assumpta, prodest cuiuscunque quercus fructus læuigatus, et
epotus. Itidem ilicis radices tusæ, & loco admotæ auxiliantur.

De hæmorrhoo, & prestere seu dipsade.

Cap. xvi.

de his
cogno-
sce ex ni-
candro
& de
dipsio.

Vi hæmorrhoi ictum sensere, validos experiuntur cruciatus,
ac modum exigua angustaq; redduntur corpora ex dolore
continuo, multus ex plaga sanguis erumpit, & si cicatrix toto cor-
pore inducta fuerit, rumpitur, funditq; sanguinem. cruenta excernun-
tur recrementa, sanguis qui defluit, in grumum concretus est, tusi ex
pulmone sanguinem reiciunt, quem euomentes etiam sine remedio
intereunt. A dipsade percussos ardor intolerabilis vrget, sitis tan-
ta excruciat, vt nec extinguere nec intermittere possit, copiose potum
ægri hauriunt, eadem tamen siti conficiuntur, tanquam nihil pla-

que haussissent, similesque toto habitu sunt iis, qui antea potus nihil hauserint. unde propter continuam potus assumptionem praeter ab vrendo, dispas a sitiendo serpens appellatur. Multi autem veterum ab haemorrhoeo & dipsade commorsos ceu desperatae salutis & conclamatos esse putauerunt. Porro si specialia aduersus ferarum praesidia desideremus, communia tentare oportet, ac protinus scarificationem vitionemque adhibere, & si liceat partem vitiatam praecidere. deuiceps autem acria cataplasma imponi debent. vtilia sunt omnium ciborum acrium esus, praesertim quae ex falsamentis petuntur, vini meraci potio, & lauacrum. haec autem continue, & exiguis temporum intervallis subinde adhibenda, priusquam morbi corripuerint. nam ubi illi semel emerferint, nulla medicorum ope iuantur. Caeterum remedia quae loco inducuntur, contra morsus inscripta reperimus, dipsadis quidem, portulacae folia contrita ex aceto, polentam, rubi folia cum melle laeuigata, plantaginem, hyssopum allium album, porrum, rutam, vrticam, haemorrhoi praeter iam dicta etiam haec benefaciunt, vitis folia cocta cum melle laeuigata. per os autem haemorrhoi ipsius caput crematum potui datur, aut allium cum vino oleo, esui dantur etiam vuae passae.

De natrice quam Graeci hydron dicunt.

Cap. xvii.

Natrice morsu vlcus factum dilatatur, & liuescens augetur, sanies ex eo nigra, copiosa, & foedi odoris, qualis ex depascente vlcere, excernitur. Curatio mali, temporis processu, & vix procedit, imponetur itaque moribus origanum laeue, ex aqua maceratum. confert & cinis quercus, oleo temperatus, vel cordeacea farina cum melle deliquato bibitur, item aristolochia drachmis duabus diluta vini portione, vel in poscae duobus cyathis, deinde marrubii succus aut decoctum cum vino, aut nasturtium sylvestre, aut semen hastulae regiae seu flos, aut foeniculi semen cum vino, item recens fauus cum aceto comeditur.

De Cenchro.

Cap. xviii.

Quod si cenchrus nocuit, morsus eius viperae similis est, putredo comitatur & carnes intumefactae prius, ut in aqua inter cutem, defluunt, lethargo veterumque premuntur. Testatus Herasistratus est, iecur ipsis, vesicam, & colon affici, resectis siquidem ipsis, partes quodammodo corruptae inueniuntur. His igitur lactucae semen cum lini semine applicatum auxiliatur. succurrit & satureia trita, rura sylvestris, serpillum cum hastula regia laeuigatum, potui vero datae protinus, centaurii radice drachmae duae cum ternis vini cyathis, aut aristolochiae radix similiter, nasturtium itide & getiana, potu conducunt. gae et rutae odore,

De dipsade lege Apollonii in argonautica. Hac fera laborat libya harena miserabiliter exsiccatate coeli. sicut & Arist. testatur. laborat eraspide. Haec autem graece dicta in libris maris libenter moratur. Est praeterea dipsas spinosa planta, quae sola ad mare rubrum oritur aethiore Theophrastus omnes afflatu lerpilli fungantur et rutae odore,

PAULI AEGINETAE

De Ceraſte & Aspidē.

Cap. xix.

Cōtra aspidis genera Galenus prodiſt, primum ea, quam cher-
pidis in ſeam quaſi terreſtrem vocant, mox eam quæ chelidonia dicta
libya ge eſt, tertiam ptyada appellarunt, quæ omnium eſt pernicioſiſſima. ſi-
nitæ quidem erecto collo, extenſoq; pro diſtancia loci, ad quem dirigit,
morſum venenum in hominem iaculatur. hanc memoriæ tradit, reginā Cleo-
reperiri patram, quū Antonio deuictō Auguſtus eam capere vellet, ſini-
negat re ſtræ mammæ admoſiſſe, morſamq; ab ea interiſſe, vt quæ longe ce-
medium lerrimam mortem inferat. Porro ceraſtis morſu locus cum duritie et
ullum puſtulis intumeſcit, emanat ex vulnere ſanies, modo nigra, modo ſub
Ariſto pallida & porraceo colore, totum corpus varicum modo attollitur,
præter ſe genitale arrigitur, mens alienatur, oculi obſcureſcunt, poſtremo, con-
pticum, uulſione vt in tetano pereunt. Verum aspidis morſus acus punctura
qd' ma- ſimilis, omnino exiguus ſine tumore apparet, ſanguis nō copioſus,
dicame- ſed exiguus et niger deſtillat, ſubita oculorum hebetudo inuadit, do-
tū ex eo lor corporis multiplex admodum, ſed mitis, nec ſine voluptate co-
ſerpente mitatur. Quapropter recte Nicander cecinit,

cōfici te Et vir perit abſq; dolore.

MV T A T V R color & viſceſcit, ſtomachi roſio exigua in-
Propter feſtat, frons continue reuclitur, palpebræ ſine ſenſu veluti in ſomno
quod an commouentur, atq; inter hæc morsprehendit, ne tertia quidem diei
tidotis parte dilata. His itaq; vtriſq; membri affecti mutilatio mox a morſu
plurimū facta, ſuccurrit, eoq; ſine mora, ſi fieri poteſt, præcidendum eſt. & in
et ipſe co his & propinquis partibus omnem carnem circum ſecare ſtatim, &
tribuit. radicatus vſq; ad os excindere oportet. deinde reliquæ ferro candēti
excandæ ſunt. etenim horum virus, ſicut & baſiliſci, taurino ſan-
guine ſimiliter, celerrime ſanguinem in arteriis & ſpiritu coagulat.

aspiſ ſoc-
mina ha-
bet os
maius
et caput
acutum.

De baſiliſco.

Cap. xx.

HAec beſtia raro quidem hominum oculis occurrit. Eraſiſtratus
autem hæc inquit, cum baſiliſcus momorderit, plaga ſub aureo
colore tingitur. conducunt ipſi, inquit, caſtorii drachmæ tres potæ.
ſimiliter etiā papaueris liquor. Nos autem hæc experti non ſumus.

De paſtinaca marina, & muræna.

Cap. xxi.

IN marinis nempe paſtinaca & muræna, agnitio manifeſta eſt,
Ipſeſce enim hi ab omnibus cognoscuntur. Auxiliantur ipſorum
morſibus lactis ſiculnei guttæ quatuor aut paulo plures, cum ramuſ
oīa viro culis ſerpilli tribus aut quatuor, & quæ ad viperas commemo-
ſiſſima, rata ſunt.

De dracone marino,

Cap. xxii.

MArini draconis icſtum plumbo inſtricato, aut ſerpillo trito, ob-
raſ au- ducito, aut lente elixa, aut ſulfure cum aceto, aut dracone ipſo

LIBER V.

152

euiferato. foueri locus vrina humana debet, absinthium cum diluta vini potione bibi, aut elelisphacus, aut surculi ficulnei, in dulci vino dilutum, aut piscis ipsius cerebrum.

De scorpione marino.

Cap. xxiiij.

Scorpia marini ictum sanat mullus piscis dissectus impositusq, sulfur viuum cu aceto infricatum, baccæ lauri tres tritæ potæq.

Quomodo testudinis marinæ sanguis præparetur.

Cap. xxiiij.

Testudinis marinæ sanguis in hunc modum præparatus, reponitur. In ligneo aut fictili vase resupinata testudine, caput ipsius celeriter amputato. concretum autem sanguinem in multas partes arundine diuidito, impositoq, operculi instar, vasi cribro, in sole reponito, siccatum excipiens vitior aduersus viperarum morsus, vt prædictum est, drachmis duabus cum vino aceti cyatho. sequenti drachmis quatuor, cum duobus cyathis, tertio die, drachmis octo cum tribus aceti cyathis.

De crocodili morfu.

Cap. xxv.

Ad crocodili morsus nitrum cum melle tritum vsq, dum vlcus repurgetur, imposito, deinde repleto melle, butyro, medulla ceruina, adipe anserino. Galenus autem tradit se cognouisse qui a crocodilis commorfi, adipe ipsorum imposita vulneribus, exacte fuerint adiuti.

De hominis morfu.

Cap. xxvi.

Non extra institutum fuerit, cum virulentis bestiis, etiam hominis morsus conscribere. siquidem maligniores multo aliis vlceribus apparent, præsertim si ieiunus momorderit, prius leguminibus vsus, & præsertim lenticula. Communiter itaq, quæ in aliis virulentis commemorata sunt, etiam in his extrinsecus per initia morfibz applicare conueniet, præter ea quæ nimium acria, adurentiaq, sunt. peculiariter autem oleo morsum prius illitum, foeniculi radice cum melle obducito, aut lomento cum posca & oxyrhodino, frequenter immutans. Emplastro autem hoc vtere, quod recipit squamæ æris, galbani, æruginis singulorum vnciam, ceræ libram, plumbaginis libras duas, olei sextarium, plumbago cum oleo prius incocta assumet æruginem, & squamam. vbi coierint, quæ liquari possunt adduntur. Finita autem inflammatione, communis vlceris modo etiam hæc curabis.

De venenis.

Cap. xxvij.

Quum de virulentis bestiis succincte tradiderimus, proximum fuerit, vt de venenis sermonem aggrediamur, simplicia quidem referentes eorumq, notas & remedia, tum communia, tum specialia,

thore
philost.
scribit
serpentes
septua-
ginta cu
bitos lo
gos de-
gent in
Arcelia
flumine
indix in
india in-
fluente
sub fo-
liis de-
inde her
baum
quosdā
latere,
aduer-
sus q̄s
nulla
medici-
na repe-
riri pōt,
Theo-
phrastus
author
est.
testudo
marina
viperas
insequi-
tur, &
eas co-
medit,
deinde
si ruta
vel ori-

PAULI AEGINETAE

Zano composita autem ex studio omitemus. etenim nonnulli variorum
purgat. medicamentorum lethalium compositiones exposuerunt, quæ no-
Morlus cere magis, quam iuuare legentes possunt. neq; enim exacta horum
foemine indicia in his qui assumpserunt, inueniuntur, vt etiam congruum ipsis
pejo, q; remedium queas adaptare. Quum igitur hæc varia ex superante in
ipsa ma ipsis vi appareant, id etiam aliquis recte quod exhibetur, varium ada-
lelica & ptans, nonnunquam ex æquo, nonnunquam vt excellat, medebitur.
dolosa Incipiemus itaq; & hic rursus a præcautione.

De venenorum præcautione Cap. xxviii.

DE venenosis medicamentis disciplinæ ea pars quæ præcauere
 illa, & declinare præcipit, longe difficillima est, propterea quod
 ii qui huiusmodi insidias homini clam machinantur, tanto id altu fa-
 ciunt, vt vel peritissimus quisq; decipi possit. siquidem amantudines
 venenorum dulci aliquo admixto, obtudunt, grauemq; odo em odo-
 ramenta is additis operiunt. interim ceu ad sanitatem, salutisq; gratia
 in morbis hæc propinare crediti, quod genus est absinthium, abrota-
 num, opopanax, castorium, venena ipsis admiscunt, tum in cibis, puta
 solidioribus, vel obsoniorum varietate adumbrantes, ipsa offerunt.
 vnde cui in suspitione huius doli vita fuerit, vitare eum oportet con-
 dita elaborataq; cibaria omnesq; in gustu qualitates intensiores, ex
 empligratia, dulceis, acidas, & salsas, potissimum vero aquæ quod
 satis est præsumere oportet, restincto enim hac appetitu, postea qua-
 litates aliæ a stomacho non apprehenduntur. veruntamen alia quæ-
 dam ratio asserendi hominem ab iniuriis venenorum, est efficacia.
 Conuenit enim quum suspicio mali medicamenti accepta fuerit, præ-
 comedisse aliquid quod obtundere venena possit, & inefficacia red-
 dere, cuiusmodi sunt caricæ cum nucibus inglandibus, ruta, salis gru-
 mo, & quæ mala medica dicuntur, item naporum semē drachmæ pō-
 dere meū vino, aut nepitæ folia, aut terram quam lemniam sphargi-
 dem vocant, aut rutæ folia viginti, nullumq; nocebit venenum. Iam
 vero antidota cum vino quotidie fabæ Aegyptiæ instar assumpta, tu-
 to admodum præseruant, quale est quod terrestri crocodilo constat,
 dialeincu dicitur, & quod a variorum animalium sanguine dia hæ-
 maton vocatur, et Mithridatium, hoc aliquando etiam ipsæ rex Mi-
 thridates vsus est, quotidie præsumens, vt a lethali medicamento se

dictum vindicaret, præseruaretq;. Quum igitur a Romanis captus, bis le-
 thali medicamento epoto, mori non posset, gladio sibi ipsi vitam ade-
 mit. Quoniam vero etiam citra insidias propter necessitatem ali-
 quando locis desertis nociuis versantes, forte sub arboribus, vt picea
 aut pinu cibum assument, diligenter attendendum est, ne ex his aut
 qui pro superioribus locis mortifera labantur animalia, & vasa, tum quibus
 hauritur

hauritur vinum, tum quibus aqua, tum quibus obsonia incoquantur, medica-
exacte operculentur, quemadmodum in virulentorum animalium mēto ve-
præcautione expositum est. nenum

Communis venenorum quomodocunq; assumptorum
curatio.

Cap. xxix.

AT si nonnulli lethale venenum sponte sua, vt mortem sibi con-
sciscant, assumpserint, qualia multa in hominum vita solent ac-
cidere, aut etiam aliquorum insidiis, siquidem nobis constet quod ve-
neni genus potatum sit protinus ad conueniens ei remedium descen-
demus, vt in horum enumeratione dicetur, at si medicamen exhibitū
tunc nobis fuerit incertum incognitumq; conuenit statim ad ea quæ
cōmuniter ad quæcunq; venena sumpta congruunt, diuertere. Nam
indicia quæ comitantur si expectes, nihil plane in medecina spei est,
ægris propter moram iam deploratis, desperatisq;. Actutum igitur
nulla mora interposita, oleo calenti per se, aut etiam cum aqua ex-
hibito, vomere cogendi sunt. Si eius copia non est, butyrum cū aqua
calida ingeri debet, aut malux, lini ve seminis, aut tragi frugis, aut
sœnugræci, aut vriticæ seminis decoctum. Non enim solum vomiti-
onibus euacuabunt, sed aluum quoq; subducent, & venenorum ma-
lignitati aduersabuntur, acrimonias ipsorum hebetantis, præsertimq;
oleum. quod manifesto inde licet cognoscere. Si namq; cutis exul-
cerandæ studio, cantharide aut calce viua, aut eiusmodi quodam
acri vtaris, corpus oleo prius oblitum, non exulcerabitur, imo neq;
corpus astringere potueris, oleo præunctum. Præterea vomitus non
modo quod nocium euacuat, utilis est. sed interim haustum vene-
num odore, concretis grumis, aut colore prodit. odore siquidem &
amaritudine, cicutam, colore cerussam, vel gypsum, concretis gru-
mis, lac aut recentem sanguinem, halitus grauitate, virus qualitate
& odore, leporem marinum, & rubetam ranam ostendit, vt per hæc
ad accommodata singulis remedia via non sit difficilis. Admiscebi-
tur autem oleo malux decoctum, aut anserinus adeps, aut ius ex car-
nibus pinguibus, vel gallinarum, aut ex lignorum cinere facta li-
xiuia. Facit etiam huc nitrum detritum cum hydromelite potum. vi-
num copiosum & vetus, & quæ adipe aut butyro constant. Verum
iis quæ in ventriculo hærent, per vomitum ablatis, quod intestinis
illapsum est, clystere acriore euacuabimus. Post hæc lac potui dabi-
mus. nam ab hoc quod afficit, & venenosum est, facile immutabitur.
Iam vero medicamenta omnibus communiter conuenientia offe-
runtur, quale est, minium lemnium, abrotanum, agaricum, erysimum,
eryngii radix, pastinacæ erraticæ semen, vel nepitæ, nardum galli-
cum, castorium, medulla viridis ferulæ, nerii, quod rhododendron

medica-
mēto ve-
nenum
ppinat.
Illud p-
terea sciē-
dum, ve-
nenata
corpora
non ver-
minare
Sen.

verba il-
la, quod
terrestri
crocodi-
lo cōstat,
quidam
codices
non ha-
bent.

impera-
tores
quoque
plures si-
cut &
Anni-
bal, vene-
num in
annulo
solum ge-
stabant,
ut mori
sibi lice-
ret, quum
voluiss-
ent.

PAVLI AEGINETAE

est aut rhododaphne flores, marrubii succus, laserpitium aut liquor
betoni - ipsius, sagapenum, opopanax, peucedani liquor & radix, aristolo-
calour - chia longa, rutæ sylvestris semen, folia cestri, quæ betonica dicitur.
τοβικη. danturq; singula drachmæ pondere cū vino. Efficax in id est, polii
herbæ decoctum & picis liquidæ linctus, generosisime etiam opi-
tulantur antidora superius cōprehensa, magisq; ex viperis theriaca.
non autem easdem vireis habent, si post medicamenta lethalia, assu-
mantur, quas presumpta. quæ enim ipsorum quantitas presumpta ad
effectum cauendum est sufficiens, hæc si quadruplo auctior, aut quin-
tuplo post præstetur, adiuuat, idq; nō semel die, sed bis etiam, sic enim
& Galeno illi admirando visum est.

Enumeratio simplicium venenorum.

Cap. xxx.

INter venena, animalia quidem sunt vitæ noxia hæc, cantharis,
buprestis, salamandra, picæ eruca, lepus marinus, rana rubeta, &
mutescēs palustris rana, hiruðines deuoratæ, ex seminibus, altercum,
coriadrū, psillium, cicuta, melanthium, ex liquoribus, meconium,
opocarpasum, thapsiæ succus, elateriū, mandragora, ex radicibus cha-
mæleon, aconitum, thapsia, ixia, veratrum, agaricum nigrum, ephē-
meron, quod nonnulli colchicum dicunt, quod in colchide nascatur,
ex ramosis et oleribus, smilax, quam nonnulli thymium vocant, Ro-
mani taxum, solanum furiosum, quod etiam doryenion appellant,
sardoe herba, quæ species est ranunculi, papauer corniculare, phari-
cum toxicum, ruta sylvestris, fungi, ab animalibus autem, sanguis tau-
ri recens, lac cui coagulum sit admixtum, mel quod ad heracliam na-
scitur, metallica, gyplus, cerussa, calx, auripigmentum sandaracha, ar-
genti spuma, adarce, plumbum, & quod vocatur argentum viuum,
ex iis quæ domestica & in quotidiano vitæ vsu sunt, vinum copio-
sum raptim a balneo potum, aut passum, aut frigida aqua similiter.

De cantharide.

Cap. xxxi.

quemad-
modum
taurino
sanguine
epoto fe-
rūt The-
misticlēs
interiis-
se.

de can-
thar. le-
ge Ari-
sto. v. de
animal.

Qui cantharidem assumpserunt, eos notæ grauisimæ comittan-
tur. fere enim a stomacho vsq; ad vesicam cuncta illis morderi
sentiuntur, gustum similem picis aut cedrino liquori habent, dextra
præcordiorum parte inflammationem experiuntur, vrinam difficul-
ter, sæpe etiam sanguinem per eam reddunt, item per aluum ipsis ex-
cernuntur, qualia in torminibus intestinorum egeri solent. præterea
animo linquntur angunturq; & vertiginibus laborant, tandem ve-
ro mente alienantur. Succurrit ipsis vomitus ex hydrelæo petitus, et
lactis potio, terræ cimolizæ drachmæ quatuor cum mulla, nuclei pi-
nei, cucumeris semen. Adiuuat bene & ius pingue ex bubula factū
aut anserinum, aut ouillum, carnesq; gallinaceorum, aut agnina, au-

ouillæ, aut porcellorum, omnesq; flaccescentes coctura longiore, & metuen-
pingues cum lini semine elixæ, vinum itidem dulce, & copiosum, das esse
thuris corticis drachmæ quatuor. Post cibum iniicietur per clysterem canthar.
cremor oryzæ aut chondri, aut tragi, aut ptisanæ, aut malux, aut lini in cœna
feminis, aut althææ, aut fœnugræci. interim etiam mulsa cum nitro dubia, di-
intestino absterfo, conuenit hæc rursus inferere, postea vero inflam- ctum ve-
matione occupata medicamentis ex lini semine & hordeo lenire. per tus.
initia esum offendunt. deinde & lauacris aquæ dulcis vtendum est,
item vnguentum irinum rosaceumq; potui dabitur.

De buprestii.

Cap. xxxii.

BVpresti potione absorpto, in gustu viroso simile quippiam per-
cipitur, dolor stomachi ventrisq; vehemens comitatur, eademq;
partes in speciem hydropici intumescunt, extima totius corporis cu-
tis intenditur, vrinæq; cohibetur. Profunt ipsis quæcunq; aduersus cā-
tharides opitulantur, priuatim autem conducunt, post euacuationes
& vomitu, & clystere factas, ficus aridæ, item earum decoctum ex
vino. Vbi vero periculum iam de suo acumine remiserit, declinatq;
Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut
lactis potu, iuuantur. pyrorum etiamnum omne genus esse. et lac mu-
liebre bibere, conuenit.

De Salamandra.

Cap. xxxiii.

QVibus Salamandra data est, eis lingua inflammatur, mens impe-
ditur, tremor cum torpore quodam & resolutione vrget, partes Arist. v.
quædam corporis in orbem liuoribus variantur, vt subinde perma animal
nente veneno, putrefactæ defluant. Ad quæ omnia faciemus quæ in
cantharidibus dicta sunt. proprie autem resinam e picea, aut pinu,
vel galbanum cum melle offeremus, aut nucleos pineos cum deco-
cto chamæpithyos, aut vriticæ folia cum liliis in oleo decocta, testu-
dinis marinæ vel terrestris oua elixæ, ranunculorum ius esculentum,
incocta simul ipsi eryngii radice.

De pinorum erucis.

Cap. xxxiiii.

PInorum eruca pota, statim sequitur oris palatiq; dolor. valida lin-
guæ inflammatio, stomachi, intestinorumq; cruciatus, quæ cum Arist. v.
pruritu circumtendi sentiantur, feruor itidem toto corpore affligit, & animal.
stomachi fastidium vrget. Succurri debet non aliter quam iis qui
cantharidas biberunt. priuatim autem in ipsis loco simplicis olei me-
linum adhibebimus.

De marino lepore.

Cap. xxxv.

LEporis marini potum, gustus sequitur piscibus virosis non ab-
similis, tempore procedente alius indolet, vrina suppimitur, si

PAULI AEGINETAE

quia hu-
more ip-
sius toto
infecto
corpore
natura
id sen-
tiens
suique pru-
dens odit
piscium
genus.
Aristot.
IIII.
& V.
rana ru-
beta ve-
natar
apet.

Sciendum
autem ani-
mantes
ipsum me-
deri mor-
bis suis
herbis quibus-
dam,
quos mor-
bo affe-
cti appe-
tunt. &
plagas
deinde
suas li-
mouatio
illinere
solitos
esse, &
morsus

quando autem eruperit, purpurei coloris cernitur. praeterea qui illum
assumpserunt, auersantur oderuntque piscibus omnibus, sudor foetidus erū-
pit biliosusque vomitus, nonnunquam sanguine mixtus superuenit. Ad
iuuari autem debent hoc malo circumuenti, lacte asinino aut passo
continue exhibito, aut maluae radice & foliorum decocto, aut cy-
clamini radice trita ex vino, aut veratri nigri, aut scammoniae liquo-
ris drachma ex mulla, anserisque sanguine recentia adhuc calido. item
cancros fluuiales solos, si sustinent, offerre oportet, Nota autem salu-
tis est, quum piscem quoque possunt comedere.

De rana rubeta & palustri. Cap. xxxvi.

Rana rubeta, aut palustris hausta, corporis tumorem inducit pal-
loremque intensum, buxo similem, aegre spiritus trahitur, os foet-
et singultus infestat, aliquando etiam semen sine voluntate prorumpit.
facile autem post vomitum reficiuntur, multa meraci vini portio-
ne assumpta arundinis radice drachmis duabus, aut cyperi totidem.
Caeterum cogendi sunt obambulare celeriter & currere, ob torpo-
rem qui ex hoc malo contrahitur, adhuc quotidie lauare.

De hirudinibus. Cap. xxxvii.

Hirudines deuoratas, cum aqua & adhærescentibus faucibus, inde
hæde dignosces, quod ventriculi os veluti exuptione vellicatur
mordeturque. atque hæc etiam nota est hirudinis deuoratae, nonnun-
quam & sanguinem floridum, hoc est viuum excreant, hirudinibus
gutturi affixis, quas muriae sorbitio expellit, aut betae folia cum ace-
to, aut niuis glebula cum posca epota. gargarizandum quoque nitrum
cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. At si gutturi adhæ-
serint, in calidam aquam descendant. item lupinorum farinam assu-
ferint, in calidam aquam descendant. item lupinorum farinam assu-
ment, frigida in ore retenta eximentur. quippe frigidae aquae appeten-
tiores, ad eam festinant profiliuntque. Nonnulli cimices iis quibus san-
guisuga deuorata erat, exhibuerunt. ego autem (inquit Galenus) alliis
in his vtens, cimicibus nunquam opus habui.

De chamæleonte. Cap. xxxviii.

Chamæleonte nigro assumpto, valida superuenit ventris erosio,
dolor, cum totius corporis peruersione, tremor, mox conuulsio
incidit. item vomitiones pituitosae & spumantes, quibusdam etiam
singultus aduenit, vox nihil sonat, facies distorqueatur. His autem co-
uenit cremor tritici pinguis, calidus epotus, item dulce vinum aquo-
sum calidum. vomitus, lactis potio, mollis clyster, fomentoque ex ca-
taplasmatis. ad eum vero qui suffocationem parit liuoremque, absin-
thium bibitur, aut nitrum cum oxymelite, vel radiculæ, fatusque præ-
cordiorum congruet.

De alterco. Cap. xxxix.

Si altercum aliquis, aut ebibit, aut comedit, mēte ab alienatur ebrii modo, faciem tamē curationem recipit, mulsa liberalius pota, & lacte, præcipue a sinino, sin minus, caprillo, aut vaccino, ficuumq; ficarum decoctio, benefaciunt ipsi & nuclei pinei, & cucumeris semen cum passo assumptum, præterea vinum salsum cum recenti adipe suilo & passo, vrticæ semen similiter, vel nitrum cum aqua cōducit, insuper cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepæ, & allia, singula cum vino sumpta. Cæterum conquiescere cogendus qui altercum hausit, vt id sicuti qui viuum biberunt, concoquat.

De coriandro.

Cap. xl.

Coriandrum latere propter odorem non potest, potum vero raucitatem facit & mentem mouet, consimiliter temulentis. Locuntur itaq; qui id sumperunt turpia, totius corporis ipsorum odori coriandrum indicat. Adiuuantur, vbi id oleo aut irino vnguento, vt supra monstratum est, eduxerint, vino meraciorum cum absinthio, & per se potio, ouisq; vacuatis in sese detritis, cum muria sorptis, ad hæc muria ipsa bibitur, & ius salsum & gallinaceum & anserinum, postremo passum cum lixiuia sumitur.

De psyllio.

Cap. xli.

Psyllii potu totū corpus refrigerat torpetq; cum resolutione & tristitia, vt animū despondeant. Præsidio sunt omnia quæ contra coriandri potum commendantur.

De cicuta.

Cap. xlii.

Cicutam potam caligo vertiginesq; insequuntur, vt nec minimum videre liceat, item singultus, mentis alienatio & artuum perfrictio comitatur, vltimoq; conuulsi qui eam sumperunt, præfocantur, cessante a motu omni in arteriis spiritu. Per initia igitur, quemadmodum & in aliis, vomitu eam eliciemus, deinde hac euacuatione vsi, quod in intestina delapsum est, excernemus, ac tunc, ad vini meracipotionem veluti præsentissimum remedium transibimus, per interval la eam exhibentes, in quibus interuallis lac vaccinum, aut asininum, aut absinthium cum pipere & vino, item castorium, rutamq; & mentam cū vino exhibebimus, præterea cardamomi, aut styracis drachmam, aut piper cum vrticæ semine ex vino, aut tenera lauri folia, similiterq; laserpitium, aut eius liquorem cum oleo & passo. Item passum per se potum, præclare opitulatur.

De papaueris liquore.

Cap. xliii.

Papaueris liquorem, epotum, subsequitur veternus cum perfrictio ne & pruritu adeo vehementi vt subinde veneno inrudescente tanta oboriatur prurigo, vt qui id biberunt, ab ea excitentur, adhæc toto corpore veneni odor sentitur. Saluti est post vomitiones oleo

os ita
sufare.
Varieta
tem colo
ris sume
re cha
mæleon
tē aiunt
ex affe
ctibus

ipsis, ex
loco, ac
re, aqua,
atq; etiā
ex colo
re vesti
mentorū
nostroū
& cuius
que rei.

hoc phi
losophi
dicunt
esse præ
sentissi
mum ve
nenum.
præfer
tim si cū
silentio
bibitur,
quia cū
sermone
parum

lædit. vt
refert
olym. in
Phædo

PAULI AEGINETAE.

5. Athe factas, acri vti clystere. item oxymel cum sale potum proficit, aut et
nientes calido rosaceo, mel, præterea merum copiosius, cum absinthio & cin
ciues su- namomo, necnon acetum calidum per se, insuper nitrum cum aqua,
os mor- organum cum lixiuio, rutæ semen cum pipere, ipsumque piper cum
te dam- castorio et oxymelite, vel satireiæ, aut organi decocto, vino addito.
natos Cæterum excitare ægros oportet iis quæ naribus admouentur, &
hac epo inaquam calidam deducere, fomentisque propter accedentem pruritum
ta vita adiuuare, a lauacro, pingui iure, cum vino aut passo, vti. Iam medulla
excede- cum oleo pota ipsis opitulatur.

De carpesiæ liquore.

Cap. xliiii.

CArpesiæ liquor potus, soporem & strangulatum præcipitem in
ducit. Eodem remedio, quo & cicutæ, auxiliamur.

De mandragora.

Cap. xlv.

Accidit mandragoræ potu quam primum sopor, virium resolu-
tio, validus veternus, vt nihil a morbo qui lethargus dicitur dis-
ui hone ferat. quibus antequam horum aliquod eueniat, vomitus conducit, post
stissimū hunc, aqua mulsa, nitrum, & absinthium cum passo, aut vino dulcio-
est. Tarē re sumpta. caput rosaceo foueri & aceto debet. corpus excitari com-
unos au moueri, adhibenda itidem quæ odoratu excitant, piper, sinapi, casto-
tem mul rium, ruta cum aceto trita, pix liquida, lucernarum funiculi combusti
tare suos extincti. Quod si ægre excitentur, etiam quæ sternutamenta mo-
ciues ve uent, adducenda, aliisque communibus remediis in his quoque vten-
dum est.

De aconito.

Cap. xlvi.

Aconitum statim quum potum est, in lingua cum astrictione qua
Adam dulcescit, inde vertigines, præsertim in exurgendo, & ocu-
lorum humiditates inducit, thoracis grauitatem & præcordiorum,
ita vt multi flatus erumpant. In quo vitio vomitu venenum deduci de-
bet, & alius clystere subduci. Potiones contra aconitum hæ profi-
ciunt, origani, rutæ aut marrubii cum vino, aut absinthii, aut erucæ,
aut abrotani, aut chamæleæ, aut chamæpityos. Prodest ipsis & opo
balsami drachma cum vino, item coagulum hædi, aut leporis aut hi-
nuli cum aceto. adhæc ferri recrementum aut vinum in quo ipsum fer-
rum, aut aurum, aut argentum sit restructum, insuper lixiuium cum
vino, & gallinæ elixi carnumve pinguium ius cum vino assum-
ptum. Cæterum chamæpitys quæ peculiariter aduersus aconitum co-
ducit, in Heraclia Ponti, vbi & aconitum nascitur, holocleros appel-
latur, Athenis, didonia, in Eubœa, sideritis.

De ixia.

Cap. xlvii.

IXia quæ & vlophonos dicitur, odorem habet & gustum quum
sumitur ocimi, linguæ inflammationem validam inducit, mentem

abalienat, atque omneis naturalis excretiones supprimit, strepitus tum multusque alui elidit cum animæ defectu, nec quicquam tamen ericitur. Aduuantur læsi ab ea, postquam vomitionibus fueriteducta maior veneni portio, aut alius soluta, absinthii diluto cum vino pleniore aut aceto aut oxymelite potio, item rutæ syluestris semine, vel laserpitii radice, similiter tragorigani decocto cum prædictorum aliquo, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut Lalerpitio, singulis oboli pondere. Profunt cum vino etiam nucis iuglandis nuclei læuigati, resina, castorio, & ruta additis, singulis drachmæ pondere. Proficiunt itidem chamæleæ drachmæ duæ, aut thapsiæ succi totidem cum aqua mulla, vtiliter & acetum calidum bibitur.

De ephemero.

Cap. xlviii.

Ephemeron, quod nonnulli Colchicon eo quod in Colchide nascatur, vocant, aut bulbum agrestem, epotum protinus, totum corpus prurire facit, velut vrtica & scilla tactum irritatumque, interiora erodit, stomachum vrit cum ponderosa grauitate. Inualecente autem malo, cruenta strigmentis mista per aluum egeruntur. Succurrendum, vt salamandræ, vomitionibus & clysteris, sed antequam vireis sibi asciscat venenum, dari debet foliorum quercus, aut glandium, aut malicorii, aut serpilli decoctum cum lacte bibendum, aut polygonii succus, aut furculorum vitis, aut rubi, aut tenerarum ferularum medullæ, aut myrtorum cum vino, item ipsorum myrtorum in læuorem detritorum, maceratorumque in aqua, dilutum potum auxiliatur, benefacit itidem castanearum interior tunicula, si cum aliquo succis quos prædiximus, assumatur, organum quoque cum lixiua potum, in idem efficax est. Adeo vero exactum præsidium est lac vaccinum calidum potum, & simul in ore contentum, vt hoc præsentem nullum aliud de sideretur.

De smilace.

Cap. xlix.

Smilax, quæ a quibusdam thymion, a Romanis taxus nominatur, pota perfrictionem totius corporis & strangulatum, mortemque maxime præcipitem inducit, quibus omnia auxiliantur, quæ & cicutæ epotæ.

De solano furioso, quod doryenion a nonnullis dicitur.

Cap. l.

Doryenium potum, quod aliqui solanum furiosum appellant, gustum quidem cœu lactis repræsentat, singultus crebros facit, linguæ humiditatem, & cumulatam sanguinis educationem, per aluum mucosa ferunt simillima torminosi. Auxilio sunt, antequam horum aliquod fuerit secutum, quæ in ephemero dicta sunt, vomitus dico & clyster, & quæcumque potu venenum possunt excernere. Proprie autem ipsi

id quod
& ipse
Theophrastus
Thra-
syan fecisse au-
thor est.

apud eos
tas quo-
que
pharma-
cum na-
scitur,
quod re-
nicum
appella-
tur, quod
celeriter
mortem
affert.
Huic an-
tiphar-
macum
quercus
corticem
esse pro-
dit Ari-
stote.

PAULI AEGINETAE.

succurrit aqua mulsa aut lac asininum caprillumve, & dulce vinum tepidum cum anisi modico potum, item amygdalæ, & elixa gallinarum pectora, idem præstant conchyliæ cruda pariter & tosta, in cibo, adhæc locustæ marinæ & gammari, & ius ex ipsis esculentum potui assumptum.

De sardonis.

Cap. li.

κέλωτα
σαρδών
ιον κέ-
λιν.

Quæ sardonis herba nuncupatur, ranculi species est, pota autem vel comesta mentem abalienat, conuulsiones adfert cum labiorum contractione, ut risus imaginem præbeat, a quo affectu etiam risus sardonius non laudabili dictorio inter homines iactatur. Cui vitio priuatim post vomitionem conducit aqua mulsa liberalius exhibitæ, lactisq; potio. item corporis totius resperio inunctioq; ex medicamentis quæ calefaciunt petita. vincit item in hydrelæum calidum descendere, deinde corpus inungere & valenter infricare. summam, ut in conuulsione tota curatio administranda est.

De papauere corniculato.

Cap. lii.

Papauer quod corniculatum appellatur, esum potumve, eadē quæ papaueris liquor inducens pericula, iisdem quoq; curatur remediis.

De pharico.

Cap. liii.

Pharicum dictum toto gustu nardum sylvestrem repræsentat, potum vero resolutionem cum furore & conuulsione excitat. Aduersus quod, ubi vomitu fuerit eductum, absinthium cum vino propinatur, item cinnamomum aut myrrha, aut nardum Cilicium, quod nonnulli isatin vocauerunt, aut spicæ nardi drachmæ duæ, myrrhæ oboli duo cum passo misti, aut iris crociq; flos ex vino. Caput ipsorum dera sum farina hordeacea cum ruta trita, & aceto cataplasmatibus modo obducere conuenit.

De toxico.

Cap. liiii.

hæc oīa
enim cō-
muniter
amentia
inducūt
ex eo, q
phrenas
inflāmāt
corrum-
puntq;.

Toxicum inde nomen videtur accepisse, quod barbari sagittas, quas toxemata vocant, eo illinant. ubi potum est sequitur laborum & linguæ inflammatio, mentis furor, qui coerceri non possit, variis obnoxius imaginibus. eoq; difficilem curationem recipit, raro etiam nonnulli qui id biberunt vitæ restituntur. Oportet igitur continere ipsos vinculis & cogere, & vi adigere, ut vinum dulce cum resaceo bibant, reddantq; per vomitum. Item raporum semen cum vino potum peculiariter ipsis confert, & quinq; folii radix, hircinus caprillusve sanguis potui datus. ad hæc, quercus cortex aut fagi aut ilicis cum lacte læuigatus potusq; proficit. Idem faciunt mala cotonea macerata, vel trita cum pulegio, ex aqua pota, præterea amomum, & balsami cum vino semen. Qui vero mali huius periculum euaserint, diu in lecto decumbunt, & quum surrexerint, attoniti ac stupentes

reliquum vitæ tempus transigunt.

De fungis.

Cap. lv.

Fungorum alii genere, alii copia offendunt, integri sumpti strangulatus laqueis simileis inducunt. his statim communi præsidio resistendum est, & qui eos hauserunt, oleo ad vomitum cogendi. Mirifice his proficit lixiuium ex sarmentis aut ex pirastri surculorum cinere cum posca, sale vel nitro, potum, item pirastri sylvestria aut folia simul incocta, vim strangulandi quæ fungis inest, tollunt, eadēq; in cibo conferunt. ad hæc oua gallinarum elixa & in posca pota, aristolochiæ drachma aut absinthii, cū vino, insuper mel delinctum potumq; cum aqua. Prodest apiastrum cum nitro, panacis radix & semen cū vino, floces vini combustæ, cum aqua, aut atramentum sutorum cum aceto, raphanus itidem aut sinapi, aut nasturtium in cibo sumptum. Quoniam vero nonnulli fungi a venenatis corrosi non modo strangulant, sed etiam intestina exulcerant, dari debet absinthium copiosum & ficum decoctum, origaniqu; ad hæc ex aqua mulsa, vomitus confert, in calidam descēdere, & crudam farinam hordeaceā præcordiis admoovere.

De sanguine taurino.

Cap. lvi.

Sanguis tauri recens occisi potus, spiritus difficultatem & strangulationem procreat, dum tonsillarum & gutturis meatus cum valida conuulsione obstruit. Iam lingua iis qui sanguinem hauserunt rubens inuenitur, dentes tincti, & vestigia cruoris concreti inter ipsorum commissuras. In hoc malo vomitus vitari debet, grumi enim attractu ad sublime relati, magis gulæ inculcantur. Exhibentur ergo quæ sanguinem coeuntem soluere, & aluum subducere possunt, vt grossi liquore suo pleni cum posca & nitro. huc facit etiam omne coagulum cum aceto, & laserpitii radix cum suo liquore. similiter etiam brassicæ semen, lixiuiumq; ex cinere ficulneo, item cunilæ folia cum pipere, rubicq; succus cum aceto. Iam vero alius recte subducetur. Solent iis qui seruantur inferius recrementa foedi odoris egeri, stomachus & venter ordeacea farina cum aqua mulsa obduci debent.

De lacte intus congelato.

Cap. lvii.

Lac potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum, multam strangulationem parit, eo quod in grumos coit gelaturque. Auxiliatur huic malo, antidoti modo, coagulum, si cum aceto frequenter bibere compellas eum qui lac hausit. item conferunt nepitæ folia arida, aut succus ipsius similiter, aut laserpitii radix liquorve cū posca, idem præstat thymus cum vino, & e cinere lixiuia. salsum vero nihil offerri debet, nam hinc lac magis coit ac in caseum transit. nec vomitus in hoc malo conducit, nam in grumos concretum, dum

PAULI AEGINETAE

ad stomachum assurgit, strangulat.

De melle quod in Heraclia nascitur. Cap. lviii.

Mel quod in Heraclia Ponti prouenit, aut esum, aut bibitum, et eadem pericula quæ aconitum, infert. quare & eadem vtriq; conueniunt remedia. Facillime autem curantur qui id hauserunt, continuo hydromelitis potu, cui rutæ folia sint admista.

De gypso. Cap. lix.

Gypsum potum strangulatum parit, in lapidem coalescens, unde transferre oportet huc præsidia quæ aduersus fungos conueniunt. datur etiam in hoc malo malux decoctum loco olei. pingue siquidem quum sit, & lubricas vomitiones procreet, corpora deradi non finit, quod lapidescens gypsus facit. Porro conducit & oleum in mulla, et ficuum decoctum, lixiuiaq; e ficulneo, aut e sarmentorum cinere facta cum vino copiosiore, item origanum, aut thymus cum lixiuia acetove. Clyster ex passo & malux decocto in anum dabitur.

De cerussa. Cap. lx.

de hisce
oibus
apud Pli
niu quo
que vide
re est.

Cerussa propter colorem facile deprehenditur, quoniam sponte sumpta palatum & linguam, dētiumq; commissuras albefacit. præterea singultum, tussim, linguæ siccitatem, extremorū perfrictio nem, cum mentis ab alienatione, & difficili corporis motu, inducit. His prodest aquam mullam, aut ficuum, aut malux decoctum propinare. item lac calidum, vel sesamum cum vino tritum, aut lixiuium e vitium sarmentis, aut oleum amaricinum, siue irinum, vel persicorum ossa cum ordeï decocto, vel lachryma thuris, vel prunorum gummi, aut vlini humor qui in folliculis ipsius seruatur cum aqua tepida. Iam vomitus continue cietur. Proficiet etiam succus thapsiæ, vel liquoris scammoniz terni oboli cum aqua mulla poti.

De calce, sandaracha, & auripigmento. Cap. lxi.

a sanda-
racha ve
meno in-
terfici
equū &
quod li-
bet iumē
tū scribit
Aristo.
viii. aīal.

Calx, sandaracha & auripigmentum pota, ventris & intestino rum torsiones cū vehemēti rosione faciunt. quare omnia quæ temperare & soluere ea possint, adhiberi debent, item quæ vomitio nes facileis & aluum lubricam efficiant, qualis est hibisci & malux succus, decoctumq; lini seminis aut tragi, aut oryzae, lac præterea co piosum, aqua mulla, iura pingua, boniq; succi.

De argenti spuma. Cap. lxii.

Spuma argenti pota, quam Græci lithargyron dicunt, grauitatem stomachi, ventris, & intestinorum, cum torsionibus validis in fert, nonnunquam & intestina pondere vulnerat disrumpitq; vrinam impedit, corpus eorum qui eam biberunt, intumescit, & coloris plumbei fiunt, & deformitatem acquirunt. Adiuuantur, secundum vomitio nes, agrestis hominis semine cum vino, myrrhæ drachmis octo, abr

finthij, hyssopi aut apii semine, aut pipere, aut ligustri flore cum vino, palumbium fimo arido cum nardo & vino.

De plumbo.

Cap. lxiii.

Plumbi scobs aut lotura pota, similia inuehit argenti spumæ pericula, eademq; requirit præsidia.

De argento viuo.

Cap. lxiiii.

Et argentum viuum potum, eadem quæ spuma argenti infert, atq; eisdem remediis qui id assumpserunt, adiuuantur. adhæc prodesse ipsis videtur lac copiose datum. cæterum & hi vomitionibus sollicitabuntur.

Illud tñ tenendū vomitio nem in oībus eē optimā præterq; in iis, qui tauri num sanguinem vel lac coagulatum hauerunt.

De veratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syluestri, nigella, & pappis.

Cap. lxv.

Habenda cura est & eorum quæ iuuandi gratia exhibentur, sæpe vero non minora aliis pericula adferunt. cuiusmodi sunt superius commemorata, nempe veratrum album, thapsia, elaterium, agaricum nigrum. hæc enim strangulatus excitant, aut magis quam opus est, purgant, in quibus strangulationes, vt in fungis & similibus comprehensum est, curabuntur, nimias purgationes, iis quæ excretiones cohibent, sistimus. iam vero quæ paululum nocere videntur, interim tamen pericula inferunt, negligi non debent, cuius generis est syluestris ruta, melanthium, recentes pappi, flores autem sunt spinæ quæ cætos dicitur, in quibus solus vomitus adhibitus laborantes sanitati restituit.

De familiaribus ac domesticis, nempe vino & aqua frigida.

Cap. lxvi.

Aqua frigida subito ac cumulatim pota, vinumq; meracius copiosum, dulce, præsertim a balneo, aut cursu, validisq; exercitiis strangulatus & dolores concitat. in quibus sanguinis dimissio protinus adhibita & inanitio, imminens periculum dissoluit.

quia magis conerescit sanguis labore corporis feructus.

FINIS. V. LIBRI PAULI AEGINETÆ, Ioanne Guinterio Medico interprete.

PAULI AEGINETAE

LIBER SEXTVS,

IOANNE GVINTERIO

ANDERNACO MEDICO

INTERPRETE.



Prooemium Chirurgicæ.

Cap. i.

carnes
sunt tãq̃
lateres
& parie-
tes. ossa
aut tãq̃
funda-
mẽta &
colũnæ
domus
corpora
lis. debet
enim eẽ
& do-
mus &
corpo-
rũ tãq̃ si-
lis ratio-
Vñ.)
A capi-
te porro
orditur
tãq̃ a no-
biliore
mẽbro,
cuius
phleg-



QVONIAM chirurgica in partes duas di-
ducta est, vt vna sit quæ carnis vitia tractet, al-
tera quæ ossum, tam in rupturis quam in luxa-
tionibus comprehendat, ab ea quæ carni seruit
in præsentia exordiemur, consueto & hic vsũ
compendio. Rursus igitur a superioribus au-
spicâtes quomodo caput, præsertimq; eius ver-
tex vratur, exponemus.

Quomodo caput aduratur in lippientibus, ægre spiranti-
bus, & elephanticis. Cap. ii.

CVM humor oculis influit superne, cumq; difficilis vrget spiratio
quæ humiditatis excrementitiæ copia e capite inferius in thora-
cem transmissa, & particulas indidem continuo suo cursu offenden-
te contrahitur, caput per medium hoc modo vrunt. Vertex ad cutẽ
prius tondetur cutis adusq; os ferramenti candentibus, nuclei modo
rotundis aduritur. quod, vbi crusta deciderit, raditur. Nonnulli vero
vbi id ipsum os addufferint, faciunt vt squama inde recedat exigua,
facile humores illinc perspiratu dissipentur euacuenturq; seruato
cui vlcere, deinde sic ipsum ad cicatricem perducunt. At in elephan-
tiasi curanda, quinq; nonnulli crustas in capite excitant, vnam in prio-
ri parte supra sinciput alteram hac inferiorem, paulo superius quam
frons habetur, vbi fere pili desinunt, ac aliam in occipitio, quod Græ-
ci opisthocranion vocant, reliquas duas iuxta ossa a squamis dicta
lepidoidæ quæ superius aures conglutinant, vnâ ex his, parte dextra,
alteram sinistra, atq; ita pluribus squammis detractis, & copiam, &
crassitiem humorum euaporatu ex alto capitis deriuantes, lumina
offendi prohibent. Iã lieni quoq; aliud ferramentũ adigunt, vt primo
melancholici recrementi opifici per crustã in cute excitatã medeant.

Cum humor capitis cutem inflat, eaq; intumescit & premententi digito cedit hydrocephalon dicitur.

Cap.

iii.

SI humor natura aqueus capitis cutem subit, vitium proprie hydrocephalon appellatur, accidit autem pueris quamprimum in lucem æduntur, capite ab obstetricibus parum dextre pressio, aut ex causa latete, aut ex vasis vnius, pluriumve ruptura & sanguine qui emanat in ociosam inutilemque mutato substantiam, aut materia ob mutualium raritatem resudante, ac inter cutem & membranam quæ caluariam integit, pericranion Græci vocant, erumpente, vel enim inter hanc, & cutem humor consistit, vel inter pericranion & os, vel inter os & cerebri membranas. Cum itaq; cuti & membranæ caluariam integenti, humor interiacet, tumor sequitur, tactu mollis, cōcolor, indolens, turgidus, puluino sublimis, & paucis particulis subiectus, digitis prementibus facile cedit, & rursus assurgit. Quibus pericranion & os intercedit humor, reliqua sane respondent, sed tumor durior multo est & lente cedit, vt qui etiam pluribus corporibus sublit, dolorq; magis vrget. Si inter cerebri membranam & os humor se receperit, tumor quidem erit, sed qui prementi nō cedat, neq; tactu sit mollis, tamen violenter pressus cedat, siquidem os infantium recens adhuc compactum facile cedit, præsertim cum suturis rarefactis humor transitus foras pateat, cognoscitur ex facili inde quod humor cum illum constringere volumus, ex aduerso repressus in altum effugiat. Dolor his acrior obuenit, caput totum in diuersa agitur, frons ipsis foras producta est, oculis cernunt inconniuentibus, & crebrius illachrymant. His igitur ceu desperatæ salutis non est manus adhibenda, & si maxime nonnulli chirurgicorum terebra perforatum os exemerint, vt in capitis fracturis dicitur. At si intra cutem & membranulæ quæ sub cute caluariam cingit, humor sit collectus, tumore quidem exiguo subistente, vna linea per medium transuersa caput incidendum, si membranulæ caluariam inuoluēti & ossi colluies interueniat magisq; caput inturgescat, duabus vtetur lineis per medium se mutuo secantibus, si magis adhuc sit turgidum etiam, tribus, ad similitudinē H literæ. Vbi manu humorem exemeris, insertis linamentis commode partem deligabimus, & vsque ad tertium diem œnelæo perfundemus, inde solutam medicamento in linteolum illito persanabimus. Quod si longiore spatio os carnem non recipiat, leuiter ipsum rademus.

Quomodo arteriæ diuidantur, arteriotomia dicitur.

Cap. iiii.

IN longis oculorum defluxionibus, tum vertiginoso affectu, arte- Primo

mata (vt
græce
loquar)
pluribus
morbis
materiā
suppedi
tant, qui
morbis
in corpo
re nostro
igni vel
ferro e-
gent. Sci
te. n. il-
lud di-
ctū aiūt.
uel seces
vel uras.

hoc ait
et Arist.
vide hi-
sto. aīal.

PAULI AEGINETAE.

diætā, rias post aures incidere consueuimus. Radenda igitur posterior ca-
deinde pitis pars, & digitis notanda est. Nam arteriæ situs ex loci pulsu fa-
pharma cile deprehenditur. deinde ipsam linea scriptorio prius atramento du-
cian, po cta, duos digitos longa, vsque ad os diuidere oportet. Quod si in cō-
stremo spectum ita non venit, incidendum circiter trium digitorum interual-
ferri vel lum, atque tunc manus iniicienda, sic vt arteriæ transversim dissecen-
ignē se- tur, quosq; & pulsatis sanguinis fluor apparuerit, & instrumentum
qui di- os propius accedat. Vbi sat fluxerit sanguinis membranula, quæ cal-
ctum est uariam sub cute ambit, diuisa, ne extensione inflammationem con-
antiquis trahat, rasq; osse penicillum ex panniculo vulneribus debet insinua-
simorū. ri, & medicamento quod linteolis illinitur adhiberi, quod si rema-
Id quoq; neat etiam hoc os lene, similiter id scalpello rademus.

et ad bel
la geren
da lege
duelli ac

commo
datur, si
recte cō
sideres.
Hæc ē
triplici
rationi
vitæ ex
propor-
tione re
spondēt.
vt est in
Phædo
ne apud
Plat, re-
ferente
Olymp.
intelle-
ctuali
purgati-
uæ, s. cū
daræ
operatri
ei, corru
ptici ac

Quomodo vasa diuidantur, quæ angiologia dicitur, eo-
rumq; adustio sit administranda. Cap. v.

IN hemi craniciis, & in iis, quorum oculos aut longus, aut etiā acu-
tus dolor ex calida, acriq; fluxione infestat adeo vt in temporum
quoque musculis calor, latusq; tumor, oedema vocant Græci, exci-
tetur, omnes medici vasorum diuisionem probarunt. Derasis igitur
primum in temporibus pilis, digitis vasa notabimus, sic vt fomenta
præcesserint, aut etiam ceruix ligata sit, vbi iam vasa oculis sese obie-
cerint, atramento notabuntur, & cutis ex lateribus, tum sinistrae ma-
nus nostræ digitis, tum ministri leuabitur, ipsumq; vas superficialia li-
nea incidemus, deinde vbi totum penetrauerimus hamulis eleuatum
& a membranis vicinis instrumento quo illæ detrahuntur, denuda-
tum, suspendemus vndiquaque liberum, etsi tenue vas fuerit, per ha-
mulum cæcum, elato ei circumductoq; membranam detrahemus, ita
vt partem quoq; ipsius apprehendamus. At si magnum est, duplex
acu funiculus subiicietur, aut linum crudum, aut aliud quoddam vali-
dum, ac quamprimū vas in rectum scalpello diuisum, sanguinis quan-
tum satis est fuderit, in vtroq; extremo quod denudatum est, lino li-
gabimus, quod intercedit excisum, aut protinus, aut cum soluetur au-
ferre conuenit. Nonnulli etiam candentibus ferramentis citra sectio-
nem vasa adurunt plagis satis altis. vbi iam ferro negotium absolu-
tum est linamentis carptis siccis vulnere oppleto, splenium quoque
superaccommodatum deligabimus. postquam solutum fuerit, medi-
camenta carni generandæ accommoda, tum arida, tum quæ linteolis
conceptis illinuntur, nec non cicatrici inducendæ apta, ad curationē
absoluendam inducemus, nimirum vbi vincula deligaturæ compu-
truerint exciderintq;.

LIBER VI.

Quomodo frons incidatur, hypopathismum
vocat.

Cap. VI.

160

Instrumenti species nomen administrationi dedit, vrimur autem
hypopathismo, in quibus fluor multus, & calidus in oculos de-
fertur, faciesq; rubescit, & in fronte sensus quidam & discursus velu-
ti vermium, aut formicarum oboritur. Derasis itaq; in fronte pilis iu-
bebimus, vt inferior gena moueatur, cauenteq; musculorum ad tem-
pora motionem, tres lineas rectas pari spatio distantes in fronte inci-
demus, latas quidem singulas duos digitos, altas adusq; os, trium di-
gitorum intervallo inuicem discretas. secundum sectionem tenuem,
spatham subicientes a linea quæ in sinistiore tempore ad mediam
tendit incipiemus, totum quod interiacet excoriantes cum membra-
na quæ caluariam incingit, deinde rursus spatulam a media ad reli-
quam demitemus. Deinde scalpri quod scolopomachætion dicitur,
faciem in primam conicientes lineam, vt acutum ipsius latus carni
quæ ab interna parte cuti cohæret accommodetur, retulsum vero, osfi.
propellemus ipsum adusq; mediam lineam, omnia a capite ad oculos
descendentia vasa præcidentes, non autem vsq; ad cutis superficiem,
rursus a media ad postremam ipsum deducemus, similiter vasa ampu-
tantes. Vbi mediocriter sanguis effluerit, extusis grumis, tria lina-
menta tortilia singulis incisuris inferemus, panniculumq; implicitum
aqua madentem superiniectum deligabimus. Postridie ænelæo non
solum vlcerebus respersis, sed etiam tēporum musculis, auribusq; pro-
pter inflammationem, tertio die cum solueris, superfusione diu vten-
dum, & basilico rosaceo soluto, linamentis insertis curationem quæ
necesse est, absoluemus.

Quid agendum in sincipite secando, Periscyphismum ap-
pellant Græci.

Cap. vii.

In quibus multa, & in alto vasa fluorem copiosum oculis trans-
mittunt, tribus lineis trāsuersis coronæ modo sinciput secatur, quæ
ratio periscyphismus Græce vocatur. Hoc morbo laborantium co-
mites notæ sunt tales. Primum oculi alimentum non sentiunt, exi-
gui, & ad visum impotentes, sunt anguli erosi, palpebræ exulcera-
tæ, & pili ipsorum deflui, lachrymæ tenues admodum & acres cum
calore deferuntur. Dolor in alto capitis acutus & vehemens vrget,
sternutamentū continuū. Itaq; deraso capite, transuersam lineam sine
musculorum in temporibus, motus offensa, vt dictum est incidemus,
quæ a sinistiore temporum parte incipiens in alteram desinat, ha-
beatq; terminos, vbi motus nullus est, paulo superius q̄ frons habet,
ducta, sic vt sutura capitis per verticem tendēs ad aures, Græcis dici-

materiali.

Rasura
Hipp. vñ
τοῖς πε-
ρὶ ἐλ-
κῶν &
Gal. i. vñ
et vi. me-
thodi an-
te oīa
comen-
datur,
more
agrico-
læ opti-
mi, qui
prius
purgat,
fodit, sa-
nitq; ar-
uū, q̄ se-
mē infe-
rat atq;
concre-
dat.

Ne in-
flāmen-
tū vlcera
primis
magna
cura ad-
hibēda.

PAULI AEGINETAE.

tur *ῥεφενια*, vitetur. Leonides per mediam frontem lineam deducit. Cæterum osse detecto, penicillis, aut linamentis pluribus inuicem separabimus, extrema diuisionis deligabimus, & vino oleoq; mixtis vt prius dictum est, aspergemus. A solutione cum inflammatio iam declinauerit, os radetur, quoad caro suppullulare incipiat, rationemq; carnis producendæ accommodabimus medicamentis aridis in id efficacibus vtentes, quale est, quod recipit farinæ triticeæ partes duas, colophonix resinæ partem vnam. Item quale est Cephalicum appellatum. Item quod ex pumice ad carnem creandam conficitur. Nam cutis crassiuscula cicatrice densata, & occlusa vaforum ora per initia pituitæ impetum in oculos deferri prohibent.

De superioris palpebræ sutura, alijsq; modis. Cap. viii.

GRæci appellant *δυσχίλιον*, cum naturali pilorum palpebræ ordinis, alijs præter naturam pili succrescunt, quod vitium ex fluida affectione contrahitur quando humor qui influit, copiosus quidem, sed rosionis & acrimonix expers fuerit. Nam acrior, aut salsus magis, aut alio quodam modo rodens, spatio temporis etiam naturales palpebræ pilos corrumpit. Interim igitur in hac affectione, sutura vtimur, interim in phalangosi cum cilium introspectat pilorum acie simul cum eo inuersa, interdum etiam in palpebris relaxatis, quando naturales pili bulbum compungunt. Aeger itaq; in sedili collocabitur, vel aduersus, vel a sinistra, superiorq; palpebra inuertetur, siquidem longos habeat pilos, illos ipsos indice & magno sinistrae manus digito apprehendemus, sin admodum breues, acus filum ducens per medium cilium in exteriorem partem transmittetur, deinde per filum sinistra manu sublata palpebra, dextra, cuspide specilli post filum in rugas plicasq; coacta inuertetur, & subtus linea interius quam pili, pungentes habeantur per cilium ducetur, a maiori angulo vsq; ad minimum pertinens. filo autem post interiorem sectionis lineam subiecto, pollice manus sinistrae exiguum quoddam linamentum implicatum obhcientes, supercilium attollemus, aliaq; parua linamenta implicata summis angulis imponentes famulo posterius stanti iubebimus, vt palpebras per ea attollat, atq; tunc lineam veru modo rectam, obeliceam Græci vocât, primum scalpello suturis aptato incidemus paulo superius quam naturales pili existant, ab angulo ad angulum tendentem, altam vt sola possit cutis diuidi, post eam, lunatam adhibebimus, incipientes quidem vnde & veru similis linea inceperit, in tantam vero sublimitatem tendentes, vt totam cutem quæ superflua est circumscribamus, desinentesq; similiter vbi & illa iam commemorata linea. Postea cum cutis duabus lineis circumscripta myrti similitudinem repræsentet, angulo qui ad dextram nostram spectet hamulo transfixo

morta-
les pluri
bus ante
secutis
absq; o-
pe vlla
medico-
rū vixis-
se, postea
hanc ad-
uenisse, et
sibi ferro
& succo
herbarū
medica-
tos inco-
gnita ad
huc phy-
sica me-
dicina
ex Ho-

transfixo totam hanc cuticulam excoriabamus. deinde vibicibus
 pongia ter quaterue ablutis, oras vulneris contrahemus, a media au-
 ipicantes, acum vero per ipsam interiorem sectionem transmittētes,
 porro filum ex lana estō. Cæterum quod eius superfluum est ampu-
 abimus, non prope suturas, sed vt circiter trium digitorum longitu-
 do otiosa pendeat, eamq; per frontem exporrectam, cum emplastro
 quodam conglutinante applicabimus, palpebræ autem pilos a sutu-
 ris, cuspide acus liberabimus. Hic igitur agendi modus & cōmunis
 & securus est. Nonnulli axcoriationem fugiunt, eoq; post ductam
 iubtus lineam, vossella palpebris continendis accommoda, hoc est,
 ad palpebræ ambitum apprehendendum figurata, id quod superest cu-
 tis, eleuatum, scalpro amputant, ac suturas, vt comprehensum est, ad-
 iciunt. At si in parte aliquā solū palpebræ ex pilis oriatur pūctura,
 illi etiam sollimanum adhibere couenit, deinde linamenta implicita
 posca malida imponemus, deligabimus imbuentes ipsam partem po-
 sca aquosa vsq; ad tertium diem, quo ligaturam soluemus, ac super-
 dua fili parte abscissa oblinemus palpebras, vel croco, vel glaucio, vel
 aliquo collyrio, quod inflammationem arceat, vt, croceno dia rho-
 don. At si inflammationem futuræ patiantur, etiam emplastrum
 aliquod lene ipsis superaccommodabimus, & veluti lacte it. fuso
 oculum leniemus, laxiores autem redditas suturas amputando ab-
 trahemus. Notus mihi quidam est qui palpebra, vt dictum est, ex-
 coriata, futuris non vteretur, sed medicamento cicatricē inducente cu-
 rationem absolueret. Nam vulnere ad cicatricem veniente, palpebrā
 ex parte attollens pilos extra inclinare coegit. Quemadmodum igi-
 tur alius quispiā ne excoriens quidem palpebram neq; externis dua-
 bus vtens diuisionibus, sed interiore solū adhibita, palpebræ rugas di-
 gitis vel hamo attollebat, item duabus arundinulis aut lamellis qui-
 busdam palpebræ longitudinem æquātib; latitudinem angusti scal-
 pelli, quod venis secandis adhibetur superfluā totam cutem mediam
 prehensam constringebat, vtriusq; ipsius terminos deuinciens. Atq;
 hac ratione, tota posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emo-
 diens, intra decimum aut plurimum quintumdecimum diem cū arun-
 dinulis aut lamellis excidebat, ita vt nulla fere cicatrix appareret.

Quomodo palpebræ medicamento vrantur.

Cap. ix.

Visionem palpebrarum ex vrente medicamento factam, omnes,
 vt vno verbo dicam, veteres damnauerunt, tum propter medica-
 menti acrimoniam oculis insidiātem, tum quod ex immodica vstio-
 ne affectus nascitur, quem Græci lagophthalmū appellant, in quo hiā-
 tus palpebris qualicūq; de causa lumen offenditur. Quoniam ve-

X

mero as-
 firmari
 pōt cui
 ego as-
 sentior il-
 liacis tē-
 poribus
 nulla hu-
 iusce phy-
 sicæ vsū
 extitisse.
 Addu-
 cor autē
 ex eo,
 qd̄ Ho-
 merus de
 hac chi-
 rurgica
 tantū me
 minit. re-
 liquā nō
 attingit
 adhuc
 ignotā.
 Lacedæ-
 monios
 quoq; et
 Persas se-
 cula mul-
 ta absq;
 medicā-
 physica
 agitalse
 compe-
 rio apud
 histori-
 cos. Ro-
 mani
 quoq; ali-
 quando
 cōmuni

PAVLI AEGINETAE

consensu ro multi a pilis semper punctiorem experiunt, ne vocabulum qu
ex vrbe dem futuræ frequenter audire sustinentes, detinent plerumq nos etiam
medicos inuitos, tanquam aliis destituti præsidii vstionem per medicamentu
expule- adhibemus Compositio vero medicamenti hæc recipit, calcis viua
runt. Ita partes duas, saponis gallici vel communis totidem. Quidem etiam
hæc chi aphronitri partes quatuor læuigatas lixiuio, aut saponario, aut alio
rurgica e ficu, aut quercu, aut vrina pueri impubis excipientes mucrone scal
physicâ pelli palpebræ iniiciemus, tantum in myrtacei folii figuram, aduren
vetustate tes, quantum etiam in descriptione comprehenderimus. vbi iam pri
multo an mo medicamenti impositu cutis fuerit adusta, eo spongia ablato rur
tecedit. sus aliud iniiciemus, tam diu id cuti inhærere sinentes quousq nigr
scat. Sin id non assecuti fuerimus, etiam tertio inducetur. Postquam

illud sciẽ vero cutis nigruerit, & reliquum iam crusta oborta medicamentur
dum do- ablueris, & balneis & superfusionibus, quousq crusta deciderit, vte
ctissimos mur. Inde rasilibus linamētis et penicillis teneris, cicatricē moliemur.

græciæ

physicos

vere phy

ficien ex

creuisse,

quippe

qui nul

lū vsum

ex ma

gicis cā

tionibus

in medi

cinæ p

cepta cō

tulerunt.

vt qui ve

re natu

ram sim

plici ra

tionem pro

sequeren

tur. Plin.

tamen et

M. Ca

to. vt a

libi. re

Si oculus cute non obtegatur, lagophthalmum
ducitur. Cap. x.

LAgophthalmon vocant cum superior palpebra sursum retracta
est. Accidit autem hoc viciu, aut naturaliter, aut ex cicatrice vul
neris, eiusq vel sua sponte facti, vel ex sutura, vel vstione, vt nuper
cebamus, parum dextre administrata, in qua etiam solum mediocri
emendatio fieri potest si palpebra crassitiem amplam habeat. conu
nit enim ipsa cicatrice diuisa, & oris per linamentum diductis, etiam
deligatura prorsus vsq ab absolutam curationem vti, ita vt non ni
mum sicca, sed relaxantia magis vinguina adhibeantur, quale est f
nugræci succus superflus & basilicum tetrapharmacum quod lin
teolis illinatur resolutum.

De inferioris palpebræ sutura & vstione per medi
camenta. Cap. xi.

Quot pilorum affectibus superior palpebra opportuna est, t
etiam inferior. Etenim ultra naturæ suæ modum excrecens, in
uertitur, & phalangosim, et distichiam sustinet. Eodem igitur mo
quo in superioris palpebræ sutura, vtendū est, ordine inuerso, primu
lunata incidi linea debet, ne sanguinis fluor opus impediat, deinde
sta. Subtus vitāda est lectio, quoniam palpebra inferior pondere s
genuino prompte inuertitur. Cæterum reliqua curatio in superiori
palpebræ sutura tractata, hic quoq conueniet, præter quam quod
lorum excessus fronti non fiat agglutinandi. At si in hac etiam a
ctione manum extimescens, vstionem potius e medicamento de
gas, hanc quoq iam traditam habes.

De ectropio.

Cap. xii.

Quemadmodum superiori palpebræ vñū vocatū lagophthalmon, ita inferiori ectropion oboritur, verū id intercedit discriminis, quod hoc non e natura prouenit, sed nonnunquam ex relaxatione, quam medicamenta in id efficacia, inflammatione præcedente concitarint, nonnunquam ex sutura, aut inartificioſa vſtione palpebra inuertitur. Acu igitur duo lina trahente carunculam tranſſuemus a ſiniſterio e angulo ad dextrum deducta. Deinde lino vtriſq; ipſius extremis admoto, carunculam per acum attollemus, atq; ita ipſam ſcalpello excindemus, auferentes ſimul cum ea & acum. Atq; ſi figuram palpebra receperit, & æqualiter ſit conuerſa, ſatis manu proſectū eſt. Sin autem poſtea quam caro fuerit ablata, adhuc inuertatur, auerſum ſcalpellum quam partem Græci cyathifcum nominant iuxta cuſpidem, palpebræ ſectæ ſubneciemus. ac in externa illius parte duas inciſas lineas, a duobus factæ ſectionis angulis, auſpicientes, in acutiem quandam ducemus, eaſq; in vnum cogentes, particulam Græcoſum literæ Δ ſimilem amputabimus, vt eius acuta pars infra ſpectet, oculum, latitudo ſupra cilium appellatum reſpiciat. Secundum hoc diductas oras acu ex lana filum ducente commitemus, duabus ſuturis contenti. Quod ſi vero ſuturæ, aut vſtioni fertur acceptum ectropion, etiam ſub inferioribus palpebræ pilis per ipſam primam cicatricem lineam ſimplicem inſidemus, labrisq; diductis linamenta inferemus, ac aliis præſidiis, quæ in lagophthalmis comprehenſa ſunt, vtemur, præterquam fomentis, vſq; dum ſutura fuerit conglutinata.

De anabrochiſmo & vſtione ſerramento adhibenda.

Cap. xiii.

In quibus haud multi palpebræ pili habentur, qui oculum irritent, ſed circiter vnus, aut duo, aut plurimum tres, inuicem propinqui, anabrochiſmum græce dictum, probamus, iſq; ſit hunc in modum. Per acus tenuiſſimæ articulam capillus muliebris, aut ſimpliciſſimū byſſinum linum tranſmittitur, duobus ſimul extremis commiſſis, vt quod inferitur duplicem habeat anſulam, alterūq; huiuſmodi filū, aut capillus anſulæ iniiciatur, traductaq; acu per cilii vbi pili enati apparent, pilū, pilosve anſulæ impoſitos, auriscalpio detrahemus. Et ſi quidē palpebræ pilus prehenuſus eſt, anſulā attrahimus. Sin vero vnus aut plures exciderint, per iniectum principiū ruruſus anſulā deorſum trahemus, iterūq; pilo, ſeu pilis in eam poſitis, attrahemus. At ſi vnus duntaxat pilus gracilis oculum pungat, etiam alterum ex naturalibus palpebræ pilis ſimul euellemus, inunctū prius gūmi, aut alio quodam glutinante, deligabimusq; donec pilus coaleſcat. Nonnulli autem vſtione præponūt anabrochiſmo, palpebram inuertūt, extra-

tuli, & magorū volumina illam admittēre vidētur. Sed de hoc nos alias per otium. Aristot. habere ipſam uēdetur inter admirabilia in fine belli, qui eſt de mirabilibus. Ex ipſius tum ſcriptis omnibus in vniuerſum colligo ipſam eſſe curſu rerum naturalium exploſam eſſe, etiamq; quippe cui nihil credere viſus eſt.

PAULI AEGINETAE

Si quata etoq̃ vulsella pilo pungente siue vno, siue duobus, vel etiam tribus, candens aut specillum, quod vtrobiq̃ extremo in cuspidem abeat, aut auriscalpium, aut eiusmodi aliquod tenue instrumentum loco adigunt, vnde pilus, pilive sint euulsi. Sic enim cute densata, nullus pilus enascitur.

De hydatide.

Cap. xiiii.

HYDATIS pinguis quaedam est substantia, palpebrae cuti praeter naturam substrata. In aliquibus autem, & praesertim pueris ceu natura humidioribus augescens, malorum superuenientium causa redditur, dum oculum pondere suo grauatur, eoque fluxionem excitat, palpebrae igitur ipsis subter supercilia aquam inter cutem representant, nec vt par est sursum possunt attolli. Si vero digitis ipsas deprimamus, inde digitos separemus, quod medium intercedit, inflatur. Horis autem antelucanis potissimum defluxione tentantur, neque contra solis splendores cernere sistent, sed tamen illachrymant, continuisque lippitudinibus infestantur. figurato igitur commode aegrotato, digitis duobus, indice & medio paululum distantibus palpebram constringemus, collectionem quandam hydatidis ad medium digitis interpositum molientes. Ministro autem posterius stanti caputque aegrotantis firmiter continenti iubebimus per medium supercillii palpebram modice attollat. Non sumpto in manus scalpello, ipsam per medium linea transversa diuidemus, non maiore quam in sanguinis per venas detractio fieri solet, alta vero vt totam cutem diuidat, vel etiam hydatidem ipsam attingat, sed cura omnino debet adhiberi. plerique siquidem altius demisso scalpello, vel membranam quae a cornu si similitudine Ceratoides dicitur, violarunt, vel certe palpebrae musculos conuulnerunt. Atque si quidem protinus hydatidis in conspectum venerit, ipsam extrahemus, sin minus, iterum diuisionem leuiter moliemur. Vnde si apparuerit digitis cum linteolo molli apprehensam huc, illuc, nonnunquam etiam circumactam mouendo extrahemus. vbi ablata fuerit implicitum panniculum posca madentem impositumque deligabimus. Sunt autem qui & leuigatum salem specilli capitulo diuisionibus inferant, vt si ex hydatide quippiam fuerit relictum, ipsam consumat, postquam solueris si desit inflammatio collyriis quae illi ni possint, aut lycio, aut glaucio, aut croco curationem expediemus. Sin inflammatio vrgeat, cataplasmatibus ad ea inscriptis, aliisque praesidiis medebimur.

De palpebris commissis.

Cap. xv.

SVPERIOR palpebra interim cum inferiori cilio coalescit, interim cum membrana adnata, interim etiam cum ea quae ob cornu similitudinem graece ceratoides appellatur, ac morbus oculi tractatus difficilis efficit.

Conuenit igitur vel auriscalpio, lato palpebræ spatio subiecto, vel ea per hamulum eleuata coalitum scalpello ad pterygia excidenda idoneo dissoluere, cura adhibita ne cornea membrana vulneretur, atque inde procidentia occasio fiat. Vbi incideris, succo in oculum infuso linamētis palpebras diducemus, ne rursus commissura fiat, lanaque ouumadente imposita post tertium diem extenuantibus & quæ cicatricem inducunt collyriis utemur.

De chalazis.

Cap. xvi.

Chalazium otiosi humoris in palpebra concretio est, quæ si ab exterioriore parte palpebræ coaceruetur, scalpello extrinsecus transuersa linea incidi debet, deinde auriscalpio, vel aliquo huiusmodi instrumento Chalazion auferemus. Quod si magna est diuisio, aut dehiscit, futuris oras committemus, ac emplastro utemur. Si exigua est, omisissis futuris, curationem absoluemus. Si ab interiori parte fuerit, ut per cartilagine[m] ipsa pelluceat, inuersa palpebra & transuersim intus diuisa, chalazion tolletur, quo facto, muriâ vulneri infundemus.

De verrucis & encanthide.

Cap. xvii.

Palpebrarum verrucis, & in maiore angulo encanthidibus appellatis vulsella prehenfis, scalpelloque amputatis chalcitidem læuigatam imponemus.

De vngue oculorum, quod pterygion a Græcis vocatur.

Cap. xviii.

Pterygion neruosa membrana est, quæ ab oculi angulo maiore plurimum initium capiens, per minorem ad interiora progreditur, offitque oculo, quod motum ipsius, bulbi contractione impediat, & quod progrediens, totam pupillam contegat. Cum igitur facilius curationem recipiant, quæ tenuia sunt, & albicant, hunc in modum ad mouenda manus est. Diductis palpebris, vnguem hamulo modice inflexo exceptum attollimus. A cum vero, pilum equinum, aut linū validum ducentem, ac paululum inflexam per summa ad vnguis dimidium traicimus. Et lino quidem vnguem deligatum sublimem eleuamus, pilo autem partem pupillæ proximam desecantes, usque ad extremum excoriamus. Reliquam partem maiori angulo vicinam scalpello futuris dicato ex basi abscondimus, ita ut anguli carunculam relinquamus, ne ea ablata, humor postea semper descendat, rhyada Græci vocant. Aliqui lino vnguem eleuatum ut diximus, scalpello in id accommodato, totum illum excoriant, cauentes ne a cornu dictâ Ceratoidem tunicam attingant. Post manus administrationem momento salis in leuiorem detriti loco iniecto, lanam ouo imbutam illigabimus. Ab huius solutione, muriam ipsis liberaliter instillabimus. Si inflammatio subsecuta fuerit, ad eam inscriptis auxiliis succurremus.

X 3

agrotis
medean
tur, ma-
gica pr
sus dimi
teat. Ae
grotis ve
ro cōsu-
lo, phar
macopo
las &
circūfo-
raneos
cōs ne
itromit-
tant. sed
odio ip
sos pene
detestabi
li profe-
quatur.
Præte-
rea neq;
astrolo-
gos neq;
hariolos
de exitu
morbi
potius
cōsulant
quā do-
ctos me-
dicos.
Ala po-
tius ver-
teret q̄s
piā, q̄a
diceret
ὀνόμιον
& non
πτερύ-
γιον.

PAULI AEGINETAE.

De staphylomate.

Cap. xix.

Staphyloma est tunicæ Ceratoidis, vna cum rhagoidi, debilitatæ, aut vitio defluxionis, aut exulcerationis, eleuatio. Ad mouemus autem huic vitio manum, non vt visum abolitum restituamus (nam id fieri nequit) verum vt moderatum ægrotanti decorum conciliemus. Itaq; acu ab inferiore parte sursum per basim staphylomatis traiecta, deinde alteram acum duplex linum ducentem ab angulo qui ad manum spectat ad alterum per basim staphylomatis transmittere oportet, manentemq; primam acu, duplici lino amputato, staphylomatis aliam partem sursum, aliam deorsum filis deuincire, atque tunc acu detracta lanam oui liquore imbutam imponere. Post solutionem blandis infusionibus oculum lenire, donec fila simul cum staphylomate decendant.

De oculis purulentis, qui hypopyi dicuntur.

Cap. xx.

oculus
ante oia
maiorē
diligentiā
requirit,
quia vt
Sol luce
sua com-
plet atq;
collu-
strat vni-
uersum,
ita oculus
purus ac lu-
cidus cla-
rificat to-
tum cor-
pus ani-
mantis.

De oculis purulentis Gale. verba apponere abunde est, quæ in eodem modum habent. Nostra ætate medicus quidam ocularius cognomento Iustus, etiam concussione capitis plerosq; hypopyos persanauit. collocans enim eos in sella rectos, ac capita ipsorum vtrinque a lateribus comprehendens, mox quatibat adeo vt pus ipsis descendere palam videremus. mansit autem deorsum propter grauitatem substantiæ, tametsi hypochymata nequaquam manerent nisi quis admodum diligenter ea infarxisset. Ac progressus iterum idem Galenus (inquit) frequenter autem multum simul puris vacuauimus tunica eadem diuisa quæ cornus speciem refert, paulo supra locum quo vniuersæ inter se tunicæ committuntur. nominant autem locum Græci nunc irim, nunc Stephanem hoc est coronam. Hoc quidem Galenus in commentario de morbis curandis prodidit. Cæterum post puris euacuationem, vlcus ex mulla aut scœnugræci succo, melle addito infusionibus repurgantes, deinceps reliquam purgationem accommodabimus.

De suffusis.

Cap. xxi.

Suffusio, ociosi humoris in cornea membrana iuxta pupillam cœcretio est, quæ visum impedit, aut certe ne clare oculus cernat, efficit. Accidit potissimum ex perfriktione ac imbecillitate spiritus visorii, eoque senes magis & longo morbo confectos inuadit. fit etiam ex vomitu violentius concitato & ex ictu, aliisque pluribus de causis. Verum de iis suffusionibus quæ nondum radices egerunt, nullam manus administrationem requirentibus, tertio libro comprehensum est. In hoc autem eas quæ iam confirmatæ sunt & ex toto concreuerunt, notis suis describemus. Omnes igitur suffusione laborantes lucem vident aut multam aut paucam, eoque discrimine suffu-

suffusiones ab hebetudine & glaucomate separamus, tum eo quod hebetudinem & glaucoma experti lucem omnino nullam cernunt. Rursus igitur Galenus docebit te suffusionum & concretionem & differentiam, item quomodo his manu mederi cōueniet. Oculus suffusione tentatus concluditur, & palpebra magno digito ad oculū premitur, eiq; adducitur, simulq; hac illac exprimitur, deinde oculo aperto & mente ei adhibita suffusionem conspiciamus. In iis enim quibus humor nondum coaluit, fusio quædam ex digiti impressione oboritur ac primum latior apparet, rursus in suam & figuram & magnitudinem reuertitur. At in confirmatis suffusionibus nulla immutatio nec latitudinis nec figuræ ex impressura obuenit. Quoniam vero commune hoc est indicium & eorum in quibus modice, & illorum in quibus supra modum humor concreuit, colore ipsos discernemus. Nam si ferri aut marinæ aquæ aut plumbi colorem suffusio habeat, moderate coaluit, & ad educationem idonea redditur, si vero gypso et grandini similis color suffusionis est, supra quam par est concreuit. Sed quia hæc a Galeno didicimus, collocato ægrotante aduerso lumine citra solem, oculum sanum accurate deligabimus, & diductis alterius palpebris recedemus ab iride appellata ad minorem angulum, quantum specilli cuspis spatii continet, atq; tum punctorii stili mucrone locum designabis quem puncturus es, in sinistro quidē oculo dextra manu functionem obiens, in dextro autem sinistra. Atque inuersa punctorii specilli acie quæ ad extremum rotunda est, valenter impingimus, & partem designatam vsq; ad vacuum intus sinum penetramus, idq; tam alte fiet, quam pupilla ab iride nuncupata distat. Ex superiori igitur parte vertici suffusionis stilum punctorium adigentes, (videtur autem conspiciue ferrum, quod tunica cornea pelluceat) humoris colluuiem per ipsam in subiecta loca deriuabimus. Et si protinus educta fuerit, sistemus quiescentes paululum, sin autem recurrerit, rursus ipsam deducemus. Euacuata suffusione, stilum tollemus, leniter circumuertendo. Post hoc oculo aqua eloto pauxillum salis cappadocici instillabimus, lanamq; oui luteo cum rosaceo madefcentem impositam deligabimus, ita vt sanum quoq; oculum comprehendamus, ne vna commoveatur. Cæterum collocantes ægrum in domuncula subterranea iubebimus prorsus ipsum conquirere, tenui vti victu, ad usq; septimum diem illigatum, nisi quid prohibeat. Post hunc solutis ligaminibus visum experiemur, ostendentes ei res quasdam visibiles, quod dum manu curamus, aut postea, fieri dissuademus, quod ex continuo nimium intuitu prompte rursus suffusio repleatur. Si inflammatio vrgeat, etiam ante septimum deligatura soluta, aduersus hanc pugnabimus.

PAULI AEGINETAE.

De ægilope.

Cap. xxii.

Aegilops, tumor est abscessorius inter maiorem angulum & nares proueniens. Vix curationem admittit, tum partium tenuitatis causa, tum periculi, ne oculus cōsortii lege indoleseat. Si igitur per summa ruptus fuerit abscessus, totum id quod eminet vsq; ad os excidendum. Et si ad malas subluuies deciderit, totam ipsam explicabimus. os autem cariem nondum sentiens, rademus. Quod si iam carie vexatum est, ferro candenti acuto ac in cuspidem abeunte, aduremus, spongia frigida madente, oculo imposita. Sunt qui post carunculæ excisionem terebra vsi, humorem, aut pus in nares deriuarint. Nos autē satis habuimus eousq; solum ferramētis ad ægilopem accommodatis adurere, vt squama abscederet. Ab vstione lenticula melle adiecto quod phacomeli vocant, vel malicorio cum melle reliquisq; siccantibus præsidiis vtemur. At si ægilops serpat ad angulum, summaq; inuadat, nequaquam tunc scalpello, quo aut pterygia, aut venas secamus, media anguli parte ad abscessum resoluta, carnes ex alto eduemus, item mediocriter desiccabimus. Vitri autem puluis tenuissimus ipsis insparsus, mirabiliter desiccet. Ad hæc aloë similiter cum fuliginethuris. Reliquam uero Aegilopum medicinam, tertio libro sumus executi.

Si meatus auditorii non perforati sint. Cap. xxiii.

Hic affectus a prima natali die cōtrahitur, mēbrana quadam auditorium meatum obstruente, nunc per summa, nūc in alto. postea accidit præcedente in audiendi meatu exulceratione, siquidem caro supernascens ipsum occludit. Itaq; si membrana auditum impediens alte in hærescit, difficilis erit administratio. Tentandum tamen est, tenui quodam instrumento ipsam incidere. si in summo fuerit, scalpello quod Græci scolopomachæion appellāt, hanc diuisam, vbi vsus exigat, etiam auferemus. At si caro supercreuerit, hanc pterygiis apto scalpello aut specillo polypis idoneo tollemus, deinde tortile linamentum ex viliore panniculo, spatioso meatus sinui aptatum aqua imbue mus, inuolutumq; chalcitide læuigata, aut huiusmodi quodam arido in meatum demitemus, ne rursus caro enascatur. Si inflammatio male habeat, protinus id auferemus. Si fundat sanguinem meatus, spongiā aqua frigida imbutam imponemus. aliisq; convenientibus vtemur remediis.

Ad ea quæ in meatum auditorium inciderunt extrahenda.

Cap. xxiiii.

Solet etiam in aurem incidere, non modo calculus, sed etiam vitrea, Sfaba, & siliquarum grana. vitrum itaq; & calculus suam seruant magnitudinem, fabæ autem, & siliquarum grana, aliaq; id genus, na-

quibusdam poros meatusq; nō solū aurium sed vuluæ scemina rū oris. & sedis ostiolū tā in fœminis q̄ in masculis nonnunq̄ coalescere ac sæpius membra quæ

turali corporis madore inflata, maximos cruciatus mouent. Conuenit igitur vel auriculario specillo, vel hamulo, vel vulsella hæc extrahere. Aut violenta capitis concussione, aure super circulum quædam imposita. Iam vero calamo hæc subinde extraximus, exurgentes etiã aquam auribus illapsam similiter, cera calami ambitum, qui auri iniicitur, obstruentes ne spiritui vsquam sit exitus. Calculos, & eius generis corpuscula, eduximus specillo lana inuoluto & in resinam terebinthinam, aut aliud quoddam glutinans demisso, eoq; in meatum auditorium coniecto leniter. Sin ista nihil proficiunt, medicamento quod sternutamentum prouocet, naribus indito, os & nares obturato. Si ne horum quidem nulli cesserit prius quam inflammatio, conuulsio, & omnino periculum fuerit subsecutum, manu, & ferramentis ipsa auferemus, figurabitur itaq; ægrotus, vt auris auersa sit ad basim ipsius post appellatam fibram, & lunata vtetur diuisione exigua, auersaq; specilli parte corpusculum quod infidet, eximemus. Hoc ablato vulnus futuris committemus, & medicaminibus ad crueta in scriptis vtetur.

De polypo.

Cap. xxv.

Polypus tumor est præter naturam in naribus oboriens, ex marini polypodis similitudine nomen sortitus, tum quod illius carnem repræsentet, tum quod suo complexu quemadmodum ille, captantes vlciscitur, nares ipsorum comprehendens, ita & vitium hoc laborantium nares obstruit, id efficiens vt & difficulter respirent, & sermonem ægre exprimant. Duri igitur polypi, tactui renitentes, liuidi, & maligni, ceu canceri naturam induentes, attingi non debent. Molliores autem, laxos, stupidos, neq; maleficos scalpello curare tentabimus. Figurato homine in sedili aduersus solis radios, & narium meatu sinistra manu explicato dilatatoq; spatula ad id facta in myrtacei folij modum acuta orbiculatim polypum, aut carunculam dextra præcidemus. illic acie ferramenti imposita, vbi naribus coaluit, secundum hæc instrumento in oppositum conuerso, manubriolo ipsius, succisam carunculam foras eximemus. Et si quidem purum naris meatum viderimus effectum, ad curationem descendemus. Sin reliquæ aliquæ polypi superfuerint, alterius cultelli rasorii acie relictum corpus cum tensione, agitatione, & rasura valenti auferemus. Malignos & peruicaces polypos candentibus ferramentis adurere consilium est. inde remediis vstioni dicatis vti. Postquam ferro satis effectum, spongia detergemus, ac poscam, aut vinum in nares fundemus. Et si humor per palatum in fauces euaserit, bene se habent munia scalpello obita, sin minus permeet, nota est carunculam polypi osibus a colando ethmoidibus dictis insidere, aut supremis narium partibus, quam instrumen-

dã inueter
sa orri
adeo vt
opẽ me
dicatorũ
expe-
ctent, in
iij. de
gener.
aial scri
ptum re
liquit
Aristot.
idemq; i
vii. de hĩ
sto. aial.
testatur.

nomina
morbo-
rũ tum a
plantis,
tum ab
aialibus
tũ ab in
strumen
tis, tũ ab
hoĩbus
ducunt.

PAULI AEGINETAE.

ta non comprehenderint. Linum igitur mediocriter crassum funiculi instar, ceu duorum triumve digitorum longitudinis in nodos constitutum, per specilli duplici cuspidē præditi foramen transmittemus, alterumque extremum specillo per nares sursum ad meatus colatorios inseretur, idem per palatum, & os eicientes utraq; manu extrahemus, tanquam carunculas nodis desecantes. Deinde funiculari linamento meatum diductum habentes post triduum pastillo musæ, & consimilibus, reliquias absumemus simul & locum exiccabimus. Postea vero pastillis cicatricem ducentibus utemur, plumbeos canaliculos naribus, si opus sit, per totam curationem accommodantes.

Curta in auribus, & labris quomodo sarciri possint, Græci vocant colobomata. Cap. xxvi.

Curta igitur in auribus aut labris, colobomata Græci vocant, hæc ratione curantur. Primum cutis ab inferiori parte soluitur, mox oræ vulnerum contrahuntur, ac id quod in callum coaluit, aufertur. Dem futuræ illis iniici debent, & conglutinantia.

De epulidibus, & parulidibus. Cap. xxvii.

Epulis carnis tuberculum est iuxta dentium aliquem in gingivis oriens. Parulis exiguus abscessus est, gingivas infestans. Epulidem itaque vulsella, aut hamulo eleuatam præcidemus. Parulidi in orbem exactæ linamenta inserimus. Vidi autem subinde scalpello, quo venas secamus, ipsam duntaxat punctam, & pure vacuato confanuisse. post ferrum, vino collui præcipimus. In sequenti die mulla, tertio Antheron, pulverem vulnere inducimus usque dum curatio finiatur. At putredo gingivis oborta si congruis medicamentis non curetur, candenti ferro ipsam aduremus.

Quomodo dentes eximantur. Cap. xxviii.

Dens qui eximetur usque ad receptaculum suum circumradi debet, inde forfice paulatim concussus, extrahitur. At si exesus est, id foramen tenui linamento primum replendum est, ne constrictus sub forfice confringatur. Eo exempto, sale tenuissimo insparso relictas carunculas consumemus. Postea vino, aut posca os colluetur dum convescat. Quoniam vero superflui nonnulli dentes enascuntur, eos qui receptaculo adnati coaluerunt, scalpbris excindemus, qui non coaluerunt, forfice tollemus. Sin autem dens aliquis excreuerit, aut etiam contractus fuerit, nonnunquam limula, id quod excedit, superfluumque in eo est, deteremus, adiectasque ipsis, ut verisimile est, squamas averso scalpello, aut rasorio, aut lima perpurgabimus.

De ligatione linguæ quod ancyliōn dicitur. Cap. xxix.

Ligatio linguæ quæ ancyloglosson Græcis appellatur, alias naturaliter accidit, membranis durioribus magisque a prima origine

minutis linguam continentibus, alias ex acquisito ob cicatricē quā-
piam duriorē sub ipsa ex vlcere contractam. Qui igitur ex natu-
ra hoc vitii habent, eo quod tarde sermonem explicare incipiunt &
vinculum sub lingua iusto magis appareat, ex ulceratione non praece-
dente, cognoscuntur. Qui vero ex acquisito, cicatricem manifesto
conspiciam habent. Collocari igitur debet ægrotus in sedili ea figu-
ra vt linguam ad palatum suspendeat, & nerueum illud vinculum
transuersa plaga incidetur. Quod si ex cicatrice aliqua ligatio proue-
nerit, ea hamulo transfixa callum sursum extrahemus, ac laterali fa-
cta diuisione ligationem soluimus, cura adhibita ne particulas alte la-
tentes incidamus. Nam sanguinis profusio quæ fisti nequeat, frequen-
ter inde secuta est. Post hæc aqua frigida aut posca vulnus debet elui,
deinde medicina vtendum quæ relaxet & carnem inducat.

De tonsillis.

Cap. xxx.

QUemadmodum glandulæ scirrho induratæ, strumæ appellan-
tur, ita etiam tonsillæ inflammationem expertæ, & supra natu-
ralem modum auctæ, & veluti desiccata, deuorationi spirationiq; ne-
gotium exhibentes, e regione vtrinque sibi inuicem oppositæ, eodem
partis vocabulo, tonsillæ, Græce antiades vocantur. Quibus cum
adeo inflammatio, scalpellum ad mouere cautio est. Vbi illa modice
conquerit, manum admoliermur, præsertim albis, contractis, angustis
basi firmatis. Nam humiditate flaccescentes, rubicundæ, amplam ba-
sim habentes, facillime sanguinem profundunt. Collocato igitur ho-
mine aduersus Solis lumen, iubebimus, vt ore hiet, ministro caput cō-
tinente, alteroq; linguam spatha ad id facta quam Græci glossocato-
chon appellant, inferiori maxillæ apprimente, nos hamulo per ton-
sillam traiecto, etiam quantum licet ipsam attrahemus, ita vt non me-
branas simul euellamus. Deinde totam ipsam ex basi amputabimus
scalpro ligationi dicato, ἀγκυλότομον nuncupant. Sunt enim duo eius
modi instrumenta, aduersos acie inflexus habentia. Postquam vna
fuerit succisa, ad alteram eodem modo vice conuersa veniendum est.
Functione scalpello obita, æger ex aqua frigida, aut posca gargariza-
bit. At si profluuium sanguinis eueniat, etiam rubi & rosarum, myr-
tici diluto egelido vtetur. Si vero copia sanguinis prorumpat, plan-
taginis & symphyti succo, item ex electo, pastillo & lemnia sphra-
gide posca soluta os collui debet. Cessante autem profluuiō, proxi-
mo die, rosarum flore, croco & amylo cum lacte perungentur ex
aqua, vel oui liquore candido, vel hydrorofato. Si sordes vlceribus
increuerint, etiam ex melle & collutiones, & illitus commode ad-
hibentur.

PAULI AEGINETAE.

De vua.

Cap. xxxi.

Gurgulio tanquam aliquod vocis plectrum subinde destillatio-
nem a capite recipit, idemq; præter naturam auctus, si oblon-
gior, tenuisq; fuerit, Columella nūcupatur, si vero crassior ab ima par-
te, & rotunda, Vua dicitur. vtrunq; autem nomen a similitudine fa-
ctum est. Si igitur vniversalibus, nempe & per sanguinis dimissio-
nem, & medicamento adhibitis vacuationibus non abigatur, neque
etiam remediis loco admotis, quæ astringant, repellantq;, vel etiam
discutere possint, cesserit, ad scalpellum veniemus, ne continuo irrita-
tu, tus sis, vigilæ, interim etiam strangulatus subsequatur. Quæ igi-
tur contractæ sunt, rotundæ, non oblongæ, cruentæ, vel subnigræ, non
attingi scalpello debent. Tenuēs autem, oblongæ, per summa graci-
les muris caudæ modo, remissæ, sanguinolentæ non admodum, sed al-
bicantes, ex curandæ sunt. hæc siquidem protinus inflammatione libe-
rantur. Id autem ex vua præciditur, quod præter naturæ modum emi-
net. Etenim si ad finem illa præcidatur, extremam omnes thoracis
regiones noxam percipiunt, & vox intermoritur. Itaque figuratur
ægrotus in sedili contra Solis lumen, iubeturq; magnum hiare. de-
inde vulsella, aut forfice quod superuacuum est prehensum, inferioriq;
parti adductum scalpello vuis aut suturis accommodato, præcidimus.
inde quæ in vasorum sectione comprehensa sunt, agemus. Sæpe ve-
ro, aut propter laborantis timorem, sanguinis profluvii metum, me-
dicamentive siccitatem ferrum vitantes, adurente potius medicamen-
to hanc absumimus. Conuenit igitur medicamento adurente quod in
palpebrarum vstione dictum est, aut eius generis alio, vux vstæ sinus
implere, ac homini magnum hiare iussu lingua per famulum forfice
constricta, instrumento adaperto tantam vux partem comprehende-
mus, quantam etiam sumus amputaturi. Cæterum spissitudinem me-
dicamentum habebit neq; liquidam, ne diffluens ab vua deceret, subie-
ctas autem partes adurat, ob quod ægro interdiciamus, ne per totum
vstionis tempus deglutiat, neq; omnino duram, quo facilius vux inci-
dat, & si ex vno ipsius iniectu summa vux pars uigruerit, abunde est
sin minus, etiam bis vtemur, ægro per totum administrationis tēpus
inclinante ore, in terram, vt salua eliquesceus simul cum medicamen-
ti particulis extra os euadat, siquidem hora vna emoritur, excidit au-
tem tertio, quartove die. Secundum vstionem, lana molli aut suppa
indice digito inuoluto quæ gurgulioni circum adhærescunt, exerce-
mus, vel etiam aqua os collui iubebimus. At ceruicis regionem fo-
mentis ex chamæmelino tum in his, tum in illis quibus tonsillæ ad-
emptæ sunt ex consortii lege adiuuabimus. Ad hæc gargarizationi-
bus, & perunctionibus similiter vtemur.

Quomodo spinæ gutturi eximantur.

Cap. xxxii.

Deuorantur subinde inter edendum spinæ, aut piscium, aut aliorum quorundam, diuersis in partibus. Quæ igitur in conspectum veniunt, vulsella, quam Græci proprie appellant acanthobolon, eximemus, quæ inferius ad ipsas fauces peruenerint, alio modo. Sunt qui dicant maiores moles esse deuorandas, vt, caulem lactucarum, aut buccellam panis. Alii vero spongiam puram mollemque exiguae magnitudinis lino illigatam deglutire iubent, linoque apprehenso retrahi, idque frequenter efficere vt spina impacta spongiæ educatur. Leonides autem iubet cataplasmatibus vt, quæ concoquant, cuiusmodi ex cruda ordeï farina conficiuntur, quo spina in pus redacta sua sponte excidat. At si eadem hora aut etiam ante ventriculi concoctionem in ægrotum inciderimus, eo quod infixum est nobis non conspicuo, vomere iubebimus digitis aut pinnis in os dimissis. Nonnunquam enim, id quod est infixum vna cum vomitu educetur.

Quomodo aspera arteria incidi debeat.

Cap.

xxxiii.

Chirurgicorum præstantissimi hanc quoque administrationem sceleris prodiderunt. Antyllus itaque hunc in modum scribit. In synachicis quidem, vt in ea parte dicetur quæ victus rationem tradit Chirurgiam improbamus, cum inutilis sit præcisio, in quibus omnes arteriæ & pulmo affectus est. In ore autem & mento inflammationem experiuntibus, aut etiam tonsillis, asperæ arteriæ os operientibus, in columi sane ipsa arteria, ratio est sectione vt, quo periculum strangulatus euitetur, deinde cum infra arteriæ caput spatio trium ipsius quatuorve circulorum manum adegerimus, partem nonnullam ipsius arteriæ scalpello pertundemus, totam enim diuidere securum non est, tum quod hic locus excarnis sit, tum quod vasa procul a loco diuiso sint disita. Itaque inclinato ægroti capite retrorsum, vt arteria redatur conspicua, transversam lineam incidemus, inter duos circulos ipsam ducentes, ne cartilago, sed membrana cartilagine colligans, discindatur. At si meticulosior aliquis inter agendum fuerit, hamulo prius cutem eleuatam diuidet, deinde sic ipsi arteriæ incidens, vasis, si forte occurrant, præteritis, lineam ducat. Hæc quidem Antyllus dixit, Coniiciens arteriam scalpello esse penetratam, inde quod spiritus per eam cum murmure quodam erumpat, tum quod vox intercisa sit. vbi vero de strangulatu metus amplius non est, oras vulneris renouabimus, mox suturis committemus, ita vt solam cutim citra cartilaginem suamus, vt murque medicamento quod eruentis facit. Sin minus conglutinetur, præsidio quod carnem inducat insistemus. Simili vero curatione vtendum etiam si quis nobis obtigerit qui mortis desiderio

PAULI AEGINETAE

iugulum sibi inciderit.

De abscessu.

Cap. xxxiii.

Quod abscessus carniū, vel partium carnosarum corruptela mutatioq; sit, quomodo generetur, quotq; eius sint differentiae, quanto libro abunde tractatum est. Nunc autem quemadmodum manu scalpelloq; i medendum sit, exponemus, cum omnino in pus transierit. Hoc autem deprehendimus inde quod dolores, febris, si praecesserit, rubor, pulsus & reliqua inflammationis signa minora tunc appareant. vbi iam tumor in acutum fastigiatus est, & pus digitis innixis occurrat, praesertim cum summa occupat abscessus, tunc ad scalpellum veniendum est. Si vero neq; ad tactum occurrat, neq; fastigietur, eo quod in alto delitescat, aliis mutationis notis attendentes, manum ad moliemur. Sciendum vero est crudos interim ipsos priusquam ex toto in pus mutati sint, incidi, si aut articulis, aut principibus particulis vicini sint, ne ligamentum, aut aliquod eis necessarium assidua putredine pariter contabescat. Porro abscessus ano proximos crudos antequam in totum ematuruerint, dissecari Hippocrates praecipit, veritus ne perforationem experiantur. Inciduntur ergo non omnes simili linea, sed naturali quidem, vt in fronte, & pilosis locis, vt in capite, cura decoris quantum licet, habita. Recta vero linea artus secamus, veluti in musculis, diligentiam adhibentes ne & nervos & arterias & principales particulas attingamus, interim in rectum, interim transversim abscessu prout cuiusq; usus exigit, diuiso. In minoribus vnam scalpello sectionem molimur, in magnis plures, iuxta amplitudinis rationem vbiq; ea quae tenuiora sunt & effluxioni idonea, incidentes. Illos sane abscessus qui plurimu fastigiantur, crudi, tenues, & emortui sunt, praecidimus trianguli, aut myrtacei folii, aut alterius anguli figura, cum circularis ad cicatricem recipiendam sit in idonea. Qui vero non in fastigium attolluntur, eos simplici duntaxat linea dissecamus. At vbi magnum sinum inuenimus, si cutis superiniecta carnosa sit, & queat coagulari, diuisione loci ea duntaxat vtemur, quae humoris effluxui conueniat. Sin tenuis, admodumq; ex carnis, totam in longitudinem simpliciter dissecabimus, & post simplicem diuisionem si corpora vtrinque sita gracilia valde & non carnosa videantur, ipsa tollemus. Administrato iam scalpelli munere, spongia locus abstergi debet, si paruus, est abscessus, vnaq; diuisio, simplex linamentum inferemus. Si magnus est & plures incisae lineae, implicitum aliquod in longitudinem linamentum, lemniscum Graeci vocant, ipsis demittimus, ipsas similiter plagas linamentis replentes. Quod si erumpat sanguis, aqua frigida, aut posca vtendum. si ita non substiterit, chalcididis pollinem inspergemus, eoq; frequenter ob flaccidam humore pu-

quia ner-
ui & ar-
teriae in-
cisae nun-
quam coa-
lescere
videtur.

credinem vtemur. Splenia si hyems est, et partes sint nervosæ, oenelæ ambuta deligabimus, si æstas, & partes carnosæ, aqua cum oleo, aut ipso quoque vino cum vino frigido tincta illigataque sequenti die eisdem liquoribus superfundemus. Post tertium diem ubi soluerimus, spongiaque deterferimus tetrapharmaco quod in linteola illinitur, vtemur. Si inflammatione caret vomica, idem fomentum & medicamen linamentis illitum accommodabimus. Si inflammatio adest, cataplasma, quod concoquendi vim habeat, iniiciemus, superfusionibus antea usi, ubi cessauerit inflammatio, medicina quæ pus maturet, & carnem inducat, medebimur. Cæterum sinus, glutinantibus remediis, vltimo quarto volumine de sinibus comprehensum est, curabimus.

De strumis.

Cap. xxxv.

Struma quæ græce chœras dicitur, glandula est indurata, in ceruice, alis, & inguinibus potissimum enascens. Nomen habet a chœradis petris, aut suibus, quod numerosæ sobolis existant, aut quod colla habeant glandulosa. Oriuntur autem strumæ in priori ceruicis parte, aut in altera, aut vtrunque vna, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, atheromata, & melicerides. Quæ igitur indolent tactu, & medicamentis impositis deteriores redduntur, malignæ sunt, quas etiam Carcinodas aliqui dixerunt, notumque est omnibus ipsas curationi quæ manu fit, non cedere. Morigeræ autem ac blandæ tum tactui, tum congruo medicamentorum vsui, hoc modo tractandæ sunt. Superficialiæ igitur, & in cutem erumpentes, simplici linea diuisæ, ab incumbenibus dissoluntur, orarum cute hamulis distenta, membranæ liberantur, vt in vasorum confectione, quam angiologiam vocauimus, expositum est, ac paulatim eximentur. Maiores autem strumas hamis transfixas suspendemus, & similiter excoriatæ corporibus eas continentibus vndiquaque liberabuntur, animo adhibito ubique, ne arteriæ, quas carotidas vocant, & nerui recurrentes violentur. At si vas aliquod diuisum opus obscuret, funiculo id excipietur, vel per medium amputabitur, nisi magnum fuerit, ubi in arcum strumæ basis venerit, dextre ipsa præcidetur, ac indice demisso tentabimus num & aliæ sint strumæ adiectæ quæ eodem modo auferentur. Quod si magnum aliquod vas aut etiam plura subinde iuxta strumæ fundum esse suspicemur, non ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere conuenit, quo particulo latim citra periculum sua sponte excidat. quo tempore medicamentum in linteola illito, curatio tentabitur. Si vero inde excindatur, oras committemus, omnino autem rectas diuisiones adhibere oportet. Atque si nihil superuacuum habuerint, inde futuris iunge-

PAULI AEGINETAE

mus. Sin ex strumæ tumore cutis redundet, parte ipsius myrti instar ablata, suturis utemur, & medicamen cruentis aptum iniiciemus.

De steatomatis, atheromatibus & meliceridibus. Cap. xxxvii.

HAec quoque in abscessuum genere comprehenduntur, sed hoc discrimine ab illis variant, quod abscessus proprie dicti inflammationem doloremque testentur, & acrem humorem, ac rodentem contineant, nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi. Cæterum illa inter se quoque differunt, quod humor in steatmate contentus, sicut appellatio ostendit, seu sit per similis. In atheromate, pulti frumentaceæ. In meliceride, humor meli repræsentet. Agnosces ipsa hunc in modum. Steatoma aliis durius est, tactui renititur, & basim habet solidiorem. Meliceris laxi cuiusdam corporis modo subsidet, & tarde quidem funditur, cito autem rursus succrescit. Curantur hæc quemadmodum strumæ, incisione, ex coriati, suturis & reliqua curatione, id solum cauendo, ne membrana vulneretur, unde humor qui continebatur, profusus operationem impediat, & ne pars ipsius relinquatur, nam renascendi occasionem plerumque in brachiali, talo & articulamentis motui dicatis exhibet, quemadmodum etiam struma vel tota, vel portio ipsius relicta, quod si huiusmodi quippiam fuerit deprehensum, satius est non suere, sed exedentibus medicaminibus reliquias absumere.

De aneurysmate.

Cap. xxxviii.

Aneurysma tumor blandus tactu est, digitisque cedit, ex sanguine & spiritu contractus. Galenus de eo hunc in modum scribit. Arteriae apertæ affectus, aneurysma vocatur. Fit autem eadem quoque contumeliosa, quoties incumbens ei cutis cicatricem quidem contraxerit, maneat autem arteriae vulnus, dum nec coaluerit, nec carne fuerit obstructa. Agnoscuntur huiusmodi affectus arteriarum pulsu, imo et prementibus nobis tumor omnis evanescit, substantia quæ ipsum efficit, in arterias recurrente. Hæc quidem Galenus. Nos autem ipsa aneurysmata hoc modo inuicem discernimus. Quæ ad aperta arteria fiunt prolixiora apparent, & in alto constituuntur, digitisque impressis ceu strepitus quidam exauditur, cum nullus sonus in iis quæ rupturæ feruntur accepta percipiatur, illa vero rotunda magis sunt, & per summa occurrunt. Quæ igitur alas, inguina & cervicem infestant, aliaque loca, ex imæ magnitudinis aneurysmata, curare propter vasorum amplitudinem non tentabimus. Quæ vero summas partes, artus vel caput affligunt, hac ratione aggredi convenit. Si quidem ex aneurysmate tumor obuenerit, cutem linea recta in longum incidemus, deinde hamis ductæ oræ sicut in vasorum dissectione dictum est, excoriantur, & scalpellis quibus membranæ auelluntur circumpurgata arteria

teria nudabitur, acu traiecta duobus funiculis deligabitur, puncta prius arteria scalpello per medium, ubi cum ambienti membrana unita fuerit, curatione pus maturante utemur usque dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteriae creatum sit aneurysma, totum id quatenus fieri licet, cum cute digitis apprehendendum est, deinde acu duplex linum trahente, inferius eo quod exceptum est transeundum. Et post acus traiectu ansulam forfice praecipere oportet, atque sic duobus filis hic illic tumorem deligare veluti in staphylomate comprehensum est. At si metus sit ne fila circumvolantur, altera etiam transmittenda est acus per totum quae priorem premit similiter duo fila deligamus, vel tumorem per medium adaperto post excretionem, cutem adinemus, eam quae ligata est relinquentes, ac splenium ex vino, & oleo imponentes, remediis in linamenta illitis utemur.

De asperae arteriae tumore qui bronchocele dicitur.

Cap. xxxviii.

GRandis in ceruice, & rotundus tumor fit, nomenclaturam ab internis partibus sortitus. Duplex eius tumoris differentia est. alius enim adipe tumet, alius partium illarum dilatatione accidit. Atque hunc notabimus veluti & aneurismata, desperatumque fugiemus, non aliter ac vniuersa aneurismata quae periculosam habeant administrationem, praecipue vero quae circa ceruicem oriuntur, ob arteriarum magnitudinem. Qui adipe inturgescit, ita ut steatomata curari debet, discretis, praeteritisque valis, eo nimirum modo quem in strumis ex posuimus.

De gangliis.

Cap. xxxix.

Ganglior, nervi est in nodum concretio, ex ictu, aut labore proficiscens, plerumque vero in manus iunctura, qua cum brachio committitur, talo, & articulationis absolvitur, quamquam, in aliis quoque partibus proveniat. Hae comites sunt notae, tumor, concolor, renites, indolensque. At si violenter premas, stupidum sensum experitur, non in alto, sed ipsa sub cute radices agens, & ad altera quidem transferri potest, si autem vi adigas, tum ante, tum post, nequaquam potest. Quae igitur in cruribus aut brachiis aut summis partibus oriuntur, ex cindere tutum non est, periculum enim ne particula reddatur mutila. At quae caput aut frontem inuadunt, cute scalpello diuisa curamus, & si quidem parua fuerint, vulsella comprehensa ex basi praeciduntur, si maiora, hamis transfixa excoriataque tolluntur, oras suturis commissas, medicamento ad cruenta apto persanamus.

De venae sectione.

Cap. xl.

ET si omnibus satis constet, quomodo vena incidi debeat, tamen

is autem tumor, ut peripatecis placet, ex humore infuso oritur. causa est, quia in arteriis spirituales aurae dominantur. spiritus autem ab humore est. ob idque et congelare ipsam decet Arist. in libello, qui de spiritu inscribitur.

PAULI AEGINETAE

venæ au ne parti chirurgicæ aliquid desit, & propter artificiosas ipsius distin-
tem ab ctiones, omittendum non est. Primum itaq; venæ sectionis consiliū
arteriis est, ut sanguis qui redundat, euacuetur. Copia vero ipsius duplici mo-
diligenter do capi demonstrata est, vno ad vires, venæ licet planæ non appa-
ter di reāt, in quo statu, homo protinus imbecillis ac inua idus redditur, na-
gnosci tura ceu ad graue aliquod onus ferendū impotente. Altero, vasa quæ
debent, id continent, in alia loca pondus transfundere spectantur, & si virtus
qd' ipsæ haud cum molestia ipsum toleret, in quibus ruptis interdum venarum
inter se i- commercijs, sanguinis sputum, aut aliæ fluxiones accidunt. Copiæ
plexæ igitur, quæ ex viribus æstimatur, corporis grauitas, nota est. Vena-
sunt. hæ rum copia tum extensione, tum quod illæ plenæ tument, agnoscitur.
nanq; de vtraq; autem, vacuationem necessariam indicat. Itaq; primo quoq;
ferunt spi die sanguinem vsu id exigente demittes, sola in ventriculo ciborum
ritus. illæ concoctione, aut etiam perfecta in iocinore sanguinis elaboratione
vero toti expectata. At si inter initia ob causam aliquam sanguinis detractio
animanti prætermissa fuerit, vel vltra septimam eum mittere alienum non est,
sanguinē si necessitas postulet, & vires non dissuadeant. Cæterum qui venam
submini- incisurus est, id habet inspiciendum, num multa stercoreis retentio
strant. aut intestina vrgeat. Quod si ita deprehensum est, molli clystere alius
quoque antea vacuari debet, ne venæ putridam aliquam excrementorum col-
Aristo. luuiem ab intestinis attrahant. his igitur qui ob morbi necessitatem,
τὰς φλέ- sanguinis detractiōem requirūt, quouis tempore venam incidemus,
βαίς καὶ si particularium duntaxat in febribus accessionum vigorem seu sta-
τὰς ἀρ- tum excipiamus. At si continuens febris extiterit, matutinum omni-
τερίας no tempus magis idoneum est. Qui vero nullo morbo vrgente, sed
σπυγ- præcauendi illius gratia sanguinis vacuationem postulant, his ver
παιv opportunum est. Porro in ætatibus vsq; ad quartumdecimū annum
εἰς ἀλ- sanguis mitti non debet, sicut etiam post sexagesimum, nisi necessitas
ἀλλας. quædam ineuitabilis huc nos compellat. in summa, imbecillis viri-
Membra bus præditi, hanc vacuationem vitabunt. Cæterum in particulis re-
autē oīa cens inflammatione tentatis, ex opposito inanitionem moliri conue-
principa nit, in vetustioribus, ex propinquo, siquidem ex multis corporis par-
lia habe tibus sanguinem mittemus, frequentius autem ex interiori cubiti ve-
re arteri na. Verum id considerandum venit, interiori & alariæ dictæ venæ,
an viden per totum, arteriam subiici, mediæ neruum, superior quæ & humera-
tur. iecur ria dicitur, periculi expers est. Ac in capitis morbus humerariam in-
autē ha- cidimus. In his qui infra ceruicem affligunt, alariam, media vtrisque
bere Ar- conuenit. Fascia igitur arcta partem aliquam circa brachii musculos
teriam deligare oportet, & frictione manuum alternante, repletam venam
negat vsui commodam transuersim per totam ipsius latitudinem solam di-
Aristo- uidere. Etenim maiores hæc plagæ, ægre cicatricem admittunt arctæ
te.

aimlum inflammationem experiuntur, preterquam quod crassioris succi transitum impediunt. In quibus autem & secundo & tertio die, interim vero & quarto sanguinem detrahendum esse speramus, obliquius vena secari debet, quo manus inflexu dehiscens non protinus cicatrice obducatur, sic enim visum est Antyllio. At quantum euacubitur, ex virium robore, & morbi magnitudine metemur. Si humoris copia subest, & materia afferuescit, vna vice usque dum anima deficiat extrahemus, virtute videlicet robusta, sic autem ut æger non ex humoris in ventriculum confluxu deficiat, ob quod etiam multi ante iustam vacuationem per initia statim animo destituuntur, verum eius deliquium his vacuati humoris ratione obuenire oportet. Iam vero si magnam vacuationem res postulet, vires autem sint inualidæ distribuenda erit inanitio, ac primum parcius detracto sanguine denovo idem auferetur, si res exigat etiam tertio. Cæterum vacuare solemus corpus vniuersum non modo in plethorica affectione, veluti & Galenus tradit, sed etiam propter affectus magnitudinem, quam totum corpus humoribus videas commoderatum, quemadmodum in sanguinis exaribus, aut alia parte profluuiio, quod non copia excitauerit, ac vacuare reuulsorio modo ex oppositis conuenit. Quinetiam in valida inflammatione idem faciendum est, sicut in colicis & renibus calculosis, lippitudine, & iis quæ tam præcipiti modo do urgent. Nam dolor & partis inflamatæ calor defluxioni præbet occasionem, licet vniuersum corpus superfluitatibus careat. Quapropter parcius id tunc faciendum est, vacuatione adhibita, quæ potissimum laborantis ætati, & naturæ cõpetere videatur, consideratio etiam anni tempore, loco, & ægrotantis consuetudine. Porro in quibus prope venam quæ diuidetur magna quædam est inflammatio, quemadmodum id pleuriticis & iocimorosis, optimū est expectare, dum color sanguinis, & substantia mutetur. Diuersus autem est in inflammatione sanguis, a naturali, quoniam largius incalescens, siquidem prius erat crudior, rubicundior, magisque flauus euadit, si autem talis prius extiterit, in nigrum adustus mutatur. Non tamen ex toto mutationem ipsius expectare cõsilium est, sed etiam ante illam nonnunquam cessare conuenit, idque duplici de causa, aut ob virium imbecillitatem, quas solui ex pulsuum tactu cognoscas, sunt enim ipsi inæquales vehementia, & magnitudine, vel etiam languidi, & robur fluxionis inclinans imbecilles iam vires notat, ut propter inflammationis malignitatem, nonnunquam enim nihil remittit, sed vehementer impacta est. At si nihil horum obstitit, ægerque floridæ ætatis sit, expectanda est sanguinis mutatio, magisque si ambiens aer temperatus fuerit. Si vero sanguis ante iustam vacuationem fuerit suppressus,

Habet enim corpus nostrum simile quoddam vniuerso. Vnde philosophus physico-rum paruum magnum appellat animal ipsum. Currei autem gumento est, quod munia corporis suam quæque per seuiant. Illud autem non ignorandum præterea bruti animalia mittendi sanguinis gratia venteribus ac demetis latera ac dorsa sua

PAULI AEGINETAE.

impinge sus, id autem accidit aut propter timorem, & animi defectum, aut san-
 re ad vul- guinis grumum, aut violentam constrictionem, contra singula pugna-
 nera fa- bimus, Animam deficientem, odoratis naribus ad motis refocillantes,
 cienda, constrictionem, vinculo remisso soluentes, in grumum coactum san-
 unde san- guinem, vel olei infusione, vel digitorum fotu dissoluentes. Reliqua
 guis ma- sanguinis dimittendi preparatio nulli non cognita est, verum hæc in
 nare pos- cubiti venis fieri solent. At ex fronte sanguis detrahetur in capitis
 sit. Hu- doloribus ita, capite fomentis adiuto, fascia cervicem vinciemus, digi-
 moribus- tis super guttur interpositis, ne suffocatu ægri intereant, repleta iam
 aut quā- vena in fronte, acie scalpelli diuidetur. Eodem modo etiam circa gut-
 quā cor- tur exstantes venæ sphagitides appellatæ, ob vetustam lippitudinem
 pus mo- aduersa scalpelli parte scinduntur, ita ut sanguis erumpat. Item venæ
 dice præ- linguae subditas, veluti in anginis, transversas incidimus, euitantes cō-
 stare vi- strictionem. Nonnulli vero in maioribus oculorum angulis venas
 demus- eminētes, sicut in longis capitis, vel oculorum morbis similem, in mo-
 atq; æ- dum diuidunt. In quibus internas quoque narium venas vel mucrone
 quabili- scalpelli contundentes, vel quibusdam asperis irritantes dirumpunt.
 ter non- item post aures sitas ob capitis affectus feriunt. Quæ vero poplitem
 nunq̃ in- perreptant, in renum cruciatibus aperiuntur. Quæ extremas corpo-
 crescere, ris partes intercurrunt, superiacētibus vinculo exceptis & manuum
 possunt- frictione, & pedum incessu repletæ diuiduntur. in sinistra quidem ma-
 tamen- nu, cum lien male habet, venam quæ inter paruum & anularem digi-
 quatuor- tum porrigitur, præcipue incidemus. cum iecur affligitur, in dextra.
 quoque- Nam extremarum partium inanitio, e longinquo magis facta effica-
 humo- tiorem molitur reuulsione, in pede, veluti cum coxendicum dolo-
 res, ex- res aut vteri vitia vrgent, eam quæ supra interiorem talum eminet, dis-
 quibus- secabimus.

De cucurbitularum usu.

Cap. xli.

Cucurbitulis neque per affectuum initia, neque cum corpora sunt ple-
 thorica, utemur, sed iis prius euacuatis, cumque nihil particulæ in-
 fluit. Vsus eius est mouere aliquid, agitare, & foras extrahere. Leuis
 itaque cucurbitula inflationes discutit, distillationes in stomachum su-
 spendit, sanguinem attrahit, & profluentem rursus sistit, subiectis par-
 tibus admota, & quod alte conditum est, in summa rursus educit, in
 totum humores traducit, spiritus euacuat. At quæ cum scarificatione ad-
 hibetur, efficacioris causis perspiratum præbet, sensibilibus ex alto ea
 quæ nocent eliciens, quippe non modo sanguinem, sed alios quoque
 humores vacuat, præsertim cum flamma ampliore adglutinata, verum
 si a carnosius particulis detractionem moliri statumus, primum cutis
 scalpello exasperanda, deinde cucurbitula imponenda est. Sin ex car-
 nis magis pars fuerit, leuem prius cucurbitulam defigemus, ubi in tu-

morem particula eleuata fit, scarificatu adhibito, rursus ipsam accom-
modabimus, & si paululum vacuare cogitamus, vna diuisio abunde
est, sin amplius, plures adhibentur. Item si tenuiorem qui continetur
sanguinem acceperimus, summa scarificari, si crassio rem, alta debent,
quando etiam concretum ex ictu sanguinem educere animus est.
Terminus autem moderatæ diuisionum altitudinis est, sola cutis cras-
situs. Nonnulli instrumentum ad hoc excogitarunt tribus scalpellis
æqualibus simul iunctis, vt vnica iniectione tres fierent plagæ, ve-
rum hoc nos inutile putantes simplici scalpello cõtenti sumus. Alii
cucurbitulis vsi sunt vitreis, vt sanguinis qui vacuatur mensura in
extractione pellulescat, verum æneæ cum maiorem sustineant flam-
mam, multo sunt efficaciores vitreis, quæ facile disrumpuntur. Quin-
etiam quæ ex cornibus, ore sugentes trahunt, minus quidem inaniunt,
non autem siccant, quemadmodum quæ cum flamma si opus fuerit,
adhibentur. Cæterum cum admoturi sumus cucurbitulam, particulæ
in rectum figuratæ ex latere hanc defigemus. Si enim iacētibus ipsis
super, linamentum ex lucerna simul cum flamma inducamus, in cu-
tem occidens illa, grauer adurit, vsu hoc non postulante. Est cum
cucurbitulæ magnitudo subiectæ parti adæquabitur, eaq; de causa p-
multum cucurbitulæ & paruitate & magnitudine differunt, quem-
admodum etiam collo prolixiores & spatto inferiori latiores aliis
efficacius extrahunt. Cauendum autem ne prope mamillas cucurbi-
tula applicetur. nam illapsæ cucurbitulis nonnunquam mammx &
inturgescunt vehementer, haud facile ipsas relinquunt, atque tunc
spongiæ ex calida cucurbitulis circundare oportet, sic enim remittun-
tur, sin minus hoc modo fuerint laxatæ, perforari ipsas ratio est.

Quomodo alæ adurantur.

Cap. xlii.

Humeri articulo luxato in nonnullis caput frequenter & conti-
nue excidit, vel humiditatis superantis vitio, vel quod cõtinuæ
luxationi opportunus locus euaserit, quando aduersionem descendere
oportet. Proinde ægro, aut supino, aut in sanum latus inclinato, inte-
riorem alæ cutem qua potissimum articulus excidit, duobus sinistrae
manus digitis, vel hamulis tenuibus & oblongis eleuatam, candenti
ferro adurere oportet, quousque ferramentum ex aduerso inflexum
vno impressu duas crustas excitat, & si magnum intercedens ha-
rum spatium fuerit, mucrone scalpelli per ipsas traiecto aliam in me-
dio crustam faciemus, adurentes vsq; dum ferramentum vrens scal-
pello inciderit. Item alias duas Hippocrates iuxta vtriusq; d. etæ me-
diam fieri consulit, æquali illis spatio distantes quadrangulæ figuræ
modo. Alius autem crute non penetrabimus, quod nerui, glan-

morbi af-
ferat, quæ
πληθω-
στικόν
græci vo-
cant.

magis at-
trahunt
etiam
æneæ, q-
spiritus
intus in-
calescens
nō ita p-
poros
diffatur.
neq; aer
extrinse-
cus igre-
ditur sicut
p- nitru.
Ille autē
spiritus
inclusus
virtute
calidi s-
anguinem
copiosū
attrahit.
Dixit au-
tem col-
lo proli-
xiores
et spatio
inferiori
latiores

Y

PAULI AEGINETAE.

effica-
cius at-
tra here,
ex eo,
qd' ma-
iorē spi-
ritus

vim ha-
bēt, atq;
ex maio-
ri spatio
magis
ad trahē-
dum in-
ualescūt.
sed hoc
ex me-
chanicis
spiritali-
bus ma-
gis co-
gnoscen-
dū est.

Codex
græcus
habet.
conuenit
igit ar-
stolo-
chiæ lō-
gæ radi-
cē oleo
hume-
ctantes
laminas
cādentes
imponere.

dulce, ac aliæ particulæ quæ inflammationem difficultatemq; functio-
num, excitare possint, subiecta sint, curari vero adusta debent pono-
cum sale trito & imposito, tum aliis præfidiis ad crustas inscriptis,
postea manu operandum caute erit.

De adnatis digitis & sexto digito.

Cap. xliii.

Adnascuntur digiti in manu nunc prope maiores digitos, nunc
prope exiguos, raro autem visi sunt iuxta aliorum aliquem.
Eorum vero qui adnascuntur, alii per totum carnosus sunt, alii ossa in
se continent, nonnunquam & ungues. Ossa habentium, hi ab articu-
lo procedunt, cuius commissuram, alteri digito communicant, illi ex
naturalium digitorum fissura oriuntur, atq; huiusmodi perpetuo sunt
immobiles, reliqui moventur nonnunquam. Carnosorum expedita
est præcisio, nam scalpello quod superuacuum est in totum tollimus.
Eorum qui ab articulo prodeunt, difficilis est tractatio illis qui a di-
gitorum fissura originem traxerunt primum caro orbiculatim usque
ad os excinditur, ipsumq; os excisum aut erasum, aufertur. Cæterum
inter curandum radimus ipsa, & cicatrice obducimus, quemadmodum
etiam in ossium vulneribus declaratum est.

Quomodo purulentis adustio adhibenda.

Cap. xliiii.

Vstio efficacissimum purulentis præsidium inuentum est. Conue-
nit igitur ferro candenti crustas excitare, unam inter claviculæ
compagem cute sursum educta, duas autem exiguas iuxta mentum
sic ut ab arteriis quæ carotides appellantur, recedatur. Duas item sub
mamillis ampliores inter tertiam quartamq; costam, alias duas inter
quintam & sextam paulum in posteriora spectantes, aliam, per me-
dium pectus, rursus aliam supra os ventriculi, tres posterius, per me-
dium dorsum unam, utroq; spinæ latere duas, quæ in dorso factam
crustam excedant non admodum extantes. Alii, ut tradit etiam Leo-
nides, ferro mucronato candenti per medium costæ spatium ubi ab-
scissus est, adacto, usq; ad pus usionem moliti sunt. Nonnulli etiam
hos curare ausi sunt, transversa linea inter quintam & sextam costam
ducta, & cute paululum oblique diuisa, deinde sic scalpello membra-
na quæ costas succingit perforata, pus excreuerunt. Atq; hi cum il-
lis qui ferro usq; ad iunum adurant, aut statim mortem inferunt, vita-
li spiritu confertim una cum pure euacuato, aut fistulas reddunt insa-
nabiles.

De cancro.

Cap. xlv.

Cancer, tumor est inæqualis, oris prætumidis, aspectu teter, liui-
dus, & indolens, interim sine vlcere, quem Hippocrates latētem
nominauit, is si curetur, peior euadit, interim exulceratus, nam cū ex
atrabile ducat originem, magna parte eroditur. Pluribus quidem cor-

LIBER VI.

1-2

poris partibus accidit, præcipue foeminarum locis, & mammis, quæ nascuntur in maribus, unde etiam nomen sortitus est. Quæ igitur per medicamenta cum mis vel ratio adhibetur, quarto volumine abunde explicata est, eius autem cancri in vulva cri qui vulvam infestat, tertio. Quoniam vero partes putrefactæ, aut potissimum, quæ (vt simpliciter dicam) naturæ modum exceſſerunt, ablationem, quæ sui postulant, cancris autem vulvæ manus opera nec potest, nec vtile ibi hu- est admoueri, eorum qui exteriora infestant, præcipue mammæ curâ moris co- di administrationem trademus. Quidam enim totam partem vitia- pia foue- tam ferramenti candentibus absumunt, alii totam mammam præci- tur. sam adurunt. Galenus solam administrationem quæ per sectionem fit recipiens, hoc modo scribit. Si quando cancrum scalpello curare au- debis, incepisse vacuationem a melancholici humoris purgatione oportebit, vbi iam totum quod vitiatum est exacte præcideris, sic vt nulla radix supersit, sanguinem effluere finito, nec celerius cum cohi- bebis, verum etiam premendo vicinas venas, crasfiorem ex ipsis san- guinem exprimes, deinde aliorum vlcera modo curabis. Hæc qui- dem Galenus memoriæ prodidit. Reliqua vero maligna putridaq; vlcera nempe phagedænas, gangrænas & consimilia eodem tracta- re modo debes.

De iis quibus mammæ foeminarum modo inturge-
scant.

Cap. xlv.

Quemadmodum foeminis, ita masculis quoq; pubertatis tempo-
re, mamillæ modice inflantur sed pleriq; rursus subsidunt, in nō-
nullis sumpto initio crescunt pinguedine subnascante. Cum itaq; in-
decora hæc corporis figura muliebris habitudinis notam repræsen-
tet, digna est cui manus admoveatur. Lunata per imam mamillæ par-
tem linea ducitur cute detracta, ademptaq; pinguedine, suturis com-
mittetur. At si forte mamilla partibus ipsius ob magnitudinē ad ima-
ut in mulieribus, inclinauerit, lunatas duas plagas in extremis inui-
cem coeuntes inferemus, vt minora maiore comprehendatur. Cute nō puto
quæ intercedit cum pinguedine adempta, similiter suturis vtetur. Home-
At si aberrantes minus exciderimus, tunc eo quod superest rursus ad-
empto, suturas iniciemus, & medicamentum cruentis idoneum ac-
commodabimus.

Quomodo iecur aduratur.

Cap. xlvii.

Si dolor cum gravitate iis oboriatur quibus iecur vemicula laborat,
carnea ipsa substantia vitata ostenditur. Si acutus dolor magis ur-
geat, puris in tunica collectio, adurere hoc modo oportet. ferrum cā-
dēs mucrone tenui, paulo supra inguen qua iecur definit, iniciit, ut cru-
stam vnam excitet, Vbi vero totam cutem adusserit, & vsq; ad tuni-

Y 4

PAULI AEGINETAE.

eam penetrauerit, pus excernetur. Ab euacuatione phacomelite, hoc est, lenticula melle addito utemur, tum iis quæ malsa & speciebus ad carnem creandam componuntur, postea vero etiam cicatricem ducentibus.

Quomodo lien aduratur.

Cap. xlviii.

CVtis quæ lieni incumbit, hamo eleuata, oblongo ferro candenti per totum ipsa aduretur, ut unico impressu duæ fiant crustæ idque faciemus ter, quo omnes crustas numero sex habeas. Marcellus autem tridente quam triënam Græci dicunt, aut tridenti simili ferramento utens, vno adactu crustas excitauit.

Quomodo stomachus aduratur.

Cap. xlix.

& recte
defluuia
cessant
vstione.
nā per si
militudi
nē Her-
cules
quoque
flumina
& palu-
des incē-
dio sic-
casse p-
ditur.

IN longis stomachi defluxionibus, recentiores vti sunt adustione. Alii ferramenti candentibus mucronatis tres crustas moluntur, vnam iuxta cartilaginem quæ ab ensis figura Græcis vocatur xiphoides, alias duas inferius trianguli figura, alias ut cutem diuidat, Alii vnam duntaxat adhibent, ampliore supra ipsum os ventriculi. Sunt qui ne ferro quidem vrant sed iscis appellatis, sunt autem hæ spongiosa quædam corpora in quercubus & corylis nascentia, barbaris magis vsitata. permittunt autem vulnera sine cicatrice diu manere, imo etiam magis adhuc diuidunt, ut maiore per ipsa diffatu os ventriculi ab influxionibus immune permaneat.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

Cap. l.

Quomodo aqua intercus contrahatur, quot sint ipsius differentiarum, quæ causa, quæ notæ, quodque remedium, tertio volumine sumus executi, vbi & demonstratum est, illud solum aquæ inter cutem genus quo veluti in vtre aqua colligitur, asciten dicunt, manus operam postulare. Atque eam hoc loco explicabimus. Itaque rectus homo statuitur, sin minus, in sedili collocatur, si ne hoc quidem fieri potest, attingi non debet, cum adeo sit inualidus. Stante recto homine minimis retro assistentibus, iubebimus ut tumorem ad pubem digitis premat, depellatque. Nos aculeo, aut scalpello quo vena inciditur, si ex partibus iuxta intestina sitis originem contraxerit, directe sub umbilico tribus digitis interpositis inium abdomen ad usque tenuem membranam quæ peritonæos vocatur, diuidemus. Sin autem primatio iecoris affectui malum fertur acceptum, a sinistro umbilici parte dissecabimus. si a liene vitium trahit originem, in dextra. non enim in illa parte sectionem molientur, in quam decumbent. Ac cute quæ superiacet acie instrumenti excoriata, membranam quæ finit abdomen peritonæos vocatur, diuidemus, quousque scalpellum ad vacuum usque regionem penetrauerit. Deinde per foramen abdominis, & peritonæi aneam fistulam scriptoriis calamis acie similem demitteremus, & per

LIBER VI.

hanc humor effundendus est pro cuiusque virium ratione, quâ ex pulsus tactu deprehendimus. Deinde exempta fistula, humor fisti debet. sistetur autem statim cum diuisio ipsa alternatim sit facta. At nos securitatis gratia linamentum tortile per solam abdominis diuisionem dimittimus, ægro recumbente recreatoque, per insequentem diem rursus momentum humoris quantum virtus exigit fistula euacuabimus atque ita deinceps faciundum est, quousque minimum humoris supersit, ita tamen, ut ubique subitam cumulatamque vacuationem vitemus, multis siquidem imperite manum admoliti vna cum humore vitali etiam spiritu vacuato subito hominem iugularunt, qui vero securius rem agunt, modico humore educto, ut virtus magno leuaretur pondere, reliquum medicamentis aquam ducentibus arena, sole, siti, & cibis desiccantibus consumpserunt. Iam vero vitione super stomachum, iecur, lienem, imum ventrem & vmbilicum vti sunt, quinque crustas adhibentes. Alii ferro tenui candenti, alii iscis nuncupatis, aut aliquo ex alia huiusmodi materia, & plerique hac curandi ratione magis consauerunt, interim nullam in totum compunctionem (quam paracense sin vocant) experti.

De vmbilico prominente.

Cap. li.

Vmbilicus indecore prominere solet, quod vitium Græce exomphalon dicitur, interim membrana quæ abdomen finit, peritonæum appellauit, illic dirupta, ac procidente, aut omento, aut intestino, interim colluie otiosi humoris sub vmbilico contracta, interim vero carne subnata, aliquando sanguine irrupente, propter venæ, aut arteriæ rupturam, ut in aneurysmatis, interdum non sanguine, verum spiritu solum irruente. Si igitur momentum prociderit, circa vmbilicum tumor concolor, mollis tactu, indolens & inæqualis apparet. Si intestinum prolapsum est, præter commemorata, etiam inæqualis magis tumor est, & digitis impressis cedit, euanesceatque, nonnunquam strepitum elidens, balneis, & distentionibus magis increfcit. At si humor collectus est, mollis similiter tumor apparet, pressus autem non cedit, neque decrefcit, neque tamen augetur. Quod si autem accedat superiori- bus signis, ut tumor sit liuidior, carneque subnata durior, etiam tactui renitetur, & eadem in magnitudine manet. Si ex inflatione eminet, tumor mollis ad tactum subleuetur, qui digitorum impulsu sonum quendam reddit, & pressus aboletur. Hunc in modum curabitur, erecto homini iubemus ut spiritum contineat, quo in omnem partem distendatur, deinde omnem vmbilici excrefcientiam orbiculatim atramento scriptorio notabimus, resupinatoque homine scalpello tumorem, quæ nota atramenti est exasperabimus, deinde medum hamo eleuatum, li- no aut neruo quæ exasperatio est, circum astringemus (hoc enim pa-

cōsiderā
da enim
semper
virtutis
potentia
est, nam
virtus ip
sa sæpe
hebetata
quauis
tenui de
causa to
ta dilabi
tur. Vi-
di ego
quosdā
ægros,
qui ob
nimium
succorū
hausiū
dum est
lecto ab
astanti-
bus ad
purgā-
tionem
alui adse-
ran ur,
vel in r
lectū tā
tis ter-
agitant

PAULI AEGINETAE

in mani-
bus ho-
minis ip-
sos mo-
uētis ex-
pirarūt.
est. n. aīa
eorū te-
nui lumi-
ni simi-
lis, quod
aura ven-
ti leuis
extin-
guit.

tro continebitur ne deuoluatur) anfulam supra deligaturam ponentes, postea tumore quem constrinximus iuxta verticem ad apertum digitum indicem demitemus, tentabimusque diligenter num intestini implexus, aut pars omenti simul fuerit constricta. Ac si quidem intestinum fuerit relictum laxata funiculi anfula, id introrsum pellemus, si vero omentum sit, eo retracto, quod superuacuum est amputabimus, vasa quod (vt verisimile est) coincidit, lino deligato, mox accipientes duas acus simplex linum ducentes, iuxta hiatus per incisionem cutis factam traiectionem, & anfulis linorum praecisis, quemadmodum in aneurysmate dictum est, ex quatuor initis constrictionem moliemur. Vbi corpora lino deuincta computruerint exciderintque, medicamentis in linteola illitis curatio absoluetur, si cauiam magis cicatricem fieri semper cupiamus. Haec quidem ad omēti, aut intestini affectum pertinent. At si caro, aut humor, aut sanguis vitium crearit, tumoris medio circulatim praeciso, deinde eo quod incumbit extra peritonaeum sublato, curationem carni generandae dicatam tentabimus. Porro si vmbilicus emineat, aut ex vasorum dilatatione, aut spiritu intercluso, attingi non debet, quemadmodum etiam aneurysmata.

De peritonæo, hoc est, interiore abdominis membrana conuulserata, item de intestini, aut omenti procidentia.

vbi etiam tractatur, quomodo ventris vulnera sarciantur ex commentariis Galeni.

Cap.

lii.

Quomodo peritonæi, hoc est, interioris abdominis membranae vulnera optime queas manu curare, deinceps venit considerandum. Si igitur paruum adeo vulnus extiterit vt inflatum iam quod procedit intestinum remittere non liceat, necessarium est, aut flatum elicere, aut vulnus ampliare. Satius autem fuerit meo iudicio quod prius dixi agere, si modo id consequi possit. At qua magis ratione id consequare, quam si causam vnde intestinum inflatur, e medio sustuleris? Quae igitur ea est? nimirum, ambientis nos aeris refrigeratio, quare etiam remedium ex calore petetur. Itaque spongia molli aqua calida madenti, mox expressa calefacere intestinum oportet. Praeparetur autem interea vinum austerum calidum. etenim hoc magis quam aqua calefacit, ac robur intestino adiicit. At si per haec intestini inflatio non cesserit, tanta peritonæi pars incidi debet, quanta id quod excidit, opus habet. Idonea vero ad eiusmodi sectionem habentur scalpella recta ne scilicet mole aecommodata. Figura autem laboranti apposita fuerit, cum in inf-

riori parte vulnus factum est, si sursum vergat, cum in superioribus, si deorsum, & si in dextris vulnus sit, in contrariam partem corpus incumbet, si in sinistris, in dextram, atque hoc tum magnis, tum exiguis vulneribus commune est. Cæterum cum intestina in proprium reponeantur, oportet enim ipsum, ubi manibus suis totum vulnus a foris apprehenderit, intro repellere, constringere ac exiguum semper suenti denudare, quin etiam id quod consutum est, med. ocri ter comprimere, quoad totum exacte persuatur. Porro quæ idonea suendi abdominis ratio existat, deinceps dicamus. Quoniam coire abdomen cum peritonæo conveniet, incipiendum quidem a cute est, atque ab externo introtrorsus acus demittitur, ubi iam & cutem, & rectum musculum totum transierit, præterito quod ei adiacet peritonæo, per reliquam huius partem eam ab interno extrorsum, atque inde per reliquum abdomen traiectabis, ubi hoc penitus pertransierit, rursus ab externo introtrorsum, idem abdomen perforandum est, mox ubi peritonæum quod illi quoque adiacet præterieris, & ad oppositum perveneris, id quoque ab interno extrorsum perpungi, utraque eum eo totum ipsi coherens abdomen debet. Deinde ab hoc rursus incipiendum, atque id cum opposito peritonæo consuendum. Ac rursus vicina etiam cute traiecta, iterum ab ea parte acus introtrorsum est incienda, consue- dumque id cum opposito peritonæo, inibi quoque vicina cute transmissa, atque hæc iterum iterumque fascienda sunt, quoad totum vulnus similiter consuerimus. Intervallum vero suturarum quod ad compescenda ea quæ subsunt, pertinet, brevisimum esse postulat. Quod autem ad firmitatem requiritur, inter suturas cutis ne alibi rumpatur, utiliter breve non est. quare vitato utriusque excessu, eligenda mediocritas est. Iam hoc quoque omnium ulcerum commune quoddammodo est, sicuti etiam ipsius quo fiuntur, feli ratio. Quod enim durius est, cutem rumpet, quod mollius, confestim ipsum rumpitur. pari modo si proxime oras summas acum transegerit, quod reliquum est cutis, quoniam minimum est, dum violenter adducitur, rumpi cogitur. Sin plurimum ab iis recesseris, non parum cutis inglutina tum relinquetur. Hæc licet omnium sint ulcerum communia, maxime tamen servanda in abdomine suendo arbitror. Porro ipsum abdomen, aut quemadmodum est expositum, consuetur, huc diligentia adhibita, ut peritonæum abdomini coalescere possit, quod vix sperare audeas, cum nervosum existat, aut sicuti quidam faciunt, qui quæ cognatæ naturæ sunt, ea committunt, utpote peritonæum peritonæo, abdomen abdomini. Id autem fiet in eum modum. A vicino nobis abdomine incipitur, atque ab externo introtrorsum per

corporis
incumbē
tis vul-
nus gra-
uetur, cu-
ra impi-
mis ad-
hibenda
est. id
quod cō-
mune p-
ceptum
Hippo-
Galenique
est. Nā
quodq;
mēbrum
laborans
quiesce-
re in pri-
mis o-
portet.

idq; in li-
bello de
ulceri-
bus Hip-
po. testa-
tur.

coalesce-
re possit
dixit.
quia me-
d. cus
laban-
tem me-

PAULI AEGINETAE

tura ex id solum acus traieciatur. post praeteritis vtriusque peritonaei labris, ex
 citat ad obiecta parte a foris introrsum per vtrumque eius labrum acus reuoca
 tur, dein haec rursus reducitur, atque ab interioribus foras per aduersum
 munia abdomen transmittitur. Hic modus a communi, & ex prompto, quo
 sua sub- abdomen transmittitur. Hic modus a communi, & ex prompto, quo
 eunda nimirum vno adactu per quatuor labra acus traieciatur, id differt, quod
 coalesce peritonaeum totum intra abdomen prorsus recondit. Caeterum med
 re autem camenta ad haec idonea materiae illius esse debent, cuius sunt ea quae
 propriu cruentis iniiciuntur. Vt autem nulla pars principalior consortii lege
 tatu na- doleat, lanam conuenit mollem oleo med ocriter calido imbutam to
 turae est, ti, quod inter inguina & axillas est, circumdare. Praestiterit autem si
 & non per clysterem intestinis aliud simile infundas. Si vero non nihil in ip
 artis. sis quoque intestinis conuulneratum sit, quod iniicietur, vinum nigrum,
 austerum & tepens erit, eoque magis si totum usque ad interiorem mea
 tum pertusum sit. Facile igitur curationem recipiunt intestina crassa, se
 cus habent tenuia, ieiunum vero omnibus insanabile est, tum propter
 vasorum magnitudinem multitudinemque, tum quod tunica eius pra
 tenuis nervosaque existat. accedit huc quod etiam bilem synceram to
 tam recipiat, adde quod omnium maxime iecori vicinum habeatur.
 Ventriculi porro imae partes carnosae vlcerae curari cum fiducia de
 bent, siquidem fieri potest ut res bene succedat, non solum quod haec
 crassiores sint, sed etiam quod sedes medicamentis quae illas curabunt,
 adhibendis in eo loco est accommoda. At vlcera quae os & gu
 lam infestant, solo transitu medicamenta attingunt, quae autem orifi
 cium ipsius obsident, ii sensus quoque in illo acutus sanationi aduersa
 tur. Cum autem peritonaeo rupto omne prolapsum aut liuescat aut
 nigruerit, sune exceptum antequam nigrescat, ne sanguis profunda
 tur, praecidere conuenit id quod post vinculum habetur, atque ut in ex
 tremo inferiori iam commemoratae abdominis suturae vinculi fines
 pendeant, curabimus, quo scilicet facile eos cum ex vulnere suppura
 te eructentur, eximamus.

Ad tegendam glandem colis si nuda est. Cap. liii.

IN quibus glans colis penuria cutis non contegitur, aliqui indeco
 ri gratia duplicem administrationis modum excogitarunt, nunc
 in superiore colis initio cutem orbiculatim secantes, ut facto ipsius di
 uortio, inferior cutis attrahatur, donec glans occultetur, nunc subtus
 interiori cutem a glandis radice scalpello excoriantes, inde inferiori
 rem trahentes, mox linteum quodam molli ambiens praeputium deli
 gantes, ita ut linteolum aliquod qua cutis excoriata est, interpona
 tur, ne praeputium cum glande coalescat. Hunc modum Antyllus ma
 gis recipit, longiore ipsum oratione exponens. Nos autem summa
 tim dixisse contenti sumus, quoniam raro inter artis opera huiusmo

di administratio requiritur, tum quod affectus nullam muniis obeun-
dis difficultatem pariat, tum quod neq; tātum indecori afferat, vt hac
magis inquisitionem aliquam ex chirurgia deligas.

Quomodo glans penis contecta aperiri possit, vitium di-
citur hypospadiæon.

Cap. liii.

Plerisq; glans ab origine non perforata est, verum sub cane appel-
lato qua glans suspensa est, foramen habetur, vnde neq; vrinam,
facere antèius possunt, nisi particulam versus imam ventris regionē
admodum inclinent, neq; liberis dare operam, cum semen ipsorum in
vterum recta non possit eiaculari. Omnium itaq; simplicissimus tu-
tissimuscq; curationis modus est qui fit per præcisionem. Itaq; resupi-
nato homine glans sinistræ manus digitis valide attolletur, deinde
scalpelli acie ipsa iuxta coronam præcidetur, plaga non obliqua, sed
sculpturæ simili, vt per medium eminentia quædam glandem repræ-
sentans appareat. Quoniam vero sæpe sanguis profundi solet, si fieri
potest medicamentis ei retinendo dicatis sistemus, sin minus, tenui-
bus ferramentis aduremus.

De phymo.

Cap. lvi.

DVplex phymi causa est, aliquando enim sic glandem præpu-
tium tegit ne nudari possit, aliquando retrorsum deducta & du-
ci non potest. Hæc species proprie periphymosis dicitur. Pror itaq;
differentia, aut ex cicatrice quæ in præputio concreuerit, aut ex car-
nis incremento quæ illic coaluerit. Altera genitalium inflammatio-
nibus fertur accepta, quoties abducta cuti retrorsum glans intumue-
rit, nec vltra præputium receperit. Si igitur prima phymi causa fuerit,
curationem hoc pacto tentabimus, figurato homine, vt par est, præ-
putium in anteriorem partem attrahemus, demissiscq; in summum ip-
sum hamulis tribus, quaternisve, ministris continēdum exhibebimus,
iubentes, ipsum quātum fieri potest, diducant aperiantq; deinde si ex
cicatrice exterior collectio fuerit creata, scalpello ab interiore parte
præputium in tribus quatuorve locis incidemus lineis directis &
æquali inuicem spatio distantibus, idq; intrinsecus, est autem duplex
in glande præputium, os igitur ipsius ab interiori parte diuidemus,
sic enim contractione quæ ex cicatrice coaluit, dissoluta, præputium
superinducemus. At si caro ab interioribus adnata phymum produ-
xerit, carne tota ferro scarificata, præputium abstrahemus, carnem in-
ter lineas eminetem rademus, postea plumbeum canalem glandi vni-
uersæ circundabimus, inuoluta ipsi papyro sicca. Habeat autem cana-
lis foramen vndiq; æquale. sic enim huius circumpositu præputium
adductum rursus coalescere prohibebitur, dum & a plumbo & pa-
pyro inuoluta distentum seruatur, intumescēs enim ex deligatura ma-

id quod
etiam su-
pradixi-
mus ex
Arist. na-
sci quos-
dam au-
ribus a-
noq; mi-
nime
perfora-
to. & q-
ulua in
foeminis
nonnunq;
vt aliqui
prodi-
dere.
phymus
από του
φικον
hoc est
ab obse-
piendo
dicitur.

PAULI AEGINETAE.

gis adhuc cutem diducet. Hoc igitur faciendum est, siue ob cicatrice, siue carnis excrecentiam phymo generato manum adhibuerimus. Sin autem periphymosis appellata creetur, vetustate temporis coalescit, & curationem non recipit, nisi quis eo modo velit tractare quem ad tegendam glandem usurpamus. Sin autem nondum coaluerit, vibicibus super ipsum rectis tribus, aut quatuor, aut etiam pluribus circulatim excitatis, oleo copiosiore tepido superfuso, extrorsum at-

trahemus. Cap. lvi.

GLans & præputium inuicem committuntur exulceratione præcedente. Conuenit igitur subtus cute, quantum licet, excoiata, acie scalpelli, aut spatula polypo accommodata, ea quæ resistunt dissoluere, id potissimum conantes, ut glandem pure a præputio adhærescente discernamus, quod si non fuerit expeditum, glandis potius non nihil ad præputium assumere, quam e contrario, cum enim præputium tenue sit, facile perforatur. Vbi commissuram dissolueris lin-teum tenue aqua frigida madens, glandi & præputio interponendum, ne rursus coalescant, vino astringente cicatricem ipsis obducemus.

id quod
& supra
faciendū
censuit.
nā natu-
ra potis-
simum
amat
σύμψυ-
σιν.
id verbū
dixit, q
religio-
so getiu
more cir-
cūcidun-
tur, ad
iudæos
respiciēs
vnde il-
lud est.
vintu
cūrtis iu-
dæis op-
pedere.

De circuncisis.

Cap. lvii.

Non de iis qui religioso gentium more circunciduntur, nunc verba faciemus, sed de iis quibus affectu naturalium oborto, præputium nigrescit. Itaque in iis totum quod nigruerit, orbiculatim præcidi debet, deinde squama cum melle vtendum, vel etiam malicorio, & eruo medicamenti instar quod linteolis illinitur. Si vero sanguis quædoque profluat, ferramentis lunatis candentibus vtendum, quæ vtrisque simul iniiciantur, & ipsi sanguinis profluuium, & vulnere depalcenti. At si tota interim glans ablumpta fuerit, exiguum e plumbo canaliculum imponentes meatui, per ipsum ægroto urinam reddere iubemus.

De thymis naturalium.

Cap. lviii.

THymi carnosæ sunt tubercula, nunc in glande, nunc in præputio proueniunt. Ex his, alii maligni, alii non sunt. Mitiores itaque scalpelli acie deradere conuenit, & chalcitidem ipsis inspergere, in malignis, eo quod vitiatum est, exciso, adustione vtendum. At si ex opposito aduersoque sibi inuicem in præputio fiant thymi, hi, intra ipsum, illi, extra, non oportet omnibus ipsis confestim manum admoliri, ne præputium structura tenue, imprudenter pertundamus. Sed prius, ne præputium auferre consilium est, iisque cicatrice obductis, tunc quoque exteriores aggredi. Nonnulli vero recentiorum forfice ipsos auellentes equino pilo deligatos, curare solent, quemadmodum alii

refrigerato ferro candenti eosdem deurunt.

De catheterismo, & clystere vesicæ.

Cap. lix.

Cum vrina non redditur, quod iter ipsius obstructum sit, aut com-
creto intus sanguine, aut calculo, aut alia quadam causa, cathete-
rismo id quod superfluum est eximemus. Sumpto igitur cathetere,
ætati & sexui convenienti, probe ipsum dirigemus, quod hoc mo-
do fiet, lana exigua lino deligata per medium, linoque ex acuto iunco
per catheteris fistulam iraducto lanam foramini adaptabimus, quod
iuxta catheteris mucronem est, ac forficibus præciso eo quod ex lana
eminet, catheterem in oleum demitemus, ægro in subscellium collo-
cato, & fomentis si nihil prohibet, irrorato, catheterem in rectum in-
feremus usque ad colicæ basim, deinde naturalia ad umbilicum inclina-
bimus. etenim ab hac parte obliquus vesicæ meatus existit, deinde
sic cathetera adigemus. Quum vero iuxta regionem inter scrotum,
& anum, prope sedem fuerit, rursus genitalia imposito instrumento
deflectemus, in naturalem reducentes figuram. nam a peritonæo vesi-
cæ meatus sursum tendit, propellemusque catheterem usque dum vesicæ
finem penetrauerit, secundum hoc, linum catheteri iniectum retrahe-
mus, quo vrina simul cum lana attracta subsequatur, quemadmodum
in syphonibus accidit, atque talis demittendi catheteris modus est. At
quia subinde exulcerata vesica collui desiderat, siquidem articulari
clysteres, id quod iniiciendum est possint transmitti, illis in prædi-
ctum modum utemur, in vesicam demissis, si fieri nequit, catheteri pel-
le, aut vesicæ bubula adaptata, eoque indito, vesicam colluemus.

Quæ curatio calculosis adhibeatur.

Cap. lx.

Cum alibi demonstratum sit quæ ex causa calculi generetur, tunc,
quod pueris in vesica magis, prouectioribus in renibus crescât,
nunc rationem exponemus, quæ excindi possint, ubi notas prius eo-
rum qui vesica habentur, designauerimus. Vrina igitur aquosa est,
quod in eis subsidet, arenosum, pudendum continuo vexatur pruri-
tu, laxatur sine ratione, rursusque arrigitur, crebro id contrectant irri-
tati ægri, & maxime pueri cum calculus in ceruicem vesicæ inci-
dit, etiam repente vrina supprimitur. Porro inter eos quibus calculus
excinditur, pueri quidem usque ad quatuordecim annos propter cor-
porum mollitudinem, facile curationem recipiunt, senes, quod cor-
pus ipsorum contumax sit, vix consanescunt, medice horum ætates
etiam in hoc, medio quodam modo habent. ac rursus facile sanan-
tur qui maiores calculos habent, quod inflammationibus assuerunt,
qui minores, difficulter sanantur, contrarias ob causas. Hæc cum ita
se habeant, ad chirurgiam profecti, concussione utemur prius, interim
per famulos, interim ipso ægroto ex alto quodam loco defilienti,

cura be-
ne loca
di ægri
in pri-
mis ha-
benda est
authore
Hippo-

sicut et
in mor-
bo comi-
tiali. di-
cit autem
usque ad
quar-
tundecim
cimum

PAULI AEGINETAE

annum, quo calculus ad vesicæ cervicem propellatur, deinde figurari æger debet, ceu rectus in sedili, manibus subter femora porrectis, quo in angustia multum vesica compellatur. Si igitur contingentibus nobis calculus in tanta quoque regione scroti & ani inter mediam procidat concussione exturbatus, inde ad sectionem conuertemur. Sin minus occurrat, indicem sinistræ manus digitum, si puer sit qui ægrotat, vel etiam medium, si ætatis sit prouectioris, oleo perunctum, in anum demitemus, & super pinis digitis perquirentes, calculumq; occurrentem paulatim traducentes, in vesicæ cervicem coarctabimus, & digito vno, pluribusque propellentes ipsum in exteriora, impactum, ministro altero manibus vesicam premere iusso, alteri præcipiemus dextra manu testiculos quoque sursum teneat, sinistra regionem inter scrotum & anum mediam excipiat, tendat in alteram partem, ab ea qua sectionem moliemur, ipsi assumpto scalpello ad calculos aptato, inter anum & testiculos, non per medium locum inter scrotum & anum sed in alteram partem iuxta finem steriorem clunem obliquam super lapidem qui subiicitur incidendis, ducemus lineam, quæ extrinsecus latum habeat spatium, intus non amplius, quam ut calculus per id queat excidere. Interim siquidem digitis super anum innixis, aut digito vna cum sectione sine euulsione calculus leniter exilit. sin minus exierit, vincto huic rei accommodo in iecto eximemus. Calculo iam ablato, medicamentis sanguinem coarcentibus ex fuligine thuris, aloë, symphito, vel etiam mify, & confimilibus sanguinis profusionem sistentes, lanas, aut linamenta implicita, vino & oleo madentia imponemus, & ligaminibus sex processuum ad calculos accommodatis utemur. At si profluuii sanguinis metus, sit linamentum implicitum ex posca, aut rosaceo aqua admixta iniiciendum est, & ægro decumbente crebrius locum perfundemus. Postquam tertio die solueris, & hydrelæo copioso irroraueris, tetrapharmaco linteolis illito utendum, ita ut frequentius ipsos soluas, curesq; propter vrinæ acrimoniam. At si inflammatio quæpiam superuenerit, cataplasmatibus & superfusionibus ad eam inscriptis adiuuabimus, ac in vesicam rosaceum, aut chamæmelinum, aut butyrum nisi aliqua nos inflammatio impediat, demitemus similiter etiam si vlcus pascendo, aut alio quodam modo serpat, aut maleficum fuerit, singulis congruentia adaptabimus, cum vlcus inflammatione caret, lauacrum adhibetur, inde emplastrum diachylon, tum lumbis tum in ventri super accommodatur. Per totum vero curationis curriculum, femora inter se conuenit deligare, & cum remediis requiescere. Sin exiguus calculus coli inciderit & per vrinam reddi nequeat, præputium valide in anteriora attractum deligabimus iuxta glandis summitatem, item posteriore parte pudendi colem vinciemus, iuxta terminum

minum ad vesicam spectantem constrictione adhibita, deinde infra
colem diuidemus, super lapidem ipsum qui excidendis subiicitur, fle
xo autem cole calculum eiiciemus, solutisq; vinculis vlcus sangui-
ne concreto vacuabimus. Posterius itaq; vinculum iniectum est, ne
calculus retrorsum recurrat, antequam, ne post calculum exemptū præ
putii soluti cutis in oppositum recurrens diuisionem contegat.

De testiculorum partibus.

Cap. lxi.

P Articularum quæ circa testes habentur, finitiones cum ad rami-
cum incidendorum doctrinam conferant prius describemus, quæ
ad illam veniamus. Igitur testiculus substantia quædam est glandulo
sa, fragilis, ad genitricem seminis effecta. At nerui testium, quos Græ
ci parastatas & cremasteras ab eo appellant, quod ex illis genitales
partes depeident, spinalis medullæ ex cerebri membrana propagines
sunt, cum venis arteriosis ad testiculos pertinentes, per quos semē in
naturalia permeat. Seminaria autem vasa, venæ sunt a caua vena in te
sticulos sinuosis anfractibus pertingentes, vnde testiculi alimentum
capiunt. item tunica erythroides naturæ neruosa, in gibba quidē par
te, atq; anteriori, a testiculo libera est, in concava & posteriore, ipsi
adhærescit, ex peritonæo originem trahens. Vocant autem partem
hanc qua testiculo adnata est, posteriorem prosphyin, quasi dicas ad
nexum. Darti vero membranæ sunt, quæ exteriorem testiculum con
glutinant, iuxta tunicam erythroidem dictam ei adhærentes, quibus
partibus & illa post testiculos tunica adunitur. Hæc autem ipsa cu
tis exterior rugosa testibus circumdata, scrotum nobis Græcis oscheon
dicitur.

De aquoso ramice, hydrocele dicitur.

Cap. lxii.

H V moris ociosi in particulis scrotum implicantibus colluuiis, tu
morem excitans sensibilem, hoc nomen sortita est. Itaq; humor
magna ex parte, in tunica erythroide appellata, testiculum ambiente,
in partem anteriorem colligitur, qua potissimum membrana illa a te
sticulo separatur. Raro extra membranam hanc erythroidem vitium
contrahitur. Subinde peculiari tunica humor comprehenditur, vo
cantq; hoc malum chirurgici in superadnata ortum. Quare si ob cau
sam præcedentem, exempli gratia, particularum imbecillitatem vi
tium oboriatur, sanguis alimenti ratione adductus, in aquosam sero
samve, & inutilem substantiam mutatur, si ex ictu, sanguinea, aut sæ
culenta substantia comprehenditur. Communis igitur nota est, tumor
indolens, firmus, ac stabilis in scroto, quacumq; tandem occasione nō
euanesceus, sed in iis qui modicum continent humorem, cedens, in il
lis qui copiosum habent, non item. Ac quibus in erythroide tunica
humor comprehensus est, tumor rotundus paululum, & oui modo lō

Quia
potissi
mum lo
cus is
exudat
ob spiri
tus san
guinisq;
copiam
quæ per
cibū eo
pertinet,
neque in
substan

Z

PAULI AEGINETAE

tiā verti
potest.

giusculus apparet. His testiculus in conspectum non venit, vt qui vndiquaq; sit implicitus. Sin autem extra erythroidem membranā subdartis habeatur, propter paucitatem particularum occurrit. At si humor in membrana superadnata coierit propter contractionē ex omni parte, & rotunditatem, tumor alterius testiculi imaginem exhibet, & cum aquosus humor extiterit, tumor concolor pellucet, cum autem fæculentus fuerit, aut sanguineus, aut rubicundus, aut liuidus apparet. At cum in vtraq; scroti parte hæ notæ apparuerint, duplicem ibi ramicem esse cognosces. hoc modo scalpello curantur, derafa pube & scroto, nisi puer fuerit, ægrum super sedile resupinabimus, podici panniculo multiplici subiecto, scroto autem spongia iustæ magnitudinis, ac sedentes a sinistra ægrotantis, ministro qui ad dextram se debet, iubebimus vt genitale in alteram partem protendat, & cutem scroti ad abdomen eleuet, nos scalpello scrotum a medio iuxta longitudinem vsq; ad pubem fere recta linea incidemus, quæ vicina sit lineæ scrotum per medium secanti, diuidemusq; tunc tunicam erythroidem. Porro si humor in adnata membrana hæreat, qua vertex eiusdē tunicæ eminet, illac diuisionem moliemur. Hamulo autem oræ vulneris diducentur, & cultro ad hydrocelicos aptato scalpelloq; dartos detegemus, nudata vero erythroidi, scalpello quo venæ incidi solēt, mediam ipsam diuidemus, per illas potissimum partes, in quibus a testiculo recedit. Humore iam toto, aut maiore ipsius portione in vase aliquo excreto, erythroidem membranam hamulis eximemus, quā fieri licet tenuissimam ipsius partem. Inde vero Antyllus futuris & medicina cruentis accommodata vtitur, recentiores ea, quæ quod carnem inducat, sarcotice appellatur. At si testiculus putredinem expertus aliove modo vitiatu deprehendatur, vasa cum neruo, qui ab inguinibus dependet, cremasterē dicto, fune excipiemus, ipsoq; cremasterē præciso, testiculus eximetur. Item in iis qui duplici laborant ramice, similiter bifariam curationem moliemur, vtrinq; per scroti partes ad inguina lineas incidentes. mox specilli mucrone per diuisionem deorsum ad scroti extremum demisso, ipsoq; scrotum attollētes, acuto scalpro lineam qua humoris est emissarium, incidemus, vt & sanguinem concretum & pus per eam excernamus, ipso vero scalpelli mucrone linamentum in longitudinem implicitum superiori diuisioni inferemus, & vibicibus per spongiā deterfis lanā oleo madentem per sectionem infra ad testiculum, insinuabimus, extrinsecus alias lanas vino & oleo imbutas scroto, imo ventri, inguinibus, regioni inter scrotum & anum & lumbis superiniiciemus, ac vbi linamentum triplex super hæc implicitum deligauerimus vinculo in sex processus exporrecto, congruisq; fasciis, homo decumbet lanis scro-

to subiectis, vt conquiescat, pelleq; super ipsas molli explicata, quofomenta excipiantur. Superfundemus autem oleo calente, vsq; ad tri-
dum. post hoc vbi solueris, tetrapharmaco linteolis illito in vulne-
re, vteris, linamentum in longitudinem implicitum ex farinaceo pol-
line superaccommodans, extrinsecus fomenta rursus propter inflam-
mationem vsq; ad diem septimum iniicietur, inde medicamēto quod
lineteolo seruetur vtemur. Vulnere expurgato, & carne iam medio-
cri obducta, deinceps etiam lauacris adhibitis linamentum in longi-
tudinem implicitum auferri debet, & reliqua curationis parte suble-
quente, quemadmodum prius explicatum est, vtemur. At si inflam-
matio quæpiam fuerit, aut sanguinis profluvium, aut aliquid eiusmodi
interea superuenerit, conuenienter vnicuiq; occurrere conuenit, ne
semel dicta iterum repetam. Si vero vstionem potius in aquoso ra-
mice, sicut recentioribus visum est, adhibeamus, omnia quæ ante chi-
rurgiam, & post eam dicta sunt, exequemur, ipsum vero chirurgiæ
opus sine ferro tantum & diuisione per humoris emissarium fieri de-
bet. Decem itaq; aut duodecim ferramenti literam græcorum Γ imi-
tantibus, & duobus gladiolis primum scrotum ferro Γ referenti per
medium aduremus, cultello autem, aut cæco hamo membranas exco-
riantes ferramento ensi simili, has ceu præcidentes, aduremus. Nuda-
ta vero tunica erythroide, facile autem cum alba & tenuis existat, co-
gnoscitur, acie ferramenti instar Γ literæ facti perurentes humorē ex-
cernemus, postea totam ipsam detectam hamulis attollentes, ferra-
mento gladiolo simili auferemus.

De carnoso ramice & tophaceo.

Cap. lxiii.

Caro in particulis quæ scrotum implicant alibi succrescens carno-
sum ramicem producit. Nascitur autem ea, ex causa latente, testi-
culo fluxionem scirrhūq; experto, aut ex ictu, aut imperita post ra-
micis succissionem curatione, subsequitur autem hos color vbique sui
similis cum duritia. Si autem tumor in scirrhū coaluerit, nullus nec
color, nec sensus adest, si malignus sit, dolor vrget punctorius. Itaque
manum admoventes ægro, figurabimus ipsum, sicut & prius, diuide-
musq; similiter, & siquidem ex generata carne, vitium testiculi crea-
tum sit, & darton membranā & erythroidem consimiliter discin-
demus, deinde testiculo eleuato, eoque extra erythroidem exem-
pto, cremastere segregato a vasis, hæc quidem constringemus, il-
lum vero nempe cremasterem amputabimus, testiculum autem
qui cum adnata carne coaluerit, ceu alienum eiciemus. Sin
hæc carnis generatio in tunica aliqua, aut, vase fiat, scroto di-
uiso subiectisque carni, membranis, totum quod in carnem con-

PAULI AEGINETAE

creuit auferemus. quod si posterior commissura carne fuerit obducta, iis quæ ambiunt ipsam ademptis testiculum simul cum ea excipiemus, quippe fieri nequit, ut testiculus sine hac permaneat. Cæterum tophi & in testiculo & in membrana erythroide occalescunt, remixumulto, duritie, & inæqualitate a carnosio ramice & aquoso discreti. His igitur manum sicut etiam carnosio ramici admollemur.

De varicoso ramice & ventoso.

Cap. lxiiii.

Vasa in scroto, aut dartis membranis, dilatata, varices simplici vocabulo nominant. Alia vero quæ testiculum nutriunt, si varicūmore dilatentur, varicosum ramicem, Græci cirsoceleū vitium nuncupant. Notæ horum euidentēs sunt, quippe pars affecta tumidior, obliqua modice vix in modum, & testiculi relaxatio antea apparet, tū aliæ nonnullæ in agendo difficultates maxime in cursu, exercitio, et itinere. Hoc modo curamus, ubi commodè ægrum figuraueris, scrotum manu permulcetur, neruus cremaster in partem inferiorem repellitur. Facile autem is dinoscitur, ut qui tenuior vasis sit, solidior, renitensq; ceu potens validusq; æger quoq; ad depressionem ipsius indolet, & iuxta colem turbatur, vasa autem digitis nostris & ministri excepta in scroto, valideq; distenta, acie scalpelli obliqua adacta supra instrumentum quod vasis cedendis supponitur secabimus. deinde per hamulos ea quæ cuti subiacent eleuata excoriantur. vasis ut in capite de angiologia & aneurysmatis disputatum est, denudatis, acus duplex linum trahens transmittitur, ansaq; lini abscessa, vasa & in prima ipsorum dilatatione & inferiori extremo fune deligabimus, & per medium recta incisa linea, & sanguine qui coierat euacuato, medicina ipsos curabimus quæ pus moueat, ut etiam funiculi cum vasis sua sponte excidant. Leonides autem præcipit, quod si aliqua ex vasis testiculum nutrientibus dilatata fuerint, hoc modo esse faciendum, sin autem omnia, testiculum cum ipsis capi oportere, ne vasis alentibus destitutus contabescat. Porro vêtosus ramex, quum genere aneurysma existat, Leonidi quidem non attingendus videtur, propter periculū quod in varicibus ab incessabili sanguinis profluuiū accidit. Recentiores autem quum duplex ipsius sit generatio, alia ex quatuor vasis testiculum alentibus, alia ab arteriis darton membranarum & scrotum intercurrentibus, hunc quidem ceu desperatæ salutis, reputant, illum priorem scalpello curant. discernimus autem ipsos, quod qui ab arteriis enascitur, facile ad digitorum constrictionem euanescat, qui a venis testiculum nutrientibus, aut neutiquam, aut cū multo metu. Cæterum curamus ipsos, ut in varicosis ramicibus comprehensum est, singulas venas fune excipientes deligantesq;.

De intestinorum ramice.

Cap. lxv.

LIBER VI.

177

Intestinatorum ramex, quem Græci enterocclen dicunt, est cum in-
testina sunt in scrotum deuoluta, id quod fit aut peritonæo circa
ilia disrupto, aut eodem extenso. vtracq; igitur, ruptura (dico) & exten-
sio ex violenta quadā occasione præcedente proueniunt, nempe ictu
aut saltu, aut clamore. At qui laxationi fertur acceptus, proprie &
propter resolutionem, & alias corporis imbecillitates, accidit. Notæ
vtriq; communes sunt, cōspicius in scroto tumor, item quod in exer-
citiis, itinere, spiritus retentione, aliisq; occasionibus, idem maior quā
ptius euadat, compressus, tarde quidem recurat, celeriter autem rur-
sus deuoluatur, superne intestinum resupinatis in loco permaneat, do-
nec erigantur. Stercus autem in scrotum receptum periculum subin-
de ipsis intulit, dolent enim, nonnunquam etiam impressis digitis so-
nitum elidunt. Peculiaria ramicis ad relaxationē relati indicia sunt,
quod non vna vice, sed particulatim temporis spatio, et quod ob cau-
sas quaslibet, nonnunquam intestinum deuoluatur, tumor æquabilis
& profundus appareat, intestino quod deuolutum est, peritonæo con-
stricto. Ex ruptura facti ramicis signum est proprium, quod vna vice
ac subito ab initio intestinū deuoluatur, idq; ob causas violentas dun-
taxat, quod tumor immensæ magnitudinis, inæqualis, & per summa
protinus in cute emineat, quoniam intestina extra peritonæum ela-
buntur. Si igitur rupto peritonæo omentum duntaxat in scrotum in-
ciderit, vitium omenti ramex, Græcis epiplocele appellatur, si intesti-
num quoq; delabatur, omenti intestiniq; ramex, Græce epiploentero-
cele dicitur, si vero & aqua in tunica erythroide apparuerit, compo-
sita ex tribus quoq; appellatio sumitur. Cæterum neq; hos, neq; ex
ruptura intestinatorum ramicem chirurgiæ subiicimus, solum vero ex
relaxatione ramicem intestini manu curamus, hunc in modum. ho-
mine resupinato & cute iuxta inguina per ministrum eleuata, trans-
uersam lineam incidimus, vt in angiologia explicatum est. Nonnul-
li vero non transversam, sed rectam lineam ducunt, hamuloq; defixo
diuisionem explicant, quæ testiculum retractum mensura adæquet,
deinde rursus tot hamulis per quartam cutem transmissis quot vulne-
ris magnitudini sufficiant, cæco hamo, aut aultro membranas & pin-
guedinem subtus excoriantes, scalpello præcidimus. detecto autem
vndequaq; peritonæo, demissoq; indice digito ad posteriorem scroti
partem inter peritonæum & dartum membranā, posteriorem con-
nexum soluemus, deinde dextra manu extremum implicant ad in-
teriora scroti, simulq; sinistra peritonæum retrahentes ad diuisionem
retrahemus testiculum vna cum membrana erythroide, ac ministro
vni iubebimus testiculum eleuet, ipsi vero posteriorem adnexum ex
toto simul cum membrana erythroide dissoluentes, explorabimus di-

Z 3

PAULI AEGINETAE

gitis num intestini inuolutio quædam in tunica erythroide relicta sit,
& infra hanc ad alium propellemus, deinde acu bonæ magnitudi-
nis linum ducente duplex, decies implicitum ad peritonæi terminū
qui diuisionem respicit per medium transuemus. † Succisis autem li-
nis quatuor faciemus initia, atq; his per vinculum rursus implicatis,
utrobique peritonæum valenter dstringemus, iterumq; initiis circum-
uolutis, astringemus quidem strenue, ut nullum ex vasis nutrientibus
adhuc possit cedere ne inflammatio inde concitetur, item secundum
extrinsecus vinculum iniiciemus minus quam duos digitos a priori
distans. Post hæc vincula digiti instar ex peritonæo relinquentes, to-
tum ipsum orbiculatim præcidemus, auferentes simul nimirum & te-
sticulum, rursus diuisione iuxta emissarium scroti adhibita, linamen-
tum in longitudinem implicitum iniicitur, & fomentis oleo imbu-
tis vinctisq; ut in aquoso ramice iniectis, omnia quæ restant, quem
admodum illic expositum est, perficiemus. Nonnullos autem nō im-
peritos chirurgos noui, qui membrana erythroide excisa, ferramen-
tis candentibus extremum ipsius adurerent sanguinis profluuii me-
tu, ut est verisimile. Hi autem ipsi post scalpelli administrationem
ægros protinus in folio oblongo ligneo, cui aqua inesset calida ad se-
ptimum diem vsq; lauabant, quinquies per diem noctemq; id facien-
tes, præsertim in pueris, & mirifice res processit, nam citra inflamma-
tionem ipsi secabant, & funiculi vna cum corporibus protinus deci-
debant. Interea vero dum ægri lauabant, prædictæ superfusiones ini-
ciebantur. Alius quispiam præter commemorata etiam pipere trito
cum oleo ceruicem ipsorum eodem tempore infricabat.

† Hic locus sic legitur in veteri codice, *κόψαντες δὲ τὸ διπλὸν
τέσσαρας ἀρχὰς ποιήσωμεν, καὶ ταύτας κατὰ χιασμὸν ἀντεμπλέ-
ξαντες εἰς ἀμφοτέρω, id est, postquam sciderimus duplicatum linum
quatuor capita faciamus, & his decussatim implicatis ex utraq; par-
te peritonæum valide constringamus.*

De inguinum ramice, bubonocoele vocatur. Cap. lxxvi.

In testini ramicem ex relaxatione creatum, inguinum hernia præ-
cedit, primum enim peritonæo nimis intenso, intestinum laxatum
tunc quidem in inguina abscedit, facitq; ramicem, quem Græci bubo-
nocelen dicunt. Hunc vetustiores in eum modum scalpello curant, li-
nea transuersa per inguina intumescencia, tres digitos longa incidi-
tur. Hinc membranæ & pinguedo eximuntur, aduerso autem specil-
lo peritonæo per mediū detecto qua fastigiatur adigi debet, id enim
intestina in altum repellit. Itaque peritonæum intus restitutum utro-
bique aduerso specillo, futuris inuicem commitemus, deinde specil-
lum extra hemus, neque peritonæum præcidentes, neque testiculum;

neque aliud quippiam retinentes, sed præsidio cruentis idoneo persanantes. Quoniam vero recentiores vstionem potius in inguinum ramibus probarunt, hanc quoque non præter institutum trademus. Homo mediocriter moueatur, tus si violenta, intentione, spirituq; re-
tento. vbi tumor in inguinibus apparuerit, locum qui vri debet, atramento scriptorio aut collyrio, figura triangula circumscribemus, transuersam lineam per inguina sursum ducentes, iniiciemusq; signum per trianguli medium. postquam æger decubuerit, cādens ferrum per mediam notam imprimemus, primum clauatum, inde per trianguli costas Græce Γ literæ figuram repræsentans, tertio laterculati aut lenticulato totum triangulum adæquabimus, ministro per totam vstionē saniem panniculo extergente, tam alte vero aduremus quousq; pinguedinem pertingamus, idq; in habitu corporis moderato, neq; enim in gracilibus ob siccitatem ferrum altius admouendum est, ne imprudentes peritonæum aduramus, neq; tamen in crassioribus pinguioribusq; in quibus vel ante iustam vstionem pinguedo apparet, sed quātum vri conueniat artificiosa deprehendemus coniectura. Secundum vstionem sal vna cum porro tritus crustæ insinuabitur, & inguinario in literæ x similitudinem ligamento vtemur, per insequentes dies remediis crustam adimunt, nempe phacomelite & similibus curabimus.

De scroto attenuato, laxoq; attritorum panniculorum modo.

Cap. lxvii.

LAxata scroti cute sine interioribus ipsius particulis vitium maxime indecorum gignitur, quod Græci racosin appellant. Leoni des igitur resupinato homine, quod in ea superfluum erat scalpello super asserem, aut durum corium, quod incidendis subiicitur excidebat, orasq; vulneris futuris committebat. Antyllus autem tribus etiā quatuorve futuris superfluam cutem prius punctam forfice acuta aut scalpello post futuras auferēbat, futurisque adunitam vt cruenta curabat.

Quomodo fiant eunuchi.

Cap. lxviii.

Cum ars nostra huc tendat, vt corpora a statu qui præter naturā est in naturalem deducat, eunuchos faciendi ratio, quam Græci eunuchisimum dicunt, contraria promittit. verum quia & inuiti subinde a præpotentibus quibusdam eunuchos facere cogimur, explicandus compendiose modus est, quo illis satisfaciamus. duplex itaque est, alter contusione, alter excisione perficitur, & prior quidem in hunc modum. Pueri adhuc infantes in aquæ calidæ solium collocantur, deinde vbi corpora eodem solio fuerint relaxata, digitis testiculi premuntur, vsque dum aboleantur & euanescant, dis-

Nā anti-
quis si-
mæ regi-
næ ho-
sce sul-
cus des-
habebat
& in
vfu ni-

Z 4

PAULI AEGINETAE

nisterio que et in ludis iocisq; unde Perian-
dri apud Herodotum opes im-
mensae ex mer-
catura ingenuo-
rum puero-
rum, quos eunu-
chos faci-
ebat. Quia tunc
quoque quum
Paulus scribe-
bat, in
usu eu-
nuchi
erant, ideo
de hac
re praeci-
pit, quam
non de-
prava re na-
tura sed ip-
sam resti-
tuere me-
dici est.
Dicit autem
in fine ve-
nerem ap-
petere

luti non amplius ad tactum occurrant, Excisione hac ratione effici-
tur, Resupinatur in sedili qui eunuchus fieri debet, & scrotum cum tes-
ticularum sinistræ manus digitis premitur, quo facto duas lineas rectas
vnam per alterum testiculum scalpello incidit, ubi exilierint testicu-
li cute detracta excabuntur, ita ut tenuissimum solum naturale va-
forum commercium relinquatur, atque hic modus, eo qui per contusio-
nem fit magis probatur. Nam qui contusionem testiculorum sunt
experti, nonnunquam venerem appetunt, parte aliqua ut verisimile
est testiculorum inter contundendum delitescente.

De hermaphroditis.

Cap. lxxix.

Hermaphroditon vitium ex compositione Mercurii, & Vene-
ris appellatum est, multum utriusque sexui adferens indecori. Cum
enim quatuor Leonide autore differentiae existant, tres quidem in vi-
ris, una in mulieribus constituitur. In viris siquidem alias iuxta re-
gionem inter scrotum, & anum, alias in medio scroto muliebris pu-
dendi pilis obstitit forma apparet. Tertia vero ad haec accedit in qua
nonnulli veluti ex pudendo quod in scroto est urinam profundunt.
In mulieribus supra pudendum iuxta pubem virile frequenter geni-
tale inuenitur tribus quibusdam extantibus corporibus uno tanquam
cole, duobus autem veluti testiculis. Tertia itaque virorum deformitas
qua urina per scrotum excernitur, curationem non recipit, reliquae
tres curantur corporibus superuacuis e medio sublatis, & ulcerum mo-
do tractatis.

Quomodo nympha excidenda sit, & cereosis
emendanda.

Cap. lxxx.

Caruncula in sinu muliebris pudendi subsultans Graecorum lin-
gua nymphae dicitur, quibusdam immensae magnitudinis effici-
tur, & non decentis inue-
ecundiae notam praefert. Quemadmo-
dum vero nonnulli memoriae produnt, sunt quae hanc partem arri-
gunt, viris similiter, & in venerem ruunt. Quapropter resupinata mu-
liere vulsellis nymphae superfluum prehensum scalpello excindimus,
diligentia adhibita ne alte ipsam penetremus, unde fluidus affectus,
rhyada vocant, excitetur. Porro cereosim, cum sit carnis ab utero ore
propago quae muliebri pudendum repleat, interim foras caudae mo-
do procidat, nymphae consimiliter auferemus.

De muliebrium locorum thymis condylomatis & haemorrhoidibus.

Cap. lxxi.

Thymus eminentia quaedam est, nunc rubens, nunc alba, plurima
parte sine dolore, thymi corymbis similis, condylomata vero, ex
crescentiae sunt rugosae, quemadmodum haemorrhoides iis quae in
ano sunt respondentes, interim & sanguinem profundunt, omnes

itaque eiusmodi in mulieribus excrementas, quæ in conspectum veniunt, inter detegendum vulsella comprehensas, ferramenti quod ex dimidio spatham refert, acie excindemus, utemurque galla læuigata, aut scisso alumine. Nam e lino deligaturam in his maiores chirurgi non admittunt.

De non perforatis & phymo. Cap. lxxii.

Genitales mulierum partes clauduntur, interim ex natura, interim ex accessorio, morbo quodam præcedente, alias in imo, alias in alis, sæpe etiam in medio spatio, idque aut secundum naturam aut ex obstructione. Quod autem foramen intersepit intercluditque, vel caro vel membrana est. Cæterum hoc mali graue fit impedimentum, modo in coitu, modo in conceptu vel puerperio, aliquando mensium purgatione, si quæ loca obstruit caro totum spatium occupauerit, in quibusdam enim medium foramine patefcit. Causa igitur inuenta, vel ex promptu, vel etiam demisso speculo, si quidem commissura solum fuerit, hanc recta linea scalpello fistulis accommodato dissoluemus, si autem distentio, hamulis per medium corpus siue id membrana, siue caro existat transfixis eleuatum, scalpello diuidemus, ac sanguinis fluore medicamentis sine rosione siccantibus suppresso, iis quæ cicatricem ducunt utemur, pessarium aliquo cicatricem inducente vinctam subiicientes, in quibus potissimum non alte admodum administratio est adhibita, quod ea de causa fiet, ne particulæ rursus coalescant, iam phymus in ostio vuluæ succrescens pari modo curatur.

De abscessu vuluæ.

Cap. lxxiii.

Vbi abscessus circa os vuluæ prouenerit qui manu tractari queat, non prompte ad sectionem properare consilium est, sed cum affectio fuerit absoluta, inflammatio plurima parte increuerit, corpora quæ humoribus incumbunt, attenuata, idque propter vteri excellentiâ. Inter agendum vero mulier in sella resupinabitur cruribus ad abdomen, & femina contractis, inuicem diuaticis, cubiti ipsius sub poplitibus subiicientur, & funiculis congruentibus ad ceruicem deligabitur, medicus autem ex dextra sedens tentabit speculo, quod dioptram dicunt ætati accommodato. conuenit autem specillo sinus muliebris altitudinem metiri, ne maiori speculi tridente, vterum premi contingat, & si amplior ille sinu reperiatur linamenta implicita alis imponuntur, ut super ipsa speculum firmetur. Cæterum conuenit speculi tridentem qui testulam habeat, in superiore parte intro demittere, et specillum a medico contineri, testulam a ministro conuerti, ut laminis tridentis diductus sinus aperiatur. Iam veto si abscessus occurrens molli & tenuis existat, qui digiti tactu subsidet, iuxta verticem diuidetur spathula, aut specillo, ori vuluæ pure vacuato, linamentum in lon-

quosdã
ex mala
concisio
ne. nam
apud
Philost.

vnus eu
nuchus
cũ pelli
ce regis
cubãs in
uentus
fuit.

Id quo
que Ari
sto. testa
tur, ut
alio lo
co retuli
mus.

PAULI AEGINETAE

gitudinem implicitum, lemniscum dicunt, tenerrimum ex oleo rosaceo imponetur, vel potius extra diuisionem sinui muliebri sine compulso inferetur. Extra vero summas oras & super pectinem lumbosque lanæ succidæ aut puræ, oleo madentes accommodabuntur. Tercio die infidebit mulier in hydrelæum calidum, aut maluæ decoctum absterfis sudoribus linamentum in longitudinem implicitum in fissuram tetrapharmaco per se, vel cum discocto melle inunctum leniter insinuabis, erit autem solutum butyro aut rosaceo, exterior regio cataplasmatibus obducetur dum inflammatio cessauerit, & vulua abscessu purgata fuerit. Sin autem difficulter expurgetur, collui debet auriculario clystere ex iridis decocto, aut aristolochiæ, aut melie. Cicatrix duci debet emplastro ex cadmia, soluto vino, per linamentum madidum. At si intra os vuluæ abscessus fuerit, attingi non debet.

Qua ratione partus ex vtero excutiat, excidaturq.
Cap. lxxiiii.

Id quod
factu
difficili-
mu Hip-
po. iudi-

Quomodo ægre parienti succurratur tertio volumine tradidimus, sin autem eo nihil proficiatur, ad chirurgiam merito diuertimus, id primum notantes, mulier superfices ne futura sit, an minus, & si quidem salus speratur tunc manum admoliamur, sin contra, attingi non debet. Qui igitur perniciem sui portendunt, inexpugnabili dormiendi necessitate vt in lethargo sopiuntur, resolutæ sunt, & vix possunt excitari, ac si excitentur, imbecilliter respondentes, rursus graui sopore premuntur. Nonnullæ conuulsionis modo contrahuntur, aut neruis commouentur, aut alimentum non sentiunt, pulsus valide inturgescens deprehenditur, sed languidus & imbecillis, quæ incolumes futuræ sunt, nihil eiusmodi patiuntur. Oportet igitur resupinam mulierem in lecto sic collocare, vt figura ipsius magis sit decliuis, crura ipsius elata mulieres vtrique contineant, aut quædam ministræ. Si vero non adfuerint, mulieris thoracem vinctulis quibusdam lectulo adfirmabunt, vt ne corpus, attrahentes sequens, tractionis vim dissoluat, ac alis vuluæ diductis, per ministrum & sinistram manum contractam cum valētibus digitis extenuatis, in ostiolum inferemus, idēq; pertentabimus, & oleo infuso relaxabimus, disquirentes vbi vncum quo fœtus extrahetur, defigi conueniat. Idonei vero loci sunt quibus iniicietur, si in caput conuersus infans descendit, oculi, occiput, os iuxta palatum, mentum, clauiculæ, & sub costis sitæ regiones, adhæc præcordia, quæ Græci hypochondria appellant, si in pedes conuertitur, ossa super pubem extantia, intercostalia, clauiculæ rursus & deinde vncus dextra manu continebitur, flexu ipsius digitis occultato, sinistra manu leniter inferemus, & particulæ cuiuspiam ex prædictis

Hæc ea-
dem ad
vnu oīa
ab Hip-
po. præci-
piuntur.

vsque ad vacua transmittemus. huic alter opponetur, quo attractio recta procedat, neque alteram in partem inclinet, deinde æquabiliter trahetur non solum recta, sed etiam in latera, quemadmodum in dentibus eximendis fieri solet, & tensionem interea remittere iterum non conuenit, postea vero indicem digitum vinctum, aut etiam plures demissos inter os vuluæ & corpus impactum, orbiculatim circumagere, veluti excoriando, si autem iuxta rationem vncus subsequatur, in superiora transferre conueniet, atque sic agere dum perfecta foetus sit extractio. Si autem manus obiecta fuerit, nec propter obstructionem queat conuerti, circumposito panniculo, ne reuoluatur, modice attrahere oportet, ac prolapsam totam ab humero abscindere, idemque facere etiam si duæ manus prociderint. similiter etiam pedes procidentes, corpore reliquo non subsequente, ab inguinibus amputari oportet, deinde reliquum corpus dirigere conandum. At si caput iusto maius obstructionem pariat, & hydrocephalon sit, idest, aquam in capite infans collegerit, spatula polypis dicata, aut scalpro, aut cultro quod scolopomachæron dicitur, inter digitos occultato, caluariam diuidemus vt vacuata concidat. quod si naturaliter amplum sit caput, similiter diuisam caluariam forcipe qua dentes aut ossa extrahuntur, comprimemus. Si ossa emineant, hæc quoque auferre ratio est. At si capite ad thoracem adacto, obstructio prouenerit, eodem instrumento clauicularum compages vsque ad interiora spatia diuidentur, vt humore vacuato thorax concidat & collabatur, quod si non concidat, diuisas etiam clauiculas ipsas auferemus, tunc enim collabatur. Porro si imus venter mortuo foetu sit inflatus, aut aquam subter cutem collegerit, eadem ratione ac via eum vacuare cum ipsis interaneis aggrediemur. Cæterum si in pedes deferuntur, foetus declinati facile ad vteri os diriguntur, quod si iuxta thoracem aut abdomen fuerit impactus, linamento ipsum attrahemus, eodemque modo ea quæ ambiunt, diuidemus. At si reliquis ablatis caput ad superiora reuersum inhæserit firmius, sinistra manus demittetur in vterum, & si os ipsius pateat, manum in ima transferemus, ac caput inuestigatum digitis ad os deuoluemus, deinde vncum vnum aut alterum defigentes, propter orificii inflammationem non propellemus, sed infusionibus pinguibus copiosisque vtemur, item infusibus, formentis, & cataplasmatis, vt diducto ore auferatur, quemadmodum superius comprehensum est. Porro latera foetus, si quidem in rectum diriguntur, prædictis vtemur rationibus, sin minus, totum ipsum intus dissectum particulatim eximemus, cura adhibita, ne particula quæpiam ipsius nobis nesciis intus relinquatur. Postquam manu scalpelloque administrationem obierimus, remediis ad inflammationem inscriptis

Ex quo
agrippæ
dicti
sunt.

PAULI AEGINETAE

utendum est. quod si profluuium sanguinis oboriatur, huius quoque curationem accepisti.

† Huius loci multo verior est scriptura in veteri codice, *τὴν ἐνών-
μον χεῖρα συναγμένην μετ' ἐνδύων δακτύλων λεπτὰσμένην*, idest,
dextram manum contractam eum fortibus digitis pingui aliquo in-
unctam &c.

Si secundæ fuerint relictæ.

Cap. lxxv.

Foetu excusso frequenter accidit, vt velamentum illius in vtero firmiter adhærescat, quod nostri secundas, Græci chorion, & deu-
terion appellant. Diducto igitur vuluæ ostio, secundæ quæ inibi re-
lictæ sunt, & in partem aliquam orbiculatim cōuerfæ, facile educun-
tur. Manu siquidem sinistra calida, inunctaq; in fundum demissa, se-
cundas sublabentes oportet eiicere. Si autem fundo vteri fuerint ad-
natæ, demissa similiter manu comprehendentes tendemus, neq; in re-
ctum, ne vulua procidat, neq; violenter admodum, sed leniter primū
deducemus, huc illuc circumagentes, deinde paulo valentius. hoc
enim pacto obsequuntur & a connexu dissoluuntur. Quod si vuluæ
os conuiuere fuerit deprehensum, remediis ad hoc cōmemoratis vten-
dum est. Si vires non fuerint inuolidæ, etiā iis quæ sternutamenta pro-
uocant, & aromatum halitu ex fictili vaporari conueniet, & si os
vteri diductum sit, manu inserta, secundas vt dictum est extrahere co-
nabimur. At si ne sic quidem exemptæ fuerint, terrere nos non debet,
secundum paucos enim dies putrefactæ & in faniem resolutæ exci-
dunt. Quia vero grauitate odoris & caput opplent & stomachum
peruertunt, suffitus conuenientes excitabuntur, ad eos autem cardamo-
mum & ficus aridæ commendantur.

Quomodo coxendices adurantur.

Cap. lxxvi.

Quemadmodum humerus, ita etiam coxa propter humidita-
tis copiam nonnullis excidens, vstionem postulat, quod Hip-
pocrates his verbis testatur. Quibus coxa ex diuturno ipsius crucia-
tu loco suo mouetur, crus contabescit & claudi fiunt, nisi vstionem
experiantur. Conuenit igitur tunc illum præsertim locum adurere, e-
que articulus excidit, sic enim humor redundans desiccabitur, & lo-
cus cicatrice densatus non amplius os suscipiet, quare etiam penitus
illic vstionem moliri conuenit. Recentiores autem tres crustas adhi-
bent, vnam retro vrentes in acetabuli sinu, alteram supra genu extrin-
secus, & tertiam supra exteriorem talum, qua est carnosior.

De fistulis & fauis.

Cap. lxxvii.

Cvm locus postulet de ani fistulis differere, nihil mali fuerit prius
generatim de omnibus fistulis verba facere. Itaq; fistula sinus est
callo obductus, aliquatenus indolens, in pluribus nascens particulis

magna vero parte ex abscessibus oritur parum dextre curatis. Cal-
lus autē cōtinua quædam caro est, albida, madoris expers eoq; etiam
doloris, neq; vena, neq; neruo ad ipsum pertinente. Interim sinus sic-
cus, interim humidus est, nunc humor incontinenter fluit, nunc certis
quibusdam temporibus remittit, ore ipsius oppleto iterumq; adaper-
to. Alias fistulæ in os desinunt, alias in neruum, aut aliam quampiam
principem particulam, vel recte intus tendentes, vel oblique, item vel
vno ore, vel pluribus peruiæ. Quæ igitur in grandes arterias aut ner-
uos, aut tendines notatu dignos, aut membranam costas succingen-
tem, aut aliquam principalem particulam deueniunt, vel nequa-
quam, vel certe, cum artificiosaq; diligentia attingere debemus reli-
quis hunc in modum manum admoliemur. primum tentabimus, si
quidem recte intus tendant, cultro excisorio, si oblique, specillo du-
plici cuspide, flexili. Huiusmodi autem sunt quæ ex stagno fiūt, item
ex ære tenuissima. In quibus autem duæ pluresve oræ habentur, no-
tationi per specillum non obtemperantes, sinu per vnum ipsius orifi-
cium adusto, ex clysteris in reliquas oras transitu deprehendemus,
num vna fistula sit pluribus oris dehiscens, an plures, ac vbi tentatum
est, si quidem per summa habeatur sinus, arctusq; sit, demisso specillo
explicantes, scalpello figura commodiore callum tollemus, aut vn-
guibus, aut acie scalpri deradentes, at si latitudinem habeat, corpora
superflua, tolli debent, sin autem non summa occupauerit, sed penitus
recte tendat, eo quatenus licet in alto diuiso, orbiculatim totum cal-
lum auferemus, q; si reliquæ ipsius aliquæ remanserint, medicamento
adurente eas consumemus, quod si amplius quum sit medicamento
non cedat, ferro candente crustas ei inducemus. Cæterum si fistula in
os terminatur, hoc idem quod integrum est, duntaxat rademus, vbi
vero cariem aliamve quandam corruptionem experitur, quod vitia-
tum est, totum excisoriis, aciem inter sese oppositam habentibus tol-
lemus, si opus sit, prius terebra perforatum, siue ad perspiratum dunta-
xat, siue ad medullam vsq; fuerit vitiatum. At si os quoq; emineat,
caulis modo porrectum, ferra ipsum adimemus. Sumptis itaq; duo-
bus loris, vnus quidem medium ossi eminenti subiciemus, ipsumq;
per ministrum attollemus, alterius autem quod crassius est, uel ex la-
na quoq; factum, similiter medium carni quæ ossi subiacet adaptan-
tes, initiaq; infra prehendentes, per ipsum lorum carnem deorsum iu-
bebinus detrahi, ne ipsa ferræ dentibus perradatur, atq; hoc pacto
nos excretionem molimur. Vbi vero particula quæpiam princeps
subiecta est, exempli gratia, membrana costas inuoluens aut spinalis
medulla aut eiusmodi aliqua, inter excidendum aut ferra coneutien-
dum os, laminam, quæ quod mēbranam cerebri custodit meningo-

PAULI AEGINETAE

philax græce dicitur, subiiciemus, non vitiatum autem osse, totum orbiculatim carne nudum ferra eodem modo deradetur. Fieri nanque haud potest, ut ossa circulatim implicita carne obducantur. Simili ratione si ossis terminus prope articulum fuerit vitiatum, idem ferra aut ferri debet. At si totum subinde os, nempe cubitus aut radius aut tibia aut eiusmodi aliquod contabuerit, totum adimetur. Femoris autem caput, aut coxa, aut spinalis medullæ vertebra affecta, attingi non debet, periculi quod ex arteriis adjacentibus accidit evitandi gratia. Hoc igitur modo hac via faciendum est in singulis ubique particularium vitiatum situ, vicinitate, & naturæ consortio inspecto, item morbi magnitudine, & laborantis virium robore considerato. Cerion autem, hoc est fauæ quum sinus sit fistulosus, mellea disfluens humiditate, eandem administrationem curationemque cum fistulis & alijs sinibus requirit.

De ani fistulis.

Cap. lxxviii.

A Ni fistulæ latentes quidem notantur inde quod ore non apparente dolor ipsis oboritur, & purulenta humiditas per anum profundatur. Plurimis abscessus quoque indicia præcesserunt, manifestæ autem cultro excisorio, aut seta porcina demissa noscuntur. Nam instrumentum ad ima penetrat, & digito indice in sedem transmissio occurrat, fistula nimirum ad interiora perforata. At in iis quæ perforatæ non sunt, instrumentum digito, non statim occurrit, sed obstat in medio corpus non perforatum. Tortuosas autem & labyrinthi modo flexuosas agnosces inde, quod instrumentum paululum procedat, pus autem ad illarum portionem copiosum efferatur. At quæ prope intestinum oriuntur fistulæ, agnitionem sui præbent, quod nonnunquam & lumbrici & stercus per orificium erumpas. In omnibus autem fere callus aliquis in orificio prominet. Itaque fistula insaniabilis est, quæ vesicæ ceruicem perforauerit, aut quæ ad femoris articulum sit, aut quæ ad ipsum longanone tendat. Aegre vero consanescit, quæ orificio caret, tum quæ delitescit & in os terminatur, multifariamque fissæ est, reliquæ in vniuersum facile curantur, administratione hunc in modum adhibita, resupinato homine, ut cruribus sursum porrectis femora ad venterem inclinet, quemadmodum fit in iis quibus clyster in aluum mittitur, si fistulæ extremum in summo occurrit, culter, aut auricularum specillum per orificium demittitur, subiectaque cutis simplici linea exciditur, si autem alte intra sedem fistulæ terminus finiat, demisso per orificium cultello, siquidem perforatam ipsam inuenerimus, demisso iuxta oppositam affecto ano manum indice digito, eiusdem cultelli initium adigentes & deflectentes, ipsum foras reducemus, ac corpora quæ incumbunt cultello, simplici diuisione liberabimus. At

si nondum fistula perforata reperiatur, in altum vero ani duntaxat
 terminetur, & tentantibus nobis indici digito occurrat, corpus inter
 cedens cum squamosum membraneumque sit, vehementius mucrone
 cultelli perforabimus, traductoque per sedem cultro, rursus scalpello
 corpora quæ ei incumbunt dissoluemus, quemadmodum prius expli-
 catum est. Si igitur terebræ aut scalpelli ad fistulas accommodari acie
 sinus fundum iuxta sedem perforauerimus, ipsum instrumentum per
 anum inferentes, illinc totum quod interiacet acie terebelli pertunde-
 mus, & post excisionem vulsellæ aut forfice corpore diuisionem am-
 bientia (calli autem sunt) prehensa ex toto adimemus, musculum qui
 anum constringit, sphincter dicitur, ubique vitantes. Nonnulli siqui-
 dem radius dum in alto sectionem molirentur, ipsum conuulnera-
 runt, atque inde inuoluntaria stercoris excretio homini accidit. At si
 qui timidiusculi chirurgiam fugiant, Hippocratica uti debent e lino
 deligatura. Iubet siquidem Hippocrates, linum quintuplex crudum
 cultro forato vel specillo per fistulam demittere, et lini principia con-
 iungi, ac quotidie constringi donec corpus totum quod duabus oris
 intercedit, dissectum, linum eructet. Si vetustate malum contraxerit,
 quum dissolues, etiam psaro aut eiusmodi quodam arido illito linum
 oportet pertrahere. Sunt qui foramini terebræ fistulis dicatæ infer-
 tum linum iuxta prædictam rationem propellunt, quod meo iudi-
 cio non conuenit. Dum enim chirurgiam vitant, præter quod hanc
 requirunt, etiam curationem remorantur. de latentibus autem fistulis
 Leonides hunc in modum tradit. Cum autem alta pars stringentis
 anum musculi in fistulam dehiscit, quæ vel a sede incipiat, vel lon-
 gius procedat, post notas indicatas, disquiretur instrumento quod ad
 sedem diducendam sit aptatum. dico autem exiguo perspecillo quod
 Græci dioptrion appellant, anum ut muliebrem sinum, distendi. At
 cum fistulæ os clare apparuerit, per ipsum specilli, mucro demittetur,
 propelleturque in anum, lamina vero subiecta tota fistula super eam
 diuidetur semispathula aut spatha fistulis incidendis peculiari. Nos
 autem cum in talem incidissemus affectum, hoc administrationis
 modo uti non potuimus, quod ductus fistulæ in conspectum non
 veniret. Nam inter anum & eius fibulam dextra parte sita erat,
 instrumentum vero quod ei diducendæ erat impositum, magis
 operationem adumbrabat, at per digitos distendentibus anum no-
 bis, rima quædam inter vnam quandam ani rugam ceu fistulæ emis-
 sarium apparebat, etenim pus per ipsam emanabat, per eandem
 vero cultelli mucronem in fistulam demittebamus ceu manu ab ea
 ducti, deinde dextræ manus indice digito, ani fibulæ inserto, tandem
 cum inuenissemus quoddam inter digitum & instrumentum, tenue vlcera

Vim ha-
 bet con-
 stringen-
 di ani
 muscu-
 lus is
 σφιγ-
 κτης
 græce
 appella-
 tus. est
 autē uir-
 tus hæc
 una de
 quatuor,
 quas
 prudens
 natura
 mēbris
 contri-
 buit prin-
 cipali-
 bus.

Qui ti-
 mor qui
 dem in
 chirur-
 gia ut
 paulo
 post in-
 quit, me
 dedi tar-
 ditatem
 adfert, ut
 tandem
 vlcera

PAULI AEGINETAE

contabe facta ho minem enecent. Quare feritas (vt ita dicam) in chirur gia mi- lericor- dia po- tius ap- pellāda est. timi- ditas cō- tra cō- des ho- minis ægro- tātis esse iudica- tur. Itaq; firmo pe- ctore ne que ma- nu tre- mente chirurgi- ca opera aggredi medicū debere, dictum, vetus sa- piētum. itidēq; qui cu- ratur, au- daces es- se debēt

corpus, cumq; violentius cultellum digito adegissemus, fundum fistu- læ sursum conuersum perforauimus, vbi iam digito mucronem instru- menti foras traiectassemus, conspicuum nobis factum totum corpus quod intet fistulæ orificia habebatur, dico autem ea quæ initio ad hu- moris emissarium sita erant, & ea quæ nunc a nobis facta sunt scalpel- lo præcidentes dissoluimus.

De hæmorrhoidibus.

Cap. lxxiix.

C Vm hæmorrhoidum notæ ex ipso quod vacuatur innotuerint, antequam manum admolamur, clystere vtemur copiosissimo, simul intestini superuacua inanientes, simul & anum, vt promptius internertatur & extrema ipsius pars exeat, irritantes. Resupinato igitur ægrotante aduersus lumen clarum, siquidem constrictione vfi fuerimus, linum quintuplex ferramento quo ora venarum in ano extantia aduruntur, vel quo vuæ, labris hæmorrhoidum circumpo- nentes vnāquamq; hoc fune astringemus, vna duntaxat relicta, qua sanguis superfluous emanet, quod etiam Hippocrates præcipit. Post astrictionem linamento implicito oleo madentē, & ad sedem accommodato ligamēte, vfi, ægro. quietem indicemus, oleo tepido, aut mulla ventri medicantes, deinde postea cataplasmate ex micis panis & croco vtemur. Vbi hæmorrhoides exciderint vino cicatrix ducitur. Leonides autem non e lino deligat, sed forcipe prehen- sas ampliter hæmorrhoidas scalpello excindit. A chirurgia, fuligine thuris vtendum & amylo, chalcitide, vel eo medicamento quod vsta spongia simul & pice constat, item pastillo faustino ad absolutam adustionem. Alij vero instrumenti quo vuas vruntur, concavo, medi- camine quod adurat repleto, quemadmodum vuam, sic etiam hæ- morrhoidas vsserunt.

De condylomatis, tuberculis, & rimis.

Cap. lxxx.

A Ni condyloma loco solum ab eo quod muliebres locellos in- festat, differt rugosa & ipsa sedis excrescētia, aut inflammatione, aut rima quæ dicitur rhagas præcedente. Per initia, itaq; tuberculum appellatur, cum occalescit autem condolyma quare conuenit, hæc quoq; quemadmodum illa, vulsella apprehensa excindere, & medi- camentis crustam ducentibus curationem absoluere. rimas autem a stercore potissimum indurescentes, & quia dum cicatrix generatur, occalescunt, inueterascuntq; recentes, faciemus, vel vnguibus vel scal- pello radentes & cicatricem vt par est, inducemus.

De ano non perforato.

Cap. lxxxxi.

P Veris recens natis, anus ex natura non perforatus interim inue- nitur, membrana videlicet obstructus. hæc igitur si fieri potest, di- gitis ipsis dirumpetur, sin minus, acie scalpelli eam excindētes, vino curabimus.

curabimus. Quoniam vero & prouectis subinde ob vlcus non de-
xtra curatum anus committitur, conuenit hanc vnitionem instru-
mento conuenienti disruptam curare, fistula plumbea, aut obturami-
ne quodam ano vsq; dum in totum consanescat, commode imposi-
to, ne rursus coalescat. Porro obturamentum medicamine quodam
cicatricem ducente oblini debet.

Quomodo varices excindantur.

Cap. lxxxii.

Varix venæ dilatatio est, aliquando in temporibus, aliquando in
ima ventris parte sub vmbilico, nonnunquam etiam circa testi-
culos, sed maxime in cruribus. Hic igitur originem plurima parte ex
materia melancholica trahit. eorum autem qui testiculis oboriun-
tur curationem per scalpellum iam in capite de varicum ramice tra-
didimus, atque his similiter crura infestantes aggrediemur, ab inter-
iori femoris parte incipientes, vbi etiam origo ipsorum magna ex
parte inuenitur. inferius enim, in plures distributi propagines diffici-
lius tractantur. Loto igitur homine, funiculum superiori femoris re-
gioni circundamus, iubemusq; vt inambulet. inde repletam venam
atramento scriptorio aut collyrio notabimus iuxta varicis situm
trium digitorum, aut paulo ampliori spatio interposito, decumbente
ægro cruribus extensis, alterum funiculum supra genu iniciemus.
Elata autem in tumorem vena, scalpellum adigimus, qua atramen-
ti nota est, tam alte, vt cutem duntaxat scalpellum penetret, ne ve-
nam diuidamus. vbi oras vulneris hamulis diduxerimus & mem-
branas cultro inflexo ad ramicem aquosum accommo ex coriaue-
rimus, vena detecta & vndiquaq; explicata femoris ligamenta sol-
uemus, vase per cæcum hamum suspenso, acum duplex linum tra-
hentem subiiciemus, plexumq; lini imputabimus, & diuisa scalpello
per medium vena, detrahemus sanguinis quantum vsus postulat, de-
inde funiculo superiorem vasis partem cōstringentes erectumq; crus
eleuantes manuum expressu, sanguinem qui in crure est euacuabi-
mus, deinde infra cursus vas deuincientes, vel id venæ quod inter
vincula est, abscisum tollemus, aut manere id sinemus vsque dum
sua sponte cum funibus excidat, & vulnere siccis linamentis opple-
to, splenium vino & oleo madens, iniectum deligabimus, medi-
camentoq; ad pus faciendum apto quod linteolis illinatur persana-
bimus. Noui autem veteres nonnullos, funibus non vsos, alios inde
vas denudatum excindere, alios alte ipsum eleuatum cum violentia
extrahere abruptentes. Verum omnium tutissimus chirurgiæ mo-
dus est, quem supra diximus. Porro varices in imo ventris suborien-
tes confimiliter tractabimus, item eos qui tempora infestant, quem-
admodum in angiologia comprehensum est.

in cura-
tione vl-
cerū suo-
rum, qua-
li, animo
Mene-
laum ia-
culo ap-
petitum
a macha-
one cura-
ri apud
Home-
rum legi-
mus.

Veteres
enim ex-
cidendi ra-
tionem
tātum fe-
re seque-
batur, vt

Aa

& histo-
rie refe-
runt.

Id via-
toribus
plerisq;
& mi-
litibus
horrida
hyeme
pugnan-
tibus
cuenire
compe-
ritur.

PAULI AEGINETAE

De Dracunculo.

Cap. lxxxiii.

DE dracunculo quomodo medicamentis potissimum emende-
tur, quarto libro peregrimus.

De extremarum partium præcisione, acroterias mon
appellant.

Cap. lxxxiiii.

SUmmis partibus nonnunquam putredine consumptis, nempe
manu aut pede, ut etiam ossa ipsa contabuerint, vel ex causa exte-
rius adueniente facta, vel etiam ex interiore causa putredinem ex-
perta, & ferrula præcidi postulent, ante hanc necesse est corpora os-
sibus circumdata primum diuidere. Verum quia dum hoc primum
fit, deinde longiore temporis spatio serræ administratio peragitur,
sanguinis profluuij metus subsequitur, recte Leonides non omnia
primum corpora præscindit, nisi ex toto putredine contabuerint, sed
partem, ubi non plures neq; grandiores esse venas aut arterias existi-
met principio celeriter usq; ad os resecat, deinde os protinus serra præ-
scindet, pāniculum lineum partibus sectis circumponens, ne serra p ipsa
tracta dolores pariat. Atq; tunc reliqua parte excisa, ferramenta can-
dentia vasis iniicito, & sanguinis fluore suppresso linamētis insertis
& cōuenienti deligatura adhibita, remedio vitior quod pus moveat.

De vnguium pterygiis.

Cap. lxxxv.

PTERYGium in vnguibus carnis incrementum est partem vnguis
operiens. Fit autem in pedis manusq; potissimum pollicibus, in
pedibus quidem, ex offensione plerumq;, in manibus autem, ex ne-
glecta reduuia, inflammata, & in pus mutata. Siquidem hoc, pus di-
co, spatio temporis vnguis radicē exedit, ipsumq; corrumpit, subin-
de totum abolet, sæpe medium vnguis admodum infestat. Iuxta vn-
guis autem radicem ipsam, nonnullam ipsius partem putrefactam,
aliquando totam radicem a rofione immunem relinquit. Est quum
& os corrumpat, odor ædatur grauis, digitus per summa dilatetur
magisq; lineat. his igitur manus debet admoueri, ita ut totā vnguis
partem relictam acie scalpelli resecemus auferamusq;, deinde exulce-
ratam incisamq; partem ferramenti aduramus. Etenim pterygium
genere depastio est, quæ nome Græce dicitur, neq; subsidet, nisi adu-
stum, adeoq; si negligitur, digitum corrumpit. At si osse & vngui a
vitio immunibus, exterior vnguis angulus qui delitescit, & carnem
ipsi agnatam pungit, & inflātionem excitat, conuenit pungentē
vnguis particulam tenui cultro aut eiusmodi quoda subiectio subli-
men eleuatam, acie scalpelli adimere, & quod eminet medicamento
crustis faciundis idoneo consumere. Pleriq; hoc modo administra-
tionis consanuerunt. Si amplius fuerit vitium primum scalpello cir-
cum adimemus, mox remedium ex medicamentis petemus.

De vngue contuso.

Cap. lxxxvi.

Quoniam vero subinde ex ictu vnguibus cōtusis dolores subsequuntur, qui ad manus operationem nos pertrahant, satis est Galeni verba hic apposuisse, quæ sonant in hunc modum. Vnguibus contusis præsens plane remedium ad dolorem auferendum sanguinis detractionem experti sumus, quum pulsus doloresq; vehementissimi oboriuntur. Cæterum linea obliqua, non recta in imum, hæc vnguis particula veluti operculum quoddam subiacentium efficiatur. At si in rectum superne deorsum lineam duxeris carnis excrescentia quam Græci *ὑπερσφικτωρία* vocant, diuersum nimirum corpus a carne quæ vngui subiicitur per mediam diuisionem suppullulante, gignitur, inde rursus doloresprehendunt, quos in reductiis nominauimus, carne quæ sub vngue succreuit, compressa. Quia igitur ex huiusmodi sectione dolorem protinus ægro adimi videre licet, per dies insequentes commodum est, nobis subsectam vnguis carnem leuiter attollentibus, vnguis saniem excernere, ac rursus subiectæ carni quemadmodum dixi, vnguem operculi modo imponere, reliqua vero digiti totius medicina vti conuenit quæ leniat, discutiatq;.

De clauis, myrmeciis, & verrucis.

Cap. lxxxvii.

Clausus rotundus callus est, coloris candidi, clauorum capitibus similis, toto corpore, sed pedum solo digitisq; præcipue enascitur, dolor sequitur, et necesse est impedimentum. Itaq; circumsarcificatus vulsellæq; apprehensus, scalpro acutæ aciei, aut quo venæ scinduntur, radicitus eximetur. Nonnulli, ne rursus succrescat, candenti ferro vtuntur. Myrmecia vero cutis tuberculum est exiguum, callosum, rotundum, & crassum, ad basim insidens, & ad frigora sensum formicarum moribus similem excitat. Hæc quoque totum corpus, præsertim autem manus infestat. nonnulli igitur, inter quos & Galenus est, præcipiunt scarificata extrema parte, fistula pennæ durioris, quales sunt veterum gallorum, anserum, & aquilarum, in imum adacta, ex basi myrmeciam auferre. Alii ærea aut ferrea fistula, idem faciunt. Recentioribus satis est, scarificatam vulsellæq; apprehensam, scalpro, clauorum modo excindere. At verruca, quæ acrochordon græce dicitur, exigua cutis eminentia est, doloris experta, callosa, rotunda, plurima parte basim habet angustam, vt suspensa esse videatur. Nominata vero sic est, q; chordæ nexui respondeat. Extendentes igitur, eminentiam excindimus, sin autem hoc non fiat, lino saltem aut pilo deligabimus. Noui plerosq; & has & prædictas omnes

A a a

PAULI AEGINETAE

excreſcentias ferramento extincto, vt dicunt, conſumpſiſſe.

De telis e corpore extrahendis. Cap. lxxxviii.

Chirurgicæ partem telis extrahendis dicatam maxime neceſſariam eſſe poeta Homerus his verſibus innuit.

Vir Medicus multis aliis præſtantiôr, vt qui

Corpore tela trahens, medicamine vulnera curet.

Hinc ex
authori

tate Ho

meri hu

ius artis

uſum &

antiquiſ

ſimū &

maxime

neceſſa-

riū mor-

talibus

doceri

poſſu-

mus. Nā

que quū

bella ca

nat Poe

ta ad

Iliū ge-

ſta in ca

ſtris græ

corū Po

daliriū

& Ma-

chaona

medicos

chirur-

gos fuiſ

ſe prodi

dit. item

Chiro-

na do-

cuiſſe ſcri

bit hanc

artem

præſtā-

P R I M V M itaq; telorum differentię enumerari debent. differunt autē tela materia, figura, magnitudine, numero, habitu, viribus. Materia quidem quatenus haſtilia aut lignea ſint, aut arundinea. Ipſa vero tela aut ferrea ſunt, aut ærea, aut ſtannea, aut plumbea, aut cornea, aut vitrea, aut oſſea, aut arundinea, vel etiam eadē ſinea, tot enim differentię potiſſimum apud Aegyptios reperiuntur. figura autem, quatenus alia ſunt rotunda, & alia vnguloſa, nempe triangula, alia ſulcata quæ & gonchora dicuntur, alia triſulca, atq; alia cuſpidata, alia cuſpidibus carent. ac cuſpidatorum, hæc cuſpides poſteriora ſpectantes habent, vt dum extrahuntur contra deſigantur, illa in anteriora, vt propulſata idem faciunt, quædam obuerſas cuſpides habent, fulminis inſtar, vt dum ipſa trahuntur propellunturq; in obiecta inſigantur. Sunt quæ mota cardine cuſpides habent, contractas, quæ dum in trahendo explicantur, telum extrahi prohibent. Magnitudine variant tela, quatenus alia magna ſunt, vt trium digitorum longitudinem expleant, alia parua, vt vnum digitum æquent, quæ ſane & myiata apud Aegyptios vocantur, alia medium inter hæc locum occupant numero autem quatenus nonnulla ſimplicia ſunt, nonnulla compoſita, tenuia ſiquidem ferramenta ipſis imponuntur, quæ in teli extractione in imo deliteſcunt. Habitu, quatenus alia ferrum acutum ligno habent inſitum, alia concavum. ac quædam firmiter ligno inſixa ſunt, quædam negligentius, vt in extractione ſeparata intus reſtaneant. Viribus differunt, quatenus veneno quædam ſunt oblecta, quædam non. Atque hæc ſunt telorum diſcrimina. Nunc dicamus quomodo extrahantur in conuulneratis, & in bello, & extra bellum, ſponte, & inuito, quacunque occaſione, ac qualibet extrahenda materia conſecta. Cæterū dupliciter tela in carne extrahuntur, tum euulſione, tum propulſatu. In quibus enim per ſumma telum impaſtum eſt, euulſione eximi debet. ſimiliter etiam quæ alte inhærent, obiectæ vero partes ſi conuulnerentur, ſanguinis profluuiū aut dolore ex conſortij lege periclitantur. At propulſatu vtimur in quibus alte telum infixum eſt, & partes obiectæ breue ſpatium continent, neque neruus, neque os, neque eiufmodi aliquod diuiſionem impedit, oſſe autem conuulnerato euulſorium modum aſſumit. Si igitur telum conſpicuum fuerit, inde extractionem moliemur, ſi occultatum

est, conuenit autore Hippocrate, modo vulneratus possit, in ea figura *tisima*
 constitutum notare, in qua etiam vulneratus est, si non possit, iacentis *Achil-*
 certe quatenus licet modo figurantes specillo tentabimus. & si qui- *lem. Eo*
 dem in carne fixum est telum, manibus extrahemus, aut eius hastili *aut tēpo*
 quod etiam attracton appellant, nisi exciderit, ligneumq; id potissi- *re, vt et*
 mum sit, si excidat forcipe qua dentes radicesve, euelluntur, aut ferra *supra re*
 mento quod a telo extrahendo belulcum Græci vocant, aut alio quo *tulimus,*
 piam instrumento accommo, extractionem moliemur, nonnun- *phyci*
 quam etiam carnem prius incidentes, si vulnus instrumentum non re *ignora-*
 cipiat. At si etiam in opposita telum processerit, nec illac ipsum pos- *bantur.*
 sit extrahi qua infixum est, diuisis iis quæ opposita sunt, per illa ip- *Spicula*
 sum eximemus, uel euellentes vt dictum est, vel per eam partem in *aut fuisse*
 quam tetendit propellentes, vel si hastile exciderit, demisso instrumē *ærea tē-*
 to propulsorio ita vt neruum, aut tendinem aut arteriam, aut eiusmo- *pore tro*
 di aliquod necessarium vitemus, protrudere oportet. turpe siquidem *iano scri*
 est, dum telum extrahimus, peius eo malum efficere. Et siquidem cau *bit pluri*
 datum telum sit (hoc autem specillo deprehendemus) scemina propul *bus lo-*
 sorii instrumenti demissa accommodataq; telum propellemus, si con *cis poc-*
 cauitatem, marem. Telum vero exemptum si sculpturas quasdam ha *ta.*
 bere, ceu aliorum tenuium ferramentorum quæ ipsis imposita esse pos-
 sint, appareat, specillo rursus vsi, si illa inueniamus, eadem ratione &
 via auferemus, sin oppositas cuspides, vt verisimile est, telum habens
 non exilierit, vicinus ei locus dissecari debet, si nulla pars necessaria
 contigua sit, detectumq; telum eleuantes, modeste extrahemus. Non
 nulli vero exigua arundine cuspidibus ipsis circumposita sic telum
 euellunt, ne carnes a cuspide radantur. & si vulnus inflammatione
 vacauerit, futuris vsi cruentorum modo curabimus, si inflammationē
 experiatur, fomentis, cataplasmatibus, & cōsimilibus medebimur. Por-
 ro si venenato telo quis ictus est, totam carnem quæ veneno iam mu-
 tata est, si quidem fieri potest, præcidemus. Agnosces autem eā quod
 e sana carne differat, pallida enim, subliuida, & veluti emortua appa-
 ret. Aiunt autem Dacos & Dalmatas cuspidibus elenium & ninum Id quo-
 dictum oblinere, idq; vbi sanguini vulneratorum obuenerit, hominē que pro
 occidere, comestum vero ipsis innocuum esse, & nihil mali efficere. dit Ari-
 At si telum osi inhæserit, rursus instrumento experiemur, & si qui- stoteles.
 dem caro impediatur, hanc adimemus aut diducemus, si vero etiam al- Quare
 te in osse lapsum est, quod cognoscimus si firmiter id infixum nulla aut phar-
 vi commoueatur, excisorio cultro osse quod iuxta est exempto, aut maca
 etiam terebra prius perforato, si crassum sit, telum liberabimus. Por- hæc im-
 ro si in principem aliquam particulam telum defigitur, exempli gra pacta
 tia, cerebrum, aut cor, aut guttur, aut pulmonem, aut iecur, aut ventri- vulneri

PAULI AEGINETAE

hoīem necēt, co-
mesta non ne-
cent, hāc
esse cau-
sam arbi-
tror, ga-
vis et po-
tentia
pharma-
ci illita
vulneri-
bus inui-
etiam se
præbet,
& nulla
re immu-
tata mo-
uet agit
que vi-
rus suū
in ipsas
carnes
cruētas.
At quū
in cibo
samunt,
virtus
hoīs cō-
coctrix
domat
vincitq;
virosam
ipsorum
potētiā,
adeo vt
nihil ho-
minem
queat of-
fendere.

culum, aut intestina, aut renes, aut vuluam, aut vesicam, quum iam rō-
tæ lethales apparuerint, & euulsio præsertim multum cruciatum ve-
xationemq; accersitura est, nihil tentabimus, ne præterquam quod ni-
hil sumus profecturi, etiam conuitiandi occasionem idiotis præbea-
mus. Si vero exitus fuerit obscurus nec in conspectum veniat, præfa-
ti periculum, opus aggrediemur. Multi siquidem abscessu quoque in
aliqua vitæ necessaria parte oborto, præter opinionem conlanuerunt,
quum & iecoris fibram, & omenti partem peritonæiq; & totā vul-
uam subinde ademptam fuisse, nec mortem inde subsequutam, memo-
riæ prodatur. Est quum guttur de industria subinde in anginis diuida-
mus, vt in capite de ipsius incisione dicebamus. Telum itaq; si in his
relinquatur, in præsentaneam mortem præcipitat, præterquam quod
artem etiam inhumanam ostendat, si eximatur, forte etiam salus sub-
sequitur. Porro principalium particularum vulneratarum agnitio nō
est difficilis, vt quæ ex accidentium proprietate, excrementis, & par-
ticularum situ, inueniatur. Si enim cerebri membrana vulnus accepit,
dolor capitis validus subsequitur, oculi feruent, rubentq; lingua agita-
tur, mens desipit. Si cerebrum percussum est, ægri concidunt, vox ni-
hil sonat, facies peruertitur, bilis vomitus sequitur, sanguis per narces
erumpit, per aurem humor albus puliculae similis emanat, sanies per
vulnus exit. At si in vacuam thoracis regionem telum defigatur, for-
amine spatioso permanente spiritus erumpit. Corde vulnerato iux-
ta mamillam sinisteriorem, telum apparet non penetrans, sed ceu al-
teri impactum, ac nonnunquam pulsatilem motum ædit, sanguisq; ni-
ger effertur, si transitus pateat, extrema frigescunt, sudor emanat, ani-
mus deficit, & sine mora exitium subsequitur. Pulmone icto, si spatio
sa laxitas est, sanguis ex plaga spumans vacuatur, quum non est, ore
magis per vomitum redditur, ceruicis vasa attolluntur, lingua alium
colorem assumit, multum spiritus attrahunt ægri, frigidi appetentes.
In septo transuerso vulnerato, telum quidem iuxta spurias costas de-
fixum apparet, inspiratio autem magna oritur, cum gemitu & dolore
per totam humeri partium compagem. Quod si abdomen vulnus ac-
ceperit, id ex recrementis innotescet, quum latum intus spatium exi-
stat, vel etiam telo exempto, vel hastili intus fracto, succus ex ventri-
culo euacuatur, ex intestinis sterces, interim & omentum, vel intesti-
num procidit. Vesica autem vulnerata, vrina excernitur. Itaq; in ce-
rebro eiusque membranis ictis, caluaria perforata telum eximimus,
quemadmodum in capitis fracturis mox dicitur. In thorace autem,
nisi telum subsequutum fuerit, per mediocrem intercostalium incisio-
nem, vel etiam vna excisa costa, lamina quæ membranam custodiat
subiecta, euellemus. Similiter in ventre, vesica, cæterisq; in alto parti-

LIBER VI.

188

culis, si quidem telum subsequatur, citra negotium eximemus, sin mi-
nus, rursus diuisione adhibita medicina utemur, quæ cruentis conue-
niat. In ventre, si res postulet, etiam suendi eius ratio, quæ gastrora-
phia dicitur, accommodabitur, quem in modum comprehensum est.
At si in grandiore quodam vase, exempli gratia, in iugularibus venis
quæ in imo latent, aut arteriis quas carotidas appellant, aut etiam ma-
gnis arteriis quæ alas vel inguina intercurrent, telum defixum, co-
piosius sanguinis profluvium propter exemptionem minetur, ratio
est hæc funibus antea ex utraque parte constringere, deinde teli euul-
sionem moliri. At si particulæ plures confixæ fuerint, verbi causa,
brachio cum thorace coniuncto, vel cubito cum aliis corporis parti-
culis, vel pedibus inuicem, siquidem non per totas utrasque partes te-
lum penetraverit aut hasta, apprehensa hæc extrinsecus, veluti etiam
in vna euellemus, sin ambas penetraverit, dimidia ligni parte serra re-
secata, particulatim singula faciliore figura extrahimus. Quoniam
vero & lapides subinde vel buccina, vel plumbum, vel simile quip-
piam ex funda mittitur, tum vi, tum quod angulosa sunt defiguntur.
Agnosces igitur ea, quod moles aspera & inæqualis illabatur, item
quod non omnino in rectum tendit diuisio, sed amplior, & caro velu-
ti contusa liuidaq; appareat, adhæc, quod cum gravitate dolor affli-
gat. Hæc igitur convenit agitata instrumento quo quid attollimus,
aut aduersa scalpelli parte, aut vulneratio specillo recipere. si autem
fieri potest, etiam forfice extrahemus. Multis autem infixæ tela inte-
gra intus infederunt, quæ vulneribus cicatrice obductis, deinde lon-
giore temporis spatio partem eam abscessu occupante & disrupto
exiliere.

Cui qui
de rōni
assentit
Gale. in
discipli-
na de tē
peramē
tis ibi. n.
tale quid
piā per-
tractat.

† Hic locus sic descriptus est in vet. Cod. τὰ δὲ γωνιώτα καὶ τοῦ-
των τὰ μὲν διχλῶχινά, τὰ δὲ γλῶχινά καὶ λόγχωτα καλούμενα,
τὰ δὲ τριγλῶχινά, id est, alia angulis habentia, & horum quidem alia
duos angulos habent, alia vero angulum habentia, quæ lonchota, id
est, longa ut hasta, alia tres habent angulos &c.

De fracturis, & quot ipsarum sint differentia.

Cap.

Lxxxix.

Proximum fuerit tradita carnis vitiorum manu scalpellove cu-
randorum ratione, etiam de ossium fracturis, dico sane etiam lu-
xationibus, sermonem instituere, quoniam & ipsæ chirurgiæ generi
subiiciuntur. & primū de fracturis agā, iisq; prius quæ in capite fiunt
tū quod inter carnis & ossium chirurgiam medium locū obtinēt, tū
q; oībus partibus calvaria præcellit. In vniuersum igit fractura ossis
est diuisio, aut ruptura, aut p̄cisio, a violētia qdā extrinsecus accidēs.

Aa 4

PAULI AEGINETAE

Et secū-
dū quā-
que diffe-
rentiam
artis ra-
tionē va-
riare &
ad speciē
fracturæ
accōmo-
dare de-
bemus.

Cæterum plures fracturarum sunt differentię, alia siquidem dicitur fieri raphanidon, hoc est, ad raphani speciem, alia schidacidon, alia eis onycha, alia alphetidon, alia cata apothrausim, idest, iuxta refractionem. Raphanidon igitur ruptura ossis est transuersim per crassitudinem facta, quæ etiam sicyedon & cauledon nonnullis appellatur, ex cucumerum & caulium fractorum similitudine. Schidacidon autem, quasi assulæ modo, est oblonga ossis fissura. eis onycha, quasi dicas in vnguem, iuxta partem aliquam recta est fissura, in extremo lunata, quæ etiam calamidon appellatur. Alphetidon, ad farinæ similitudinem dicta, est quum os in multas tenuis partes finditur, quæ et ipsa caryedon a quibusdam vocatur. Refractio autem, quæ apothrausim dicitur vel etiam præcisio, est quum pars ossis per summitatis rupturam auferitur, vt ablata superinnatet. Atq; tot fracturæ constant differentiis.

De fracturis capitis.

Cap. xc.

FRactura in capite peculiariter caluariæ est diuisio, nunc simplex, nunc multifida, a vi quadam exteriore facta. Porro differentię capitis fracturarum hæc numerantur. Rhogme, idest fissio, Eccope, hoc est excisio, Ecpiesma, quod est effractio, Engisoma, idest corporum appropinquatio, Camarosis, hoc est testudinatio, in infantibus etiam Thlasis quod est contusio. Rhogme igitur caluariæ per summa est diuisio, aut rima profundior, in qua nequaquam os vitiatum foras emouetur. Eccope caluariæ fissura est cum ossis offensi ruptura. At si a reliquo osse pars offensa disceserit, apolceparnismon nonnulli vitium appellant. Ecpiesma in multas partes caluariæ effractio est, in qua profundius ossa descenderint, & cerebri membranam contactu suo premant. Engisoma caluæ ictus est, in quo os vitiatum ad interiorē cerebri membranam descenderit. Camarosis diuisio caluariæ est, in qua pars affecta cameræ modo exaltata relinquitur, vt Galenus tradit, ac intro a sanis fracturæ partibus ossa magis recedunt, membranaq; innituntur, quemadmodum in ecpiesmate. sic enim ille existimat. Alii etiam trichismon, quasi dicas capillationem, his adnumerarunt. Est autem trichismus arctissima rhogme, sensum plerūq; fallens, eoq; latens, quæ quia non facile se ostendit, mortis causam sæpe adfert. Thlasis caluariæ diuisio nō est, eoq; nec fracturam recte dixeris eius modi affectionem, verum est ossis caluæ in interiorē partem impulsio, aut inflexio, concauitatem integra caluæ continuitate tantum efficiens, vt licet in plumbeis ex crudoq; corio confectis vasculis, si foris percutiantur illidanturve, conspici. Porro contusionis huius duæ existunt differentię, vel enim calua per totam ipsius crassitiem contunditur, vt frequenter etiam cerebri membrana abscessu occupe-

tur, vel omnino a caluaria hæc per totum aut non per totum premi-
 tur, sed iuxta exteriorem duntaxat superficiem vsq; ad laminam se-
 cundam deprimitur. Sunt qui his differentiis apechema, quasi dicas
 ab Echo responsionem, addiderint. Ea est, a contraria ictus parte fa-
 cta caluariæ fractura. At falluntur hi, quoniam non fit in hominis cal-
 ua quemadmodum in vitreis quibusdam vasculis fieri illi docent. illa
 siquidem vacua sunt, ideoq; id patiuntur, calua autem hominis vndi-
 que plena & alioquin solida est, ac rhogme seu fissura caluariæ, quæ
 aliarum complurium capitis partium ictarum lapsu, vel citra cutis
 continui solutionem generatur, quæq; postea abscessu in ea facto, eo-
 demq; secto, apparuerit, in opposita ictus parte factam esse ipsis vide-
 tur. atq; hoc vitium quemadmodum prima dicta rhogme curatur.
 Si igitur fractura capitis facta fuerit, speciem ipsius ex corpore quod
 percussit, deprehendes, si acutum fuerit, aut graue, aut durum, aut vio-
 lenter impactum. Item ex symptomatis quæ icto superueniunt, exem-
 pli gratia, vertiginibus, voce amissa, aut subito collapsu, præsertim in
 engisomate, aut contusione, aut ecchymate, aut interiori camarosi ce-
 rebro compresso, item ex notis quæ a sensu capiuntur. Si enim ampla
 cutis fuerit diuisio, per ipsam prompte cognoscemus, sin autem diui-
 sio non per totum ierit, aut angusta sit, fracturam tamen esse suspice-
 mur, cute diuisa, & oculis, & specillo demisso eam pernoscemus. Si
 enim ex aliis quæpiam fracturis fuerit, inde manifestum euadet, at si
 rhogme solum angusta & pilosa sensum fugiens, medicamento ali-
 quo nigro, liquido, vel etiam ipso atramento scriptorie infuso, os ra-
 demus, ipsa nãq; rhogme nigra ostenditur, conuenitq; rasuræ tam diu
 insistere, quousq; signum rhogmes aboleatur. Si ad cerebri membra-
 nam vsq; peruenerit fractura, non rademus, sed agnoscere conabimur
 vtrum membrana ab osse recesserit, an affixa permaneat. Si enim ipsa
 manet, inflammatio nulla vulnus infestat, æger paulatim febris libera-
 tur, & pus coctum apparet, si recesserit membrana, augentur dolores,
 & febris similiter, os alium sumit colorem, pus tenue & crudum ef-
 fertur, & si medicus rem negligentius tractet, nec perforatione vta-
 tur. hoc grauiora oboriuntur symptomata, nempe bilis vomitus, con-
 uulsio, mentis delirium, febris acuta, in quibus manum admolari non
 oportet. Quod si his absentibus membrana cerebri non abscesserit, **Mamum**
 rhogme autem duntaxat fuerit, etiam solo rasorio curatur, vel si vsq; **admoue**
 in altum penetret. Sin autem tantum vsq; ad laminam secundā, quæ **dam ne-**
 diploe dicitur, fractura peruenerit, eousq; radendum est, vel etiam con- **gat, sicut**
 fractum os eximendum, quemadmodum docebitur. At si in tenuia **etiam su**
 frustra os fuerit comminutum, hæc quoq; diligenter instrumento ido- **pra pce**
 neo auferentur, etiam si membrana non abscesserit. **Ab initio autem** **pit, ne**

PAULI AEGINETAE

medici quum vulneratum susceperis, hyeme quidem ante diem quartum de-
 pterquā cum omnino os auferre tentato, æstate, ante septimum priusquam
 quod æ commemorata oboriantur symptomata. Cæterum manum hoc mo-
 dum admolieris.

Caluariæ fractæ curatio.

DERASO super vulnus capite, duas lineas iuxta rectos an-
 gulos mutuo se secanteis, quæ literæ X figuram accipiant, incide-
 mus. harum autem alteram esse conuenit, quæ iam antea erat, deinde
 apud ho quatuor in vertice angulos excoriantes, vt totum os, quod perforabi-
 tur nudum existat, siquidem sanguis fertur, linamentis ex posca ob-
 iectis cohibebimus, sin minus, siccis. deinde implicito linamento ex
 tamiam. vino & oleo iniecto, conuenienti vinculo utemur. sequenti die, nisi
 Idq; ab recentius aliquod symptoma prohibeat, perforare os vitiatum aggre-
 Hippo. diemur. Collocato igitur in sedili ægroto, aut recumbente prout vul-
 quoque neri conuenit, auribusq; ipsius lana obturatis, propter sonitum qui ex
 præcipi appulsu redditur, vinculum aliquod vulneris [soluimus]. linamentis
 tur. vt sa omnibus exemptis, & spongia deterfis sordibus, iubebimus mini-
 nables stris duobus, vt tenuibus fasciis circumpositis, quatuor angulos cor-
 causas porum quæ fracturæ incumbunt, attollant, & si quidem os fuerit im-
 medici becillum, aut natura, aut fracturæ vitio, id scalpris excisoris acie bin-
 suscipiāt ter se aduersis, auferemus, primum canis excisoris scalpris, quos Græci
 difficilli cyclicos vocant, a latiore incipientes, mox angustioribus, deinde
 mas ac specilli modo angustis, malleolo sensim adactis, ad capitis concussio-
 pene de- nem utemur. Si autem validum os fuerit, prius eo terebellis quæ mer-
 speratas gi non possint, quas ab argumēto abaptismos dicunt, perforato, (eius-
 omittāt. modi vero sunt quæ paulo interius quam cuspis acuta est, eminētias
 habent, quæ ipsas ad cerebri membranam demergi prohibeant) per
 scalpra circuncisione vsi, id quod vitiatum est, auferemus, non subito,
 sed particulatim, siquidem fieri potest, digitis, si non, forcipe, aut vul-
 sella qua vel ossa vel pili apprehenduntur, aut eiusmodi quodam in-
 strumento. Locus autem qui inter foramenta est, tantum spatium con-
 tinebit, quantum maximi mucronis specilli longitudo. tam alte ve-
 ro descendet, vt interiorem ossis superficiem accedat, cura adhibita,
 ne membranam cerebri terebra attingat. Quare etiam terebram ossis
 crassitudini respondere conuenit, compluribus id genus ad hoc præ-
 paratis. At si fractura caluariæ vsque ad secundam laminam dunta-
 xat peruenerit, ad hanc etiam vsque solum foranda est. Osse iam ab-
 lato, asperitudinem quæ ab excisione caluariæ provenit, rasorio aut
 quodam scalpello excisorio adæquabimus, laminam quæ membra-
 næ custos est, subiicientes, ac ossiculis quæ remanserant, vt verisimi-
 le est, aut spiculis ingeniose ablatis, linamenta inseremus, quem mo-

LIBER VI.

100

dum diamotosin appellant. Hæc ratio chirurgiæ communior simul
& promptior est, & periculo vacat. Item modus qui per lenticula-
tum excisorium scalprum fit, mirum in modum Galeno commenda-
tur, sine foratione, post insculptionem cycliscis scalpris factam, ipsum
adhibenti. Scribit itaque hunc in modum. Si vero vnam semel par-
tem nudaueris, ac scalprum qui in cuspide præfixam habet retusam
leuemq; lenticulæ speciem, aciem vero per longitudinem erectam,
submiseris, vbi latam partem lenticulæ super membranam defixeris,
malleolo feries, diuidesque sic caluariam, ita siquidem agentibus, om-
nia quæ requiruntur, euenient. Nam membrana, ne si dormitans qui-
dem, agas, latæ tantum lenticulæ parti occurrens violari non potest.
Quod sicubi adhæreat caluariæ membrana, huius quoque adhæren-
tiam innoxie dirimit rotundum lenticulæ extremum, subsequitur au-
tem præeuntem eam a tergo ipse scalper caluariam secans. Quare
nec qui minore cum periculo, nec qui celerius perficiatur, forandi mo-
dum inuenias. At quæ administratio ferris & modiolis, quem chœ-
nicion siue chœnicida Græci vocant, peragitur, recentioribus, ceu no-
xia, improbata est, sed administrationem quam in rhogme exposui-
mus, probant. Idem vero modus osium excindendorum conueniet
in reliquis etiam caluariæ fracturis. Quantum vero excidere conue-
niat. Galenus nos docebit, hunc in modum manifesto scribēs. Quod
vehementer est contractum id totum auferri debet, si vero ab eo frag-
menta quædam longius excurrant, quemadmodum aliquando cerni-
tur accidere, hæc persequi ad extremum non oportet, illud probe sciē-
tes, nullam inde noxam sequuturam, modo reliqua omnia rite sint cō-
fecta. Post chirurgiam panniculo simplici lineo vulnere æquali, ro-
faceo madenti, cerebri membranam operiemus, exiguaq; lanæ stup-
pam similiter rosaceo imbutam prædicto panniculo imponemus, de-
inde linamentum implicitum duplex in vino & oleo aut ipso rosa-
ceo tinctum, toti vulnere circumponemus, diligentia adhibita ne ce-
rebri membrana grauetur, postea latiore vtemur ligamento, neq; hoc
astringentes, verum vt linamenta solum retineat. Victus adhibebi-
tur qui inflammationem arceat, & febribus peculiaris est, membrana
cerebri crebrius interea rosaceo superfusa. Post tertium diem, vbi vin-
cula dissolueris, & sordes spongia deterferis, remedium induces quod
cruentis iniicitur, & inflammationem repellit, superaccommodans
membranæ aliquod ex cephalicis dictis aridis, vsq; dum carne op-
pleatur. Nonnunquam os radetur, si hoc res postulet, propter quasdā
summitates extantes, aut etiam propter ipsius carnis productionem.
Reliqua medicamentorum materies, vt in vulneribus comprehendā-
mus, admoueri debet.

PAULI AEGINETAE

De cerebri membranæ inflammatione.

QUONIAM frequenter cerebri quoque membrana post chirurgiam inflammationem experitur, ut non solum caluariæ crassitudinem, sed etiam cutem ipsius excedat cum renixu, & ut naturalis ipsius motus pulsatilis impediatur, quæ potissimum & convulsio aliisque graua symptomata vel ipsa mors subsequitur. Origo inflammationis aut ex acuta quadam ossis eminentia pungente ducitur, aut ex linamentorum grauitate, aut perfrictione, aut multo esu, aut vini potione, aut alia quadam occasione latente. Si quidem ex manifesta occasione inflammationem contraxerit membrana, ea protinus amputanda est, sin ex latenti, magis pugnare conuenit, utpote sanguinis dimissione, si causa non obstitit, victu qui inflammationi congruat. Item loco induci remedia debent, calentis rosacei fots & superfusio ex althææ decocto, aut foenugræci, seminis lini, chamæmelorum, similiumque cataplasmata vero ex cruda ordeï farina, aut lini semine, cum prædicto decocto & gallinarum adipe, adhæc fomentum ex lana adhibebitur. Capiti & occipitio meatuumque auditorio oleum aliquod inflammationem prohibens instillabitur. Viscerum quoque cura habenda est, cataplasmatibus adhibitis, item toti corpori prospicere, consilium est, in calidam id aquam, ut par est, collocantes inungentesque.

Quia
corpus
bile ex-
purgatum
caput
quoque,
quod bilio-
si vapores
pe-
tentes fa-
cile infla-
mant, ca-
lore æ-
stusque ex-
onerant,
atque mol-
liter le-
nit.

Si perseverat inflammatio, & nihil aliud prohibet, medicamento quod bili ducendæ est, purgare ipsos Hippocrates præcipit.
† Rectior est scriptura veteris libri. πλεον ἄγωνίζεσθαι προσήκει ἢ φλεβοτομίᾳ χρωμένους εἰ μὴ δὲν κολύοι, ἢ ἀδύτῃα, ἢ τῇ πρὸς φλεγομένην ἀρμόσει διὰ τὴν. Id est magis pugnare oportet, vel venam secantes, si nihil prohibet, vel inedia, vel victu inflammationi conuenienti.

Si membrana cerebri nigruerit.

CEREBRI membrana si quidem per summa ex medicamentis in id efficacibus nigruerit, tunc mel triplum rosaceo miscentes & per linamenta id applicantes, curabimus, deinceps & reliqua admouentes. At si nigrities sua sponte prouenerit, idque in imo potissimum, cum aliis grauibz indicibus, attingi tunc non debet, ut quæ natium calorem emortuum innuat. Noui quendam qui post annum quam affectu conflictaretur, caluaria perforata superuixerit. erat enim fractura in principio ex telo facta, emissariumque habens per quod etiam membrana ab offensa immunis conseruata est.

† Græcus codex antiquus μέλιτι τριπλὸν μίξαντες ἑοσίον. Id est, melli triplum rosacei miscentes.

De naribus fractis contusisque.

Cap.

xcj.

LIBER VI.

191

Narium pars ima, quum sit cartilaginosa, frangi non solet, sed cōtundi, sima fieri & perueri, superior quæ ossea est, nonnunquam frangitur. In his autem deligaturam damnat Hippocrates, vt quæ magis resimas efficiat & distorqueat, præterquam in his quæ ex ictu per medias naris emineant. in his enim conuenientem fasciam, cum medicamine imposito assumit, vt compressæ nares naturalem figurā ita et ca-
rec ipiant. Fractis igitur naribus, in ima quidem parte, indice aut par-
uo digito demisso in exteriora dirigentur, in interiore, etiam scalPELLI fanta-
nucleo id faciendum est, primo statim die, aut nō multo post. Quum fasciis
vero decimo die naris ossa continentur, extrinsecus indice magnoq; formare
digito hanc efformare congruit. Vt autem figura quam fingis nō co-
cidat, duo obturamina tortilia ex panniculo inuoluta, naso impones
vnum singulis nasi foraminibus, & si altera duntaxat naris pars sit
peruersa, eaq; sinere conuenit, donec os aut cartilago contineat. Non
nulli fistulas ex anserum pennis panniculis replentes, naribus insinua-
runt, quo figura custodiatur, & respiratio non impediatur. quod non
necessarium puto, quum spiritus per os trahatur. At si inflammationē
nares sentiant, medicamentum aliquod quod eam arceat indemus, id quod
exempli gratia, ex succis inscriptum, aut quod oxelæo constat, & comi-
eiusmodi aliquod. vel ex triticea simila & thuris fuligine seu gummi
vna incoctis cataplasma iniiciemus, tum propter inflammationem, tur. Idē
tum vt nares contineantur. Quod si in alteram partem nares distor-
tæ, Hippocrates postquam commodè eas figuraueris, oblongam ha-
benulam digitali latitudine iubet circundari, alteram ipsius extremū
taurino glutine, aut gummi illitum summæ narium parti agglutina-
ri, ex latere quo inclinant. vbi illa exaruerint, habenam transferre per
aurem oppositam versus occiput, & frontem oportet, deinde ipsi sub
altero habenæ principio affirmabitur, vt nares in latera retractæ ad
mediam dirigantur figuram. quod non admodum recentioribus pla-
cuit. Porro minutim contractis narium ossibus, diuidere ipsas, aut su-
periores ipsarum partem conuenit, ac fragmenta ossiculorum vulsel
la auferemus, suturis diductas partes committentes accommodan-
tesq; ipsis remedium quod cruentis aptum est, & conglutinat. Sin au-
tem extra nares vlcer fuerit excitatum, linamentis in longitudinem
implicitis curabimus. Sunt qui plumbeis canalibus, quas solenas Græ-
ci dicunt, vsq; dum cicatrix fuerit obducta vsi sunt, ne caro ex vlceri
bus supercrescat.

De maxilla confracta, & aure contusa. Cap. xcii.

De aure contusa tertio libro tractatum est, tanquam huiusmodi
affectio ad fracturas non pertineat. Maxilla multas ob causas
frangitur. Si igitur extrinsecus solum offensa, non per transuersum

PAULI AEGINETAE

fissa, introrsus cauata fuerit, promptum sane est cognoscere. Opus autem est altera manu, siquidem dextra maxilla fracta fuerit, dextra, si altera, sinistra, indice igitur & medio digito in affecti os demissis, in teriorem fracturæ extantiam, probe foras compellere conuenit, altera manu foris eam excipiente. Rectitudinem vero maxillæ ex eiusdem dentium æqualitate deprehendemus. Quod si fractura per transversum facta fuerit, primum tensione, deinde retractione, quam antitaxis vocant, partis in contrarium usus, ministro eam continente, vt dictum est, dirigere aggredieris, porro denteis in parte confracta diductos, inter se, vt Hippocrates præcipit, auro deligare, nempe lino ab auro chrysolino dicto aut chrysonemate, quoniam vero huius facultas non omnibus conceditur, lino valido, aut bysso, aut pilo equino, aut id genus aliquo. Verum si quidem cum vlcere fractura euenerit, specillo tentandum, num tandem etiam reformatio ossis facta sit. atq; si exigua diuisione facta, os vnum reformatum aut plura remanserint, idoneo instrumento auferentes, suturis oras vlceris committemus, & medicamento cruentis apto vsi deligabimus, sin autem citra vlcus contigerit, ceratum simplex maxillæ impositum conuenienter deuinciemus. fasciæ medium per occiput dispensabitur. habentulæ vtrinque per aureis ad summam maxillam, inde rursus ad occiput, mox ad mentum, inde per genas ad sinciput, inde rursus sub imam occipiti partem, distribuuntur, vbi & fasciam definere oportet. Super hæc rursus vinculum aliud fronti circumdatum, quod episolema Græci dicunt, post caput coniungetur, omnes prædictæ fasciolaræ id circum astringent. Alii vero tenuem ferulam, quemadmodum alii corium, quod æque sit longum impositum maxillæ, deligant, vt commemoratum est, reliqui deligatura, quam Græci dicunt phorbiam, quasi dicas capistrum, vtuntur. At si vtraque maxilla in summo mento auellatur, qua etiam parte cocunt, ambabus manibus parum inuicem distantibus, rursus adaptato, & denteis adunitos, quomodo diximus, deligato, fac congrua vsus ligatione, tenui ac sorbili alimento ægrotantem nutrir iubeto. Nam mandere ipsi inimicum est. Si aliquid emotum a figura conuenienti putaueris, tertio die soluēs, iterum illigato, quod tam diu facies, quam callus fracturam firmarit. firmatur autem maxilla intra treis potissimum septimanas, quoniam laxa & medullæ plena est. Quod si inflammatio aliqua superuenerit, ne aduersus hanc quidem tum fomenta, tum cataplasmata negligere oportet. Quod in omnibus ex æquo obseruatum abs te cupierim.

† Antiq. codex, καὶ τῇ προσήκοοντι χρεωμένῳ ἐπιδέσει κέλευσον ἢ βρεμὴν λεπταῖς καὶ βροφηματώδεσι τροφαῖς χρεωμένοις, & congrua vsus ligatione, iubet vt quiescat & tenui ac sorbili victu vtatur.

LIBER VI.

De iugulo contracto.

Cap. xciii.

198

Iugulum, quod etiam clavicula dicitur, quum naturaliter figuratū
est, interiore ipsius extremo, cum pectore committitur, exteriore,
cum summi humeri compage, seu articulo adunitur. eoque si hu-
merum, aut ipsum sustinens brachium, fracturam quacunque tandem
parte experiatur, qua humerum suum spectat, plerunque infra inte-
rius extremum fertur, vna cum brachio detractum. Præstiterit autem
per transversum potius quam assulatim, aut arundinis modo, hoc est,
in longitudinem claviculam frangi, quod vulgo receptum est. Nam
transversim contractum, extensione compressioneq; digitorum prom-
pte in naturalem figuram reuertitur, cætera vero eminentias habent,
quæ ægre possint coaptari. Si igitur per totam ipsius crassitudinem
quocunque modo, iugulum fractum fuerit, duo ministri, vnus ad hu-
merum eiusdem lateris fractæ claviculæ manibus circuminectis,
brachium ad exteriora simul & sursum trahens, alter oppositum hu-
merum, aut certe ceruicem attrahens, retractionem a se, quam Græci
vocant antitaxin, molientur, medicus suis digitis fracturam diriget,
prominentiora pellendo, ima foras attrahendo. Quod si maiorem re-
tractionem a se desideret, orbiculum bonæ magnitudinis ex panni-
culo, aut lanis, aut eiusmodi aliquod corpus alæ subiiciens, cubitum
lateri indidem adiget, ac reliqua sicut dictum est, exequetur, si au-
tem id nequeat, extremum claviculæ iuxta humerum in alto situm
ad superiora, ægrotante resupinato, educet ceruicali quodam medio-
cri, dorso subiecto, ministro humeros duos ad ima deprimente, vt os
claviculæ quod in imo est, reuocetur, rursus digitis suis fracturam
conformabit. Porro si partem aliquam iuguli refractam, instabilem,
aut etiam pungentem percipiamus, scalpello in rectum diuisam ean-
dem auferemus, ac reliqua scalpris excisoris, lamina quæ a tuendis
cerebri membranis menyngophylax dicitur, aut alia quæ exciden-
dis supponitur propter firmitatem claviculæ subiecta, ex æquabimus
& si quidem inflammatione careat, suturis, sin aliter est, linamentis
vtemur. & splenis diuersis præparatis ad ossis eminentis inclinatio-
nem, maiora ex eis & crassiora superaccommodabimus, si inflamma-
tio infestat, oleo imbuta, si minus, sicca, ac mediocri ex lana orbe pro-
pter alā subiecto, cōueniētē inducemus deligaturā, per axillas, affectā
claviculā, scapulasq; prout res exigit, deligantes. & si quidē ad ima
tetēderit pars claviculæ humero proxima, latioris habenulæ dimi-
diū, eiusdē cubito subiiciētes, totū brachiū ex collo suspēdemus, altero
aut vinculi dimidio, manum quemadmodum in iis sit quibus ex cu-
bito sanguis detractus est. At si versus superius extremū inclinauerit
quod raru est, brachiū suspēdi non debet, verū resupinus æger decum-

PAULI AEGINE TAE

bet, & tenui nutrietur victu. si vero opus est, etiam fomentis adiuvabitur, sed pro ratione, usque dum callus eam firmarit. id quod fit plurima ex parte diebus viginti.

De scapulis.

Cap. xciii.

Scapulae quae latae sunt & mensurae figuram repraesentant, non franguntur, iuxta spinam vero fracturam sustinent, nunc compressae, nunc rupturam simplicem expertae, interim etiam refractae. Compressionem itaque tactu cognoscimus, si caua occurrat, stuporem proximae brachii, & dolorem pulsatilem inducat. Ruptura ex tactus asperitudine & loci doloreprehenditur, ambo autem ratione qua inflammationem arcemus, curantur. Refractio & ipsa tactu agnoscitur, levis ac modica fascia convenienti adaptatur, aucta vero & pungens ablatione per scalpellum adhibita & futuris, ut prius dictum est. Fasciae autem & hic similiter ut in clavicula iniiciuntur, incubitus oppositi lateris conveniet.

De pectore.

Cap. xciv.

Medium pectus, diuiditur imprimaturque, summum, refringitur. Rupturam itaque per medium factam dolor loci & inaequalitas sequitur, & strepitus digitis innixis eliditur, impressionem vero dolor vehemens, spirandi difficultas, tussis, membrana quae costas incingit dispuncta, nonnunquam etiam sanguinis eruptio, partis confractae cavitas, & in cedendo facilitas. Curationem eam adhibere oportet, quam in scapulis prodidimus. In impressione autem adaptatio Hippocratis adhibebitur, quam ille in clavicula quae foras processerit, usurpat, per incubitum supinum cervicali dorso subiecto, scapulisque constrictis, ita ut costae utrinque manibus simul contrahantur. Iam vero costas lana obiectis circulem adhibebis deligaturam, loris prius in rectum subditis, postea duorum initia inuicem excipiuntur, quae orbiculares fascias decidere prohibeant.

De costis.

Cap. xcv.

Ex costis quae pleurae & spathae Graecis dicuntur, ossae quidem omni in parte rupturam sustinent, spuriae autem, in ea tantum quae spinae adiacet. nam hic solum osseam habent naturam, in exteriori parte in cartilagine degenerantes, contunduntur, nullam fracturam percipiunt. Notae ipsarum non sunt difficiles, etenim inaequalitas digitis explorantibus occurrit, strepitusque, & ad confractum adductio. Quod si intro spectauerint, dolor vehemens punctorius sequitur, eo qui in costis provenit grauior, quod aculei modo membranam costas integram conuulneret, item aegra respiratio, tussis, eruptio sanguinis, subinde comitatur. & reliquas utique declinationes digitis liceat conformare, eam vero quae intro spectat, nequaquam, quod tendi nequeat.

nequeat. vnde alij cibum flatulentum vberemq; assumi iubent, vt fractura ex inflatione & tensione foras propellatur, quod necessarium non esse puto. Nihil enim commune ad hoc inter se habent, tū thorax, tum uiscera nutritoria, præterquam quod inflammatio etiam ex repletionē augeatur. Alii cucurbitulam adglutināt, quod a ratione & uia curandi alienum non esset, nisi particularum ex attractu, collectione, fracturam amplius ad interiora propellerent. Quapropter Soranus hunc in modum scribit. Lanis oleo calido madentibus partes conteguntur, & linamentis implicitis intercostale replebitur, ut delegatura æqualis iuxta orbicularem cirunductum veluti in pectore fiat. Omnia vero vt in pleuriticis fieri debent, ad magnitudinis proportionem. Porro si magna quædam necessitas compellat, quod membrana costas cingens vehementer compungatur, cutem diuidere conuenit, & fractam costæ partem detegere. deinde lamina, ne tunica costas tegens conuulneretur, prius subiecta, ossicula quæ pungunt ingeniose excindere ac eicere oportet. postquam hoc feceris, ea sane quæ inflammatione carent coniunges, & cruentorum modo curabis, quæ autem illa affliguntur, linamentis oleo madidis operies, victum curationemq; adhibens inflammationi dicatam. Decumbent ægri ea figura quam facilius tulerint.

De coxarum & pectinis ossibus. Cap. xcviij.

Coxarum aut ilium ossa raro quidem franguntur, sed easdem cum scapulis differentias sustinent. Franguntur enim in extremis, rumpunturq; in longitudinem, & per medium comprimuntur. Comites notæ ipsorum sunt, dolor partem affectam affligens, punctiōis pullusq; sensus, cruris in eodem latere subitus stupor propter compressionem. adaptationem vero scapulis similem postulant, aduersantur autem solam ex chirurgia eius quod fractum est, exemptionem per externas partes. nam si opus sit, digitis conformantur. deinceps autem etiam aliam curationem moliri oportet, fomentis vtendo, & concaua illum linamentis adimplendo, quo deligatura ceu fasciis circularibus super iniectis, æquabilis efficiatur. Eadem etiam dicenda sunt, de pectinis ossibus, nihil enim peculiariter de ipsis dicere habemus.

De vertebris, spina dorsī & sacro osse.

Cap. xcviij.

Vertebrarum complexus interim sane contusionem, raro vero et fracturam experiuntur, propter quæ contusis spinalis medullæ membranis, vel ipsa etiam medulla, nerui in doloris consortiū adducuntur, & mors præceps subsequitur, magisque si ceruicis vertebra affectus infestari, vnde præfatus periculum, siquidem fieri po-

B b

PAULI AEGINETAE

test, audebis etiam sectione ossiculum, quod premit eximere: si minus, ratione saltem qua inflammatio propulsatur, ipsas lenies. At si processus vertebrarum aliquis unde spina constat, fuerit refractus, digitis tentantibus prompte occuret, dum refectio mouetur, rursusque in locum transponitur. Conuenit autem id quod refractum est auferre, cute extrinsecus incisa, futurisque commissa, remedio cruentis idoneo uti. Cæterum osse sacro fracto, index sinistrae manus digitus in anum demittendus est, dextra manu quod contractum est, quatenus licet, in naturalem figuram reducere oportet. Si autem aliquid refractum sentiamus, hoc quoque diuiso, deligaturam curationemque congruam adhibebimus.

De brachio.

Cap. xcix.

In brachio fracto Hippocrates quidem intentionem hoc pacto molitus est. Lignum, inquit, oblongum manubrii ligonis modo, per summa fune deligatum, obliquum ex trabe quadam suspendere oportet: collocato autem homine in sublimi quodam erectius, quam iuxta figuram qua recta ceruice dormimus, orthocatheudon dicitur, manum ipsius super commemoratum lignum traducere, ut medium ligni alæ eius transuersim adaptetur. manum autem inflexo iuxta rectum angulum cubito, minister procumbens continebit. deinde graue aliquid, exempli gratia, lapidem aut pondus plumbeum vel eiusmodi quippiam ex cubito suspendens, sinensque pendere sublime, ita fracturam conformabis, vel loco ponderis, famulus ad ima brachium detrahat. Nonnulli vero loco manubrii ligonis gradu scalæ vsi sunt. Soranus hunc in modum tradit ægro in sedili collocato, vel, quod satius est, resupinato quo minus molestiæ sentiat, manu fune ligata iuxta compagem qua ipsa cum brachio coniungitur, & ex ceruice suspensa, ut angulosa ipsius figura seruetur, ministris duobus iubeamus, huic, supra fracturam, illi, infra digitos circumponant, atque sic tensionem perficiant. Quod si valentius opus sit tractione, duos funeis æqualeis brachio circundamus, vnum, supra fracturam, alterum, infra. atque vni famulo super ægrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capita funium tradentes, iubeamus in diuersa brachium distendere. At si summus humerus fracturam senserit, dimidio vinculi, quod circa dicitur, alæ subiecto, reliquam partem iuxta caput teneri iubentes, alio quod oppositum est retrahente. antistasin, hoc est a se retractionem ut dictum est, moltemur, quemadmodum sane si cubitus contractus fuerit, illi vel iuncturæ manus cum brachio funis iniicietur. Ossibus iam fracturæ probe coaptatis, distentio quidem remittetur, sed iuxta Hippocraticam consuetudinem deligabitur. Por-

ro si fractura inflammatione vacet, recensq; sit, lineis vtendum fasciis oblongis abunde, circa treis quatuor ve digitos latis, aqua madentibus, aut etiam posca: si inflammatio adest, lanis tenuibus mollibusq; oleo imbutis: & siquidem in medio brachii fuerit fractura, initium fasciæ super fracturam iniicietur, vbi bis ter ve illigaueris, sursum fasciam ducere conuenit, (vt quemadmodum inquit) sanguinis influxiones excipiantur, atque illic finiatur. Iam vero & secunda fascia vti oportet, initium eius similiter supra fracturam iniiciendo, atque alia eo modo quo in priori: rursus autem superne deorsum, atq; iterum sursum reuocare, illic etiam sic terminabitur. Porro constrictio mediocris esto, tum nostri sensus, tum ipsius ægrotantis iudicio. At si iuxta summam humeri compagem contigerit, priore fascia illam & scapulas, & pectus comprehendens, vt deligatura fiat quam Græci geranida appellant, perque secundam vsq; ad cubitum dispensabis, ac inde ad supraposita recurre, cum summo humero scapulas pectusq; comprehendens primæ fasciolæ similiter. Quod si iuxta cubiti flexum fractura obuenerit, etiam cubitum colligare expedit, ita vt angularis figura conseruetur, similiter in aliis quoque artubus, nimirum cubito, femore, tibia, cum fractura in parte, aut etiam iuxta articulum & non in medio membro existit, post articulum fasciam iniicere expedit. Recentiores itaque secundum deligaturam protinus ferulas etiam iniiciunt, vt adaptationis figura contineatur, constringentes ipsas prout sensus & tumor ex inflammatione postulat. veteres autem, a die septimo ferulas accommodarunt. nam intra hunc inflammatione declinante membrum redditur tenuius. At Hippocrates tertio quoque die ligamenta solui iubet, ne tensio quæpiam, aut motus præter solitum contactæ particulæ obueniat, aut eius quod iam infixum fracturæ est, perspiratus prohibeantur, propter quos non solum noxijs pruritus quibusdam accidit, sed etiam erosa a saniei acrimonia nonnunquam cute, exulceratio concitatur. Itaq; aquæ temperatæ tantum super funnere ratio est, quantum saniem discutere sufficit. Post septimum diem, ex maiore intervallo soluere conuenit, ceu partes non amplius saniem excerne uenit. Cæterum ferulæ iuxta sequentem rationem debent iniici. Splenia triplicia oleo imbuta super fascias circundantur. Si igitur membrum crassitudine fuerit æquale, similiter si inæquale, partibus magis concauis per splenia repletis, æquale ipsum crassitie ferulis accommodandis efficiemus. deinde lana aut stuppa ferulas mediocriter inuolutas, in orbem fracturæ circundamus, non minore

PAULI AEGINETAE

quam digiti spatio inuicem distantes, easque moderate constringemus, ita tamen, ut quatenus fieri licet, ferulas propius accedere articulum prohibeamus, praesertim iuxta interiorem flexus partem. Ulcera siquidem in ipsis nonnunquam & nervorum inflammationes pariunt, verum illic laxiores ipsas esse oportet, quemadmodum valentiores, ubi fractura curuatur. Praestiterit autem thoraci etiam brachium mediocriter colligare, ne ipsum loco motum, figuram peruertat. At si quandoque inflammatio fuerit, (eam vero agnosces ex ambiente tumore, ac rubore, & quod membrum nunc multo magis quam prius stringatur) vel si contractum membrum, distortum sit, & nihil horum appareat, sed ligamenta laxa, vel e contrario strictiora, quam par est, inueniantur, solutis ipsis deligatura instauranda est. Resupinari igitur aegrotus debet, ita ut super stomachum manum contineat, brachio subiicietur molle quiddam pellem super se habens, ut superfusionum influxus excipiat. Superfundetur autem quotidie oleo calido, praesertim quum viget inflammatio, quando etiam cibus tenuis exhiberi debet, postea mediocris, ad calli generationem quies indicitur usque dum fracta occalluerint. occalescunt autem brachium & tibia, diebus circiter quadraginta, post quos ubi solueris fascias, & lauacro usus fueris, emplastris ad fracturas factis perfanare conuenit. haec tractandi ratio omnibus aliis propemodum contractis artubus conuenit.

De cubito, & radio.

Cap. c.

Cubitus radiusque, interim uterque iuxta eundem locum frangitur, interim alter duntaxat, vel in medio, vel in parte iuxta flexuram, aut brachiale. Omnium itaque deterrimum est quum ambo eadem parte franguntur, deinde etiam cubitus solus. At radius fractus, aliis facilius curatur, siquidem maior cubito non est, sed illum ipsum subiectum habet, ut veluti insideat. Porro si ipsorum alter duntaxat fractus fuerit, in illo maxime intentionem validiorem moliemur, si uterque similiter intendemus, manu anguli modo figurata, ut pollex omnium digitorum altissimus, exiguus digitus humillimus habeatur, sic enim cubitum radio subiici continget. At si valentius opus sit intentione, ambobus potissimum contractis, non solum manibus, sed etiam finibus intendere aggrediemur, ut in capite de brachio comprehensum est. Caeterum omnis deligatura, & reliqua praesidia, una cum ferularum iniectione, hic adhibenda sunt, dum callus eos firmarit. Firmatur autem cubitus diebus plurimum triginta. Ac repositio ipsius similis erit ei, quam brachium fractum vendicat, praeter ea quae ipsi subiiciuntur.

De summa manu, & ipsius digitis.

Cap. ci.

Brachialis & aduersæ eius partis, & in digitis articularum ossa quum laxa fistulosaque natura sint, contunduntur quidem plerumque, raro autem franguntur. Aegro igitur in alto sedili collocato, medicus in altero quodam æquali aduersus sedebit, priusquam manum imponat, ac tensis per ministrum iis quæ fracta sunt, duobus digitis ipsa conformabit, pollice & indice digito prius compressa, deligatura utetur, quo tempore vrget inflammatio. Nam propter laxitatem facile in ipsis callus amplior conrescit. At si acies digitorum, aut digitus simpliciter contractus est, siquidem magnus, & pollex appellatus, fuerit post commodam deligationem ab inferiore parte, ipsum utique cum manu ligabis, ne dimoueat, si ex aliis quispian, vel index, vel paruus digitus, proximo colligabitur, sin aliquis ex mediis, iis qui vtrinque habentur, vel etiam omnes deinceps ligari vna debent, melius enim conquiescunt, quemadmodum si contracti ferulis quoque colligentur.

De femore.

Cap. cñ.

EAdem de femore dicenda sunt, quæ de brachio prodidimus, peculiaret autem magis femur fractum, in anteriorem partem & exteriorem promouetur, etenim in his naturaliter dilatatum est, instauratur autem manibus, funiculis, & antennis æquivalentibus, vna supra fracturam posita, altera, subter. Quod si in parte fractura euenerit idque iuxta femoris caput, dimidio fasciæ lana circumdato, ne corpora incidat, iuxta inguina disponemus, & initia ad caput reducta, famulo ut partem contineat, trademus, infra autem fracturam fune circumposito initia ad intentionem alteri ministro exhibebimus. Quod si ad genu fractura habeatur, funem sane supra fracturam iniicimus, initia eius ad extensionem dispensamus, genu etiam ipsum implicito quodam fune continemus, hanc autem partem restituimus aegro decumbente, & crure exporrecto, quæ pungunt ossa ut subinde dictum est, eleuata, superius tollemus, reliquam curationem in capite de brachio exposuimus. cæterum callo firmatur femur quinquaginta circa diebus. At quomodo reponi debeat, post totius cruris disciplinam, comprehensum est.

De patella.

Cap. ciii.

Patella os laxum est ac molle, valide corporibus superiore & prima parte comprehensum, frequenter sane contunditur, raro autem frangi solet, sustinet autem rupturam per crassitudinem, & intenuia fragmēta finditur, cum vulnere vel sine vulnere. Nota vero conspicua (motus enim continuitatis intercedit) & cauitas & sonitua. Instauratur autem pars cruris extensa, nam quæ bifariam fissa est digitis eousque committitur, donec fracturæ labra supra sese contingant,

Bb iii

PAULI AEGINETAE

& inuicem iungantur: quæ vero in tenuia fragmenta fissa est, manu conformatur. etenim callo non generato, eo quod pars vtræque per musculos cognatos & nervos, a femore & tibia in contrarium non retrahatur, tamen multitudo distentionis contrahet, & functionis difficultatem affectis inducet, neque enim laborantibus ipsis diutius genu sustinet, & obambulando illi impediuntur, præsertim ascensuri: siquidem in æquabili per planiciem motu actionis difficultas occultatur, in ascensu autem, eo quod genu, in crucis elevatione & positu non inflectatur, deprehenditur. Iam vero ossiculum si quod pungit, eleuatum prius eximito, ac curationem consentaneam adhibeto.

De tibia. Cap. ciiii.

Tibia cubito respondens, eandem curationem recipit, etenim illa duobus ossibus fulta, altero crassiore & cognomini, altero tenui, quod ex similitudine perone Græcis, quasi fibula, latinis sura dictum, easdem fracturarum differentias recipit. in omnem enim partem distorquetur, quum ambo ossa contracta fuerint: in tre is autem, quum alterum, intra & extra: tibia quidem, retro: sura, antarius. quapropter etiam ipsa similiter restituitur manibus, aut funiculus superioribus, quam fracturæ funes sunt, interim ipsi tibiæ circumdatis, interim femori. Nam quum genu sit validius, articulum integrum per tentionem seruabimus. Similiter & inferiore fracturæ funiculo, ut in cubito dictum est: reliqua ut in capite de brachio tradidimus.

De pede summo. Cap. cv.

Talus nequaquam frangi solet, eo quod vndeque tibia, sura, & osse quod ob tessaræ similitudinem vocatur cyboides, custodiatur muniaturque. At os quod a cymbæ figura dicitur scaphoides, & supernæ pedis regionis, item pedis digitorum ossa, ipsumque cyboides, similiter iis quæ in brachiali & opposita eius parte, manusque digitis sunt, franguntur. quare etiam quæ de illis diximus, ne eadem repetatur, illinc huc transferre consilium est.

Quomodo crus reponi debeat. Cap. cvi.

Nemo refracto, aut tibia, non minori cura repositionem ipsius quam reliquam curationem obibis. Nam partium contractarum æqualitas, hac potissimum probe administrata, conseruatur. Nonnulli igitur canali, quam solenam Græci dicunt, nunc lignea, nunc fictili, membrum fractum, aut etiam crus ipsum reposuerunt alii vero sola ea quæ cum vulnere fracta sunt, eo quod hæc ferulis nequeant constringi. in totum vero solenarum vsum posteriores damnarunt multis sane de causis, sed præcipue, quod ipsarum duritia partibus ne

gotium faceretur. Neque tamen alienum est, artus cum vulnere fractos ferulis excipere, ut ostendemus. Aeger itaque resupinabitur, ac indumentum aliquod crassum cruri æquale, in longitudinem utroque contractum & inuolutum, ut canali per mediam concavitatem oblongam proportionem respondeat, subiicietur: pellis super ipsam molliuscula explicabitur, quæ superfusiones excipiat, deinde in longum crus concavitati huic canalem referenti, insinuabitur. a lateribus alia vestimenta lanæ ve apponentur, ne membrum in latera declinet, pedis autem ima pars asserculum rectum panniculo circumdatum, propter molliorem, assumet. ac maioris securitatis gratia, media fasciarum duarum trium ve, vestimento canalis modo præparato subicientes fractum membrum ipsi leuiter deligabimus. At si æger non tolerans conetur pedem totum contrahere, conuenit id facere quod in superiore pedis parte dictum est, deinde blande cum asserculo deligare, ne inuiti inter dormiendum, ut verisimile est, pedem contrahant. Aliqui vero etiam stragula lecti per medium pertundunt, ut ipsi sint immobiles, & per foramen vrina & stercus reddatur, usque dum callus coalescat.

De fracturis quæ cum vulnere incidunt. Cap. cvii.

FRACTURA cum vulnere facta, siquidem sanguis profundatur, hunc prius sistemus, si inflammatio fuerit, præfidiis in eam efficacibus utemur. Carnibus contusis, partem affectam sacrificabimus. metu, ne in gangrænam incidat, sublato, at si illa quoque accesserit, aut alia quæpiam serpens putredo, conuenienter occurreremus, habes autem horum singulorum curationem quarto volumine explicitam. At si nihil horum adfuerit, neque ossa largiter denudata sint, hamulis futurisque uti, remedio cruentis apto, his medebimur, sic, ut ossicula refracta, ut verisimile est, & pungentia innatantiaque primum auferamus. Quod si magnum aliquod os emineat non commissum propter magnitudinem, in intensione huic prospicies. Siquidem Hippocrates semore & brachio contractis ossa excedentia statim eiicere dehortatur, periculum his futurum præcens ex inflammatione, quam tensio crearet, vel etiam conuulsione, ut credibile est, musculorum neruorumque. Tempus vero nonnunquam administrationem commodam inuenit. In quocunque igitur osse quod ex sede sua excidit, nanum ad mouere volumus, nequaquam in inflammatione aggremur, sed primo statim die, antequam inflammatione occupetur, ut nono, inflammatione iam finita. Adaptamus vero ossa vectæ uâ Græci mochliscon vocant, est autem ea instrumentum ferreum aptum octoue digitos longum, mediocriter crassum, ne inter commoendum inflectatur, acutum in summo latumque, & leuiter in-

Bb iiii

PAULI AEGINETAE

flexum, cuius acutum extremum superposito ossis tuberculo subiacentes, ex altero in oppositum tendentes simul, & mediocri intensione membri facta, inter se sineis fracturæ commitemus. quod si facere nequeamus, scalpris excisoris obuersas acies habentibus quod eminet auferemus, aut serra subsecabimus, quemadmodum in fistulis docuimus, ossiumque asperitudine ad æquata, & membro directo, medicamentis quæ in linteolis illinantur, curabimus. Maxime autem animum adhibere oportet in membris coniugalibus, aut a iugis appellatis, altero autem in ipsis osse particulatim serra obsecisso, ut membrum in contractum maneat, etiam intensione accurata utemur, deligatura vero hoc modo adhibenda est. Circulares itaque fasciæ, partibus vulneris utrobique iniici debent, obliquæ vero, per ulceris longitudinem, ut in literæ Græcæ X similitudinem conclusio omnium fiat. Si sordidum adhuc ulcus est, purgantia adhibebimus: si purum, quæ carnem inducunt, linteolis illita, aliamque comprobata vfu materiam. Hippocrates pissera emplastro in linteolis utitur, id autem esse dicunt tetrapharmacum basilicum. Vbi caro increuerit, ferulæ iniicientur, aliqui vero per initia ipsas accommodant, ulceris locum vitantes, & pro vfu urgente ipsas constringentes, vel rursus remittentes. In quibus autem squama ab osse recedet, notabimus quidem hoc, inde quod copiosus humor & tenuis excernatur, caro autem ulceribus vacua inanisque facta attollatur, deligatura quidem laxiore ad curationem utemur, hamulo autem, aut eiusmodi quopiam squamam euellentes, iterum validiore deligatura utemur. Porro per totum ulceris tempus medicamen aliquod ex iis quæ inflammationem arcent linamento illitum, vulnere incubet, ac simplices fasciæ iniicientur, quæ singulis curationibus solui debent, quum aliæ supra dictæ maneant, ut in capite de brachio expositum est.

Si præter modum fracturis callus obducatur.

Cap. cxiij.

Immodici fracturarum calli indecoram omnino speciem efficiunt, nonnunquam etiam functiones impediunt, si prope articulum coaluerint. Si igitur recens adhuc callus coierit, remediis admodum astringentibus utemur deligatura ipsa accommodantes. Nonnunquam vero & plumbea imposita lamina, id quod requiritur, effecimus. At si lapidosus solidusque fuerit, incidentes ipsum rademus, id quod eminet, scalpris auferentes, si res exigat, etiam terrebris vfi.

Si distortum membrum callus firmavit. Cap. cix.

Quibus membrum distortum callus firmauerit, difficultate functionum obeundarum haud exigua subsequente, præsertim si in pedibus fuerit, repositionis quidem modus non recipiendus est,

vt qui extrema inferat discrimina. verum si callus nondum radices egerit, laxantibus superfusionibus, & cataplasmatibus ex ficis pinguibus & columbarum stercore, aliisque medicamentis quæ a callo soluendo porolytica dicuntur, vtimur. Insuper per manus frictione, et contractione hunc dissoluemus. Quod si lapidosus euaserit, scalpello superficie diuisa, excisoriis scalpris consortium ab osse liberabimus, deinde fracturæ medebimur, vt superius a me dictum est.

Si fracturæ callo non firmentur.

Cap. cx.

FRACTURÆ nonnullæ sine callo permanent, supra definitum naturæ tempus, aut ob continuas resolutiones, aut immodicas superfusiones, aut motum intempestiuum, aut fasciarum copiam, aut quia totum corpus alimentum non percipit, in quibus etiam tenuius fieri membrum contingit. Itaque cum alias occasiones, tum maxime corporis in diem tollere conandum est, partim per calidiora alimenta materiam particulæ distribuendo, partim cibum subministrando sufficientem, item lauacra, & reliquas animi voluptates. Porro notæ eos qui callo iam firmanentur comitantes, hæc inter alias sunt præcipuæ, si fasciolarum cruorem referant, etiam non ob orto vulnere, quod forsitan accidit, calli substantia quando coalescit fistulis, ossium inspersas sanguinis guttas extundente.

De ossibus luxatis. Cap. cx i.

QUUM luxationes fracturis proximæ sint, de iis verba facere aggrediemur. Luxatio igitur est, vt summatim dicam, quum articulus a proprio sinu, ad insolitum excidit, in qua motus arbitrius impeditur, differentias ipsius alias dicere non habemus, nisi eam duntaxat quæ ex maioris minorisque ratione sumitur. quum enim articulus in totum exciderit, communi generis vocabulo affectus Græcis exarthrema, Latinis luxatio dicitur, quum aut aliquatenus duntaxat emotus est, aut vsq; ad superficiem e sinu elapsus, pararthrema.

De maxilla. Cap. cx ii.

RVSUS a superioribus incipientes de maxilla dicamus. Nam quum malæ sint immobiles, luxatione non periclitantur, maxilla autem toto loco non mouetur, quod capita ipsius malis firmiter ac tuto insinuata sint, modicam vero perueisionem quam pararthrema vocauimus, subinde experitur, quod ob musculos qui ipsam continent ex continuo mandendi loquendiq; exercitio in mollietate elanguescente, qualibet de causa facile laxetur, quod verbum apud Hippocratem $\sigma\chi\alpha\rho\alpha$ dicitur, in quibus sine aliqua difficultate articulus sponte in proprium locum reuertitur. verum de maxilla in tota, laxata, satis est illius verba exponere, quæ cōpendiosa, integra, & perspicua

PAULI AEGINETAE

exiſſūt. Scribit itaque hunc in modum. Excidit quidem maxilla raro, laxat autem ſubinde oris hiatu, quomodo etiam aliae plures muſculorum neruorumq; peruerſiones, id efficiunt. Clarum itaq; hinc potiffimum eſt, quodocunque exciderit. Nam maxilla in anteriora propellitur, & ad contraria eius vnde prolapſa eſt, peruenit, oſiſq; tuberculum iuxta malas tumidiuſ apparet, difficulter ægri maxillam committunt. Qualis autem repositio iſſis congruat, manifeſto liquet, alium enim continere caput oportet, alium comprehendentem ab interiore parte & exteriorē digitis iuxta mentum hiantē homine quam modiocriter poteſt, primum quidem maxillam cō mouere aliquandiu, & huc, illuc manu diducere, iſſiq; homini iubere, vt laxam maxillam habeat, ſimulq; remittat, & concedat, vt repē te potiffimum laxetur, tribus pariter figuris, mente adhibita. Ratio ſiquidem eſt illam ex peruerſione in naturalem ſtatum reducere. Oportet autem maxillam in poſteriora propellere, item conſequenter hiſ committere, neq; hiare. Inſertio igitur hæc etiam in aliis figuris fieri non poterit, medicina autem modica ſufficiet, ſplenium appoſitum ceratum ſaſcia laxiore deligare. Sed tutius eſt, reſupinato homine firmare caput iſſius puluinis ſubiectis quam pleniffimis, vt quam minime cedat. Cæterum vulnerati caput aliquis continebit. Sin autem vtraque eadem maxilla eluxata fuerit, curatio quidem adhibebitur. verum committere minus hi oſ poſſunt, vt quibus prominentiores maxillæ ſint. rectitudinem autem indeflexam maxime cognoſceſ, dentium & ſuperiorum & inferiorum terminis. ſecundum horum directam aciem conſert illas quam citiſſime inferere. quomodo autem inferetur, expoſitum eſt. Quod ſi locis ſuis non inſinuentur, periculum de anima ſubſequetur ex febris continentibus, & torpido Caro. Nam muſculi hi dum alterantur, & præter naturam intenduntur, Carum inducunt. venter ſolet hiſ biliola deicere, vel ſyncera pauca, & ſi etiam vomant indiſcreta eiiciunt. hi igitur de cimo die potiffimum moriuntur. ac hoc modo iniectionis nos ſubinde uſi ſumus, fomentis prius ex hydrelæo calido per ſpongiā ſuper luxatam maxillam adhibitis, quando potiffimum ægre poteſt reſtitui, homineque humi collocato, poſt iſſum nos ſedentes, quemadmodum ab Hippocrate traditum eſt, operamur.

De clauicula & ſummo humero. Cap. cxiii.

Clauicula interiori quidem extremo non excidit, vt quo pectori committatur. vnde ne mouetur quidem in ipſo. At ſi violentia cuiuſdam acuti extrinſecus ferientis auellatur, quemadmodum fractura iſſius inſtaurari debet. Extremum autem, iſſius quod humer articulo inferitur, non admodum ſane excidit, a bicipiti mu-

seulo summoque humeri tuberculo prohibitum, imo neque violento quodam motu clauicula priuatim agitur, propter solam thoracis factam separationem. Vnde homo solus inter animantia clauiculam obtinet: quam si in palæstra, vt verisimile est perueriti contingat, conformatione per manus dirigitur, & splenis multiplicibus accommodatis vna cum deligatura decenti. eadem curatione etiam summus humerus peruersus in propriam sedem reuertitur. Est autem ossiculum cartilagineum quod clauiculam scapulis colligat, in resiccatiss mortuorum cadaveribus occultatum, quod loco motum, imaginem imperitis exhibet, brachii caput excidisse. etenim in hoc exterior humeri pars acutior apparet: concauum autem, id vnde excidit, verum notis quas deinceps subiungam ipsa discernentur.

De humero luxato.

Cap. cxiiii.

Brachii caput scapularum sinui insertum, excidit quidem frequenter, verum neq; in superiorem partem, vt quod scapularum processus ancoræ similis impediatur: neq; in posteriorem, propter ipsas scapulas: neq; tamen in anteriorem, ob muscoli bicipitis tendinem, ipsumq; humeri fastigium. Sed raro quidem in interiorem exteriorēq; prolabitur: continue vero, præsertim macilentioribus, ad ima atque his sane facile & excidit & rursus inseritur. multa autem carne præditis contra, raro quidem elabitur, sed ægre in sedem suam compellitur. Quibusdam itaq; etiam non luxatis, ex ictu frequenter elapsi loco membri suspicio oritur, eo quod valida inflammatio subsequatur. Porro quibus in imam partem luxatus humerus est, hoc modo agnoscas. affectus humerus si cum sanu conferatur, multum differt quum exterior eius pars vnde excidit, concaua appareat, vt in summo humero eluxato diximus, q; acutius quā naturaliter esse debet, apparet, & brachii caput elapsum in ala manifesto occurrit, ac manus huius cubitus a costis magis recessit, quibus quidem costis si ipsum adigas, cum dolore admouetur, neq; ægri manum extenso cubito ad aurem possunt reducere, neque alium motum multiplicem per eam moliri. In pueris itaque vel in quibus recens nec ampla facta est eluxatio, etiam nodo medii digiti flexi eminente medici manus, vel ipsius affecti, sanæ manus, si non puer sit, frequenter restituta est, vt inquit Hippocrates. valentius autem hoc modo luxata inferuntur. Homo lotus & superfusionibus laxandi virtute præditis vsus, resupinari humi debet, & pila mediocris vel coriacea, vel alia quæpiam non admodum mollis alæ accommodabitur, ac sedens medicus aduersus ægrum, iuxta latus affectum, si quidē dexter humerus luxatus sit, dextri pedis calcem superponet pilæ alæ suppositæ: si sinister, finistri, ac affectam manū prehensam ad pedes trahet, simulq; calcaneo alæ

PAULI AEGINETAE

in diuersum propellet, ita ut aliquis post caput ad alterum humerum resistat, ne corpus circum diuellatur. Est & alia ratio immittendi quæ humero subnixo perficitur, quod Græci κατὰ μίζαν dicunt. Adolescens, aut longior ægrotante, aut altius consistens iuxta affectum latus, ægri indidem collocati alæ suum ipsius humerum subiiciet, & manum eleuatam ad ventrem suum attrahet, ut reliquum ægri corpus post eum qui humerum suum alæ subiecit sublime pendeat. At si æger leuior fuerit alius quispiam puer levis ex ipso suspendetur. Nam manu ac reliquo corpore in contraria detractis ad ima, subiectus alæ humerus facile elapsus articulum reponit, atque hoc etiam ligno quod Græci hyperon dicunt, efficiamus. Est autem id lignum oblongum, rectum, quod in pavimento super aliud quoddam solidum ponitur, huius igitur summum extremum rotundum, quod non admodum crassum neque tamen tenue est, alæ ægri aut stantis, aut sedentis, subiicietur, iuxta totam ipsius longitudinem. Ac manu per lignum istud porrecta & detracta, reliquo autem corpore contra inferius vergente, vel sua sponte, vel alio quodam trahente, restituito fiet. atque hoc in scalæ gradu fieri debet, quemadmodum in con fracto brachio per tensionem fieri dicebamus. hic autem rotundum quoddam corpus super gradum deligatur, quod ægrotantis alæ possit adaptari & brachii caput propellere. Porro si ob vetustatem affectus, aut corporis duritiem, repositio nobis facessat negotium, utemur etiam ratione quæ per spatham ligneam, amben appellatam sit. Est autem ambe lignum quod longitudinem duorum cubitorum habet, latitudinem quatuor digitorum, crassitudinem instar digiti, alterum extremum rotundum, quod etiam prompte in alæ sinum ingreditur, perinde ut ligni quod hyperon vocatur, extremum. hoc itaque extremum panniculo circumdatum, quo lenius existat, capitulo brachii iuxta alam accommodabimus, totam vero manum ad lignum intensam cum eo deligabimus, iuxta brachium, cubitum, & eius extremum, deinde ligno obliquo inter duas columnulas rectas adaptato, vel rursus supra scalæ gradum manu traiecta cum ligno, ut ala per transversum gradui accommodetur, manum infra trahentes, sinemus in alteram partem reliquum corpus in sublimi pendere, tunc enim articulus ingreditur. Vbi fuerit repositus, mediocris ex lana pila siquidem inflammationem pars non sentiat, sicca si sentiat, oleo madens alæ iniecta, deligabitur. per hanc autem alam & humerum & alteram alam vinculi deligationes literæ X figuram potissimum apparebunt, ita ut in hunc modum facta deligatura super affectum humerum accommodetur, brachium autem costis colligetur, ipseque cubitus & summa manus, ex ceruice deuinciantur, ne rursus de integro

articulus excidat. Post septimum diem vel tardius ubi fascias diffolueris, mediocri uti frictione præstat, eo quod corpore solidiore facto articulus ita firmetur, ut non facile prolabatur. Quod si autem crebro prolabatur, aut humiditatis vitio, aut ob aliam quampiam iam diu factam elabendi viam, ad visionem veniendum est, sicut supra comprehendimus. Quum autem vel infantibus in utero aut æditis quidem in lucem, sed adhuc incrementibus, particula fuerit luxata, nec dum reposita, in humero quidem carnes nihil a naturali figura deficiunt: neque enim manus quodcumque opus perficere impeditur, os autem brachii brevius permanet, non augescens, ac tales nominantur galian cones. In femore etiam os incrementum non sentit, & totum crus contabescit, quum enim pondus corporis ferre nequeat, non exercetur, ac in aliis membris luxatis manentibus quæ subiiciuntur partes omnium iniuriis expositæ sunt.

De cubito.

Cap. cxv.

Quanto cubiti articulus humero magis varius creatus est, tanto plus negotii prolapsus exhibet, & tardius quidem excidit, sed difficilior reponitur, propter tuberculorum sinuumque frequentiam. Nonnunquam igitur solum aliquatenus detorquetur, quem casum parathrema dixi. sæpe vero etiam ex toto in omnem partem prolabitur, præcipue in priorem & posteriorem, quod facile dignoscitur, eo quod excidit oculis & tactui obiecto, in quodcumque prolapsus sit, & sinu unde excidit apparere. Hæc vero potissimum sani cubiti inspectio coarguit. Conuenit autem protinus membrum reponere priusquam inflammatione occupetur. siquidem eam expertum, difficulter curatur. Quædam etiam nullam prorsus curationem recipiunt, maxime si in posteriora prolapsa sint. Hæc enim luxatio omnium quæ in cubito fiunt maxime dolorifica est & periculosa. Quod si modice articulus inuersus sit, moderata etiam intensioe restituitur, sic ut ministri manum ex porrectam iuxta brachium cubitumque contineant, & in aduersa retrahant, medicus autem suæ manus palma quod excessit in suam sedem compellat. Hippocrates in priora luxationem subito manus inflexu instaurat, ut palma ipsius humerum iuxta rectum pulset: in posteriora vero, subita rursus & diutius facta extensione, quoniam luxatio in priorem partem, violenta potissimum extensione efficitur, quæ in posteriora, flexu similiter vehementi. Quod si luxatio perseveret, etiam validam magis intensioem usurpabimus. eiusmodi vero est potissimum quam Hippocrates in brachio confracto exposuit, ubi ligonis manubrium adhibebat. Porro recentiorum aliqui hunc in modum adaptant. ministris duobus manum ut dictum est, intendentibus, ita ut alter sursum ad alam

P A V L I A E G I N E T A E

contineat, alter deorsum iuxta brachiale, medicus aduersus ægrotanti consistens, duabus palmis iuxta articulum, brachium circumdat, ac ubi iusserit vestimentum contractum in oblongū vel latam fasciam manibus ipsius simul & ægrogantis brachio circumtrahere, ipse deinceps cum tensione constrictas ipsas trahit, donec cubiti articulum excedant. Cæterū manus prius oleo illini debet, vt lubrica fiat & facile medici palmis deducatur. Sic enim prolapsa, si pertrahentiū manum vi premantur, in propriam sedem reuertuntur. Postquam sunt reposita, in anguli modum figurata manu, ex splenis & conuenienti deligatura curationem petemus.

De brachiali & digitis luxatis. Cap. cxvi.

Brachialis digitorumq; luxatio nullum facessit negotium per se, nisi cum vlcere facta fuerit. de hac igitur in capite de luxationibus quæ cū vlcere fiunt tractabitur. At sine vlcere luxatis, mediocri intensione, & remediis quæ inflammationem pellūt, medebimur.

De vertebris spinæ. Cap. cxvii.

Vertebræ spinæ si ex toto prolabuntur exciduntq; præsentaneam mortem inferunt. Medulla siquidem ipsius spinæ vel quālibet compressionem non sustinet, quum & solus ex ipsa neruorum processus si contundatur, hominem in periculum perducere sufficit. Peruersionibus autem subinde affligitur, nunc in priorē partem distorta, ac vitium lordosin Græci appellant: nunc in posteriorem, & cyphosin a loco gibbato vocant: interim vero in latera, quod scoliosin nuncupant. Quum igitur multæ simul vertebræ paululum adeo peruersæ fuerint, plurium simul peruersio ex circulari flexus rotunditate fieri apparet, ac putant nonnulli decepti, ab vna vertebra ampliter peruersa id fieri. Nam magna distortio non rotundum, sed angularem spinæ flexum molitur, quando etiam magis periculum subsequitur. Si igitur introrsum spina est peruersa, restitutionis spes nulla est, eo quod per ventrem, antierius oppositio fieri nequeat. Qui enim in scala sic affectos intendūt, aut cucurbitulas admovent, aut sternutamenta aut tussim aut flatum excitant, quid tandem promouere putati sint, Hippocrates abunde ostendit. Quoniam vero subinde cuiusdam ossiculi spinæ refractione facta, cauum locum representat, quemadmodum in capite de fracturis comprehensum est, aliqui vitium lordosin esse crediderunt. deinde hoc celerius perfunato (prompte enim callo firmatur) lordosin curatu facilem existere pronuntiarunt, & si nullam curationem, aut certe difficilem recipiat. his etenim vrina supprimitur, alius non respondet, corpus inhorrescit, postea etiam sine voluntate excrementa prorumpunt. Hæc autem eueniunt, neruis, & musculis consortii lege laceratis,

ac celeriter ægri moriuntur, præsertim si superiores & cervicis vertebræ affectum fuerint expertæ. Cui vero iam inde a paruulo potissimum vertebræ gibbatae protuberant, vitium longum esse neque celeriter mortem sed morbum accersire, & insanabile Hippocrates prodidit. At quibus recens hic gibber ex casu prouenerit, machinæ quidem, per scalam, & rectam ægri suspensionem ac vteri inflationem adhibitæ ridiculæ sunt. sola autem Hippocratis adaptatio sufficiet. Conuenit enim, inquit, lignum magnum quod tantam longitudinem ac latitudinem habeat, ut hominem excipiat, aut scamnum huic æquale, prope parietem deponere, ac iuxta hunc ita extendere, ut in longitudinem pede non amplius absit, & vestimenta quædam super ipsum explicare, ne hominis corpus infringantur. Cuius autem hic lotus antequam super lignum scamnum ve infideat, deinde lorum pectus ipsius bis circumdatum, per alas iuxta dorsum vincire, initia lori ligno oblongo pistillo simili deligare, atque hoc super paumentum iuxta ligni aut scamni subiecti extremum constituere, & ministro post ægri caput stanti ex superiore parte continendum tradere, ut imo quidem extremo contra fixo, altiore supra caput tracto opportuna fiat intensio. altero autem lorum pedes simul & superiores talorum partes deligantes, & rursus alio, superiora ilium & lumbos, ita ut huius in lumbis fiat connexio, iterum extrema horum ligamentorum coniungemus: alii autem ligno pistillo respondentem, similiter prædicto illigantes, statuemus in ligni aut scamni extremo quod iuxta pedes est, lignum pistillum repræsentans, ad prioris similitudinem, deinde famulis iubebimus ut per ligna retractionem in diuersa moliantur. Quidam vero asellis dictis hanc efficiunt: sunt autem hi axes qui contra rectum lignum vertuntur: utroque huius magni ligni aut scamni latere iuxta extrema ad pedes, caputque sita, lora inuoluantur. Quum autem sic intensio ipsa administratur, manus palma gibberum constringemus. si autem usus postulat, etiam super ipsum infidebimus, nullum veriti periculum. At si ne sic quidem spina instauretur, & æger pressionem ferat, ut le est parietem adiacentem in longum canalis modo exculpere e regione gibberi, ut sculptura cubiti longitudinem habeat, neque altior sit ægrotantis spina, neque multo humilior, imo sculpturam prius præparatam esse oportet. huius enim causa etiam lignum ab initio prope parietem poni maluimus. deinde asseris mediocris alterum finem ad ima comprimemus, donec sensibilibus spina dirigatur. verum ut inquit Hippocrates, sola intensio citra asserem, rursusque per asserem sola curatio, id quod requiritur potest efficere. Quod si hoc verum est, non alienum etiam in lordosi & scoliosi per initia intensiorem præ-

PAULI AEGINETAE

dictam, sine cōstrictione videlicet, moliri, post adaptationē vero; lamina lignea quæ latitudine treis digitos æquet, longitudine gibbero respondeat & aliquam ex sanis vertebis comprehendat, loro lineo aut stuppa propter duritiem inuoluta, vertebis ipsis imponi & conuenienter deligari debet, victus adhibebitur tenuis. At si post hæc quædam gibberi reliquæ remanserint, laxantibus emollientibusq; remediis cum laminæ appressu, per diu vtendum est. aliqui vero plumbam laminam vsurparunt.

De coxa luxata. Cap. cxviii.

QUum alia corporis ossa interim paulum excedant, interim toto loco excidant, coxæ humeriq; articulus soli luxationi opportunus est, qua tota sede promouetur, atque ex his, magis coxæ articulus, quoniam sinum & rotundum, & profundum possidet, ad hæc, quod elatioribus marginibus munitus sit. At si quandoque articulus ob vim quandam vehementem sinu suo exciderit, etiam multæ luxationis secundum minoris, maiorisq; rationem differentię, proueniunt, quatuorq; modis, imo locis coxa luxatur, vel enim in interiorem partem, vel exteriorē, vel priorem, vel posteriorem, prolabitur. verum intro quidem & extra continue, & multo frequentius intro. in anteriora autem & posteriora, rarius. Quibus itaq; in interiorem partem coxa prolapsa est, iis crus affectum, si cū sano conferas, longius spectatur, & genu prominentius, & ad inguina crus inflectere nequeunt, & in regione scroti & ani inter media tumor manifestus occurrit, tanquam femoris capite illic desidente. Quibus autem in exteriora promota est, iis cōtrarie notæ eueniunt, siquidem crus breuius apparet, & inter scrotum & anum in sinum dehiscit, iuxta clunes in tumorem attollitur, & genu interius demergitur, crus inflectere ægri possunt. Si in priorem partem prolapsa est, crus sine dolore genu extendunt, non autem ad interiorem partem inclinare possunt, incedere conantes. Vrina his supprimitur, inguina intumescunt, nates rugosæ excarnesq; apparent, calci inter ambulandum innituntur. Porro quibus in posteriora excidit, non aut popliteum, aut genu extendunt, neq; inflectere possunt prius quam inguina flexerint, atque his crus breuius, inguina laxiora apparent, & per nates femoris caput eminet. Quibus sane iam inde a pueritia, aut certe longiore temporis spatio articulus prolapsus curæ non fuit, etiam præsidium nihil promouerit, membro iam in orbem coacto. Quibus autem continenter excidit, hi curationem Hippocratis assumēt. quapropter statim reponi luxata debent, vetustæ siquidem coxæ luxationes, nullo modo consanescunt. Communiter itaq; in quatuor luxationibus instauratio congruet, tū quæ euersione articuli &

culi & circumductu sit, tum quæ intensione. Si enim affectus recens fuerit, & æger inuenis, nonnunquam femur continētes circumagentesq; huc illuc, articulum reposuimus. Quod si in interiorem partem luxatio declinauerit, etiam crure tantum subito & valenter ad inguina quam intime flexo, id quod requiritur effecimus: sin autem his non cesserit, intensione vtendum, primum p manus adhibita, quæ crus ab inferiore parte trahant ac per femur tibiāq; constringant, ex superiore autem parte, sub alis corpus circundet. Quod si etiam valentior desideret intensio, funibus contextis aut implicitis, vel loris crus deligare, omnino quidem supra talum, vt autem genu nihil patiat, hoc quoq; superius, oportet: at pectoris regionem vincire necesse non est, verum, vt dictum est, manibus subter alas comprehēdatur, loriq; mollis & validi medium iuxta regionem inter scrotum & anum adaptatum in humeros reducemus antierius per inguina & clauiculam: posterius, per summas partes, duosq; lori initia ministro trademus, deinde omnes simul trahētes, vt ægrotantis corpus eleuetur, intensiōem molientur. hic quidem intendendi modus cōmunis est quatuor femoris luxationum differentijs, priuatim autem in singulis modus quo ossa vecte in sedem suam compelluntur, Græci moliam dicunt, euariat. Intensio enim homine si quidem in interiorem partem articulus exciderit, lori per regionem quæ scrotum & anum interiacet, traieci medium inter femoris caput ipsamq; regionem a scroto ad anum tendentem dispensari conuenit, referri autem lorum per inguina adiacentia & clauiculam expedit. At adulescens quidam duabus vlnis affectum femur, quæ crassius est, circumdatum, in exteriora valenter extrahet. Atq; hic modus inferēdi alijs expeditior est, cui si articulus non cesserit, alijs quoque vtendum, varijs quidem magis, sed hoc efficacioribus, intendi etenim hominem super lignum grandius aut scamnum oportet, in quo etiam spinæ gibbero vitiatos intendimus. Insculpentur autem per totum fere oblongæ quædam ceu fossæ, quæ latitudinem altitudinemq; trium digitorū, non maiorem habeant, dissidentes inuicem non magis quam digitos quaternos, vt vecte iuxta extremū in ipsis resistente, in quacunque partem conueniat restituatur membrum. Per medium autem lignum aut scamnum, aliud impingatur lignum pedalis longitudinis, ligonis manubrij modo crassum, vt sub hoc inteso homine lignum medium inter regionem a scroto ad anum porrectā & femoris caput cōsistat. Simul. n. corpus iis qui a pedibus trahūt porrigi phibebit, eoq; ne vsu quidē sæpe venit in cōtraria ex superiore parte intensio, simul autem inteso quoq; homine ipsum lignum femoris caput foras propellet, ac intensio ad superius dictum modū admini-

PAULI AEGINETAE

strabitur, praesertim pedis. Quod si ne sic quidem in sedem suam redierit, impactum lignum rectum auferri debet, ex latere autem humius situs utrinque singula ligna infingentur, tanquam postes, non minus quam pedalis longitudinis. his aliud lignum adaptabitur gradus scalae modo, ut trium lignorum figura H literam representet, nam paulo inferius summis, medium lignum accommodabitur. Deinde in sanum latus iacente homine sanum quidem crus inter hos postes subter gradum quodammodo ducemus, affectum autem crus ex superiore parte super hunc ponemus, ut ipsi femoris capiti accommodetur substrato prius ei multiplici vestimento, ne femur contundatur, aliud autem lignum mediocriter latum tantam habens longitudinem ut a femoris capite usque ad talum subiectum pertineat, intrinsecus cruri alligabitur. Vbi iam facta est haec intentio, aut per pistillum, ut in gibbero prius diximus, detrahere ad ima crus cum alligato ligno oportet, ut violentia hac femoris caput in propriam sedem reuertatur. Ceterum est & alius reponendi modus sine intentione per lignum, ab Hippocrate commendatus. Manus enim, inquit, aegrotantis mollior costis alligare oportet, & pedes utrosque valido loro molliq; talos & super genu devincire, ut quatuor digitorum spatio inuicem distent: intento autem affecto crure duobus digitis magis quam alterum hominem suspendere, ut caput cubitos duos a terra absit. Adolescens vero aliquis peritus vlnis suis femur affectum comprehendens quacrasissimum est, vbi & caput femoris, subito pendere ex homine cogetur, facile namque articulus ingreditur. Hic reponendi modus aliis quidem simplicior est, ut qui non multo apparatu peragatur, sed veluti miserabilem ipsum, plerique medici auersantur. Porro si in exteriora membrum fuerit luxatum, homo superius intendi debet, lorum aut iuxta regionem inter scrotum & anum per oppositas partes ferri conuenit, inguina dico & claviculam, medicum autem ab exteriora parte introrsum agitare iuxta conuenientem foueam ex iis quae in sculpae sunt ministro quodam vectem ad sanum clunem ne cedat obiciente. Sin autem in priora promotus est articulus, homine intento vir quidam validus dextrae manus palmam affectis inguinibus imponens altera comprimet, simul ad ima, genu versus constringet. At si in posteriora prolapsus est articulus, non opus est quidem hominem in sublime usque intendi, sed in solido iacere, quemadmodum etiam si in exterior articulus exciderit. Sicuti autem in gibbero dicebatur, super lignum aut scamnum homo pronus intendetur vinculis non per ilia, sed in crure, ut nuper dictum est porrectis. Iam vero uti conuenit constrictione per asserem adhibita, iuxta clunium regionem, vbi & articulus excidit, atque haec sane de coxendice ex

LIBER VI.

202

causa foris adueniente luxata, dicta sint. quoniā vero propter copiam humiditatis, veluti humerus, sic etiam coxa prolabitur, vitione vtendum est, quemadmodum in capite ipsius comprehendimus.

De Genu articulo.

Cap. cxi.

Genu in treis parteis promouetur, interiorē nimirū, exteriorē, & iuxta poplitem. in priorem enim prolabi opposita patella prohibetur. Eiusdem igitur intentionis vtentes modis, interim per manus solas, interim etiam funibus, decenter deligabimus, reliquamq; adferemus curationem, hoc spectantes vt particula diutius immobilis cōseruetur.

De tali articulo, vbi etiam de pedis digitis agitur.

Cap. cxx.

Tali articulus si paulum excessit, modica etiam intentione curatur: si toto loco mutatus est, vehementione indigit auxilio. Tēdandum itaque & hic per manus validiore intentione vti. Quod si non reponitur, homine humi resupinato extensoq; longum aliquē & validum palum inter duo femora iuxta regionem scroto & ano interiectam humi per ima rectum defigemus, vt corpus aduersus eū renitens, ad pedis intentionem non cedat, imo prius defigetur, quam homo decumbat. Quod si magnum illud lignum adest, quod pedale aliud lignum per mediū habere defixum diximus, super hoc intentionem moliemur ministro vno femur continente retrahenteque alter manibus aut loro pedem trahet, medicus luxatum manibus diriget, alterumque pedem alius ad ima continebit. A repositione deligari tuto pes debet fasciis ad superiorem pedis partem, aliis ad talum distributis, cura adhibita ne posterior tendo iuxta calcem constringatur. in hoc casu vsque ad dies quadraginta in quiete homini perseverandum est. nam incedere ante absolutam curationem tentantes, particulam reddunt inutilem. At si quis ex saltu, vt fieri solet, calcis os peruerterit, vel etiam aliam quampiam inflammationis affectionem excitarit, blanda quadam intensionē, conformatione, fomentis inflammationi contrariis, & fasciis firmis id dirigendum est, homine similiter vsque dum consanuerit, in lectulo perseverante. Cæterum digitorum peruersio, vt in manibus dicebamus, non difficulter moderata tensione emendatur. In omnibus autem luxatis peruersisq; postquam instaurata sunt & conquerint inflammationem in articulis, vt verisimile est, remanentē, aut tumorem, quæ etiam diu membra a functionibus impediunt, mollientibus remediis persanabimus, quorum materiem nullus qui in artis operibus versatur, ignorat.

E c ii

PAULI AEGINETAE

De luxatis cum vlcere.

Cap. cxxi.

IN luxatis cum vlcere multa requiritur prudentia. Dum enim hæc inferuntur, extrema pericula, nonnunquam, & mortem inferunt. inflāmati enim extensiones iis qui adiacent nervis & musculis, dolores validi, conuulsiones, & febres acutæ oboriuntur, præsertim in cubiti gibbero, genu, & superpositis partibus. Nam quo principalibus sunt viciniora, hoc maius periculum concitant. Hippocrates itaque horum repositionem, valentiorēq; deligaturam omnino auersatur. solis autem quæ inflammationem abigunt leniuntq; præfidiis, per initia vti præcipit. Sic enim ipsis super esse forsan licebit. Quod autem ipse in solis digitis consulit, id nos reliquis etiam articulis facere tentabimus, ac inter initia statim quum pars adhuc inflammatione caret, prolapsum articulum mediocri intensione reponemus. quod si secundum animi institutum euenerit, persistemus, sola ratione quæ inflammationem arcet, vtentes si inflammatio quæpiā aut conuulsio, aut aliquid prædictorum contigerit, rursus eiicere ipsos necessarium est, siquidem citra vim porrigantur. at si hoc quoq; discrimen metuamus, (non enim porrigentur forsan inflammata) satius est per initia in maioribus quidem articulis repositione superfedere. vbi vero inflammatio declinauerit, (id autem fit post septimū nonum ve diem) præfati etiam periculum, quod ex repositione futurum sit tum quod si non repositum fuerit, claudi omnino superuiuent, conabimur tuto administrationem obire. vtentes propter commoditatem, etiam recte. Porro vlceris curationem vt in fracturis cum vlcere dictum est administrabimus.

De luxatione cum fractura facta.

Cap. cxxii.

AT si luxatio sine vlcere cum fractura euenerit, communi intentione & per manus conformationem vtendum est, vt in simplicibus fracturis docuimus: cum vlcere autem rursus, ex fracturis cum exulceratione & luxationibus priuatim expositis, congruam administrationem petemus.

Finis libri sexti, Ioanne Guinterio Andernaco Medico Interprete.

203

PAULI AEGINETAE
LIBER SEPTIMVS.

IOANNE GVINTERIO ANDER-
NACO INTERPRETE.

De temperamentis, quæ per gustatus quali-
tates deprehenduntur.

G A P V T I.



DE SENSILIVM corporum temperamē-
to, coniecturam ex odoratu aliquam sumere,
haud est securum. Nā inodora, substantijs crassa
quidem sunt, sed quāto sint calore, & frigiditate
prædita non ira constat: odora vero, & tenuia
quodāmodo sunt & calida, sed quatenus id sint,
neutiquam ostenditur, eo quod substantiam ha-
beant inæqualem. Multo adhuc minus ex coloribus exacte quid
licet colligere, cum in singulis calida, frigida, humida & sicca repe-
riantur. Verum in gustatu omnes similiter particulæ corporum gu-
stabilium, vt hoc vocabuli vsurpem, linguæ obijciuntur, sensumq;
mouent: vt manifesto ex ipso quoq; temperamentorum vires de-
prehendamus. Quod igitur astringit, cogere, obturare, densare, re-
pellere, incrassare, atq; ante hæc omnia, refrigerare, ficcareq; est ido-
neum. Acidum incidere, diuidere, extenuare, aperire, & perpur-
gare citra calefactionem potest. Acre, similem acido affectum præstat, ex-
tenuando purgandoq;: sed acidum refrigerando euariat: acre, calefa-
ciendo: præterea illud repellit, hoc attrahit, dissipat, rumpit, crustas
inducit. Pari modo etiam amarum, meatus expurgat, abstergit, exte-
nuat, incidit succorū spissitudinem, sine calore manifesto. Aquosum
frigidum, incrassat, cogit, cōtrahit, obturat, sensum aufert, stuporemq;
inducit. Salsum contrahit, stringit, condit, ficit, citra insignem cali-
ditatem frigiditatem ve. Dulce laxat, concoquit, emollit, rarefacit.
Oleosum humectat, emollit & laxat.

De ordine & interuallo temperamentorum. Cap. ij.

Moderatum sane medicamentum ita vt temperatura ei respon-
deat cui admouetur, inde quod nec ficit, nec humectet, nec re-
frigeret, nec calefaciat, ipsum neq; ficcum, neq; humidum, neq; frigi-

Cc ij

PAULI AEGINETAE

dum neq; calidum nominare conuenit. Quod autem ficius est, aut humidius, aut calidius, aut frigidius, a præpollente appellatur facultate. Præstat autem in vnoquoq; excessu, quatuor quantum ad vsum spectat, ordines statuisse: calidum quidem nominantes in primo ordine quod utiq; nos calefacit, sed non euidenter, vt illius rationali quadam demonstratione indigeat. Simili ratione, frigidum, & siccum, & humidum quodcunq; demonstrationem requirat, nondum actionem validam neq; euidentem sortitum. At quæ manifesto iā siccare vel humectare vel calefacere vel refrigerare possunt, ad secundū huiusmodi ordinē refertur. Quæ vehementer iam sed nō summe id faciūt, tertio annumerantur. Quæ vero sic calefaciunt vt crustas inducant, quarti sunt ordinis. Similiter quæ refrigerant, vt iā sensu priuent, hæc quoq; ad quartum relegantur. Porro ficius medicamentum nullū est inuenire, quarti ordinis, si non vrat. Nam si quod summe exiceat, id plane vrit: huius notæ sunt, chalcitis, misy & calx. Tertij vero ordinis siccantium, potest aliquod esse etiam non vrens, quemadmodū quæ vehementer astringunt omnia, e quorum numero est omphacium, rhus, & alun. en.

De particularium simplicium medicamentorum facultatibus.

Cap. iii.

Abrotanum.

ABrotanum & calefacit & siccit in tertio abscessu, discutiendi incidendiq; facultate præditum, modice vero astringit, totiū corpori cum oleo infricatum, rigores circuitu remeantes persanat, stomacho minus amicum est. crematum maiores in siccando vires acquirit, quam quod ignem non est expertum. capillorum defluuia quas alopecias vocant cum tenui quodam oleo inunctum explet.

Agallochum.

AGALLOCHVM lignum est Indicum Thuiæ ligno simile, odoratum. Mansum animæ suauitatem commendat. Item in suffitam adhibetur. Radix eius pota drachmæ pondere, flacidum ex superflua humiditate stomachum resolutumq; confirmat. Ad hæc incinorosis, dysentericis, pleuriticisq; opitulatur.

Agaricum.

AGARICVM radix est, in arboris trunco prognata, corpore fungoso, quæ ex aëria terrestriq; substantia coaluerit: vis eius est discutere & crassos humores incidere. v. scerum maxime obstruentionibus purgando medetur.

Ageraton.

AGERATON vim habet discutiendi, & leniter etiam in

inflammationem quodammodo arcet.

Agnus, qui vites dicitur.

VITEX qui græce agnus vel lygos appellatur, in tertio ordine tum calefacit tum siccatur, substantia tenuis est, eoque flatus abolet, castitati conseruandæ facere creditur, non modo commanducatus potusque, verum etiam in cubitum substratus. Semen ipsius etiam iocinoris & lienis infractus liberat epotum. Frixi autem minus est flatulentum, & facile in membra distribuitur.

Agrostis, gramen.

GRAMEN Parnasi admodum vtile est. Siccatur & modice refrigerat: tenuiumque partium & subacerbum existit, eoque cruenta vulnera glutnat: Decoctum eius calculos confringit.

Anchusæ quatuor.

QUATVOR sunt anchusæ, non eiusdem omnes facultatis. Nam onoclææ appellatæ radix astringendi vim habet & quiddam subamarum, ad lienis renumque dolores efficacem, cataplasmatibus autem modo cum polentis applicata erysipelatis succurrit: folia minus radice refrigerant desiccantque, hinc ad alui profluuium bibuntur. Quæ dicitur lycopsis, astringens quodammodo efficacius, similiter erysipelatis conuenit. Onochelos vero seu Alcibiadios nuncupata medicatio quodammodo, viperarum moribus succurrit forma cataplasmatibus adhibita, alligata, & comesta. Quarta omnibus aliis breuior sine nomine propemodum, maiore quam Alcibiadios, amaritudine donata, latis alui lumbricis instar acetabuli pota benefacit.

Adarce.

ADARCE veluti spuma quædam est aquæ salis in cremis & arundinibus concreta. tantum vero acrimoniam habet & caloris, ut extrinsecus cum aliis imposita fere vrat, intro eam assumere nulli licet.

Adiantum.

ADIANTVM siccatur, extenuatur, & modice discutit, calore ac frigiditate medium quodammodo est: Alopecii igitur medetur, tumores discutit, calculos potu confringit, e pulmone reiectiones desiccatur, alui profluuium sistit.

Aizoon, semperuium.

SEMPERVIVVM duplex, refrigerat quidem ex tertio abscessu, desiccatur autem astringitque mediocriter. Hac ratione igitur valet erysipelatis, & ad herpetas inflammationesque ex fluxione coniectas conuenit.

Aethonicon.

De Aethonycho in capite de lapidibus pertractabitur.

Ce. iiii

PAVLI AEGINETAE

Athera.

ATHER. A pulicula est sorbilis e zea molita, aut e frumento confecta infantibus accomodatur. Item cataplasmatibus vice illinitur, Aegilops.

AEGILOPS discutiendi facultate praedita est, unde etiam indurescentibus inflammationibus & aegilopi quae oculorum fistula est, opitulatur.

Aegiros, populus nigra.

POPVLVS nigra in primo ordine calefacit, modice ficit, & tenuis est substantiae, cuius folia cum aceto cataplasmatibus instar applicata, podagricos dolores sopiunt. Quae vero ex ea distillat resina, floribus calidior miscetur acopis: & malagmatis, fructus cum aceto potus couitiales auxiliatur.

Aedæon, hoc est, pudendum masculi cerui.

PVDENDVM cerui masculi ficitum tritumque ex vino potum, viperarum moribus subuenit: miscetur autem compositis remediis.

Aethale, fuligo.

AETHALE & lygnys in litera L, exponetur.

Aethiopsis.

AETHIOPIS similia verbasco habet folia, radicis decoctum potu datur ischiadicis, pleuriticis & sanguinem reiicientibus, & arteriae asperitates cum melle lenit.

Aima sanguis.

SANGVIS frigidus nullus est, verum suillus, humidus est, & minus calet, humano maxime temperamento similis. Columbarum vero, palumbi & turturis, temperatus quodammodo, oculorum humor ex ictu, hyposphagmata dicunt, medicatur, si calidus instilletur. Item crassiori cerebri membranae infusus, in his quorum calua perforata est, inflammationem arcet. Noctuae sanguis cum vino aut aqua potus, spirandi difficultatem adiuuat. Vespertilionum, virginum mammillas tuetur, & pilorum incrementa illitum prohibere dicunt. Similiter, sanguis ranarum, chamaeleontis, & ricinorum qui in canibus haerentes inveniuntur, sanguis facit. Galenus autem haec facto rei experimento falsa esse pronunciat. Caprarum vero siccitatis nomine aquas cutem subeuntes cum melle potus iuuat, renumque calculos conterit. Gallinarum cohortalium sanguinis e cerebri membrana profluua coarctet. Agninus comitialibus prodest. Hoedinus nuper coagulatus circa heminae dimidium cum pari aceto contra cruentas pectoris excreationes bibitur. Vrsorum, sylvestrium caprarum, hyrcorum, & taurorum, abscessus maturare fertur. Terrestris crocodili oculorum claritatem efficit. Equarum quae sunt ex parte admissura, remediis exedentibus. σπρτικὰ Graeci vo-

LIBER VII.

205

cant, admiscetur. Antidotū ex sanguinibus quod in lethalia medica-
menta efficax est, anatis, hœdi, & anseris, sanguinem recipit.

Aera, lolium.

LOLIUM calore & siccitate ad tertium fere ordinem pertin-
git, iridi facultate simile.

Acacalis.

ACACALIS fruticis, in Aegypto nascentis fructus est, cu-
jus dilutum collyriis claritati oculorum efficacibus miscetur.

Acacia.

ACACIA tertij quidē desiccantiū ordinis est: primi vero refri-
gerantiū, at si elota fuerit, secundi. Est autem acerba & terrestris.

Acalyphe, vrtica.

VRTICAE & fructus & folia tenuē habent substantiam, ci-
traq; rosionem siccant, tumores discutiunt, abstergunt, ventrem subdu-
cunt, mediocriter flatulenta, quare etiam ad venerem incitant.

Acanthus.

ACANTHVM alij a nigro colore foliorum melamphillon
appellant, alij pæderoten. uis eius est discutere & ficcare.

Acanthium.

ACANTHIVM tenui calidaq; natra p d it um conuul-
sis auxiliatur.

Acantha leuce, spina alba.

SPINA alba radicem siccantem & modice astringentem ob-
tinet, eoq; & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiumq; do-
loribus succurit, semen tenue calidumq; est, qua vi conuulsioni quo-
que medetur.

Acantha, idest, spina Aegyptia, vel Arabica.

SPINA Aegyptia, secundum alios Arabica, astringit, siccatoq;
impense, vnde & sanguinem, & alias defluxiones retinet.

Acinos.

ACINOS ocymo similis, mediocres astringendi vires habet,
ideoq; aluum, & menseis pota sistit: applicata vero panos & sacros
ignes perfanat.

Aconitum.

ACONITVM, quod quidem pardalianches dicitur, exeden-
tem lethalemq; vim habet, quam ob causam intro non assumitur: ex-
trinsecus tamen in carnibus quas exedi oporteat, vti licet, quod vero
a lupis lycoctinon dicitur, similes priori vires fortitum, priuatim lu-
pos, vt illud pantheras enecat.

Acoron.

ACORON intertio abscessu calefacit & deficcat, radice ip-

PAVLI AEGINETAE

flus ad ciendam vrinam, lienisq; scirrhum vtimur: cæterum membrana oculorum, ob cornus similitudinem cæratoïdis dictæ, crassitiam extenuat.

Acrides, locustæ.

LOCUSTAE vrinæ angustis præsertimq; mulierum, odoris suffitu profunt. At quæ alis caret, contra scorpionis morsus cum vino salutariter bibitur.

Acte, hoc est, sambucus, & chamæacte, id est, ebulus.

SAMBVCVS, & ebulus qui chamæacte dicitur, quasi humilis sambucus, vterq; deficcandi facultatem obtinet: modice discutit & conglutinat: potus aut & manducatus, aquam per aluum educit.

Als, sal.

SAL quilibet vim habet vehementer ficcam & astringentem: vnde quicquid in corporibus humidum est, id omne depascit, reliquû astrictione leuiter contrahit: qua ratione ad cõdimenta omnia adhibetur, putredinemq; arcet: crematus vero sal magis discutit.

Althæa.

ALTHAE A seu ebiscus species est malux sylvestris, vis eius discutit, laxat, inflammationem abigit, lenit, & phymata concoquit. radix autem & semen reliqua sane intensa habet, verû exterit etiam vitilignes abstergitq; præcipue autem semen calculos quoq; confringit.

Alimon.

ALIMON dissimilarium partium est, salsum gustu & leuiter astringens, maxima ipsius pars calore temperata cum humiditate insuperabili est, lactis itaq; & seminis vbertatem conciliat.

Alcæa.

ALCAEA sylvestris malux & hæc genus est, in vino pota intestinorû torminibus & erosionibus medetur, multo magis ipsius radix.

Alcyonium.

ALCYONII genera omnia quidem abstergunt discutuntq;, acri qualitate prædita, sed milesium C est autem vermiculum purpureumq; cæteris præstat: quare combustum, pilorum defluuia, quæ alopecix dicuntur, impetigines, vitilignesq; abstergit. Porro, quod in superficie læuorem habet & vehementer acre est, non modo abstergit, verum etiam excoriat. Postremo, quod lanis succidis respondet, omnium est imbecillimum.

Alme, quæ muria dicitur.

MURIA nulli alteri mixta substantiæ, similes habet sali vires, sed imbecilliores aqua contemperata: at saliorum piscium oliuarumq; colymbadum muria valentius abstergit, contra intestinorû tormina & coxendicæ dolores clystere iniicitur.

Aloë.

A LOE calefacit in primo, siccat in tertio ordine, stomacho etiam amica est, abstergit dissipatq, aluum subducit, lota vero minus detergit, sed stomacho gravior est, inflammationem prohibet, & ulceribus cicatricē inducit, præsertim sedem & naturalia infestantibus.

Alos Anthos, id est, salis flos.

FLOS salis liquidum est medicamentum sale concremato tenuius, acre, & abunde discutiens.

Alos achne, id est, salis spuma.

SALIS spuma lanugo salis spumosa est, tenuior quidem illo magisq, discutiens, sed minus contrahit.

Alfine, auricula muris.

ALSINE, quam alij muris auriculam vocant, vim habet helxinæ similem quæ refrigerat humectatq, quapropter ad feruentes inflammationes conuenit.

Alypon.

ALYPI semen bilem atram per inferiora purgat pari epithymo mensura sumptum cum sale & aceto, veruntamen intestinalia leuiter exulcerat.

Alysson.

ALYSSON quod a cane rabido morfos iuuat, sic appellatū est: cæterum siccatoria, discussoria, absterforiaq, vi præditum, renum meatus aperit, ephelidem, quæ aspera discolorq, cutis est, exterit.

Alopex, vulpes.

VVL PES viua aut mortua, tota in oleo decocta, discutiendi vim oleo conciliat, adeo ut humores alte fixos in cutem extrahat, hinc articuli in folio eo repleto diutius immorati, incipientem quidem affectū finierunt, inueteratum vero moderati, onem reddidere.

Amaracus.

AMARACVS tertio in ordine calefacit secundo desiccatur.

Amarantus.

AMARANTVS extenuat, incidit, menseis cum vino potus educit, sanguinis grumos dissoluit cum mulso, omneisq, fluxiones desiccatur, stomacho inimicus.

Ambrosia.

AMBROSIA cataplasmatibus modo imposita vim habet astringendi repellendiq.

Ami.

AMI ad tertium calefacientium siccantiumq, ordinem refertur, tenue, discutiens, & urinæ mouendæ efficax, semen ipsius longe vtilissimum est.

PAVLI AEGINETAE

Amiantum.

AMIA NTVM in Cypro nascitur alumini scisso simile, quod in ignem coniectum accenditur quidem inflammaturq̃, sed nō comburitur. vtuntur eo nonnulli in desiccantibus psilothris.

Ammos, arena.

ARE NA littorū maris affatim desiccatur, seruefacta sole aquas subter cutem exhaurit, corporibus hydropicorum in ea coopertis: torrefacta autem ad sicca fomenta in salis, & milij vicem adhibetur. Ammoniacum thymia ma, quod latinis ammoniacum sulfimen, & ammoniaci gutta dicitur.

AMMONIACVM thymia ma liquor est tanta molliendi virtute præditus, vt scirrhus & tophos discutiat.

Amurca.

AMV RCA secundi calefacientium siccantiumq̃ ordinis est, eiusq̃ intensi. hac etenim ratione vlcera in ficcis quidem corporibus curat: in alijs autem intendit, irritatq̃.

Ampeloprasum, agreste porrum.

AMPELOPRASVM, seu porrum sylvestre acerrimum est calidissimumq̃ in summo ordine, quamobrem etiam exulcerat, inciditq̃, viscerum meatus recludit, stomacho inimicum.

Ampelos agria, vitis sylvestris.

VITIS sylvestris racemi & germina ipsa abstergendi facultate pollent, item nonnihil astringens obtinent.

Ampelos hemeros, vitis sativa.

VITIS sativæ facultas respondet sylvestri, sed imbecillior est.

Ampelos leuce, vitis alba, quæ & bryonia dicitur.

VITIS albæ, quam & bryoniam & psilothron appellant, germina sane ceu stomacho grata eduntur, vrinæq̃ ciendæ sunt. radix abstergit, tenuis natura & mediocriter calida, vnde fit vt lienes etiam potu consumat, extrinsecus autem cum ficis applicata scabiei & lepræ medetur.

Ampelos melæna, vitis nigra.

VITIS nigra, quæ & ipsa bryonia nuncupatur, superiori con similis est, nisi quod inefficacior.

Amygdala.

AMYGDALA quæ quidem amara sunt extenuant, viscosos crassosq̃ humores altius hærentes euellunt, tum cutis vitia abstergunt: arbor eandem vim repræsentat. dulcia vero amygdala moderato calore donata sunt.

Amylon.

AMYLON ex puro tritico aqua sub caniculæ æstu macerato conficitur, quæ (aquam dico) quinquies in die mutatur: quum autem tenerrimum euaserit, colo traiecta aqua quam superfunderis,

furfures secernere ficcateq; ad solem oportet, ptinus antequam ac-
cat. Cæterum vis eius est refrigerare mediocriter, & ficcare, & acria
lenire.

Amomum.

A M O M V M acoro virtute respondet, sed hoc quidem sic-
cat magis: illud autem expeditius concoquit.

Anagall. s.

ANAGALLIS vtraque vim habet abunde abstergentem
subcalidam quoque nonnullam & attractricem, vt etiam aculeos
euellat, item succus ipsius naribus instillatus caput purgat.

Anagyris.

ANAGYRVS frutex est grauis odoris, acrisq; calefacit &
discutit, semen tenuius, & vomitui ciendo est.

Andrachme, portulaca.

PORTULACA tertio quidem abscessu refrigerat, secundo
autem humectat. qua de re etiam causone laborantes ventriculo im-
posita, iuuat, & fluxiones repellit: lentore suo dentium stuporem ex
acidis contractum corrigit: ob astrictionem vero, & intestinorum
tormina & sanguis profluuium coërcet.

Androsæmon.

ANDROSÆMI duplex genus est, alterum ascyrrhon
vel ascyrrhoides nominatur specie hyperici, alterum dionysias. se-
men ipsorum purgat, folia autem magis desiccant.

Androsarces.

ANDROSARCES amara acrisq; herba est. vis eius est
discutere & desiccare: potum ipsa, tum semen ipsius vrinam pro-
mouet.

Anemonæ.

ANEMONÆ omnes vim habent acrem absterforiamq;
item extrahendi, & oris vasorum recludendis, idoneam qua pituitam
illiciunt, lepras tollunt appositu, & lac in mammas suggerunt.

Anethum.

ANETHVM calefacit in secundo ordine intenso, siccatur pau-
lo remissius: quod in oleo excoctum discutit, dolorem sopit, somnum
conciliat, & crudos tumores maturat: vltimum terij calefacientium
siccantiumq; ordinis efficit, ex humiditate nimia flaccidis vlcibus
applicatum confert: viride autem humidius minusq; calidum est,
& concoquit.

Anthyllis.

ANTHYLLIS duplex quidem est, sed vtraq; vlcera per-
ficcat: quæ chamæpitij respondet, tenuior est, quare etiam comitia-
libus competit, cæterum efficacius eadem abstergit.

Anisum.

ANISI semen acrius est, in tertio abscessu calefaciens, siccansq;
hinc vtique & vrinam mouet, & flatus discutit.

PAULI AEGINETAE

Antirrhinon, vel anarrhinon.

ANTIRRHINON siue anarrhinon persimilem inguinariae vim obtinet sed minus efficacem, atque ex illo hoc quoque cognosces.

Anonis, vel ononis.

ANONIS siue ononis calida facultate est, praesertimque eius radix, cuius succus cum vino potus urinam ducit, calculos conterit, crustas rumpit & dentes mitigat.

Aparine.

APARINE, quam alij philantropon, alij omphacocarpon appellant, modice abstergit & deficcatur, item tenue quippiam in se continet.

Apios, pirus.

APIOS temperatura inaequalis est, terrestre aliud sortita, aliud aquosum ob quod manducata stomachum iuuat, sitimque arcet. admodum vero forma cataplasmatum, siccatur refrigeratque mediocriter.

Apocynon, aut cynocrambe, canina brassica.

APOCYNON aut cynocrambe, dicitur autem & cynomorion quod celerrime canes enecat, eademque vi maleficium & lethalis homini est, foedi admodum odoris, & calida citra siccitatem, unde etiam discutiendi facultatem applicata repraesentat.

Apochyma.

APOCHYMA pix est vetus quae a nauigijs deraditur, tumores diffundit, siccatur & discutitur.

Arachne, araneus.

ARANEVS cum emplastro subactas, impositusque fronti, & temporibus tertianarum febrium circuitus finit, ut Dioscorides memoriae mandauit: tela ipsius applicata sanguinis fluores sistit, & vlcera in summa cute ab inflammationibus tuetur.

Argemonæ.

ARGEMONAE facultas est abstergere simul et discutere.

Arisarum.

ARISARVM multo breuius est aro, acriusque, radicem oliuae magnitudine obtinet.

Aristolochia, malum terræ.

ARISTOLOCHIA omnis calida, tenuis, abstergens, amara, & subactis, ad medicinas utilissima. At Rotunda, tenuior, & in omnibus efficacior est. Clematitis hoc est sarmentacea, odorata quidem sed imbecillior. Longa vero praeter alia, media harum est, sed non minus calida, quam rotunda.

Arceuthos, Iuniperus.

IUNIPERVS calefacit, & siccatur in tertio ordine, fructus autem calefacit quidem similiter, sed in primo gradu siccatur.

Arction.

ARCTION, prosopites folia habet cucurbitæ similia, maiora autem & duriora, discutit, quidem siccatur, & astringit, quapropter & folia ipsius vetusta ulcera perfunant.

Arction.

ARCTION verbasco simile est, radicem habet teneram, candidam, & dulcem: vis eius est tenuis, siccans, & mediocriter astringens.

Armeniacum.

ARMENIACVM, vim habet absterforiam simul cum modica acrimonia & minore astrictione, hinc etiam ocularijs medicinis miscetur, & augendis palpebrarum pilis vsum habet.

Arnabo.

ARNABO, odoramentis a numeratur, ob quod vnguentis potissimum expetitur, calida siccaturque potentia preditum in tertio ordine, cassiæ & carpesio simile: unde Posidonius ubi cinamomi copia non datur, hoc vtendum esse censet.

Arnoglossum, plantago.

PLANTAGO refrigerat pariter & desiccatur in abscessu secundo, temperata ex aquea & terrestri substantia, cui etiam astrictio non nihil adfit: quare ad maligna ulcera, fluxiones, putredinesque temperamenti moderatione accommodata est, sanguinis quoque profusio cohibet, & plurimis congruit: etenim siccitatis quæ nequaquam rodit compos est, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

Aron.

ARON calore & siccitate primi est ordinis, ex terrestri calida & absterforia substantia & hoc generatum: radices ipsius calidiores sunt, dracunculus autem efficacior.

Arsenicum, auripigmentum.

ARSENICI vis est caustica, vtuntur eo & in pilis abolendis: quod si diutius adhæserit, etiam cutim ipsam attingit: vsum vero tenuius redditur.

Artemisiæ.

ARTEMISIA vtraque secundo in ordine calefacit, siccatur in primo, tenui substantia prædita, eoque renum calculos comminuit, & vteri fomentis accommodatur.

Artos, panis.

PANIS illitus magis discutit quam triticum, ceu & salis & fermenti particeps. Nam ad extrahendum ea quæ alte hærent, fermentum idoneum est.

Asarum.

ASARVM similem acoro virtutem habet, sed magis intestina.

Asbole, fuligo pictorum.

FVLIGO qua pictores vtuntur, ex vitriarijs officinis u-

PAULI AEGINETAE

mitur, vim habet discutientem, adeoque acrem, ut & urat, & exedat, cæterum fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Ascalabotes, stellio transmarinus.

ASCALABOTES animal ad reliqua sane inutile est, sed scorpionum ictibus impositum opitulari ipsum tradunt: expetitur etiam naturalia intendentibus medicinis.

Asclepias.

ASCLEPIAS calida, sicca, & tenuis substantiæ, torsionibus cum vino pota competit, venenatorum autem moribus & maleficis mammarum muliebriumque locorum vitis applicatur.

Ascyrrhon.

ASCYRRHON in androsæmo expositum est.

Aspalathus.

ASPALATHVS dissimili constat virtute, acri & astringente, & ob utramque siccatur, idcirco & putredini, & fluxionibus utilis est.

Asparagus.

ASPARAGVS petreus, aut myacanthinus abstergit utique, sed calore, & frigidityate medius est, renes & iecur obstructa reccludit, præsertimque radices & semen. item dentium doloribus medetur.

Asplenon.

ASPLENON tenue quidem est virtute, non tamen calidum, hac utique ratione, & calculos confringit, & lienes consumit.

Astaphis, vna passa.

ASTAPHIS domestica sane concoquit simul & astringit, & leuiter discutit: sylvestris autem acris adeo est, ut pituitam per os educat, & vehementer abstergat.

Aster atticus, siue inguinalis herba.

ASTER atticus, quam alij herbam inguinalem vocant, ob hoc ipsum quod non tantum emplastri modo imposita, verum ad alligata etiam bubonibus prodesse creditur, mixtæ est virtutis, discutientis, & refrigeratoriæ.

Astragalus.

ASTRAGALVS frutex est exiguus, cuius radices astringunt, ipse non ignauiter desiccatur: vlcera itaque vetusta ad cicatricem perducit, & aluum fluentem radix in vino pota sistit: plurimus in Phæneo Arcadiæ nascitur.

Asphaltus, bitumen.

BITVMEN siccatur, calefacitque in ordine secundo, quare vlcera cruenta glutinat.

Asphodelus, hastula regia.

ASPHODELI radix vim habet detergentem discutientemque: concremata autem ipsius cinis calidior, siccior, & tenuior euadit, quo fit ut alopecij medeatur.

Atractylis.

Atractylis.

ATTRACTYLIS seu cnicum sylvestre ex spinosorum genere habetur, vi siccante, & mediocriter calida.

Atriplex.

ATRIPLEX humectat sane in secundo, refrigerat in primo ordine, qua de causa etiam ventrem celeriter permeat: semen ipsius vi pollet absterforia, unde iectericis ex iocinoris obstructione accommodatum est.

Aphace.

APHACE lenticulae modo astringit, sed manducata aegrius concoquitur, valentius siccatur, mediocriter calefaciens.

Aphronitrum.

APHRONITRUM vis est discutere & abstergere, ut non solum sordida exerat, sed etiam pruritus, quippe saniem dissipat, medeatur, potum vero stomacho nocet.

Aphros, spuma nitri.

SPVMA nitri proximam nitro facultatem obtinet, sed tenuior substantia, ob quod & laevis, farinae modo, existit.

Achras, pirum agreste.

PIRVM agreste eandem piro domestico virtutem habet, sed magis intensam, quapropter magnis vulneribus glutinandis est.

Absinthium.

ABSINTHIUM calidum primo abscessu est, siccum tertio, astringenti, amara, & acri simul donatum qualitate: qua biliosos in ventriculo humores per aluum & urinas inanit: quibus autem pituita redundat, hos propter astrictionem nihil iuuat: succus ipsius, herba multo calidior est.

ENVMERATIO EORVM

quae a B. incipiunt.

Balanus myrepfica, glans vnguentaria.

Q O D intra vnguentariam glandem veluti carnosum est, abstergendi incidendiq; cum astrictione vim habet: eamq; ob causam drachmae vnius pondere cum mulsa pota, facile vomitiones eiect, & inferiorem ventrem subducit: cum posca vero ad viscerum obstructiones conuenit: item cutis vitia cum aceto perunctum abstergit. Cortex vero ipsius valde astringit.

Baccharis.

BACCHARIS odorata est herba similis cinamomo, coronaria & acris. huius radicis decoctum meatus obstructos aperit, urina

D d

PAVLI AEGINETAE

& menſeis citat: folia ipſius quum ſint astringentia, fluxionibus optulantur.

Balaustium.

BALAVSTIVM, ſylueſtris punice flos eſt, valide astringens, & ſicca & frigida facultate præditum: itaque ſummæ cutis vlcera ad cicatricem perducit, & fluxiones cohibet.

Balsamum.

BALSAMI, quod veluti lignum eſt, ſiccatur & calefacit in ſecundo ordine, ſubtilemque habet ſubſtantiam. liquor autem multo tenuior eſt: fructus proxime hunc virtute accedit, ſed minus tenuis eſt.

Ballote, marrubium nigrum.

BALLOTE quod alij marrubium nigrum dicunt, acris eſt & abſterſoriæ facultatis, impoſitum cum ſale rabidi canis morſibus medetur.

Batus, rubus.

BATI frutiſoſum, abunde astringit & ſiccatur. qua de cauſa & vulnera committit, & deſluxiones ſiſtit. radix autem præter astringentiam, non parum etiam ſubtilis eſt, unde renum calculos confringere eſt idonea. fructus ſi maturus eſt, magis calefacit, ſimulque mediciter astringit, ac ideo cibo idoneus eſt, immaturus autem & acerbus eſt & valide ſiccatur, præſertim retorridus. eadem etiam flos efficit.

Bathrachion, ranunculus herba.

RANVNCVLI quatuor ſunt genera, omnia excellenter calida, ſicca, acria, vrentia, adeo ut vlcus cum dolore excitent: quibus ſi modice vtiſis, cutis vitia tantum exterunt. radix autem arida ſternutamentis ciendis eſt medicamentum.

Bathrachi, ranæ.

RANAE aduerſus virulentorum morſus in iuſculo eduntur. Crematarum ranarum cinis maxime ſiccans reſtituit, ſanguinis eruptiones ſiſtit, & alopecij cum pice liquida medetur.

Bdellium.

BDELLIVM tum Scythicum tum Arabicum ſcirrhos emollit, præſertimque recentes, Arabicum vero vrinx ciendæ eſt, calculos comminuit, & cruda concoquit.

Betonica.

BETONICA herba eſt ramulis exilibus pulegio ſimilibus ſed tenuioribus, & pæmodum ſi guſtes, nullam qualitatem referentibus. Nascitur potiſſimu locis petroſis, qua & in renum medicinis vtiuntur. Eſt autem apud Romanos alia quedam betonica dicta, quam Dioſcorides nominat ceſtron, alij vero psychotrophon, eo quod frigidis locis gaudeat nihil ſimile cum prædicta habet, præter actionem: ac ultra quod urinam ciet, etiam alijs multis benefacit. potiſſimumque radix ipſius, cum hydromelite pota vomitionem mouet. folia autem aluum ſubducunt.

Bechium, tussilago.

TVSSILAGO, quæ Græcis bechion siue bechicon inde dicitur, quod tusses & recta ceruice spirantes, suffitu iuuat, constat ex cal. da aquosaq; substantia.

Blitum.

BLITVM esculentum olus est, humidum frigidumq; in abscessu secundo.

Bulbus.

BVLBVS esculentus amari simul & astringentis modice compos est, siccatur glutuatq; vulnera, & abstergit. Qui autem vomitum cit, calidiorum quam alter repræsentat.

Botrys.

BOTRYS, quam alij ambrosiam, alij artemisiam dicunt, plāta est insigniter odorata. hæc cum vino pota, subrecta ceruice spirantibus quos orthopnoicos appellant, succurrit.

Bubonium, inguinalis herba.

BVBONIVM in attico astere dictum est.

Buglossum, lingua bubula.

BVGLOSSVM humidum calidumq; temperamento est, eamq; ob causam vino iniectum lætitiā animi conciliare dicitur.

Bunium.

BVNIVM quod alij arction appellant, calidum est, vrinæ & mensibus educendis accommodatum, huic rīdet & pseudobunium.

Buprestis.

BVPRESTIS animalculum est cantharidi simile, reponitur, itaque sicut & illa.

Butyrum.

BVTYRVM cōcoquit & modice discutit, in teneris corporibus. bubones igitur & parotides iuuat, gingiuas extenuat, & præsertim in infantibus dentientibus, item humores in pectore fixos, linctum concoquit.

Buphthalmon.

BVPHTHALMON similem habet chamæmelo florem, sed multo maiorem acrioremq; ideo & discutientem, adeo ut cerato mixtum duritias remolliat.

Brathy, herba Sabina.

SABINA, cupresso similis calefacit siccaturq; in tertio ordine tenuissimamq; est, extenuat & discutit pota, tum in putredines cupresso similiter efficax est.

Britannica.

BRITANNICA astringit & conglutinat, syluestri lapathio specie similis, succus ipsius putredines os infestantes per sanat.

Bromus, auena.

AVENA similem hordeo obtinet facultatem, siccatur autem

D d ij

PAULI AEGINETAE

& modice citra corrosionem discutit: iam & nonnullius astrictio-
nis compos est, vnde & alui profluuijs subuenit.

Bryon thalassion, muscus marinus.

MVSCVS marinus, refrigerat simul & astringit, eoq; fer-
uentes inflammationes cataplasmate admotus, iuuat.

Bryon, muscus.

BRYON, quod alij splanchnon dicunt, in quercubus & po-
pulis albis, piceisq; inuenitur, discutiendi simul & molliendi vim mo-
deratam obtinet, potissimum quod cedris adhæret.

Bryonia.

BRYONIA dicta est vitis alba.

Initium literæ G.

Gala, lac.

LAC omne tribus constat substantijs, caseosa, serosa, & pingui,
quam copiosissimam bubulum obtinet, vnde etiam butyrum effici-
tur. Serum ipsius vim habet abstergendi, vnde & aluum subducit, si
ipsum per decoctionem secernas. id vero quod caseum refert & cras-
sum est, magis obstruit, atque ideo acrimoniam obtundit: coctum
vero lac aut marinis calculis ignitis in ipsum iniectis, aut alio quo-
dam modo, præsens fit remedium dysentericæ, & acrium in ventrem
defluxionum. Cæterum lac totum ad acres oculorum fluores, aliasq;
acrimonias conducit. At temperatissimum lac, muliebri est, mox ca-
prillum, hinc asininum, ouillumq; postremo vaccinum.

Gale, mustela.

MVSTELAE concrematae cinis abunde discutit, ex ace-
to igitur illitus podagricos, & articulares dolores iuuat. inare-
facta autem inueteraq; mustela comitialibus auxiliatur.

Galion.

GALION a coagulando lacte dictum est, aparinx simile,
siccandi vim, mediocremq; acrimoniam habet: flos eius ad sangui-
nis eruptiones & ambusta, congruit.

Galopsis, vel galiopsis.

GALOPSIS, quam alij galibdolon appellat, vrticæ similis
herba est, leuior autem, & seedi odoris, scirrhusos tumores dissipat
& emollit, item ad vlcera serpentia facit in cataplasmate imposita.

Garum.

GARVM calefacit exiccatoq; efficaciter, ac ideo aduersus vl-
cera putrida extrinsecus eo viuntur, præterea contra intestinorum
tormina & coxendicis dolores ex partibus inferioribus iniiciunt.

Gentiana.

GENTIANA radix efficax admodum est extenuare, per-
purgare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

Geranium.

GERANIVM id quod folijs respondet anemonæ, radi-
cem habet esculentam, quæ cum vino drachmæ modo pota vteri in-
flationes dissolvit, altera gerani species ad medicinam inutilis est.

Ge, terra.

OMNIS terra desiccatur, quæ vero alterius substantiæ expers
est, etiam sine morfu id facit. at si ignea quædam ipsi qualitas ad-
mixta sit, lotionem hanc quoque deponit. Inter cultas igitur terras quæ-
libet pinguis omnium particularum quæ siccari postulant curationi
accommodata est, Aegyptio igitur luto utuntur contra aquas cutem
subeuntes, & lienosos affectus, item ad fungosos laxosque tumores evi-
denter proficit. Ex ferris medicatis lemnium minium, quæ sphragis
dicitur, siccatur pariter & astringit mediocriter, contra lethalia medi-
camenta præsentis antidoti vires habet, vlcibus malignis cum ace-
to aut vino medetur, sanguinis profusionem quamlibet sistit, & depa-
scentem dysenteriam intestino mulla prius, deinde muria per clyste-
rem eloto, coercet. Minium rubricum vehementius, quam lemnium
obstruentibus quæ emplastica dicuntur, miscetur medicinis, & pota
lumbricos interimit. Sed multo lenior est Samia quàm Lemnia terra,
ceu glutinans & viscosa, quare utendū ea est in his quæ leniri oportet.
& sanguinis reiectiones, quacunque ex parte fiant, compescit.
Selenusia & Chia maiore abstergendi virtute pollent, ideoque mulie-
ribus ad nitorem cutis & læuorem in facie utilis est, vlcibus carnē
& cicatricem inducit, præsertim ambustis. Cimolia mixtæ faculta-
tis est, refrigerantis discutientisque, idque illota. lota vero magis re-
frigerat, & ambustis ex posca medetur. Ampelitis, est autem ea
quæ vitibus inungitur, quod innascentes ipsis vermes enecat, siccatur
& discutit egregie citra erosionem. Cretica, æria est, & sine rosione
abstergit. Erethrias evidenter astringit, concretamenta vero & elota sine
rosione desiccatur, præstantior vero est cinerea. Pnigitis similes cimo-
liæ vires repræsentat, sed colore nigrescit. Armenia, quam etiam bo-
lum nominant, summe desiccatur, unde dysentericis, alui fluxionibus,
spuito cruento, tabi, spiritus difficultati ex humiditate, vlcibus hu-
midis, & pestilentialibus vitis strenue opitulatur. Cæterum cum
vino tenui diluto bibitur: si febris adsit, cum aqua. Alana autem
gleba Armeniæ vim obtinet. Ochra vim habet discutiendi ex-
edendique, reprimat igitur supercrescentia vlcera, & caua cum cerato
mixta replet.

Dd 14

PAULI AEGINETAE

Geras, senecta, anguis.

SENECTA anguis affatim siccat; aceto igitur subseruefacta, dentium doloribus medetur. Aspidis exuuium cum melle tritum de litumq; oculorum aciem maxime iuuat.

Ges entera, terræ intestina, seu vermes terreni.

LUMBRICI terræ detriti neruorum vulneribus impositi, repente euestigio mirabile adfuerunt præsidium.

Gigarta, nuclei acinorum vuæ.

NUCLEI acinorum vuæ, deficcant ordine secundo, refrigerant primo. quum itaq; abunde sint acerbi, omnibus alui vitij fluidis, conueniunt.

Gingidium.

GINGIDIUM calorem non adeo manifestum sortitum est, cæterum siccat in abscessu tertio, & astringit: qua de causa & stomacho utile est.

Glaucium.

GLAUCIUM astringit, sed ita ut etiam nonnihil gustanti sit ingratum, manifeste refrigerat, eaq; vi erysipelatis non tamen validis succurrit.

Glaux.

GLAUX herba calida & humida temperamento est, vnde ad lac generandum efficax est.

Glecon, pulegium.

PVLEGIUM calefacit, & extenuat vehementer, vnde si cataplasmate applicetur ruborem excitat, & crassos viscososq; humores e thorace & pulmone emolitur.

Glecos, sordes balneorum.

SORDES balneorum calefaciunt modice, emolliunt, discutunt, rhagadibus ani & condylomatis accommodatæ.

Glycyrriza, dulcis radícula.

GLYCYRRIZA tepidi humidiq; temperamenti est, alicuius etiam astrictionis particeps: vnde & asperitates læuigat, non arteriæ tantum, sed etiam vesicæ scabiei medetur: eadem sitim arcet.

Glycyfide, pæonia.

GLYCYSIDE quam alij pentameron, nonnulli pæoniam vocant, radicem habet acrem & leuiter subamaram & ficcantem, cui etiam astrictionis nonnihil inest: quapropter mensis ciet, renes & iecur purgat, instar amygdalæ pota cum vino: at si hoc austerum fuerit, alui quoq; fluores coercet: adalligata vero puero, morbum comitalem abigit.

Gnaphalium, centunculus.

CENTUNCULVS dictus est gnaphalium quod folijs ipsius teneris loco tomenti, gnaphalon dicitur, vtamur. sunt autem calida & modice astringentia, atque hinc ad dysenterias cum vino austero bibuntur.

Gongylis, rapum.

R A P I & radix & semen flatulenta & semini creando sunt, veneremq; excitant.

Gordylion.

G O R D Y L I O N alij seseli appellant, calidum est, vrinx & mensibus educendis habile: radix ipsius cum melle lincta, quæ in thorace hærent, educit.

Geris, pollen farinaceus.

P O L L E N virtute respondet amylo, sed calidior est.

Gypsum.

G Y P S V M vim habet siccantem opplentemq; . propter quam ad sanguinis eruptionem conuenit temperatum cum polline, candido oui liquore: vsum vim opplendi non similiter retinet, verum magis siccatur & repellit, præsertim cum posca.

Quæ a D incipiunt.

Dades, tedæ.

T E D A E acre quiddam habet, item vim cõcoquendi, & abstergerendi nonnullam, unde aceto incoctæ dētium doloribus si hoc aceto colluantur, succurrunt: at si mel adiectum fuerit, pituitam per os educunt: mixtæ etiam eclegmatis faciles e thorace excreatus reddunt.

Damascena.

D A M A S C E N A, quum ad pruna ventum erit, exponam.

Damasonium.

D A M A S O N I V M absterforiam quandam vim obtinet, qua calculos conterit, & quæ per aluum diffluunt, ad vrinas deriuat.

Daucus.

D A V C V S, quod & staphylinus dicit, duplex est, cuius radix flatulenta est, & venerem mouet. Syluestris dauci semen minime flatu creat, sed vrinam & menses citat, quemadmodum & herba ipsa.

Daphne, laurus arbor.

L A V R I arboris folia siccant & calefaciunt insigniter, magis quoque fructus: radicis cortex amarus & leuiter astringens calculos comminuit, & iecinorosis opitulatur cum vino odorato triobolari pondere potus.

Daphne herba, laurus alexandrina.

D A P H N E herba, quæ & Alexandrina dicitur, calida, acris, & subamara est, idcirco menses & vrinas commouet: laureola vero, quæ daphnoïdes græce nuncupatur, eiusdem facultatis est: tum chamædaphne, quasi dicas humilem laurum, quæ & ipsa commanducatur.

PAULI AEGINETAE

Derma, pellis.

PELLIS ouina recens detracta, calens adhuc iis qui flagris caesi sunt circumposita, mirifice auxiliatur. At hippopotami pellis combusta & cum aqua laevis imposita phymata discutit. At viperæ pellis detrita impositaq; alopecij mirabiliter pilos reficit.

Dermata, hoc est, pelles seu coria veterum calceamentorum.

CORIA veterum calceamentorum crematorum cinerem red dunt siccatorium : vnde ex calceis pedum attritibus nondum inflammatis, ambustis, intertriginibus, & tuberculis medentur.

Dictamnion.

DICTAMNUM tenuius est virtute pulegio, cætera simile. quod autem vocatur pseudodictamnion, imbecillius est.

Dionysias.

DIONYSIAS dicta est in androsæmo

Diphryges.

DIPHRYGES mixtæ est facultatis : habet enim quippiam astringens & mediocriter acre, ideoq; malignis vlceribus præsens est remedium.

Dipsacos, quod labrum veneris dicitur.

DIPSACI spinæ radix in secundo ordine desiccatur, nonnullam vero abstergendi vim simul obtinet.

Dorycnion.

DORYCNION simile temperamento est papaveri & mandragoræ, immodice refrigerans : siquidem modicum, stuporem inducit : copiosius assumptum, interimit.

Dracuntium, dracunculus.

DRACUNCULVS simile quiddam aro habet, sed eo aerius, amarius, calidius, tenuiusq; est. Item astrictionis non nihil habet coniunctum. Radix ipsius pota viscera purgat, & peruicacium seu malignorum vlcum excellentissimum est remedium : folia respondent : semen valentius est.

Dryopteris, filicula.

FILICULA dulcis, acris, & leuiter amara est : radix acerba est, cæterum vim habet exedentem, qua & pilos abolet.

Drys, quercus.

QUERCVS & folia & fructus siccante & tepida vi pol- lent : quamobrem vulnera recentia glutinant, inflammationibus incipientibus medentur : at quod sub glandis corio membranofum, fructus carnem ambit, cum valentius astringat, ad fluxum muliebrem, aliosq; fluidos morbos exhibetur.

Quæ ab E incipiunt.

Ebenus.

E BENI ligni vis est excafactoria, deterforia & subtilis: unde etiam caliginem oculorum abstergere creditur, aliisque oculariis miscetur medicinis.

Encephalos, cerebrum.

CEREBRVM leporis coctum detritum, comestumque infantium dentitionibus utile esse fertur, nonnulli vero tremoribus succurrere manducatum literis prodiderunt. At galli cerebrum cum vino potum ad venenatos morsus efficax esse Dioscorides pronuntiat, & sanguinis e cerebri membranis eruptionem cohibere. Cameli cerebrum Galeno autore siccu cum aceto potum, comitiales persanat. Idem facit mustelæ cerebrum. Hirundinum cum melle in oculorum suffusionibus efficax est. Cerebrum ouillum similiter præparatum, infantium dentitionibus exacte opitulatur.

Elæa, olea.

OLEAE ramusculi quantum astringunt, tantum etiam refrigerant: fructus qui exacte ematurus, moderate calidus est, immaturus maiorem tum astringendi tum refrigerandi vim repræsentat.

Elea, hoc est olea, Aethiopica.

OLEAE æthiopicæ lachryma ammoniaci tenui similis, vires habet extensorias: quare ad cicatrices, albugines, hebetudinesque oculorum ea utuntur, & ad dentium dolores, si cauis ipsorum inficiatur efficax est, nonnulli vero syluaticam esse hanc oleam asserunt.

Elæon, oleum.

OLEVM ex oliuis drupis dulce calidumque mediocriter est magis humectans: at quod ex immaturis oliuis exprimitur, Græci omotribes appellant, tantæ astringentis particeps est, tantæ etiam frigiditatis. Eliotum, vero oleum morfu ac rosione caret. vetus quanto diutius reservatum, tanto magis calefacit, discutitque, præsertim si iam inde ab initio tenue extiterit: iudicatur autem id, si purum sit, pellucidum, si paucum magnam corporis partem inungat, & ex facili cutem penetret combibaturque. huiusmodi nimirum est Sabinum: quod autem ex agresti olea funditur, abstergit simul & astringit, squalidissimumque id est, pro oleorum ratione. ricinum vero æquales veteri vires obtinet: reliqua vero nempe sesaminum aut raphaninum & quæ eius sunt generis pro substantiis ex quibus constant, vires quoque diuersas præseferunt.

Elæomeli.

Oleum in Syria ex trunco quodam arboris emanat crassius melle & dulcius, quod instar ducrum cyathorum potum cum aquæ hemina, crudos humores biliososque ex aluo educit: qui vero id bibunt, torpescunt, quod extimescendum non est, sed excitari ipsi debent.

PAULI AEGINETAE

Elaterium.

ELATERIVM succus syluestris cucumeris fructus apel-
latur, in secundo ordine calefaciens: quod menseis prouocat, foetus
appositu propter summam amaritudinem necat, euacuationem etiā
ex naribus cum lacte instillatum molitur: ab inferioribus partibus
inditum, pituitam, nonnunquam etiam sanguinē extrahit.

Elate, abies.

ABIES arbor calefacit ficcāq; vt nigra populus similiter: de
resina ipsius in resinarum sermone agemus. Elatine.

ELATINE herba est parietariæ similis, mediocris frigidityte
& astrictione donata. Elaphoboscus.

ELAPHOBOSCVS virtutis est calefactoriæ & siccae
in secundo abscessu, substantia tenuis. Elelisphacus, salua.

SALVIA euidenter calefacit & leuiter astringit.

Helenium, inula campana.

HELENIVM calidum est & siccum cum excrementitia
humiditate: quare & eclegmatis temperatum infractis thoraci hu-
mores educit, ac ex eo in particulis ruborem excitant.

Eleoselinon, palustre apium.

ELEOSELINON in aquosis natum locis idem potest
quod hortense apium, licet maius ipso existat. Ebur.

EBORIS ex vngue ramenta si obducantur, reduuis profunt:
item osium dentiumq; ipsius quum sint siccae facultatis & abster-
sionis, huiusmodi miscentur medicamentis.

Helcysma, argenti recrementum.

HELCYSMA, argenti est excrementū, viribus plumbagini
respondens: quippe astringit, simul atque extrahit: quo fit vt empla-
stris quas phæas appellant & iis quæ cicatricē ducunt admisceatur.

Helleborus, veratrum.

VERATRVM vtrunq; calefacit & desiccāt in tertio ab-
cessu, item acre est & absterforium, vnde etiam ad leprosa cutis vi-
tia conuenit: nigrum vero si fistulis inseratur tribus diebus, callum
extertit. Helechryson

HELECHRYSON alii chrysanthon, alij amaranthum ap-
pellant, coronarius est frutex, coma aurum referente, quæ cum vino
pota vrinæ angustis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis
accommodata est, ex mulso pota menseis educit, sanguinemq; concre-
tum dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

Helxine, parietaria.

HELXINE M, alii perdicium, alij parthenium, quidam si-
deritum, quidam heraciam nuncupant, vis eius est abstergere,

LIBER VII.

214

ac leuiter astringere, cum humiditate subfrigida.

Helxine.

HELXINE quæ & cisampelus dicit, vim habet discutiendi.

Elymus, quæ & meline dicitur, panicum.

PANICVM simile est milio, siccâs refrigerâsq; extrinsecus inductum, cæterum & alui fluores deficcât.

Empetron.

EMPETRON, quod ab alijs prasoïdes nominat, pituitam & bilem purgat. est etiâ falsum, quare abstersionibus accommodat.

Epithymum.

EPITHYMV in tertio abscessu siccat & calefacit, thymo efficacius.

Epimedium.

EPIMEDII virtus est mediocriter frigida cum humiditate aquosa: quod si obducatur, mammas erectas conseruat: dicitur etiam sterilitatem potu facere.

Epimelis.

EPIMELIS, quæ etiam ab Italicis rusticis vocatur vnedom, malus est syluestris, cuius fructus acerbus & stomacho inimicus est, capitiq; dolorem mouet.

Epipactis.

EPIPACTIS, quæ & elleborine appellatur, aduersus venena & iocinoris affectus bibitur.

Erebinthus, cicer.

CICER quod quidem consuetum legumen est, flatus creat, valentis materiæ, aluum facilem reddit, vrinam mouet, lacti seminiq; generando accommodatum, idem mensis elicit. at crios appellatum, hoc est, arietinum, alijs magis vrinæ ciendæ est. decoctum ipsius præsertim nigri calculos quoq; in renibus cõterit: quod autem orobæum ab eruo vocat, calidius his est et subamarum. Syluestria quouis modo domesticis sunt validiora.

Eria, lanæ.

LANAE quidem sordidæ fomentis vtilis sunt, nam pinguitudo ipsarum, quam cœsypon Græci appellant, butyri modo, concoquit: at quæ sordibus carent, materiæ rationem duntaxat obtinent: cõcrematæ vero vim habent acrem, calidam, siccam simul & tenuem, vt etiam flaccidas ex vligine vlcera carnes protinus absument.

Erice.

ERICE vi pollet discutiente citra rofionem: sed flore ipsius potissimum, & folijs vtendum est.

Erinon.

ERINON aquatica herba est, cuius seminis drachmæ duæ cum mellis drachmis quatuor illiti, oculorum fluxiones sistunt, succus aurium doloribus benefacit.

Hermodactylus.

HERMODACTYLI radix & per se & ipsius decoctum vim habet purgandi, priuatim etiam arthriticis tunc quum

PAULI AEGINETAE

humores defluunt exhibetur, verū stomacho nimis quā aduersatur.
Herpyllum, serpillum.

SERPILLVM calefacit, vt & vrinam, & menstrua com-
moueat. Erythrodanon, rubia.

ERYTHRODANON rubra tinctorum radix est acer-
ba amaraq; lienem, iecur & renes ita purgat, vt cruenta quoq; per
vrinam & menses euocet: ac cutis vitia quæ abste- sionē postulant,
exerit. Erysimon.

ERYSIMI semen igneum calefactoriumq; est, vti nasturtiū,
quare in fermento tostum, thoracem purgat in eclegmatis assumptū.
duritiaq; emollit, & cæcos caneros inductum adiuuat.

Euzomon, eruca.

AERVCA, & ipsa priori similis temperamēto, flatulenta est,
ob quod ad venerem instigat, semen ipsius vrinam quoque mouet.
Cæterum syluestris domestica valentior est. Eupatorium.

EVPATORIUM tenuem vim & incidentem sine con-
spicuo calore habet, quæ iecur obstructum expurgat, est & nonnul-
lius astrictionis particeps. Euphorbium.

EVPHORBIUM adurentem vim sortitū est subtilemq;
aliis liquoribus similiter. Ephemeron.

EPHEMERON, non venenum illud sed quod iris syluati-
ca nominatur, mistæ potestatis est, & repellentis, & discutientis.

Echidna, id est, vipera.

VIPERAE carnes calidæ & siccæ temperatura euidenter
existunt, quæ corpus totum per cutem expurgant. hinc multi quos
elephantia male habebat, esu potū ve ipsarum confanuerunt: quæ in
maritimis, aliisq; locis aridis degunt, magis ad sitim faciendam sunt
efficaces. Echinus herba.

ECHINUS herba quidem, acerba est, quæ repellat, & siccet,
Echinus, erinacius.

ERINACEI autem terrestres, caro inueterata siccataq; vali-
de discutit exiccatq;: pota igitur elephanticeis, malo habitu præditis,
& aliis plurimis auxiliatur: pellis ipsius concremata vehementius
siccat & discutit, alopecias cum pice liquida peruncta sanat. Marini
erinacet quod esui idoneum est, vrinam citat, & aluum reddit faci-
lem: testa cremata, terrestri respondet. Echion:

ECHION, alii doriada, nonnulli alcibiadion vocant, spinosa
herba est, quæ non modo a serpente cōmorsis cū vino pota auxilia
tur, sed præsumētes quoq; percuti nō patitur. Hepsēma, sapa.

HEPSEMA mustum decoctum, quod alii firæon appel-
lant calefacit modice & concoquit, est autem medica mentum, &

emplasticum, & rosionis expers.

Quæ a Z incipiunt.

Zea.

ZE A tritico viribus respondet, medium inter calorem, & siccitatem obtinens, leuiter exiccat, necnon vim opplendi quam vocant emplasticen, obtinet.

Zingiber.

ZINGIBERIS radix impense quidem calefacit, sed non primo statim occurso, quod inuictæ cuiusdam & crassioris humiditatis particeps sit, propter quam etiam facile perforatur, firmam autem conseruat caliditatem.

Zythus.

ZYTHVS compositæ est substantiæ, etenim acris est, ceu ex putredine procreatus, & frigidus, ex qualitate accida, eoq; prauis sibi habetur.

Zyme, fermentum.

FERMENTVM & ipsum contrariis constat qualitatibus, quippe acoris cuiusdam frigidi, ac putredine nati caloris, tum eius qui ex salis & farinæ natura contrahitur, compos est: quare non mediocriter calefacit atque discutit.

Zomos, Piscium ius.

RECENTIVM piscium ius esculentum aluum per se, & cum vino potum deiecit, priuatim vero in hunc usum conficitur ex phycidibus, scorpionibus, iulidibus, percis, & saxatilibus aliis teneris simpliciter cum aqua, oleo, anetho, & sale. Item eorum quæ testacea cute integuntur, tellinarum, hiatarum, conchularum, & veteris galli cum sale diutissime excocti iusculum, ventrem subducit, e contrario gallinæ ius comprimit.

Quæ ab H Græco incipiunt, quod Latini in E longum vertunt.

Hedysmus, Menta.

MENTA in tertio ordine calida, tenuis, acris cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in venerem incitat: sed amari, quoq; nonnihil obtinet, quo lumbricos enecat. Quæ vero acerba est recentes sanguinis reiectiones coërcet.

Hedysarum.

HEDYSARVM aut pelecinos amarum est, leuiterq; astringit, unde potum stomacho gratum redditur, cæterum viscera obstruenda repurgat.

Heliotropium.

HELIOTROPIVM maius, quod & scorpiurum vocant, calidam, siccam, & abstergentem vim præ se fert cuius decoctum potu educit pituitâ, bilemq; applicatum vero semen ipsius myrmecias & huius notæ vitia persiccet. Minus autem heliotropium, & hæc abolet & latas tineas interimit, si cum semine suo adiecto,

PAULI AEGINETAE

nitro, hyssopo, & nasturtio bibatur. Electrum, Succinum.

ELECTRVM populi albæ lacrymam dicunt, quæ iuxta amnem Eridanum destillat, & in spissitudinem coit, aureo colore: quod si læuigatū bibatur, stomachi & alui fluxiones, & sanguinem compescit.

Hemerocalles.

HEMEROCALLIS radix viribus lilio respondet, perinde ac illud ambustis opitulatur.

Hemionitis.

HEMIONITIS astringens simul & amara est, idcirco lienosis cum aceto pota succurrit.

Hepar, Iecur.

IECUR rabidi canis tostum comestumq; iis qui ab eo commorsi sunt subuenire fertur. Caprilli iecoris inassati sanies lusciosos iuuare instillata: vaporemq; eius decocti oculis recipi iubent: idem quoque iecur esse: manducatum vero comitiales coarguere. Idem præstare & hircinum ferunt. Ad hæc lacertæ iecur dentibus corrosis impositū, dolorem sopit. Item lupinum, medicamini hepatico quod constat eupatorio iniicitur. Asinum tostum comitiales, si ieiuni id manducant, adiuuat. Apri iecur recens inaresactum tritumq; cū vino, ad serpentium morsus bibitur. At mergi iecur siccum epotum, calculos eiicit.

Erigerum, senecio herba.

SENECIO mixtas habet vires, refrigerat & modice discutit.

Eryngium.

ERYNGIVM calefacit quidem non manifesto, siccitatis autem haud obscuræ, nec modicæ particeps.

Quæ a TH incipiunt.

Thalassion hydor, marina aqua.

AQVA marina acris, calfactoria mediocriter, deficcās, & pota stomacho quidem contraria est, ventrem autem turbat, pituitamq; educit: si calida superfundatur, extrahit, & discutit.

Thaliethrum.

THALIETRV M siccandi vim sine rosione habet, hinc vlcera inueterata cicatrice obducit.

Thapsia.

THAPSIA acris est, & valenter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit insigniter, attractumq; eadem discutit.

Theion, sulphur.

SVLPHVR trahendi & ipsum vim obtinet, calidum & substantia tenue, vt aduersus pleraque virulenta animalia resistat, præsertim turturem marinum, draconemq; vel siccum inspersum, vel saluæ quoq; mistū, vel vrinæ pueri, vel oleo, vel melli: item scabiosa corporis vitia mirifice per sanat.

Thermos, lupinum.

LVPINVM, esculentum quidem opplendi viribus pollet: amarum vero, abstergit, dissipat, & sine rosione, deficcatur, tineas occidit inductum, & potum, item viscera purgat cum ruta & pipere potum. nam cutis vitia extergit, tumores dissipat, cum oxymelite applicatum: sylvestre autem amarius est & omni ex parte satiuo valentius.

Thelypteris.

THELYPTERON, quam nonnulli nymphæam, vel ptelin appellant, filici similis facultate, quæ cum vino pota latas & teretes ventris tineas interimit, foetum in utero corrumpit. folia ipsius manducata aluum emolliunt.

Thlaspi.

THLASPI semen est viribus acre, ut intestinos abscessus potu rumpat, mensis prouocet: ab inferioribus partibus iniectum coxarum dolores finit, cruenta vacuans, ac alioquin supra infraque biliosa instar acetabuli potum, expurgat.

Thridax, lactuca.

LACTUCA olus est non summe frigidum humidumque, sed pro fontaneæ aquæ temperamento quapropter calidis inflammationibus conuenit, præterea sitim potu restinguit, & genituræ fluxum venerisque insomnia cohibet. Sylvestris lactuca hac minus & refrigerat & humectat, verum succulentior existit.

Thymus.

THYMVS in tertio ordine calefacit & deficcatur, glutinosos crassosque humores incidit.

Thymbra, satureia.

SATVREIA agrestis quidem eadem quæ thymus præstat, hortensis autem in omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum laudatior.

Thymelæa.

THYMELAEA, unde granum cnidium fit, simileis ei vires obtinet.

Quæ ab I incipiunt.

Idæa radix.

IDAEA radix gustu acerba & viribus, sanguinis eruptionibus & rheumaticis affectibus, tum pota, tum extrinsecus imposita accommodatur.

Hidros, sudor.

SVBOR per se contrahere efficax est, miscetur autem in palæstris exercitantium sordibus, quibus astringendi vis duntaxat inest, ac redditur totum discussorium. Mammis igitur inflammatione tentatis efficax est remedium, & feruori ipsarum restinguendo: benefacit etiam bubonibus: at si fuerint ficiore,

PAULI AEGINETAE

cum cyprino, aut rosaceo emolliiri debent. Ixos, viscum.

VISCVM calefacit cum acrimonia, humores ex alto valide elicit, & taphsæ modo discutit, hac tamen multo est ignavius.

Ion, viola.

VIOLAE folia aquea frigidaq; substantia præpollenti constant. Ios, ærugo.

AER VGO acrem gustu qualitatem præ se fert, item discutit, consumit, inciditq; non teneram modo, sed duram quoque carnem: at si momentum ipsius cerato copiosiori misceas, medicamentum fiet quod citra rosionem abstergat. Hippocampus.

HIPPOCAMPVS marinum animal est cuius concremati cinis cum liquida pice alopecias explet.

Hippolapathum, grandis rumex.

HIPPOLAPATHVM in palustribus locis nascitur, lapatho consimile. Hippomarathron, grande fœniculum.

HIPPOMARATHRON VM cachryi proximum, magis quam fœniculum desiccatur, unde & aluum fluentem sistit, & calculos confringit, menseisq; mouet: semen ipsius coriandro simile, respondet quidem ei viribus, sed imbecillius est. Hippopotamus.

HIPPOPOTAMI, quod est equi fluminalis, testiculus aridus potus ad serpentium morsus efficax est.

Hipposelinon, grande apium.

HIPPOSELINON cum apio domestico virtute conuenit, nisi esset imbecillius. Hippuris, cauda equina.

HIPPURIS astringentem cum amaritudine qualitatem possidet, eoque valenter simul & sine rosione desiccatur, ac vulnera maxima committit, intestinorum ramicibus opitulatur, & vitis fluidis cum vino pota medetur. Hippophaës, lappago

HIPPOPHAËS, quod alii hypophyes vocant, quo vestes expoliunt furculosus frutex est, e cuius radice thapsiæ modo liquor colligitur, qui cum erui farina instar drachmæ datus, bilem ac pituitam purgat: item totus ipse frutex siccatus ad purgationes accommodatur. Iris.

IRIS affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substantia, tussis utilis, humores in pectore contumaces faciles ad excretionem facit, torsionibus ventris medetur, sordida vlcera purgat, cum mulsa pota aluum inanit. Ifatis, glastum.

ISATIS domestica qua tinctorum vsuntur, siccandi vireis & astringendi habet. his etiam magna vulnera in duris glutinat corporibus, sanguinem erumpentem compescit, laxos cedentesq; tumores discutit ac omnibus malignis vlceribus resistit. Syluestris autem quæ magis

LIBER VII.

217

magis rodat, magisq; ideo siccet, valentius aduersus humidas putredines pugnat, ad cætera deterior, vt quæ mo deat: cæterum ob virium vehementiam lienosis quoq; vtiliter adhibetur.

Isopyron, aut phasiolum.

ISOPYRVM phasiolum ve semen amarū ac modice acerbum occupat, ob quod crassos glutinososq; humores & abstergit & incidit, sic vt corpora contrahat stringatq; hinc etiam quæ alte desident expurgat, excreationibus sanguinis non aduersatur.

Itea, salix.

SALICIS & folia & flos facultate constant quæ citra rosionem siccet, habent etiam nonnullam astrictionem: cortex autem paulo siccior est cuius perusti cinis ex iis habetur quæ vehementer exiccent, quippe clauos & myrmectas, cum aceto exterit.

Ichthyocolla, gluten piscium.

ICHTHYOCOLLAE vis est opplere & siccare, recte miscetur emplastris capitis & glutinantibus, & iis quæ ad lepras tollendas & erugationem faciei conficiuntur.

Quæ a C incipiunt.

Cancanus.

CANCANI radix modice siccet, & sine rosione ad opplen- dum infarciendum que accommodata, quare ex vino lincta mansaq; tragacanthæ & dulcis radiculae modo, arteriæ scabriciem iuuat.

Cancamum.

CANCAMVM lachryma est arboris in Arabia, myrrhæ si- milis, odore grato, qua etiā ad suffitum vtuntur. vis eius est obesos extenuare, abstergere, & aperire obstructa.

Cadmia.

CADMI A vtraq; siccet, sed quæ botryitis quasi acinosa ap- pellatur, tenuioris est substantiæ: placitis autem dicta crassioris. Cæ- terum concremata cadmia sine morfu desiccet, abstergit, cauavlcera- tum in oculis tum in toto corpore explent, & præsertim humidiora in naturis mollioribus, in durioribus efficacium magis vsus est.

Cacalia.

CACALIA viribus & vsu cum cancano conuenit.

Calamagrostis, gramen arundinaceum.

CALAMAGROSTIS siccet, hinc succus decoctumq; radicum ipsius oculariis miscetur medicinis: semen vrinam cit, & sto- macho benefacit.

Calamintha, nepita.

NEPITA tertio ordine calida & sicca temperamento, est te- nuis acrisq; menta longe valentior, siquidem est veluti sylvestris men- ta: facile igitur quæ alte hærent ad se trahit, eoq; sudores mouet, to-

E e

PAVLI AEGINETAE

tum corpus digerit, ac rigores febrium qui circuitu remeant, finit, extrinsecus cum oleo infricata strenue. quinetiam ad coxarum dolores ab inferioribus iniicitur, & vitiosos humores in cutem erumpentes abstergit.

Calamus.

CALAMVS odoratus in secundo ordine calefacit, & siccatur, inest ei quippiam & subtile & astringens: urinam itaq; citat & stomachicis, tum quæ vtero & iocinori faciunt medicinis temperatur. Calamus autem phragmites extergit, folia ipsius viridia mediocriter refrigerant, cortex crematus calefacit siccaturq; in tertio fere abscessu: radicem cum bulbis applicatam spicula & aculeos extrahere prædicant.

Campæ, erucæ olerum.

ERVCAE olerum cum oleo inunctæ, tutos a vitelunorum animalium moribus conseruare dicuntur.

Cantharides.

CANTHARIDES quæ in tritico reperiuntur luteis transuersim cingulis inuolutæ, aceti feruescentis vapore suffocatæ, ad plurima vtilis redduntur, quippe vngues scabros cum cerato eiiciunt, clauis scabiosisq; affectibus opitulantur, iam vero & exdentem vrentemque vim habent: nonnulli vero etiam medicamentis urinam prouocantibus momentum ex ipsis admistum exhibuerunt.

Cannabis.

CANNABIS semen flatus discutit, & siccatur, vt & genituram exarefaciat, succus ipsius viridis ad aurium dolores exobstructione creatos efficax est.

Canopon.

CANOPON sambuci flos est, de quo prius dictum est.

Capnion, secundum alios capnos, fumaria.

FVMARIA inde nomen sortita est, quod succus ipsius copiosas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatē: acris amaracq; est, vnde urinas biliosas liberaliter prouocat, iocinoris obstructioni langorigq; medetur, stomachum confirmat & aluum emollit.

Capparis.

CAPPARIS Radix extergit, probe purgat, incidit, discutitq; tum amaritudine, tum acrimonia at acerbitate contrahit, stringit & densat: quapropter lienes induratos & pota & extrinsecus posita, iuuat, menfis promouet, pituitam per os educit, maligna vlcera sanat, dentiū dolores sopit, tumores discutit, & vitilignes, quas alphos dicunt, aurium vermes enecat: folia autem & fructus similem quidem, sed in becillio rem vim possident.

Cardamum, nasturtium.

NASTVRTII semen sinapis modo vrit, vnde etiam induratum ruborem in cute excitat: cæterum crassos humores, cum alijs

potum incidit, herba vero arida viribus respondet, humida moderatior, ideoque crudam ipsam assument.

Cardamomum.

CARDAMOMVM acre quidem & ipsum est, verum nasturtio inualidius: compos est etiam nonnullius amaritudinis, qua tineas alui interimit, & scabiem cum aceto exterit.

Caris.

CARIS in pollinem detrita & cum radice bryoniae potatineas occidit.

Canceri.

CANCROVM concrematorum cinis, fluuiatilium sane siccatur, erinaceorum & cochlearum modo, at totius substantiae proprietate: canis rabidi mosibus potu mirabiliter efficax est: ut in aliis dictum est: marinorum cinis eximia donatus siccitate his quidem non conuenit, sed iis qui magis siccati desiderant, proficit. fluuiatilis cancer tritus si inducatur, spicula & aculeos eiicit.

Caros.

CARI semen & siccatur & calefacit in tertio fere grandu, flatus discutit, urinam mouet, idque non semen duntaxat, sed etiam tota planta.

Carpesium.

CARPESIVM odoratum est tenue, viscera obstructionibus liberat, urinas mouet, & renes calculo laborantes purgat.

Carya, nuces.

NVX arbor tum in coliculis tum in folijs aliquid habet astringens, plurimum autem in nucum coriis existit: succus itaque eorum decoctus cum melle, stomaticum fit medicamentum: interius inde putamen carinatum vsum extenuandi vim acquirit, & sine rosione siccat, quod in eo clauditur edendo aptum, natura oleosum, facile in bilem conuertitur confectumque ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines, quas sepedonas dicunt, discutiendi vim obtinet. Flacciscentes autem vetustate nuces, cutis vitia abstergunt. At auellanae, quas & ponticas vocant & leptocarya, frigidiores sunt & austerrae, in caeteris, iugladibus aequales.

Caryophyllon.

CARYOPHYLLON, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam quae nomine preteditur, sed ex India veluti flores cuiusdam arboris festucae & nigri sunt, longitudine fere digitali, odorati, acres subamari, calidi & sicci in tertio propemodum ordine: qui multiplicis vsus sunt tum ad obsonia, tum ad alia multa medicamenta.

Cassamum.

CASSAMVM hoc nonnulli balsami fructum esse dicunt, de quo supra egimus.

Ec ii

PAULI AEGINETAE

Cassia.

CASSIA calefacit & siccatur in tertio fere abscessu, tenuis abunde, & acris & modice astringens: incidit igitur simul & discutit, roburque instrumentis adiicit, postremo & mensuris euocat.

Castorium.

CASTORIVM calefacit siccaturque cum extenuandi viribus eximius, quibus praeter alias actiones, etiam nervorum qui ex copia humorum male habent, affectibus, congruit, & refrigeratos facile recalcit, & extrinsecus applicatum & potui datum, idque ita, ut nullam aliam offendant particulam etiam si mediocriter febris affligat, quemadmodum in veternis & lethargis, sed & mensibus retentis proficit, & secundas expellit, ut in cerebri & pulmonis vitiis etiam suffusus castorei inspiratu haustus, preclare opitulatur.

Caucalis.

CAVCALIN alij daucum sylvestrem appellant, nam dauci modo calefacit, siccatur, vinam mouet, & balsamento ad repositionem conditur.

Cenchros, milium.

MILIVM refrigerat in primo abscessu, siccatur in secundo, habet etiam modicam extenuandi facultatem: extrinsecus igitur in facculis ad fouendum & cataplasmati modo adhibitum, desiccare consuevit.

Cedrus.

CEDRVS & quae fruticosa est iuniperi similis, & quae arbor calefaciunt, siccanturque in tertio ordine. confectum ex eis oleum quod cedream appellant, etiam quartum attingit, subtilis admodum substantiae. hinc teneras carnes expedit & citra dolorem exedit, duras autem praesertimque demortuas siccatur & a putredine asserit: pediculos, pulices, ascaridas, & aurium vermes interficit, aliaque plura facit.

Centaurium.

CENTAVRII maioris radix acris, calida, & terrae astringentis compos est. mensuris itaque promouet, foetus corrumpit, eiicitque, vulnera glutinat, sanguinem spuentibus, & reliquis pectoris vicis praesens est remedium. Minoris centaurei radix inefficax, est coliculi valide & citra morsum siccatur: unde non solum ad quae maius centaurium valet, sed etiam coxendice laborantibus, ipsius decoctum inferius injectum, biliosa vacuat, nonnunquam & cruenta, ac valde proficit.

Ceras, coruu.

CORNV caprillum hirci, numquam cocrematum denteis nitidos reddit, gingiuas nimia humiditate flaccidas compescit. Cerui autem cornu cum vino uaceratum tritumque deinde circumlitum mobileis sicut dentibus. Crematum, mox lotum, dysentericiis, coeliacis, sanguinem ex-

LIBER VII.

219

puentibus, & arquaticis, duorum cochlearium instar auxiliatur: miscetur etiā ocularijs medicinis. Taurinum cornū cum aqua potum, sanguinis eruptiones cohibet.

Cerasia.

CERASIA dulcia quidem citius per aluum descendunt, austerā stomacho vtiliora sunt, acida vero ob incidēdi vim quam habent pituitosis excrementisq; stomachis profunt. gummi vero cerasi arboris a teriam exasperatam læuigat, & calculo laborantibus cum vino potum succurrit.

Ceratonia arbor.

CERATONIAE fructus quæ ceratia dicuntur, siccandi & astringendi virtutis, nonnullius etiam dulcedinis particeps est.

Cephalæ capita.

MENARVM sale conditarum capita cremata, vim siccandi non admodum acrem acquirunt, hinc sedis rimas & guttur diu induratum Scyro sanant. Smaridis caput totum combustum ad alopecias cum adipe vrsino proficit. Idem præstat etiā muris caput crematum cum melle. Molui aridum sine plumis, modo qui tribus digitis cōprehendi queat, cū aqua potum ani dolores finit. Lacertæ vero caput aculeos educere tradūt, myrmecias, verrucas, & clauos exterere.

Cecis, Galla.

GALLA, omphacitis, quidem medicamentū est affatim astringens, eamq; ob causam siccāt, fluxiones repellit contrahitq; laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisq; omnibus affectibus accommodata est; ponitur autem in tertio siccantium ordine, secundo refrigerantium. Altera quæ flauo colore, inanis magnaq; est, nō tantam in siccando & astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes & procidentias excocta iuuat: gallæ vero combustæ & aceto restructæ, sanguini supprimendo sunt.

Cepæa.

CEPÆA portulacæ similis est, folia ipsius contra vesicæ scabies viriliter bibuntur. radix cum asparago, quem myacanthinum, hoc est, corrudam appellant, pota, vrinx stillicidia, quæ ex obstructione fiunt, abigit.

Cera.

CERA quum temperata sit, reliquorum medicamentorum materia efficitur: ipsa vero per se ex iis est, quæ læuiter abstergunt, nam & discutientem & calidam vim exiguam obtinet.

Ceryces, buccina.

BVCCINORVM testa concremata excellenter desiccāt citra rosionem, vnde vlcibus maleficis accommodatur: at in iis quæ putredinem experiuntur, cum aceto, aut vino, aut oxy-

Ec 15

PAULI AEGINETAE

melite ipsis vtendum est. oleum in quo veluti caro ipsorum adhuc viuentium excocta sit, aurium dolores si instilletur, discutit.

Cici, ricinum.

RICINI fructus quemadmodum purgat, abstergit, discutit, sic etiam folium, sed imbecillius: de oleo tractatum est.

Cinnabaris.

CINNABARIS acris mediocriter vires habet, item non nihil etiam astringentis.

Cinnamomum.

CINNAMOMI vis est summe tenuis, non itē aequē calida, sed tertij ordinis, nihil autem ex iis quae parem ipsi calorem referunt adeo siccant, propter substantiae tenuitatem. Cinnamomis autem veluti inualidum quoddam cinnamomum est, quod nonnulli pseudo-cinnamomum vocant.

Circæa.

CIRCAEAE radix calida est & odorata, quae cū vino pota foeminarum locos purgat semen in sorbitione sumptum lac generat.

Cisseris, pumex.

PVMEX absterforius est praesertim dentium, nō modo viribus, sed etiam scabritie, conicitur autem in medicamenta quae carni vlceribus inducendae sunt, item in ea quae cutis labes exterunt. Crematus tenuior quidem, sed mordax reddit: lotus, id quod mordet, deponit.

Cisthos.

CISTHOS aut Cissaros frutex est astringens & modice frigidus virtute, folia ipsius & germina adeo siccant, vt etiam vulnera conglutinent: at flores quum in secundo fere gradu sicciores sint, dysenterijs, alijsq; fluidis vitijs accommodati sunt: extrinsecus illiti, putrida vlcera compescunt.

Cissos, hederæ.

HEDERA contrarijs constat viribus, vt quae astringat & refrigeret. Item acris est & calida, aquae substantiae & tepidae quum viridis est, particeps: cuius folia vino incocta vulneribus glutinandis, ambustis, & lienosis salutariter adhibentur: succus ipsorum naribus ad pituitam educendam infunditur. item diuturnis aurium defluxionibus succurrit: lachryma hederæ, vt quae acrior sit, pediculos enecat, & pilos abolet.

Citrium, quod & malum medicum dicitur.

CITRII medium acidum aut qualitatis expers est, in quo semen tertij refrigerantium siccantiumq; ordinis habetur: cortex siccant in secundo quidem abscessu, sed non item refrigerat, acri virtute praeditus. caro ipsius crassi succi est, pituitae generandae apta, & frigida: semen discutit, & in secundo ordine desiccant: folia arboris siccandi discutiendiq; vim representant.

LIBER VII.

220

Cichorium, intybus sylvestris.

CICHORIUM picris ve tanquam syluatica seris est, refrigerans siccansq; in primo abscessu: habet etiam vim astringendi, qua ad hepaticas dysenterias conuenit.

Clematis.

CLEMATIS quibusdam dapnoïdes, alijs myrsinoïdes, nōnullis polygonoïdes, sarmenta habet oblonga, crassitudine iunci quem holoschoenum dicunt, foliū vero lauri, siccandi virtute pollet, qua alui fluores, quam diarrhoeam dicūt, dysenteriam, & dentium dolores finit: contra venenatorum morsus recte imponitur.

Clematis altera.

CLEMATIS altera arboribus smilacis modo circumuoluitur, acri & caustica facultate donata, huius semen cū aqua potum, pituitam & bilem per inferiora educit, folia autem ad lepras arcendas inducuntur.

Clinopodion.

CLINOPODIUM vis est calida siccaq; nondum vero adurens, sed tertij fere ordinis.

Cnicus.

CNICI semine ad purgandam aluum duntaxat utimur, si quis extrinsecus eo utatur, tertij siccantium ordinis erit.

Conchyliā,

CONCHYLIA buccinis facultate proxima sunt.

Coelia, venter.

VENTER mergi, aut recens coctus, aut inarefactus, esu stomacho utilis esse dicitur. similiter etiā gallinarum interior alui membrana sicca potui data: verum Galenus experimento falsum utrūq; se inuenisse scribit. Palumbi vero avis ventrem paulatim potum calculos per urinam elicere, testis est Dioscorides. Musielæ alius pota contra quælibet venenata amuletum dicitur.

Coccus cnidios, granum gnidium.

GRANVM gnidium semen est thymelææ, non chamelææ, ut quidam opinati sunt, acri & adurente facultate præditum, hoc epotum, per inferna aquas detrahit.

Coccus baphicos, granum tinctorium.

CRANVM tinctoriū leniter siccat, vnde magnis & nervorū vulneribus, cū aceto aut oxymelite læuigatum commode imponit.

Coccymelæa, prunus.

PRUNI fructus vētrem subducit, recēs magis, aridus minus; decocto ipsius, gutturis inflammationes vtiliter colluuntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidendi vim extenuandiq; testatur, ob quod nonnulli frangēdis vesicæ calculis esse cum vino potum affir-

E c iij

PAULI AEGINETAE

mant: ex aceto, puerorum impetigines persanare. Syluestrium prunorum baccæ euidenter astringunt, ventremque reprimunt. Nominatur hæc planta in Asia prunum. Domestica vero pruna ficcata apparent, quæ nunc Damascena appellantur, quemadmodum Galenus memoriæ mandauit.

Colla, glutinum.

GLVTEN quod ex simila & polline conficitur, emplasticam vim & concoctricem repræsentat.

Colocyntha, cucurbita.

CVCVRBITA humidi, frigidiq; in secundo abscessu temperamenti est; vnde tota si applicetur, calidas refrigerat inflammationes.

Colocynthis, cucurbita syluestris.

CVCVRBITA syluestris validam purgandi vim obtinet: viridis ipsius succus infricatus, coxendicum doloribus auxiliatur.

Comaros, arbutus.

ARBVTVS, & arbor, et fructus acerbæ qualitatis est, vocatur cum memprocelon: cæterum stomacho aduersatur, & capitis dolorem facit.

Commi, gummi.

GUMMI ficcante vi & emplastica pollet, & inimirum asperitatibus medetur.

Conia, lixiuium.

LIXIUIUM veluti cineris lotium nominatur: omnium maxime abstersorium & ficans est, quod ex fici & tithymalli cinere præparatur, ac fere iam exedens: quod si calx etiam cineri addatur, lixiuium redditur adurens: quod iam etiam protostacton nuncupant, clysterium potissimum medicinis miscetur. vehementissimum vero omnium est, quod ex sola calce conficitur.

Conyza.

CONYZA utraq; ficat & calefacit in tertio ordine, hinc etiam oleum in quo decoquitur, rigores febrium circuitu remeantes discutit: flores idem præstant, quorum decoctum menseis citat, & foetus extrahit: quæ vero in humidis regionibus nascitur, odore grauior & inefficacior est.

Copros, stercus.

STERCVS quodlibet calefacit, maxime ficat & discutit: variat autem pro animantis quod ipsum reddit temperamento & vietus ratione. itaque canum quum ossa vorauerint fimus inarefactus, dysenterias cum scisso lacte, quod Græci schiston vocant, potus, sanat: idem vetusta vlcera reficit, si medicamenti in ea efficacibus misceatur. Hoc anginæ, tonsillarumque inflammationes cum melle inunguntur. At puerorum qui victu non superfluo educati sunt stercus, huic malo magis prodest. Luporum quod & ipsum candidius in fru

LIBER VII.

227

ticibus reperitur, coli doloribus strenue succurrit, non potum modo, sed corpori etiam adalligatum: alligetur autem ex lana ovis a lupo enectæ, aut pelle ceruina. † Caprillum stercus acrius, magisq; discutiens, scirrhusos tumores applicatum dissipat, præsertim in duris corporibus: crematum vero valentius abstergit, extenuatq;. Bubulum extrahendi quandam vim obtinet, ideoq; vesparum & apium ictibus medetur: quinetiam toti corpori in sole oblitum aquas inter cutem præclare iuuat. Ouium vero cum aceto myrmecias, acrochordonas, furunculos & clauos, persanat. Columbarum syluestrium, quas palumbes latini dicunt, alijs longe acrius cum nasturtij semine cutem exulcerat. Gallinarum ex oxymelite, aut aceto, aut mulso potum, vomitione strangulantes fungos educit, præsensq; est remediū: hoc quoq; colico dolore conflictantibus potui quidam exhibebāt. Nonnulli vero & ciconiarum fimum orthopnoicos potum auxiliari affirmant. Murium fimus reliquis abstergit efficacius, eoq; alopecias curat, & infantium sedi appositus, ad excretionem proritat. Sturnorum qui oryza pasti fuerint, abstergendi vim præ se fert, quæ cutis asperitates, quas ephelidas Græci vocant, extergit. Terrestrium crocodilorum fimus vitiligines, quas alphos dicunt, extergit: quemadmodum fluuiatilium, oculorum albugines extenuare creditur.

† In Cod. antiquis, hæc verba ita leguntur. κόπρη αἰγῶν, σπύραθοι δὲ ἰδίως ὀνομάζονται, δριμύτης καὶ διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως τοῖς σκληρυνμένοις ὄγκοις ἀρμόψουσα, οὐ σπληνὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων μερῶν. Εἰς γὰρ ἐπὶ γόνατος ἔχοντος ὄγκον χρόνιον, δύσλυτον, ἐρχισάμην αὐτῇ δι' ὀξύκράτου καταπλατῆσαι κελεύει αὐδύρον κρείβον ἐμβαλλομένης τῆς κόπρου. Quæ verba quoniam conuersa sunt in latinum sermonem ab interprete Aetij, ex quo huc traslata, tu apud eum auctorem lege.

Corallium.

CORALLIVM veluti arborea planta est in lapidis duritiem coalescens, crescit non in terra, sed in alto maris, colore rubrū lapidi simile, siccandi validam, astringendi mediocrem vim possidet, ideoq; cruentis sputis, & dysentericis vtile.

Coris animal, cimex.

CIME X acri virtute pollet. Scribunt igitur quidam cum aceto potum hirundines eiicere.

Coris herba.

CORIS herba, quam alijs vocant hypericon, acris est, & odorata, semen eius ad vrinam & menses ciendos bibitur: succurrit & phalagiorum moribus, item ad episthotonon cum oleo iungitur.

PAULI AEGINETAE

Corianum seu corium, coriandrum.

CORIANDRVM ex contrarijs viribus compositū est, tenuis substantiæ, terrenæ, amaræ, aquosæ aut humiditatis tepidæ particeps, habetq; modicam vim astringēdi, quapropter inflammationibus, erysipelatis non admodum feruentibus conuenit, tumores molliusculos cū quodā in id efficaci discutit. Semē modice quidem cum passo bibitum, tineas pellit: liberalius aut sumptum, mētem tentat.

Corydus, aut cordyallus, Galerita, siue alauda.

ALAVDA auis simplici iure elixa, coli cruciatibus opitulatur: assumi autem continue & sæpe cum ipso iure debet.

Coronopus, pes cornicis.

CORONOPODIS radix & ipsa ad colicos cruciatus proficere manducata creditur.

Costus.

COSTVS modicum quidem amaritudinis, plurimum vero acris & calidæ qualitatis habet: unde in quibus vel calefacere partem quampiam cogites, vel ex alto in summa humorem aliquem elicere, ad costum confugiendum est: vrinam igitur & menses ducit, tineas enecat. Quum vero & flatulenti cuiusdam particeps sit, venem cum mulso potus stimulat, coxendicum doloribus, resolutis, febrium rigoribus ante accessiones, cum oleo infricatus, conducit.

Cotyledon, acetabulum.

ACETABVLVM refrigerat, repellit, abstergit, et dissipat: folia ipsius cum radice māducata calculos comminuere, & vrinam ciere creduntur.

Cochlea.

COCHLEAE concrematae impense siccant, & mediocriter calefaciunt, conferunt dysenterijs, quas nondum putrelago obsedit, si misceantur harum partes quatuor, piperis albi pars vna, gallarum partes duæ. At quæ ignem non sunt expertæ, si cum tegumentis in pollinem coactæ vētri imponantur, aquam subter cutem exinaniūt, prosunt item articularijs doloribus applicatæ, quoad sua sponte deciderint: in vniuersum humorem alte insertum valide deficcant.

Crania, cornus.

CORNI arboris fructus acerbus, si edatur, valide ventrem astringit. folia autem & germina acerbitate vehemēter siccant, adeo vt etiam maxima durorum corporum vulnera conglutinent.

Crambe, bralsica.

BRASICA quæ edendo est siccat, & manducata, & a foris imposita, non tamen acrem conspicue vim ostendit, eoque vulnera glutinat, & dolosa malignaque vlcera, ac tumores solui contumaces persanat: habet etiam nonnihil abstersorium, quo lepras exterit. Semen ipsius potum tineas occidit, præsertim Aegyptiæ: caulium crema-

torum cinis adurente vi constat, cum adipe longis laterum doloribus utilis. Sylvestris autem brassica, sativa in omnibus validior est, unde nec intra corpus citra noxam sumitur. Marina, subsalsa leviterque amara, aluum soluit.

Cratægonos.

CRATÆGONI herbæ semen & acre gustanti deprehenditur & frigidum, milio simile.

Crethmon.

CRETHMON falsum est simul & amarum, sed modice, quare & vis ipsius est absterforia & desiccans.

Crithe, hordeum.

HORDEV refrigerat ficcaturque in primo abscessu, verum non nihil etiam extergit: cæterum fabarum lomento ficitate præcellit, minus flatulentum est, polenta hordeo multo magis ficit, ptisana præterquam quod largius humectat, etiam abstergit vehementius.

† In altero manu scripto his verbis hæc sunt adscripta οἱ δὲ ἐκ τῶν κριθῶν γινόμενοι ἄρτοι, ἀτρυφώτεροι τῶν ἐκ τῶν πυρέων εἰσιν, id est, panes qui ex hordeo conficiuntur, minus alunt quam qui ex tritico. Quæ huc traducta sunt ex Aëtio.

Crimnon.

QVOD in tritici & zææ farina crassius est, crimnon appellatur, validius nutriens quam polenta ægrius autem conficitur.

Crinon, lilium.

LILII flos temperamento mixtus est, ex tenui substantia, terrestri & nonnulla aquosa temperata: qua propter oleum quoque ex eo confectum discutiendi vireis, molliendique representat, vulnæ inflammationibus accommodatum. Radix ac folia ficcant, abstergunt, discutiuntque mediocriter, quo fit ut ambustis conferant: succus ipsorum, & nervorum vulneribus cum oxymelite prodest.

Crocodilon.

CROCODILII semen & succus calidam, ficcam & discutientem vim præ se fert: vrinas itaque & menses movet: radix excreationes e pectore iuvat, item sanguinem per naris ducit.

Crocus.

CROCVS ad secundum calefacientium ordinem, primum ficcantium refertur, astringit & concoquit.

Crommyon, cepa.

CEPA ex quarto calefacientium ordine habetur, substantiæ crassioris, quamobrem hæmorrhoidas appositu aperit: item abstergit: vitiligines, alphas dictas, cum aceto exterit, & alopecias ocyus alcyonio pilos restituit, succus oculis suffusus aut crassi humoris vitio hebetibus auxiliatur.

PAVLI AEGINETAE

Cyamos, faba.

FABA non multum a medio temperamento recedit, siue refrigerando, siue siccando: caro ipsius nonnullius etiam absterforix qualitatis est, excreationibus e thorace & pulmonibus utilis: quum autem cortex fabae nonnihil quoque astringat, tota ipsa faba in posca decocta coeliacis, & dysentericis conducit inducta vero cataplasmatibus modo inflammationibus & tumoribus medetur, lac in mammis extinguit.

Cyanos.

CYANOS acrem habet vim detrahendi, & discutiendi maiorem quam cinnabaris: astrictionis quoque particeps est.

Cyclaminus.

CYCLAMINVS varias vires habet: etenim extergit, incidit, aperit, atrahit, & dissipat: succus itaque ipsius haemorrhoidas sedi ad motum aperit, duritias cum alijs discutit: cum melle, suffusis proficit, per nareis purgat, abdomini inunctus aluum subducit, foetus corrumpit: radix autem tota succo quidem est imbecilior, sed & ipsa vehemens adeo est, ut cum mulla instar trium drachmarum pota, interanea expurget: caeterum in cutis vitia exterit. Altera cyclaminus, quam etiam cissa themon vocant, radice donata inutili, semine habet efficax, ut potum priori simili faciat.

Cyminum, cuminum.

CVMINVM in tertio ordine calefacit, vrinam mouet, & flatum discutit.

Cynosbator, rubus caninus.

RVBI canini fructus non instrenue astringit: folia id praestant mediocriter, at quod in fructu lanæ speciem praese fert, ceu arteriae inimicum cauere debet.

Cyparissus, cupressus.

CYPRESSI galbuli & turiones siccandi viribus pollent, nullo calore conspicuo quapropter vulnera magna in duris corporibus conglutinant, & superfluis putridinibus in alto fixas humiditates, citra noxam depascunt, intestinorumque ramicibus opitulantur.

Cyperus, iuncus angulosus.

IUNCVS angulosus calefacit siccaturque citra morsum: hinc etiam humidicribus vlceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris vlcera persanat. habet & vim quandam incisoriā, qua calculos comminuit, vrinam & menstrua promouet.

Cypros.

CYPRI folia & surculi mixtis constant viribus, discutiente & astringente, tum ea quae sine offendiculo & morfu siccet ideoque decoctum ipsorum ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Item oris eruptiones, quas aphthas vocant, com-

LIBER VII.

223

manducata, perfanat item medicinis lieni dicatis miscetur.

Cytisus.

CYTISI folia discutientis leniter, & tepidæ naturæ sunt, quemadmodum & malux.

Conium, cicuta.

CICVTAE vires summe refrigeratorias esse, omnibus cōstat.

Conos.

CONI cortex & folia, pinum viribus repræsentāt, sed acriora efficacioraq; sunt fructus, quem etiam strobilon appellant, viridis, amarum quiddam & acre, cum humiditate possidet, quare thoracis affectibus ad facilem excreatum accommodatur: esculentus in aqua maceratus vt acrimoniam exuat, temperatus redditur, rosionis expers, opplens obstruensq; vt etiam aperitates læuiget.

Quæ ab L ordiuntur.

Lagopus.

LAGOPVS siccæ facultatis est, quæ alui fluores desiccāt.

Ladanon.

LADANON a cistho ladone dicta gignitur, quam depascentes capellæ barbis suis & villosis cruribus succulentum & pinguius ex herba deferunt, quod congestum ladanon est medicamen præstantissimum, in secūdo fere abscessu calidum, natura tenue, emolliens mediocriter, discutiens & concoquens, eoq; vteri affectibus peculiariter conuenit: habet præterea nonnullas astringendi vires, quibus defluos capillos confirmet.

Lathyrus.

LATHYRIN & in ipsam tithymali speciem esse dicunt, quod eius succus, illius modo purget, semen autem huius præcipuè purgandi vim habet.

Lapsana

LAPSANA manducata stomacho nocet, inducta vero cataplasmate nonnihil abstergit discutitq;.

Lapathum, rumex.

RVMEX mediocriter discutit acuta rumex, quæ oxylapathum dicitur, præter id etiam pauxillum repellit. semen autem præsertim oxylapathi, astringens, alui profluvia, diarrhoeas dicunt, & dysenterias perfanat folia vero semini contraria faciunt: hæc etenim comesta aluum mouent, illud potum ipsam comprimit.

Lemonium.

LEMONII fructus austerus cum vino cœliacis, dysentericis, & sanguinem spuentibus datur, item ad fluorem muliebrem acetabuli mensura.

PAVLI AEGINETAE

Lichen herba.

LICHEN herba in petris nascens muscum repræsentat, vis ei est exterendo purgare, mediocriter siccare, & refrigerare: impetigines sanat, inflammationes arcet, & vt Dioscoridis verbis vtar, sanguinis eruptiones sistit.

Lichenes equorum.

LICHENES equorum triti cum aceto, comitialibus, & omnium venenatorum moribus mederi feruntur.

Leontopetalon.

LEONTOPETALI radix & sicca & calfacientis in tertio ordine facultatis est, nec non discussoria. Lepidion.

LEPIDION, quam & hiberiada vocant ex quarto calefacientium gradu est, nasturtio proximum viribus, minus autem eo de siccitat.

Lepis, squama.

SQUAMA omnis valide siccatur, astringit, nec ignauiter mordet. Sed æris amplius siccatur, extenuatur, cui non nihil æruginis adest, magisque ea quæ ex Cypriis clauis raditur, quam propterea etiam helitim quasi clauale appellatur. At ferrisquama liberalius astringit, atque hac magis stomomatis, quapropter ad contumacia maligna vel vlcera præstantior est, sed æris, carnem magis purgat & consumit.

Leucacanthum.

LEVACANTHI, quod alij polygonatum, alij ischiada vocant, radix incidit quidem, & in tertio ordine siccatur, in primo autem calefacit.

Leucas.

LEVICAS calfacit siccaturque in tertio ordine, acrimonia vero præpollet.

Leucoion, viola alba.

ALBAE violæ totus frutex abstergendi extenuandique vires possidet, magis autem flores, & ex eis, sicciore: idcirco & mensis stimulant, foetus corrumpunt expelluntque, ac si quis aquæ mixtura vim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducent, præsertim vteri: radices eadem præstant, crassiore magisque terrestri natura præditæ ex aceto inflammationibus in scirrhum indurescentibus imponuntur.

Leuce, populus alba.

POPVLVS alba aquosa, tepida, terrestrique constat substantia, viribus absterforijs.

Libanotides, rosmarinus.

LIBANOTIDES tres numerantur, una sterilis, duæ fructum ferentes: vires illis extergendi, incidendi, discutiendi, & emolliendi: succus eorum oculis ex humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur: coronariæ vero libanotidis decoctæ ius regio morbo laborantibus recte bibitur.

LIBER VII.

Libanotos, thus.

224

THV S in secundo ordine calefacit, in primo ficit, habet & modicam uandam vim leuiter astringentem: cortex ipsius manifeste astringit, ficitq; in secundo abscessu absolute, crassior thure & minus acris, hinc sanguinem spuentibus, dysentericis, coeliacis, & stomachicis, tum foris impositus, tum intro assumptus, salutaris est. Sucus ipsius calefacit ficitq; tertio in abscessu, atq; nonnihil extergit: quocirca oculorum vlcera, & purgat & explet.

Lynnis, fuligis.

FVLIGO specierum quorūdam concrementarum, nempe thuris, myrrhæ, terebinthi, styracis, picis liquidæ, cedri, veluti tenuissimus quidam pulvis est, qui Græcis æthale dicitur, cum fumo ascendens. obtinet quidem ficcātem & terrestrem tenuemq; substantiam, particulares autem ipsius differentię secundum materię combustæ rationem fiunt. Vtuntur ea potissimum in medicinis ocularijs, & ad honestandas palpebras accommodatis. at thuris fuligo omnium est utilissima, vt quæ mitior contra pini, coni, & picæ valētior est, quo fit vt ad glabrescentes palpebras, destillantes & erosos oculorum angulos, illachrymantesq; recte adhibeatur.

Ligysticum, ligusticum.

LIGVSTICI & radix & semen adeo calefaciunt vt mensis citent, flatuq; probe discutiant.

Lithargyros, argenti spuma.

ARGENTI spuma medij inter metallica ordinis est, eoq; ceteris materie ipsa alijs medicinis mista subinde vtimur, ficit tamen mediocriter, abstergit & astringit: inde femorum attritus persanat.

Lithi, lapides.

LAPIDES omnes terræ modo desiccāt, sed hæmatites astringit & abūde ficit. quare etiam oculorum asperitates extergit, quum quidem inflammatione carent, ex aqua: quum vero illa tentantur, ex ouo. cæterum ad sputa cruenta bibitur utiliter, vlcera supercrescentia compescit. Schistos lapis superiori quidem cōsimilis est, sed imbecillior. Mox galactites, id est, lactarius sequit. Melitites cuiusdam etiā caloris compos est. Moroxus, quem etiam, leucographida vocant, quo prædictis omnibus mitior est (nullas enim habet vireis, efficaciores) eo moderatior, magisq; dolorem lenit eamq; ob causam in teneris corporibus cū cerato ad cicatricē vlceribus obducendam illo vtuntur. Iaspis qui subviridi colore est, quum efficacior sit, oculorum cicatrices & pterygia extenuat. viridis autem Iaspis adalligatus & in anulo gestatus stomachum adiuuat. Iudaicus dictus renum calculos conterit, vnde etiam recentiores tecolithon appellant.

PAULI AEGINETAE

Pyrites ex eorum numero est, qui valide discutiunt tumores, sanguinemque in grumos concretum: cuius quum facultas non est, molari utuntur. Phrygius praeter quam quod valenter desiccatur, non nihil etiam astringit roditque, unde & repellere & discutere potest, eoque ocularius miscetur remedijs. Ageratus astringendi discutiendique virtutis compos gutturis inflammationem iuvat. Asiae petrae flos tam subtilem naturam habet, ut carnes humiditate flaccidas citra rofionem absumat. Gagates affatim siccans inflationibus praesertim diuturnis expedit. Magnes, quem & Heraclium lapidem vocant, aequales haematiti vireis representat. Arabicus ebori similis, siccandi detergendi que vireis habet. Alabastrinae combusti cinerem stomachicis nonnulli bibendum exhibent. Smyris extergit, dentibus purgandis accommodatus. Qui in spongijs inveniuntur lapilli, renum calculos frangunt. Similes his vireis habent qui in Argeo Cappadociae monte nascuntur. Similiter & ophites dictus, qui ad alligatus contra viperarum morsus confert. Ostracites, hoc est, crustaceus, & geodes a terra quam intra se complectitur appellatus abunde siccare feruntur, ideoque inflammatis tumoribus mederi. Naxiae cotis detritum refrigeratorium esse dicunt, ut & virginum mammas & puerorum testiculos ne crescant, reprimat. Quod vero ex olearia cocte detritum fuerit, absterforia vi donatum alopecias explet. Hieracitin & Indicum lapidem alligatum contra haemorrhoidas valere perhibent. Saphyrus potus, scorpionum ictibus a duersatur. Aphrodesenes, comitialibus potui datur. Armeniacus, inferiorem ventrem purgat, sed stomacho nocet.

LITHOSPERMON, quod alij Liosporon, alij heraclion vocant, herbae aetonychi dictae, semen est lapidosum, album, quod cum vino albo potum calculos frangit, & urinas eiicit.

Linospermon, lini semen.

LINI semen ex primo gradu calidum est, inter humectantia siccantiaque medium. manducatum flatibus creandis est, etiam si frictum fuerit.

Linozostis, herba mercurialis.

HERBA mercurialis aluum liberaliter subducit, indurata cataplasmatis modo discutit. Sciendumque est eius semen infricatum corporis excrescentias praeter naturam, quas vulgus vocat naphia, abolere, sicut experientia comprobatum est. Sed viride semen esse oportet, & frequenter ipsum tuberculis illis infricare.

Litrum, nitrum.

LITRUM medium inter aphronitrum & salem virtute est, crematum magis extenuat discutiitque, & si intro sumatur, crassos viscososque

LIBER VII.

225

colosq; humores plus cæteris incidit & extenuat. Chalastreum vero (est autem Chalastra Theſſaliæ locus) acrius ſiccantiuſq; eſt, quare ad capitis deſtillationes & articulares cruciatus eo vtuntur.

Lonchitis.

LONCHITIDIS, cui ſemen triangulum eſt, cuſpidis modo, radix dauco æqualis vrinam mouet. eius vero quæ ſcolopendrio reſpondet, folia viridia, vulnera glutinant, ſicca vero cum aceto pota lienibus ſcyrrho induratis, medentur.

Lycopſis.

LYCOPSIS radix quum ſit aſtrictoria, cum polenta admota in cataplaſmate, eryſipelatis authore Dioſcoride conuenit: ſi læuis cum oleo inungatur, ſudores elicit.

Lycium.

LYCIUM ex diuerſis genere ſubſtantijs conſtat, calida, tenui, & diſcutiente, terreſtri vero frigida & leuiter aſtringente, vt in ſecundo abſceſſu deſiccet, calefaciendo refrigerandoq; medium eſt: hac de cauſa ceu abſterſorio, in oculis obſcuratis eo vtuntur: tanquam aſtringenti, in coeliacis, dyſentericis, & maleficis vlceribus: at contra inflammationes, vt diſcutienti; cæterum primas obtinet Indicum.

Lyſimachium.

LYSIMACHIVM vim habet excellenter aſtrictoriã, quæ & vulnera glutinat & ſanguinem cõpeſcit, tum ipſum, tũ ipſius ſucus, dyſentericos & potum & ab inferioribus partibus iniectũ, ſanat.

Lychnis.

LYCHNIDOS coronariæ ſemen calidum eſt & ſiccum in ſecundo abſceſſu, eoq; abſoluto.

Lotus herba.

LOTVS domeſtica, quam nonnulli triphyllon appellant, abſterſorias vireis obtinet & modice ſiccanteis, calore temperata eſt. At ſylueſtris loti ſemen ad ſecundum calefacientium ordinem reſert, habet autem nõnihil etiam abſterſorium. Aegyptiæ ſemen in panes quoq; effingitur.

Lotus arbor.

LOTVS arbor extenuat, ſiccatur, & mediocriter aſtringit: quæ de cauſa ad fluxum muliebrem, alui fluores pota cum vino aut aqua, aut etiam in aluum data, ſalutaris eſt, pilos deſluos confirmat.

Quæ ab M auſpiciantur.

Macer.

MACER cortex eſt qui ex India importatur, tertio ordine ſiccatur, inter calorem & frigiditatem medium obtinet eſt etiã aſtringens tenuiſq; vnde coeliacis & dyſentericis auxiliariſ habetur.

Ff

PAULI AEGINETAE

Malobathron.

MALOBATHRON I folium æquales spicæ nardi vireis representat.
Malache, malua.

† Malua sylvestris mediocriter discutit & emollit: hortensis autem, ceu humidior, etiam imbecillior est: semen tanto viribus præstat, quanto & ficius est.

† Huic capiti addita sunt quædam in veteribus manuscriptis de dendromalache, quæ quia totidem verbis apud Aëtium leguntur, adscribenda non putavi.

Mamiras.

MAMIRAS veluti radícula herbæ cuiusdam est ceu geniculis frequentibus nodosis, quæ cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate prædita.

Mandragoras, mandragora.

MANDRAGORA tertij refrigerantiû ordinis est: mala ipsius caliditatem quampiã & humiditatem referunt, vnde soporem grauem homini possunt accersire: ac radicis cortex vehemētissimus nō refrigerat modo sed etiã siccatur: interior eius pars imbecillior est.

Manna thuris.

MANNA thuris simileis thuri vireis habet, sed remissas & sensim astringentes.

Marathron, sceniculum.

FOENICVLVM calefacit in tertio ordine, in primo siccatur. hinc etiam lacti generando est, & suffusis auxiliatur.

Mastiche.

MASTICHE, Chia quidem calefacit siccaturq; in secundo ab selescu, cæterû cōpositæ est facultatis, astrictoriæ simul & emolliētis: hanc ob rationē stomachi, ventris, intestinorum & iocinoris inflamationibus cōuenit. Aegyptia, nigriore colore quodāmodo, siccatur magis & discutit, minus astringit, hinc furunculos quoq; dissipat.

Melan, atramentum Indicum.

ATRAMENTVM Indicum auctore Dioscoride in genere leniter astringentium est, quæ inflammationes laxosq; tumores, œdemata vocant, rumpunt, vlceraq; purgant.

Melantheria, creta sutoria.

CRETA sutoria impense astringit extenuatq;.

Melan, atramentum scriptorium.

ATRAMENTVM quo scribimus abunde & ipsum de siccatur: solum vero posca ambustis si illinatur, præsentis est remedio.

Melanthion.

MELANTHION in tertio ordine calefacit & desiccatur, est.

etiam tenui natura præditum. vnde destillationibus in fauces, olfactum prodest, intus assumptum discutiendis flatibus singulare: est etiã amarum, vnde tineas interficit: abstergit & incidit, hinc orthopnœis quoque conuenit, item lepras exterit, myrmecias eiicit, & menstrua incitat.

Meli, mel.

MEL calefacit & ficit ordine secundo, abstergitq; insigniter: coctum vero minus quidem acre redditur, deterforium, & ventri subducendo accommodum, sed magis nutrit. Amarum mel, sicut & id quod in Sardinia fit, mistas habet vireis, terrestrem & calidam. At mel, sachar quod ex felici Arabia conuehitur, minus dulce nostro est, sed æqualeis vireis obtinet, præter quam quod nec stomacho noceat, nec sitim faciat, quemadmodum hoc nostras.

Melia, fraxinus.

FRAXINVS nota arbor est, folia eius pota viperarum moribus succurrunt: cortex crematus, illitusq; ex aqua lepras separati: ligni vero ramenta si bibantur, lethalia esse ferunt.

Melilotos, fertula campana.

SERTVLA campana mixtis facultatibus pollet: astringendi, discutiendi & concoquendi.

Melystrophillon, apiastron.

APIASTRVM viribus marrubio per omnia respondet.

Memæcylos.

MEMAECYLOS arbuti fructus, in litera C comprehensus est.

Mespila.

MESPILA, alij tricocca quasi trigrania vocant, fructus est assatim acerbus, & vix esculentus, aluumq; continens: germina foliaq; mespili impense acerba sunt:

Medion.

MEDII radix vireis semini contrarias præ se fert, quippe austera est & fluxiones comprimit, ideoq; muliebrem fluxum sistit: semen quum tenuis incidentisq; sit facultatis, mensis quoq; proritat.

Mecon, papauer.

PAPAVER multiplex est: hortensis quidem, quod etiã thylacitin ceu vtricularium vocant, semen est esculentum, si cum pane assumatur, mediocriter somnum cõcilians. At rhœas appellatum, inde quod semen ipsius celeriter defluat, validius hortensi est: manducatur itaq; non per se, sed momentum copiosiori melli mixtum. Quod veluti decidenti, ac depresso calice est, nigrum semen habet & medicatum nimis quam frigidum. Quod prolixiore & proceriore constat: calice, medicatius quam cætera omnia existit, vt etiam stuporem inducat, quousque interimat. Nam & ipsum & eius lachryma.

ff ¶

PAULI AEGINETAE

quam per excellentiam opion nuncupant, quarto refrigerantium ab-
fessui ascribuntur. Corniculatum papauer abstergendi vireis sortitur:
ideoq; radicis ipsius decoctum potu iocinorosis auxiliatur: folia au-
tem & flores perquam sordida vlcera expurgant, crustasq; tollunt:
Heraction & aphrodes idest spumofum papauer dictum, semen ha-
bet pituitæ purgandæ accomodatum.

Mela, mala.

MALIS omnibus frigida & excrementitia inest humiditas:
& quæ in eorum censu resoluta & aquosa sunt, frigiditate cæteris &
humiditate præstant: dulcia, aquosa quidem, non tamen manifeste fri-
gida sunt: austera dulcibus quidem frigidiora, sed minus humida aci-
da frigida quidem & ipsa, verum incidendi humores ventriculo in-
hærentes vim testantur: acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt,
frigido & terrestri donata temperamento, ventrem supprimunt, vul-
nera glutinant, pari modo folia, succi, & cortices arborum inter se
differunt.

Melea, malus, persica.

MALI persicæ surculi & folia euidenter amara sunt, eoq; concisa
tritæq; vmbilico imposita, tineas enecant: fructus autem ipsius, nem-
pe persicum hoc esculentum, in secundo ordine frigidum humidumq;
existit.

Melea, malus, Armeniaca.

MALI armeniæ fructus, quæ nunc vocant mala præcocia,
conformes persicis vireis refert.

Meon.

MEI radices in tertio ordine calefaciunt, in secundo siccant, ideoq;
vrinam & menses cient: liberalius meon assumptum, capitis facit do-
lores.

Milax.

MILAX tam levis, quam aspera, arbores amplexa, calidam
acremq; facultatem possidet.

Misy.

MISY medicamentum est ex iis quæ crustam faciunt & adu-
runt, valenterq; astringunt, minus autem quam chalcitis erodit, quo-
niam tenuius ea est: cæterum chalcitis & fori vetustate in misy mu-
cantur, vt ait Galenus: a superficie incipiente statim mutatione.

Molybdæna, plumbago.

PLVMBAGO argenti spumæ vireis habet a medio tem-
peramento ad frigidius digressa.

Molybdos, plumbum.

PLVMBVM refrigeratoriæ virtutis est, habet & humidæ
substantiæ plurimum, quod ex frigore coaluerit. Quod si id perfun-
datur teraturq; aut vino aut immaturo oleo, aut quodam succo refri-
gerante, ad naturalium & sedis vlcerosas inflammationes excel-
lentissimum erit rimedium: lamina vero plumbea super lumbos ge-
stata, veneris insomnia cohibet. Item bractea tenuis ganglio impo-

LIBER VII.

227

fit, ipsum dissipat. Concrematum plumbum validius quidem siccat sed & acrimoniæ nonnihil obtinet: si eluatur, tum sine rosione siccat, tum maleficis vlceribus præsentaneum est remedium.

Moræa, morus.

MOR I fructus maturus quidem aluum subducit, & medicamentis stomaticis aliis quæ moderatam requirunt astringentem vtiliter miscetur. immaturus vbi exaruerit, per quam obstruens fit medicamentum cortex autem radicis arboris etiam amaritudinis cuiusdam particeps, purgare potest, eoque latas ventris tineas occidit: foliorum autem furculorumque vis subducentium & comprimentium media quodammodo existit.

Myagros.

MYAGR I semen pingue est. quod in eo oleosum habetur, opulenti vireis repræsentat.

Myaces, mituli.

MYTVL I combusti, eundem cum buccinis effectum præstât, proprie vero eloti palpebrarum asperitatem & albugines: cum melle exterunt, caro ipsorum canum moribus vtiliter imponitur.

Myaron.

MYARON, quam alii melampycon appellant, herba ferulacea est & pinguis, videtur autem ipsius pinguitudo corporis asperitates læuigare.

Myelos, medulla

MEDVLLA facultatis est quæ indurata ac in scirrhum concreta corpora emollit. Laudatissima est ceruina, mox vitulina: taurina vero hircinaque acrior est, magisque siccat: & quæ in artubus continetur, pinguior est magisque emollit: quæ de spina elicitor, durior squalidiorque est.

Mycetes, fungi.

FVNGI frigidi & humidi admodum temperamentosi sunt: nonnulli ipsorum manducati, etiam exitium adferunt, præsertim qui iuxta ipsos nauarum constant putridæ qualitatis participi.

Myosote, muris auricula.

MVRIS auricula dicta est asine.

Myxa

MYXA arboris fructus est minor quidem prunis, facultate vero consimilis.

Myrica, tamarix.

TAMARIX incidit extergiturque, ita ut manifeste non siccat, habet autem astringentem nonnullam: qua de causa decoctum ipsius potum lienes adiuuat, item dentium doloribus medetur: fructus autem & cortex ipsius gallæ virtute proximus est: cinis arboris vehementius exsiccat.

Myriophillon, millefolium.

MILLEFOLIUM tantam siccandi vim possidet, ut vulnera conglutinet.

Fi iii

PAULI AEGINETAE

Myrrha, vel myrrhis.

MYRRHA in secundo ordine calefacit, ac nonnihil etiam extenuat, radix ipsius odorata dulcisq̃ est, mensibus mouendis, & humoribus ex thorace & pulmone repurgandis idonea.

Myrrhine, seu myrsine, myrtus.

MYRTVS ex diuersis composita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, qua valenter siccatur. at myrtula quæ soboles myrri est, tuberosa, caudicē ipsius & ramos amplexa, vehementius astringit & siccatur. iam vero & folia aridiora viribus magis siccant: item fructus succusq̃ tum foris applicatus, tum intus assumptus per similes vires præ se fert.

Moly.

MOLY, quod nonnulli rutam syriacam, alij zarmalam dicunt. Syrii besalam, tertio calefacientium ordini annumeratur, substantia tenue: hinc crassos humores viscososq̃ incidit, discutit & urinam promouet.

Quæ ab N incipiunt.

Nascaphthon.

NASCANTHON, sunt qui nascaphthon dicunt, Indileum est odoramentum, quod ad astrictos foeminarum locos suffitu vaporetur.

Napy, sinapi.

SINAPI calefacit siccaturq̃ in quarto abscessu.

Nardostachys, spica nardi.

SPICAE nardi radice calefacit in primo, siccatur in secundo ordine, particeps est etiam astringentis cuiusdam qualitatis, acris, & subamaræ, iocinori igitur prodest & stomacho extrinsecus admota & ebibita: urinam mouet & interaneorum fluxiones desiccatur: sed Indica valentior est quam Syriaca, & nigrior.

Nardus Gallica.

NARDVS gallica superiori vireis habet similes quidem, sed imbecilliores, præterquam ad urinam ciendam, calidior enim est quam illa: minusq̃ astringit.

Nardus montana.

NARDVS montana, quæ nonnullis thylacifis, yritisq̃ dicitur, commemoratis est infirmior.

Nartex, ferula.

FERVLAE semen extenuat calefacitq̃: medulla ipsius viridis adhuc, astringit, eoq̃ sanguinem spuentibus & coeliacis accommodata est.

Narce, torpedo marina.

TORPEDO marina viuens capiti imposita dolores eius accet, idq̃ forsan eodem illo torpore quem membris eam contingentibus inducit: oleum in quo viua decocta fuerit, ad acriores articulos cruciatus leniendos iungitur: eadē torpedo anum procidentem coërcere apposita fertur.

Narcissus.

NARCISSI radix adeo deficcet, ut maximis vulneribus sic glutinandis, imo etiam tendinum præcisionibus confert, cæterum abstergendi & attrahendi vim quandam habet.

Neuras, seu poterion.

NEVRAS, quod alij poterion vocant, sine rosione deficcet, ut & ipsa nervos præcisos glutinet. radices autem potissimum hunc effectum præstant, & impositæ, & potæ.

Nerion, aut rhododaphne.

NERION extrinsecus applicatum vim refert discussoriam: si intus assumatur, occidit.

Nymphæa.

NYMPHAE A vireis habet sine rosione ficas, quibus & venter reprimat, & genituram arefacit: verum alba radice donata valentior est: eoq; fluxum muliebrem cum vino nigro & austero pota per sanat: quæ nigram refert, deterforia quoq; vi nonnulla pollet, eaq; vitilignes, alphas dictas cum aqua exterrit: alopecias cum pice liquida illita replet.

Quæ ab X ordiuntur.

Xanthion, aut phasganion.

XANTHION phasganium, ve fructum fert discutiendi viribus præditum.

Xiris, aut Xyris

XIRIS naturæ tenuis est, discussoriæ, & extrahentis, ac nimis siccatoriæ, præcipue semen, quod & urinam cit, & leni in scirrhum indurescenti medetur.

Xiphion, gladiolus.

GLADIOL radix trahit, discutit, & ficit.

Quæ initium habent ab O.

Oë, sorbus

SORBUS arbor cuius fructus, a nonnullis & dicitur, astringendi vim obtinet, sed minorem mespillo.

Orthonna.

OTHONNAM, alij herbæ esse succum in Arabia ad Aegyptum nascentis affirmant, alij lapidem Aegyptiam: detergit autem eroditq; omnia quæ claritati oculorum officiant, exterens.

Oenanthe.

PLVRIMVS sane usus sylvestris vitis florem abunde astringentem esse fatetur: & ventrem potissimum corroborare. Dioscorides autem aliam describit oenanthem contrariis donatam viribus, unde secundas eam eicere, & urinæ stillicidio, morboq; regio meri tradit.

PAULI AEGINETAE

Oenos, vinum.

VINVM ex iis est, quæ in secundo ordine calefaciunt, siccantq; quod admodum vetustum est, in tertio: Mustum vero in primo.

Oesypus, lanæ pinguitudo.

OESYPVS in sermone de lanis explicata est.

Olynthi, grossi.

GROSSI acrem & discussoriam vim obtinent, liquoris gratia qui in ipsis continetur. cocti igitur duros tumores dissipant; crudi myrmecias & thymos exterunt.

Olostium.

OLOSTIVM siccant astringitq; hinc eo adrupta vtuntur:

Omphacium.

OMPHACIVM succus est vix immaturæ, astringens egregie & siccans in tertio abscessu: eoque fluidis affectibus & præsertim stomachicis, accommodatur.

Onagra.

ONAGRA, quam nonnulli onotheram, alij onothurin dicunt, frutex est arboreus, cuius radix inducta, ferocientia vlcera mitigat.

Onoma.

ONOMA, vel onomis, vel phlomitidis, vel ononis, acrem amarumq; vim obtinet, eamq; ob causam folia eius cum vino pota foetus occidunt expelluntq;.

Onobrychis.

ONOBRYCHIS vi rarefaciendi & discussoria, tubercula, quæ phymata dicuntur, dissipat, vrinæ stillicidio medetur, & sudores prouocat.

Oni, asini seu multipedæ.

MULTIPEDAE quæ sub aquarijs vasis agunt, & in orbem se conduplicant, discutiunt siccantq;, potæ cum vino vrinæ angustij & arquato medentur, anginæ itidem cum melle iisdem illinuntur. Item detritæ cum rosaceo calfactæq; in mali punici cortice, auribus dolentibus salutariter instillantur.

Onyches, conchulæ Indicæ.

ONYCHES conchyliorum Indicorum opercula sunt, quæ suffitu strangulatione vulvarum concidentis foeminas excitant, item comitiales: potæ vero aluum turbant.

Ononis.

ONONIS radice constat quæ in tertio fere gradu calefacit, cortex ipsius extergit, & incidit, vnde etiam calculos conterit.

Oxos, acetum.

ACETVM mixtæ est naturæ frigidæ & calidæ, sed vtriusque tenuis, frigida tamen calidam excellit, cæterum in tertio ordine siccant.

LIBER VII.

329

Oxyacanthos.

OXYACANTHVS arbor piro sylvestri & figura & viribus similis est, habet & subtile quippiam coniunctum: sed fructus ipsius myrti baccis respondet. Opos, liquor.

LIQVORES, & Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus per excellentiam dicuntur, calidi natura, & spirituosius insigniter: verum Cyrenaicus cæteris est calidior tenuiorq.

Origanum.

OMNIA origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi vireis in tertio abscessu ostendunt.

Oreoselinum, apium montanum.

APIVM montanum viribus domestico æquale est, sed inuolentius.

Orobanche.

OROBANCHE sicco & frigido temperamento est, secundum primum ordinem.

Orobos, eruum.

ERVVM calefacit in primo gradu, siccatur in secundo, amarumq. est, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit: liberius sumptum sanguinem per urinam expellit.

Orminon.

ORMINON marrubio specie simile est, calidum, mediocriter siccum & abstergens: venerem igitur stimulat, & oculorum crassities cum melle repurgat, tumores laxos quæ oedemata vocant discutit, & extrahit aculeos. Sylvestre domestico est valentius.

Oryza.

ORYZA vim quandam astrictoriam præ se fert: qua etiã ventrem mediocriter cohibet.

Orchis herba.

ORCHIS herba (nominatur autem etiam cynosorchis, id est, testiculus canis,) radicem habet bulbosam & duplicem: vis autem maioris, humida & calida, eoque veneri incitandæ est: minoris, calida & sicca, contra igitur venerem coërcet.

Orchis, serapias.

ORCHIS, quæ & serapias dicitur, alijs triorchis, priore valentius desiccatur: quare laxos tumores cedentesq. dissipat, vlcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inarefacta aut magis siccatur. Quoniam vero substringere idonea est, aluum quoque cum vino pota retinet.

Osyris.

OSYRIS, ex qua medicamenta ad exterendam, læuigandamq. cutem, Græci coremata vocant, fieri solent, amara est, & iccoris laxandi vireis habet.

Osta, ossa.

OSSA concremata vehementer discutunt siccantq.: præsertim id facere dicuntur humana: atqui suillus talus combustus inflationi-

PAULI AEGINETAE

buz & circa vmbilicum torsionibus mederi dicitur. quinetiam ossa cremata si potui quis exhibeat, morbum comitalem, & articulares dolores abigunt. Bubulus talus vsus, mobileis firmare dentes praedicatur, cum melle potus teretes tineas educit, cum oxymelite lienem consumit, & vitilignes, quas vocant leucas, illitus abolet, item ad venerem commedatur: femora bouis cremata potu sanguinis eruptiones, & alui fluxum compescunt. Ostrea, testæ.

TESTAE fornacium tritæ siccant exterguntq; hinc dentifricis accommodantur: illitæ cum aceto pruriginis, pustulis, quæ appellantur exanthemata, conferunt: cerato exceptæ strumas discutiunt.

Ostrea.

OSTREORVM testa cremata æqualem buccinis vim, sed minus crassam repræsentat, abstergit igitur faciei labes. & dentibus nitorem conciliat: elota rosionem amittit, ad carnem cicatricemq; humidis vlcibus induendam accommodata.

Ouron, vrina.

VRINA quælibet calida est & acris, sed humana omnium aliorum animalium, exceptis maialibus, infirmior est. cæterum vehementer abstergit, quapropter nonnulli potionem eius in peste vsi, mortem euaserunt, eadem lepras, vlcera putredinem experta, capitisq; mania vlcera, quæ vocant achores, & furfures per sanat. item pedum attritus nondum inflammatione occupatos. At pueri venerem non experti vrina omnium efficacissima est, vnde etiam chrysocolle conficitur. Mulorum, articularibus doloribus congruit. Caprarum & chameolorum, aluum deiecit, ideoq; contra aquam subter cutem bibitur.

Quæ a P incipiunt.

Pancration.

PANCRATION & specie & viribus scyllæ simile est, verum imbecillius.

Paliuron.

PALIVRI folia & radix astringunt, eoque aluum fluentem sistunt, tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutiunt: Semen eius tam vehementi incisoria virtute valet, ut & calculos conterat, & excreationibus e pectore auxilietur.

Panaces.

PANACES Herculeum est ex quo opopanax dictus conficitur, in tertio ordine calefaciens, in secundo siccans, emolliens, discutiensq; radicis cortex liquore imbecillior, habet nonnihil & abstergens, & carni ducendæ idoneum: semen ipsius mensis quoque citat. Asclepium panaces & Chironium priori calidiora sunt, hinc floribus ipsorum & semine ad malefica vlcera & phymata vtunt.

LIBER VII.

230

Papyrus.

PAPYRVS ignem non experta, materia quædam efficitur: vsta, ficit chartæ crematæ modo, verum papyri cinis viribus inferior est.

Paronychia.

PARONYCHIA inde nomen accepit quod digitorum re diuuis, quæ græcis dicuntur paronychiae, medeatur, vis eius est extenuare & ficare, idq; citra rasionem.

Pentaphyllon, quinque folium.

QVINQVEFOLIVM in tertio ordine deficcat, minime acre, eoq; in multos vsus accommodatur.

Peplon, herba.

PEPLON nonnulli papauer spumeum dicunt: & hic frutex liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

Peplion.

PEPLION quoque liquorem habet, & magna ex parte maritimis locis nascitur, cætera quidem inutile, semen autem ipsius feruidi saporis vt peplum expurgat.

Peperi, piper.

PIPERIS radix costi vireis refert: fructus nuper quidem germinantis arboris, oblungum est piper, humidius natura & calidum: fructus veluti acerbus immaturusq; album est piper, nigro acrius, vt quod impendio magis assatum sit: vtrumq; vero & calefacit & deficcat.

Pepon.

PEPON absterforiæ facultatis est, inde veluti caro ipsius ephelidas & consimilia faciei vitia exterit, semen renes obstructione liberat.

Periclymenon.

PERICLYMENI folia & semen incidendi simul & calefaciendi vireis obtinent, quapropter vrinam cruentam excernunt, ad sex dies pota: semen autem ad quadraginta dies potum lienosos & ægre spirantes adiuuant.

Peristeron, verbenaca.

VERBENACA adeo deficcat astringitq; vt vulneribus glutinandis, & sanguinis eruptioni sistendæ sit.

+ Totus hic locus in antiquis sic legitur. περιστερέων εἰς τοσούτον ξηραίνει τε καὶ σύφει ὥστε δύνασθαι κολλᾶν τραύματα, ὁ δὲν ἰατῶν κακοῦδων τε καὶ φαρμακικῶν αὐτῷ χρῶνται. Id est, Peristereon vsq; adeo ficit & adstringit vt possit glutinare vulnera. Itaq; eo vtuntur in malignis vlceribus & ad partes vicinas serpentibus.

Persæa seu persica.

PERSAE A arbor est Aegypti, cuius folia & ficit & astringunt, eoq; sanguinis eruptionem compescunt.

PAULI AEGINETAE

Petasites.

PETASITES tertio siccantium ordini ascribitur, unde
& malefica & phagedænica vlcera eam vsurpant.

Petroselinon.

PETROSELINI semen calidum siccumq; est in tertio
abscessu, vi incisoria præditum, vrinam, menseisq; copiose trahit,
flatibus discutiendis accommodatissimum.

Peucedanum.

PEVCEDANI liquore & succo affatim calefacienti, di-
scutienti, extenuantiq; vtimur, tum naribus admoto, tum in potione
assumpto, ad pulmonem & pectoris vitia ex humorum crassitu-
dine contracta: item ad lienem scirrho induratum: dentibus autem
perforatis impositus, dolorem protinus sopit, neruorumq; affectibus
idoneus est: radix squamas ossium separat, maleficis vlceribus suc-
currit, in tertio ordine & calefaciens & desiccans.

Peuce, pinus vel pinafter.

PINVS piceæ viribus respondet, sed moderatior est.

Peganum, ruta.

RUTA sylvestris ad quartum calefacientium siccantiumq; or-
dinem refertur: satiuæ, ad tertium, cuius vis est crassos lentosq; humo-
res incidere, & dissipare, vrinā mouere, attenuare, & flatus discutere,
unde & venerem coërcet.

Pissa, pix.

PIX arida quidē in secundo abscessu desiccet, minus calefacit: li-
quida econtrario, imo etiam extergit, maturat, discutit, acrisq; est,
eamq; ob causam vngueis scabros educit, impetigines extergit, tumo-
res maturat. Valentior autem est liquida, vt etiam suspiriosis &
purulenta excreantibus, linctæ subueniat: sed arida vulneribus ma-
gis glutinandis est.

Pisselæon, oleum picinum, seu picis flos.

PICINVM oleum ex liquida sit pice, qua natura tenuius
existit.

Pistacia.

PISTACIORVM fructus esus stomacho mediocriter co-
ducit, iecur obstructum laxat, præcipue summi & odorati corū ope-
rimenti ex vino decoctum, profunt etiam contra serpentium morsus.

Pityides.

PITYIDES fructus sunt picearum, mistæ facultatis, astricto-
riæ & acris, quam ob rem reiectionibus e pectore opitulantur.

Pityocampæ, picearum cruce.

PICEARVM cruce eiusdem sunt virtutis, quam cantha-
ris & buprestis obtinet.

LIBER VII.

22;

Pityos phlæos, piceæ cortex.

PICE AE cortex astringendi vim eximiam possidet, qua intertrigines & ambusta illitus persanat, ventrem potius reprimat: folia etiam vulnera conglutinant. *Pityusa.*

PITYVSAM quoque nonnulli tithymalli speciem affirmant, quoniam & liquorem habet, & perinde ut illæ purgat.

Platanus.

PLATANVS vi humidior & frigidior pollet, eaq; de causa folia viridia ad inflammationes nascentes proficiunt: cortex & pilulæ quoniam maiorem siccandi potentiam habent, in aceto decoctæ dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanant. Cortex autem crematus siccet vehementius & abstergit, eoque lepras pellit, & humidis vlceribus medetur.

Pneumon, pulmo.

PVLMO aguinus, suillusq; attritus pedum ex calceis curare creditur: vulpinus sale inueteratus si bibatur, suspiriosis proficit: maxinus recens detritus podagris & pernionibus succurrit.

Polemonium.

POLEMONIVM, quod alijs phileterion dicitur, tenue est, & siccandi viribus donatum inde nonnulli contra coxendicis dolores, dysenterias, lienem scirrhum induratum, radicem eius, cum vino propinant.

Polium.

POLIVM minus, quo & in antidotis utimur, tertium calefacientium siccantiumq; ordinis est, itaque omnia viscera obstructa laxat, vrinam mensisq; trahit: viride adhuc, magna glutinat vulnera, aridum maleficis inspersum vlceribus proficit.

Polygalon.

POLYGALON folia habet gustu mediocriter acerba: potum, lac quoque generare putat, calidi humidique temperamenti compos.

Polygonaton.

POLYGONATVM variae particeps est facultatis, astringentioris, acris, & amaræ, & cuiusdam gustu ingratae, quæ verbi nequeat exprimi: quapropter in multipliceis vltus haud est accommodatum. radicem ipsius nonnulli vlceribus inducunt, & faciei labes, quas ptilos dicunt Græci, eo abstergunt.

Polygonon sanguinaria.

SANGVINARIA habet sane vim quandam astringendi: sed humiditas in secundo ordine frigida in ea præpollet, stomachi feruori frigida inspergitur vtiliter, erysipelatis, inflammationibusq; calidis illinitur, ac talis quum sit, fluxiones repellit, atq; hac ratione sic catoria esse putatur: foemina autem mas efficacior est.

PAULI AEGINETAE

Polycnemon.

POLYCNEMON in secundo ordine calefacit & deflecat, eoque vulnera glutinat.

Polypodium, filicula.

POLYPODIUM ficit abunde citra morsum: potum inferius purgationem molitur.

Pompholix.

POMPHOLIX sine rosione ficit, ideoque cancris vlcibus alijsque maleficis opitulatur, item cum ocularijs medicinis miscetur.

Porphyræ, purpuræ.

PVRPVRÆ crematæ testis similem vim sortitæ sunt: opercula ipsarum cum oleo incocta pilos fluidos confirmant, cum aceto pota lienes tumidos sanant: suffitu foeminas loculorum stangulatu concidentes excitant secundasque eiiciunt.

Potamegeton.

POTAMEGETON refrigerat & astringit, perinde ut herba sanguinalis iisdem virtutibus prædita.

Poterion.

POTERION, quod alij phrynon dicunt, radices concisæ neruos præsectos & vulnera conglutinant, decoctum ipsius epotum neruorum affectibus auxiliatur.

Prasion, marrubium.

MARRVBIUM in secundo ordine calefacit, amplius autem ficit, iecur lienemque obstructum laxat, excreationes e thorace & pulmonibus, mensesque promouet: in cataplasmate vero inductum extergit, discutitque, præcipua exterioria incisoriaque vi prædita.

Prason, porrum.

PORRUM mali succi est & acris. ut autem Dioscorides memorie prodidit, graua facit insomnia, aluumque bonam, vrinam ciet, & extenuat: habet & abstergendi vim aliquam, qua pectoris excreationes elicit ptisanæ incoctum semen vero ipsius nephriticis temperatur medicinis: folia etiam nonnihil astringunt, ac eam ob causam succus ipsorum sanguinem supprimit.

Prinos, ilex.

ILEX simileis quercui vireis habet, sed multo ea est validior.

Propolis.

PROPOLIS calefacit quidem in secundo abscessu, abstergit autem mediocriter, tenuisque naturæ est, & meatuum apertoriæ:

Ptarmicæ.

PTARMICÆ folia sternutamenta mouent, totus autem frutex viridis sugillata, liuoresque alios difficit, est enim herba calida & sicca, viridis secundi ordinis, arida tertij.

LIBER VII.

232

Ptelea, vlmus.

VL MVS siccare valet & abstergere, eoq; vulnera glutinare, cortex autem magis, si recens fasciolæ modo vulneribus circūuoluatur, cum aceto lepras quoq; tollit: radices idem præstant, si ossa fracta quæ solidari tophacia cicatrice, quam poron dicunt, desiderant, decocti ipsarum iure perfundantur.

Pteris, filix.

FILIX vim siccandi & amaram repræsentat, eaq; foetus corrumpit, laticq; tineas enecat, instar quatuor drachmarum cum mullâ pota: quoniam vero modice constringit, vlcera citra rosionem desiccare potest.

Pycnocomon.

PYCNOCOMON discutiente vi extrahenti acrisq; donatum est, folia igitur panos & furunculos dissipant, semen præterea infixa corpori spicula extrahit, radix flauam bilem purgat.

Pyrethron.

PYRETHRI radix adurentem potestatem occupat, dentium qui frigori patuerunt dolores lenit, item ad febrium rigores ante accessionem infricatur cum oleo, adhæc iis quorum corpora stupent, & resoluta sunt, efficacissime adhibetur.

Pyros, triticum.

TRITICVM in primo ordine calefacit, verum siccando humectandoq; medium est, nonnihil etiam glutinosum, & obstruendū efficacem obtinet.

Pytia, coagulum.

COAGVLVM omne naturæ acris est, tenuis, discutientis, & nimirum siccantis. sed leporinum comitiales sanare cum aceto potum, literis mandarunt: fluoremq; muliebrem emendat, lac in ventre concrecum soluit, similiter etiam sanguinem: nonnulli vero cruentas pariter e thorace excreationes cohibere ipsum tradunt: equinum vero coagulum coeliacis & dysentericis prodesse: phocæ autem castorij vireis præ se ferre.

Quæ ab R incipiunt.

Rhacos, attritæ vestis fragmentum.

ATTRITARVM e lana vestium fragmenta cōcremata simileis eidem lanæ vireis repræsentant. Linei autē panniculi quum adhuc vrantur, tenuem ex se fumum reddunt, qui etiam destillationes in guttur liberet, & vuluæ sursum recurrenti salutatis sit: cremati iam ad lanæ virtutem accedunt.

Rhamnus.

RHAMNVS siccet in secundo, refrigerat in primo abscessu quare herpetibus & erysipelatis non admodum calidis medetur, sed teneris eius folijs vtendum est.

PAVLI AEGINETAE

Raphanus.

RAPHANVS in tertio abscessu calefacit, in secundo siccatur sylvestris efficacior est, in ambobus autem semen valentius. itaq; sugillata, aliosq; liuores difficit.

Rheon, rha.

RHEON, quod alij rha dicunt, compositum est ex terrestri frigida & tenui substantia, aëreaq; calida & leniter acris, eamq; ob causam conuulsis, ruptis, orthopnoeis opitulatur: quod discutiendi vim habeat, liuores emendat: quod astrictoriam, cruentas excreationes, coeliacos, & dysentericos sanat: vtraque vero facultate, iocinorosos iuuat.

Rhetinæ, resinæ.

RESINAE omnes & calefaciunt & desiccant: verum terebinthina principatum obtinet, discutientis naturæ, emollientis, tenuis & absterforiæ, eoque scabiem corrigit: & larix huiusmodi est. quæ vero epinu destillauerit, atq; hac magis adhuc strobilina, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut atrahit: medium inter ipsas locum tenet, & quæ de picea, & quæ de abiete raditur.

Rhoda, rosæ.

ROSÆ mixta constât substantia, aquosa scilicet, calida, astringenti, & amara: flos autem ipsarum magis adhuc astringit, eoque desiccatur.

Rhodia radix.

RHODIA radix calefacit in secundo abscessu, tenui & discutiente vi prædita.

Rhoea siue rhoë, malum punicum.

MALVM punicum omne astringendi vireis eximias habet, quibus refrigerat siccaturq;: verum dulce alijs minus: austerum magis refrigerat sicciusq; est, & stomacho amicum, acidum refrigerat quoque, & maiorem quandam incidendi virtutem repræsentat. verum acini succo magis astringunt siccantq;, efficacius his adhuc malicorium quod sidion Græci vocant: huic virtute respondet mali flos qui cytinus appellatur.

Rhus.

RHV coriariæ a medicis dictæ fructus præcipue & succus magno in vsu sunt, quum illa astringendi siccandiq; vim ex tertio ordine habeat, detergendi e secundo.

Rypos, sordes.

SORDES ex statuis æreis, aut vasis in quibus multum olei inhærescit, detractæ sic vt nonnihil æruginis admixtum sit, discutiendi vireis habent, siccandiq; mediocriter & emolliendi, eisq; immatura phymata discutiunt. At de sordibus quæ in palæstris habentur, quas nonnulli etiam patos vocant, in sudore dictum est. Aurium lordiculæ reduujs mederi dicuntur.

Quæ

LIBER VII.
Quæ ab S incipiunt.

233

Sapagenum.

SAPAGENV M seu ferulæ liquor est, calidus & tenuis, cui
& absterforia quædam vis inest, qua & oculorum cicatricibus &
suffusionibus prodest. Salamandra.

SALAMANDRAE vltæ cinerem nonnulli medicinis
exedentibus, tum iis quæ ad lepram & scabiem componuntur, ad-
miscent. Sampsuchum.

SAMPSVCHVM calefacit siccatoq; in tertio abscessu, est
etiam tenuis naturæ & discussoriæ. Sandaracha.

SANDARACHA adurentis est facultatis, quemadmodum
& auripigmentum. Sandyx, vel firicum.

SANDYX aut firicum extenuat & siccatur, non tamē calefacit.
Saprotes, caries lignorum.

LIGNORVM caries, præsertim vltimi, humentia purgat vl-
cera & explet. Sapo.

SAP O abstergendi vim habet. Sarcocolla.

SARCOCOLLA perficæ arboris lachryma est, opplēdi
& citra rofionem siccandi vireis sortita, atq; ideo vulneribus est glu-
tinandis. Saxiphages, saxifraga.

SAXIFRAGA vrinam mouet, & calculos conterit.
Satyrion, trifolium.

SATYRION, aut triphyllon humidi est temperamenti &
calidi, item flatuosum, vnde veneris appetentiam facit: nonnulli opi-
sthotonis cum vino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in
commentario de theriaca trifolium ait hyacintho simile esse, quum
aëre inturgescens, semen sylvestri cnico æquale habet: decocti ipsius
ius superfusum phalangii aut viperæ morsus sanare: sino idem potui-
datum, similem animalium horum ictibus affectum conciliare.

Saura, lacerta.

LACERTAE iecur & caput suo loco exposita sunt: totum
autem caput dissectum impositum scorpionum ictibus medetur.
Selinon, apium.

APIVM tanti caloris est, vt & vrinas & menses eliciat.
cæterum flatus discutit, præsertimq; eius semen. Seris, intybum.

SERIS subamarum olus est, admodum refrigerans hume-
tansq; habet etiam nonnihil astringentis.

Gg

PAULI AEGINETAE

Scriphum.

SERIPHVM calefacit quidem in secundo, siccatur autem in primo ordine, consimile absinthio, minus tamen eo astringit, magis calefacit, animalia ventris occidit, mediocriter stomacho aduersatur.

Sefeli.

SESELIS radix magisque semen insigniter calefacit, tenuisque substantiae est, urinam quoque ciet, comitialibus, & orthopnoeae accommodatum.

Sepiae, testa.

SEPIAE testa persimilis est ostreo quod ad vireis attinet, sed tenuior substantia & abstergens, eoque in cinerem redacta, vngueis cum sale solutio extenuat: ignem non experta si infricetur, fucus exierit, & cutis labe abstergit.

Sesamoides.

SESAMOIDIS albi semen calefacit, detergit, & rumpit.

Sesamum.

SESAMVM non parum lentoris, pinguisque obtinet, idcirco opplere, mollire, & mediocriter calefacere idoneum est.

Seps.

SEPS, quam nonnulli chalcidicam lacertam dicunt, in vino pota, proprijs moribus succurrit.

Sialon, saliva.

SALIVA hominis ieiuni maxime discutit & abstergit, eoque infantium impetigines illita exierit & furunculos cum tritico, nimirum manso imposita, maturat, & sugillata delet, feris hominem occidentibus maxime aduersatur.

Sideritis.

SIDERITIS Heraclia & helxine dicta est, Achillea autem sideritis illi quidem consimilis est, sed magis astringit, eoque fluidis affectibus accommodata.

Sideros, ferrum.

FERRVM aqua restinctum subinde, vehementem deficcandi vim aquae conciliat, quae pota lienosis conducit: vinum autem in quo id restinctum est, coeliacis, dysentericis, cholera infectatis, stomacho resolutis, auxiliatur.

Sycos, cucumis.

CVCVMIS esculentus quidem viridis, refrigerat humectatque in secundo ordine: caro ipsius feruidas solatur inflammationes: semen abstergendi incidendique virtute praeditum, urinas mouet, & corpus nitidum efficit. aridus siccatur in primo ordine, magisque abstergit, & semen, & radix.

LIBER VII.

234

Sicyos agrios, cucumis sylvestris.

CVCVMERIS syluatici seminis succus elaterium dictus est, qui autem e radice & folijs premitur, elaterio similis est, sed imbecillior: radix detergit, dissipat, emollit. succus siccandi vireis habet.

Silybon.

SILYBON spinosus frutex est, albo chamæleonti perisimilis, esui accommodatus: radicis liquor drachmæ pondere cum mulla potus, vomitiones excitat.

Silurus.

SILVRVS sale conditus si edatur, arteriam humentem expurgat, applicatus corpori spicula educit.

Silphe, blatta quæ in pistrinis inuenitur.

BLATTAE quæ in pistrinis inuenitur, interanea decocta contritaq, aurium dolores perfanant.

Silphium, laserpitium.

LASERPITIVM probe calefacit, flatulentum est etiam & concoctu perucax: a foris corpori applicatum efficacius deprehenditur, magisq, liquor ipsius, extrahendi potens, item & superexcrementia amoliendi vim quandam obtinet.

Sison.

SISON calidus est, vrinam mouet, concoctionem adiuuat, menses educit, & viscera obstructa aperit.

Sion.

SION calidum, vrinam citat, & discutit, renum calculos frangit, menses euocat.

Sifarum, siser.

SISERIS radix cocta stomacho utilis est, & vrinæ ciendæ, calida in tertio ordine: semen tenue est, discussorium, validumq, idcirco iis quos singultus & torsiones circa umbilicum male habent, cum vino exhibetur.

Sisymbrium.

SISYMBRIVM sunt qui cardaminē vocant, cardamo, hoc est, nasturtio assimilatam: aridum quidem calefacit siccataq, in primo abscessu: humidum autem in secundo.

Scammonia.

SCAMMONIA calefacit, discutit, & biliosa extergit, magisq, eius liquor, qui iam & phymata dissipat, foetus appositu corrumpit, lepras extergit, diuturno capitis dolori cum oxyrhodino superfunditur: radix autem tum ipsa, tum decoctum eius potum, purgat: cum aceto autem & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus applicatur.

Gg h

PAVLI AEGINETAE

Scandix.

SCANDIX sylvestre olus est, calefaciēs siccansq; in secundo gradu, urinam propellit, & viscera obstructione liberat.

Scingos, terrestris crocodilus.

SCINGI carnes renibus proximæ, naturalibus arrigendis bibuntur. rursus semen lactucae cum aqua potum eadem contraria virium lege videtur remittere: item lentis decoctum cum melle.

Scylla.

SCYLLA incidit, calefacit & desiccet in secundo ordine: præstat autem eam assam aut elixam sumere.

Scolopendra marina.

SCOLOPENDRA marina in oleo elixa iunctaq; pilos abolet, vsta etiam pruritum excitat.

Scolopendrium.

SCOLOPENDRION asplenon est.

Scolymon, carduus.

CARDVVS calefacit, siccatur in ordine secundo, radix eius cum vino decocta, urinas foetidi odoris liberaliter educit & alarum totiusq; corporis graueolentias corrigit.

Scordion, trixago palustris.

SCORDIVM varijs pollet facultatibus, vt quod amarum acerbum, & acre sit: purgat igitur simul & calefacit viscera, urinas & menstrua concitat, refrigerata omnia excalfacit, vulnera glutinat, repurgatq; aridum inspersum cicatricem inducit.

Scordon, allium.

ALLIVM calefacit siccaturq; in quarto abscessu: at sylvestre allium quod ophioscordon, quasi anguinum allium, & agrioscordon dicitur, domestico valentius est.

Scordoprason.

SCORDOPRASON porri & allij mixtas habet vireis & gustatum.

Scorpioïdes.

SCORPIOIDES excalfacit abscessu tertio, siccatur secundo.

Scorpius.

SCORPIVS terrestris crudus impositus, aut tostus in cibo, proprii ictus remedium efficitur: marinus autem fel habet oculorum suffusionibus vtile.

Scoria, recrementum.

RECREMENTVM omne valide exiccat: ferri stercus alijs amplius, quod excoctum & in tenuissimum pollinem detritum cum aceto auribus suppurantibus mirifice proficit, item iis qui acornitum biberunt, cum oxymelite potum remedio est. Plumbi recrementum eidem respondet, sed magis astringit.

Smilax, aut cactus arbor taxus.

SMILAX, vel cactus arbor est virosæ virtutis.

Smyrna, myrrha.

MYRRHA e secundo calefacientiũ ficcantiũq; ordine est: capitis igit vulnere insperfa glutinat, item amaram vim obtinet, qua tineas, & foetus occidat: adhæc abstergit, eoq; ocularijs medicinis, tẽperatur, & humores pectori infixos expurgat, ita vt guttur non exasperet. Bœotica myrrha vireis habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

Smyrnion

SMYRNION, quidam hipposelinon, quidã apium sylvestre nominant, calefacit & ficat tertio ordine, ap. o quidem fortius, petro selino autem inualidius, vrinæ & mensibus educendis accõmodatũ.

Senchus.

SONCHVS astringit, & manifeste refrigerat, tum corpori admotus, tum manducatus: exarefactus autẽ mediocriter calefacit.

Sparganium.

SPARGANIVM ficcandi & hoc vireis refert.

Spartos, genista.

SPARTI quo viceis ligant, & semen & flos cum mulsa instar quinq; obolorum pota, per superiora purgant, veratri albi modo sine periculo: semen autem per inferiora quoque purgat: virgulæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

Specularium, lapis specularis.

SPECLARIVM, alij per ph scribunt spheclarium, quononnulli loco vitri in fenestris vtuntur, eoq; diaphanes a perspicuitate appellatur, substantia gypseum, vireis habet concrematis testis aut ostreis simileis.

Spongos, spongia.

SPONGIA recens quæ marinum odorem adhuc reseruat, si cum aqua, aut vino, aut posca imponatur, vulnera glutinat, cremata acris est virtutis, & discussoriæ: cum bitumine autem & pice liquida vsta, appositaq; ex igne, sanguinis eruptiones compefcit.

Spodium, cinerula.

SPODIVM pompholygi viribus æquale est.

Staphylinus, pastinaca.

PASTINACA vrinas mouet, mensis proritat, præsertim semen ipsius & radix, folia autem abstergendi viribus prædita phagedænicis affectibus congruunt, & virida cum melle: sylvestris aut pastinaca ad omnia valentior est domestica.

Stachys.

STACHYS marrubio similis frutex tertium in calefaciendo ordinem occupat: mensis itaque excitat, foetus occidit, & fecundas expellit.

PAULI AEGINETAE

Steata, adipēs.

ADEPS omnis humanum corpus & humectat, & calefacit, sed pro diuersis animalium temperamentis virtus eius euariat. Suillus igitur omnium humidissimus est, ut ad olei naturam accedat, unde etiam rosiones obtundit. Caprillus, siccior est, & celeriter concreuit, eoque iis qui in longanone rosiones experiunt, ab inferiori parte iniicitur. Anserinus calidior est, maioremque tenuitatem obtinet. Inter utrumque hunc gallinarum, gallorumque adeps consistit. Leoninus calore omnis, & tenuitate superat, & propterea etiam viduiscussoria. Bubulus inter suillum & leoninum mediis temperamento existit. Vrsinus alopecuris medetur. Vulpinus aurium doloribus, quemadmodum viperinus pilos abolere, & oculorum suffusiones impedire fertur. In omni autem adipum specie calidior, sicciorque est marium, atque ex his eorum animalium quae testes habent, magis quam illorum quibus hi sunt execti, & suigentium aetate efficacior quam aliorum. ceterum vetustate omnis adeps redditur calidior.

Stimmi.

STIMMI praeterquam quod siccet, etiam astringentem habet ob quam ocularius collyrius miscetur. Stoebeae.

STOEBAE semen folia in tertio ordine desiccant, viribus donata astringentis, eamque ob causam vulnera magna conglutinant: decoctum ipsorum dysentericis, sanguinis eruptionibus, auribus purulentis auxiliatur: folia applicata oculis ex ictu suffusis conferunt.

Stoechas.

STOECHAS adaperit, extenuat, detergit, & viscera omnia, totumque corporis habitum confirmat. Stratiotes.

STRATIOTES aquaticus frigidus est natura: terrestris, etiam astringendi vim habet, qua ulcera committit: nonnulli eo & ad sanguinis eruptiones & ad fistulas utuntur.

Strychnon, solanum.

SOLANVM hortense esculentumque astringit, & in secundo ordine refrigerat. Solanum halicaccabum neposum hortensi simile urinae ciendae idoneum semine habet acino urinae aequale. hypnotici, id est, somni fici solani radices cortex, cum vino denarii pondere potus, somnum conciliat, semine habet ad urinam mouendam accommodatum, ex tertio refrigerantium ordine: unde corymbi eius plures duodecim epoti, furor accersunt. Quartum vero genus solani intus assumptum, inutile est, a foris autem applicatum ulcera depascentia curat, refrigerando, siccandoque ad secundum ordinem relatum.

Stypteria, alumen.

ALVMEN omne, maxime acerbum est, substantiaque crassum.

LIBER VII.

236

tenuius autem reliquis est quod vocat scissile, mox rotundū, & astragaliote. Crassum admodum est liquidum, & quod placites & plinthites appellatur.

Syrax.

STYRAX calefacit, emollit, & concoquit: tussi, destillationi in fauces, & grauedini utilis, mensis idem & potus, & appositus extrahit.

Syca, ficus.

FICUS aridæ in secundo fere ordine ficcant: pingueis aut, duos tumores magis maturant, aciores deterunt, discutuntq: decoctum ipsarum mellis speciem referens, quod iam nonnulli firæon appellat, viribus melli respondet: virides aut ficus, imbecillioris virtutis sunt, utraq; tamen & virides & aridæ aluum subducunt. At ficus caprifici, acres & discussoria sunt, quemadmodum ex domesticis grossi.

Syce, ficus arbor.

FICUS arbor calidi tenuisq; temperamenti est, adeo ut liquor & foliorum succus non rodat modo, aut abstergat vehementer, sed etiam exulceret, ora venarum aperiat, & myrmecias exterat: iam vero & purgandi vim obtinet. At sylvestris ficus, quam caprificum vocant, in omnia efficacior domestica est.

Sycomorus.

SYCOMORI fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius: liquor arboris vi pollet emolliendi, glutinatoria vulnerum, discussoria tumorum: bibitur inungiturq; ad serpentium morsus, lienes scirrhi induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores sanat.

Symphytum petræum.

SYMPHYTUM petræum contrariis constat virtutibus: habet enim aliquid quod incidat, pus in thorace & renes expurget. habet etiam aliquam contrahendi virtutem, qua sanguinis excretionibus medeatur, conuulsis, ruptis, mulierum fluori rubro, intestinorum ramicibus: item calida quædam humiditas ei inest, qua sitim arceat, & arteriarum asperitates sanat. Symphyton alterum nempe magnum, viscosum quippiam & quod pruritus excitet, repræsentat scyllæ simile. Utuntur eo, ut superiori.

Spondylion.

SPONDYLII semina & radix virtute acris & incisoria, suspensiosis, comitialibus, & arquatis succurrunt: radix autem circumrasi, fistulisq; imposita illarum callos tollit: succus e flore ipsius expressus, veterum aurium ulceribus instillatur.

Schinos, lentiscus.

LENTISCUS in omnibus sui partibus ficit secundo ordine absoluto, calefaciendo autem & refrigerando medius est, adeo astringens ut ad hypocistidis succum astringione accedat.

G g iij

PAVLI AEGINETAE

I V N C I odorati & rotundi flos modice calefacit, minus astringit, tenuem naturam sortitus, qua urinam mouet & menses trahit. obstructaq; referat in fomentis, potu & cataplasmati adhibitus radix adhuc magis flore astringit, sed ille calidior.

Schoenus elia, iuncus palustris.

P A L V S T R I S iuncus duplex est, sed eius qui vocatur oxyschoenus, semen somnificum: holoschoeni autem dicti, minus. idem & capiti dolorem facit. vtriusq; semen frixum si cum vino bibatur, alui fluores desiccatur, & mulierum fluxiones cohibet.

Sori.

S O R I vireis misy æqualeis obtinet, longe illo naturæ crassius.

Quæ a T incipiunt.

Tarichos salsamentum thynni.

C O N D I T A N E I thynni caro acris est & desiccatoria: morsus igitur a vipera, quam præsterem dicunt, quamplurimum eius esui datur, vinumq; superbibitur liberalius, & vomitus excitatur: eadem ad acrimonias esitatorum, valet, item rabidorum canum aliorumq; serpentium moribus utiliter applicatur.

Taurocolla, glutinum bubulum.

T A V R O C O L L A aliis xylocolla dicitur, ex boum coriis confecta, vim habet insigniter absterforiam, eoque aceto subacta, impetigines & summæ cutis lepras exterit ambustis, si aqua calida solvatur, inflammationem oboriri non finit: eadem oxymele soluta vulneribus accommodatur.

Tellinæ.

T E L L I N A E conditanæ crematæ, adurentem cinerem reddunt, qui cedrino liquori mistus euulsos radicitus palpebrarum pilos, si instilletur nasci iterum prohibet.

Terminthos, terebinthus,

T E R E B I N T H V S calefacit in ordine secundo, siccatur autem si viridis est in primo, si aridus secundo: fructus ubi inaruerit, ad tertium siccantium ordinem refertur. hac igitur ratione & urinam mouet, & lienes adiuvat.

Tettiges, cicadæ.

C I C A D A E crudæ siccatae ad colicum dolorem potui dantur aut tres, aut quinque, aut septem, cum totidem numero piperis granis. quidam tostas contra vesicæ dolores potui exhibent.

Teutlon beta.

B E T A nitrosam vim habet, qua abstergit, discutit, & per nareis purgat, sed alba elixa plenius, inflammationi arcendæ sit idonea, & modice discutit.

LIBER VII.

237

Teucrion.

TEUCRION calefacit in secundo, ficit in tertio ordine, vi incisoria tenuiq, lienibus medetur.

Tephra, cins.

CINIS non oīs idem exacte habet temperamentum, sed pro materiæ combustæ differentia euariat acerbarum sane arborum cinis nempe quercus & ilicis, astringendi vim non modicam obtinet, qua sanguinis eruptionem compescit, quum nullius alterius datur facultas: acrium vero, puta fici & tithymali cinis, acrior & magis deterforius efficitur.

Telephion.

TELEPHION in primo abscessu calefacit, secundo autem deficcat: est itidem absterforium, quapropter vlceribus putredinem ex pertis conuenit, & vitilignes, tum leucas, tum alphas cum aceto abolet.

Telis, scœnugrecum.

FOENVGRAECVM ex secundo ordine calidum est, e primo siccum, idcirco feruidas inflammationes irritat: minus autem calidas & induratas scirrhus magis discutiendo persanat.

Tithymalus, herba lactaria.

TITHYMALI omnes e quarto calfacientium ordine sunt acrimoniæ & validæ amaritudinis participes: sed radix quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta dentium erorum dolores finit: liquores vehementiore donati virtute, dentium cauis imponuntur, reliquum corpus si attingant, adurunt, quare etiam pilos modice delitos auferunt, item myrmecias, verrucas & huius generis alia tollit: & cutis labes abstergunt, maligna vlcera, & phagedænica, curant. Cæterum ex septenario ipsorum numero validissimi sunt, appellati characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur: hos sequitur qui verbasco similis est, & cyparissias, deinde paralius, quasi dicas maritimus, postremo helioscopius..

Titanus calx.

† **CALX** viua quidem vehementer adeo vrit, vt crustam inducat: restincta vero crusta quidem subito excitat, sed post diem vnum non amplius, calefacit tamen & consumit carnis: si lauetur, idq, aqua mariua, validas discutiendi vires acquirit.

† Hæc verba sic leguntur in veteribus libris, τίτανος ἢ μὲν ἄσβεστος καὶ σφοδρῶς, ὥστε καὶ ἐσχάρουν, σβενδῆσα δὲ παραχρῆμα καὶ ἐσχάρου, μετ' ἡμέρας δὲ οὐκ ἐτι θερμαίνει δ' ὅμως καὶ διατηρεῖ τὰς σάρκας, εἰ δὲ πλυθεῖν, ἀδνητὸ γίνεται, καὶ μάλιστα, εἰ πλεονάκεις πλυθεῖν, διαφορητικὴ δὲ ἱκανῶς γίνεται θαλάσῃ πλυθεῖσα. Id est Calx viua vrit multum, vt crustam inducat, extincta autem statim crustam efficit: sed post aliquot dies vis eius remittitur, calefacit ta-

PAULI AEGINETAE

men & tabefacit carnes: Si autem laetetur, sine morfu redditur, praefertim si sepius lota fuerit: marina vero aqua abluta vim digerendi habet. Quam esse huius loci veram scripturam, ex Galeno & Aetio facile intelligi potest.

Tragacantha.

TRAGACANTHA per similes gummi vires repraesentat.

Tragium.

TRACIVM frutex est in Creta lentisco similis, virtute calida in tertio abscessu, attractoria, discutiente, & tenui aculeos igitur educit, calculos comminuit, mensisq; citat, instar drachmae potum. Sed alterum tragium, hoc amarius est, scolopendrio asimile, nascitur multis in locis, tanta astringendi virtute praeditum, ut fluidis affectibus commode faciat.

Tragoriganum.

TRAGORIGANVM organi virtutes habet, & nonnullam etiam astrictionem.

Tribolos, tribulus.

TRIBVLVS mediocriter refrigerat sed terrestris siccando valentior est, aquaticus leuiter etiam humectat: uterq; contra inflammationum generationes, omnesq; influxus conuenit: terrestris fructus quum tenuis existat, renum calculos conterit.

Tragos fitodes, tragus frumentaceus.

TRAGVS frumentaceus zea respondet, sed difficilior in stomacho conficitur, & aluum emollit.

Trigle, mullus.

MVLVS piscis continue eius claritati oculorum nocet: crudus dissectus & impositus marini draconis, scorpionis, & araneorum moribus succurrit.

Tripolium.

TRIPOLI radix calida est in tertio abscessu & acris.

Triches, crines.

PILI combusti per similem lanis concrematis vim obtinent.

Trigon, pastinaca marina.

MARINAE pastinacae aculeus impactus denti infirmo, ipsum conterit excutitq;.

Tryx, fax.

FAEX vini ignem non experta compositis viribus constat, ut quae abunde deficcet discutiatq; astrictoria autem facultas ei ex vini unde confit specie, accedit: Utendum igitur est ea tum in humidioribus, tum in fluidis affectibus. phygethla discutit, lac, mammis eo refertis imposita, extinguit: cremata vero quam etiam spheclen appellant, adurentem vim acquirit, quapropter & medicamentis quae adurant, ipsam miscemus. vngueis igitur scabros cum resina eiicit pilos cum oleo lentiscino per noctem totam iuncta, flauos efficit.

LIBER VII.

238

Lota oculorum medicinis absterforis temperatur. Aceti sæx in omnibus valentior est iam dicta, magisque astringit.

Troglodytes, passer.

TROCLODITE S passer est omnium avium excepto regulo minimus, in sepibus potissimum degens, qui & tostus & crudus salsus manducatus renum calculos conterit: cremati ipsius cinis epotus, idem præstat.

Tyros, caseus.

CASEVS recēs & mollis repellēdi vī obtinet. leuiter refrigerans, quare & vulnera impositus conglutinat: at qui oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiam discussoriam modicam possidet, magisque vulnera conglutinat. vetustus, isque pinguis magis discutiendi virtutem præ se fert, qua articulariorū quoque tophis accommodatus est, præsertim cum suillæ carnis & salsæ & pinguis decocto.

Quæ ab Y incipiunt.

Hyacinthus.

HYACINTHI radix bulbi speciem repræsentans, primi in ficcando ordinis est, secundi refrigerando, pueros itaque impuberes diu conseruare cum vino inducta creditur. semen leuiter abstergit astringitque, idcirco arquatis cum vino datur, ut quod desiccet magis quam refrigeret.

Hyalos, vitrum.

VITRVM læue cum vino tenui & albo potum, vesicæ calculos comminuere dicitur.

Hydnon, tuber terræ

TVBER terræ terrestri constat substantia cum modica quadam virtute tenui.

Hydrargyros, argentum viuum.

ARGENTVM viuum in medicinæ vsum non adeo accommodatur, quod venenum repræsentet: nonnulli vero concrematum ipsum in cinerem, mixtumque aliis speciebus, colicis & iliois potioni exhibuerunt.

Hydropeperi, aquaticum piper.

HYDROPIPER, herbula est calida sed non piperis modo: viride cum semine suo inductum, sugillat, & tumores scirrhi duratos discutit.

Hydor, aqua.

AQVA præstantissima & alterius substantiæ expers, refrigerat, humectatque, ex peculiari sua natura: ubi autem ascititium calorem assumpserit, quamdiu eum seruat, calfacit frigida autem facta, se

PAVLI AEGINETAE

frigerat, Porro quæ nonnihil mixta est, vt nitrosa aut bituminosa, ad iunctæ substantiæ vneis acquirit. Pluvialis autem nonnihil etiam astrictionis habet, ob quam ocularijs miscetur medicinis. Qualem vero conveniat laudatissimam esse aquam, in primo libro comprehensum est.

Hyoscyamus, altercum, seu herba Apollinaris.

ALTERCVM cuius semen nigrum est, item cuius flavum, venenosum est: accommodatissimum vero curationibus, quod & semen & florem candidum habet ex tertio refrigerantium ordine.

Hypericum.

HYPERICVM duplex est alterum quod androsæmon & ascirrhon appellatur, expositum est: alterum vero calefacit & ficit, tenui substantia præditum, eoque urinas elicit, & menstrua citat, totum ipsius semen, quod si cum folijs inducatur viride, cicatricem vul-neribus obducit, † arida vero folia inspersa ulceribus medentur, dantur etiam potioni adversus coxarum dolores.

† Hic locus ita descriptus est in veteribus libris, ξηρά δὲ ἐμ-
παρόμενα τὰ πλασθεὰ τῶν ἐλκῶν ἰώνται, id est sicca autem in-
spersa, præhumida ulcera sanant. **Hypecoon.**

HYPECOON refrigerat in tertio ordine, papaveri viribus proximum.

Hypoglossum.

HYPOGLOSSON frutex pusillus est, cuius radix & suc-
cus emolliendi virtute pollent. **Hypocistis.**

HYPOCISTIS eorum quæ ad radices cisti & cistari appel-
lati subnascuntur, nempe cytinorum, succus est, medicamentum ad
omneis fluidos affectus efficacissimum, vt quod particulas ficit cor-
roboretque.

Hypophæston.

HYPOPHÆSTON species est spinæ fulloniæ, quemad-
modum & hippophaës, ex huius capitulo, folijs et radicibus, succus
expressus ficiturque trium obolorum pondere, cum mulla pituitam
& aquam euacuat, maxime cõgruit orthophnoeis, comitialibus, &
neruorum affectibus.

Hyssopum.

HYSSOPVM in tertio ordine & calefacit & deficcat, te-
nuisq; substantiæ est.

Quæ a Ph auspiciantur.

Phaci, lentes.

LENTEs in secundo ordine ficiant, medio caloris & frigi-
ditatis temperamento donatæ, sed astrictionis quoque nonnihil ha-
bent. Totum vero lentis corpus ficit, aluumq; fistit: decoctum

LIBER VII.

ipſius proritat, ideoq; prior aqua defunditur, quum comprimend
gratia lentes aſſumuntur.

Phacoſ, lenticula, paluſtris.

LENTICVLA paluſtris humectat refrigeratq; in ſecund
abſceſſu.

Phalaris.

PHALARIDIS ſuccus, folia & ſemen pota, veſicæ dolo-
ribus auxiliantur, habet eadem herba & tenuem quandam vim na-
turamq; calidam.

Phalangites.

PHALANGITES quod phalangiorum morſibus medea-
tur, nomen hoc inuenit: eſt & tenuis naturæ compos: qua torſio-
nibus circa umbilicum auxiliari putatur.

Phellos, ſuber.

SVBER, præſertim ex vinorum cadis, combuſtum, cinerem
reddit ſiccando vehementiſſimum, qui medicinis ad dyſenterias in-
ſcriptis adm ſceſur.

Philyras, tilia.

TILIAE arboris folia, ſylueſtri oleæ ſimiliter aſtringunt, qui-
bus commanducatis, oris vlcera iuuantur, eorumq; decocto colluun-
tur quod etiam potum & vrinam & menſeis trahit.

Phlomos, verbaſcum.

VERBASCI genera plura ſunt, inter quæ eſt & dicta trya-
lis: cæterum folia omnium ſiccantem & mediocriter aſtrictoriam
vim referunt: præcipue eius quod aurei coloris eſt, & quod acerbæ
ſint, fluidis conferunt affectibus: nonnulli & dentes ex eis colluunt.

Phoenix herba.

PHOENIX, alijs rhu herba eſt lolio conſimilis, aſtringendi
viribus donata, in vino auſtero pota, omneis fluidos affectus ſiſtit.

Phoenix arbor, palma.

PALMAE fructus qui iam ematurunt, calidus mediocriter
eſt, viſceribus roborandis & ſtomacho idoneus, tum intus aſſumptus,
tum foris applicatus: reliqua palmæ portio vehementer aſtringens
eſt, quam obrem ſtomachicis, & hepaticis medicinis temperatur: lon-
ge magis aſtringit quod fructus enaſcentis veluti inuolucrum eſt.

Phormion.

PHORMION tenuis, abſterſoriæ & attractricis facultatis
eſt: ſemen igitur cum melle albugines extenuat, & ſpicula e corpo-
ribus extrahit.

Phu.

PHV radicem habet nardi perſimilem, quæ tamen ad pleraque
infirmior ſit, ſed vrinas magis quam ea elicit, nardi gallicæ modo.

Phyllum, folium.

PHYLLON, Malabathri folium eſt, de quo in illius ca-
pite diximus.

PAULI AEGINETAE

Phycos, fucus.

PHYCOS refrigerat, siccatur in secundo abscessu, ac mediocriter etiam astringit.

Phylites.

PHYLITES cum acerba quadam prædita sit qualitate non immerito alui profluuijs pota auxiliatur.

Quæ a Chauspicantur.

Chalbane, galbanum.

GALBANVM calore tertium fere ordinem accedit, siccitate secundum, molliendi & discussoria vi donatum.

Chalcitis.

CHALCITIDIS vires astrictoræ, acres, adurentesque sunt, & crustam inducunt, tenuitate media inter misy & fori consistit: vsta tenuior redditur.

Chalcanton, atramentum sutorium.

CHALCANTHON aqua est in Cypri metallis coalescens, valentissimæ astrictionis cum calore non ignauo. quod omnium efficacissime humiditas carnis conseruat suo condimento deficcatur. longiore temporis processu in chalcitidem mutatur.

Chalcos, æs combustum.

AES combustum a cre quiddam habet & astrictionis particeps est, quapropter ad cicatricem vlcibus obducendam in siccioribus corporibus præstantissimum est: si eluatur, teneris vtilius est, quam illotum.

Chalcu anthos, æris flos.

AERIS flos tenuioris naturæ est, quam æs concrematum, eiusque squama: mixtus itaque collyrijs palpebrarum & asperitates, & fici extert.

Chamædrys.

CHAMÆDRYS in tertio ordine calefacit siccatur. lienes igitur consumit, vrinas & menstrua elicit, viscerum obstructions expurgat.

Chamæcissus, hedera terrestris.

HEDERÆ terrestris flos quum amarus insigniter existat, iecoris meatus aperit, item contra coxendicum dolores exhibet.

Chamæleuce.

CHAMÆLEUCE in tertio abscessu calefacit, in primo deficcatur.

Chamæleon.

CHAMÆLEONTIS nigri radix calefacit siccatur prope modum in tertio ordine, est & absterforæ facultatis particeps, qua cutis labe extert, item duos tumores dissipat emollitque, &

LIBER VII.

240

phagedænica vlcera admota in cataplasmate perfanat. si autem intra corpus sumatur, veneni loco est. Albi radix superiori proportionē respondet, sed amarior est: quæ si cum vino austero instar acetabuli bibatur, latas ventris tineas enecat facit etiam ad aquā inter cutem.

Chamæmelon.

CHAMÆMELON siue anthemis calefacit siccatur in primo abscessu, præterea virtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata constat.

Chamæpitys.

CHAMÆPITYS secundo gradu calefacit, tertio deficiat: quam ob causam & purgare & abstergere viscera, potissimum iecur potest, item vrinas mensisq; trahit, magna vulnera conglutinat, putredinem expertis medetur, duritias discutit: decoctum ipsius etiam coxendicum doloribus salutare est.

Chamædrops.

CHAMÆDROPS, quidam & hoc chamedryn vocant, alijs etiam teucrion, viribus chamedryi respondet.

Chamælyce, humilis ficus.

CHAMÆSICE absterforia & acri facultate pollet: quapropter & furculi ipsius & liquor myrmecias, verrucasq; abolent, crassas oculorum cicatrices cum melle abstergunt, hebetudini, & suffusioni incipienti medentur.

Chamælea, oleago.

OLEAGO absterforia facultate, sordida vlcera & crustas cum melle purgat.

Chelidonium, herba hirundinaria.

CHELIDONIUM in tertio ordine calefacit, valenterq; abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est: radix arquat cum vino & aniso pota, obstructione liberat: manducata dentium doloribus auxiliatur. Minus chelidonium quarto calefacientium ordini ascriptum, acrius est, vt inductum cutem exulceret: vngueis scabiosos eicit: succus autem ipsius per nareis purgat.

Chelidones, hirundines.

HIRVNDINUM crematarum cinis cum melle illitus, anginarum inflammationes perfanat: idem oculorum claritati benefacit.

Chole, fel.

FEL omnium aliorum animantis humorum calidissimum est, colore tamen inter se differt: siquidem quod flauum, pallido calidius: & flauo, æruginosum: præterea variat p animantium quæ id habet ratione, quatenus suillum omnibus alijs infirmius est, eoq; citra rosionem aurium vlceribus medetur. Ouillum maioris acrimoniæ est quam suillum, & ouillo caprillum efficacius, caprino æqualia visio-

PAULI AEGINETAE

um & boum existunt. taurinum vehementius: hoc, fel hyæne superat, rursus hyæna vincitur a pisce callionymo dicto, & scorpione, cuius animantis fel suffusionibus oculorum, hebetudini, & albuginibus accommodatur: item marinæ hirundinis. at capræ sylvestris fel etiam lusciosis conferre dicitur. cæterum omnium volucrum fel, tum acrius, tum siccando vehementius est quam quadrupedum: inter has ipsas autem gallorum & perdicum alijs est præstantius accipitrum & aquilarum acrimonia & rosione quodammodo superat, æruginoso colore, nonnunquam etiam nigro.

Chondrilla.

CHONDRILLA intybi species subamara gustu est, propterea etiam maiorem siccandi vim quam illa obtinet.

Chondrus.

CHONDROVS tritico persimilis est, nisi quod glutinosior.

Chrysocolla.

CHRYSOCOLLA altera in metallis reperitur, altera in rubri æris pyla ac tali pistillo in vrina pueri venerem non experti, sub caniculæ ætate contrita, præparatur. hæc igitur abstergit, discussoria, siccanteq; vi prædita maiore, quam ea quæ in metallis inuenitur, ut etiam carnem absumat citra rosionem: ob quod vlcerebus maleficis accommodata est: concremata vero minus erodet.

Chrysocome.

CHRYSOCOMAE, quæ etiam chrysitis dicitur, radix acris simul & astringente vi existit: quare non multi in medicina vsus est, quanquam peripneumonici & iocinorosis, in mulso elixa exhibeatur: cæterum mensis educit.

Quæ a Psordiuntur.

Pseudobunium.

PSEUDOBVNIVM bunij speciem repræsentat, calefacit, discutit & abstergit: torsiones igitur circa vmbilicum, stillicidia & laterum dolores soluit: strumas etiam cū sale & vino inductum difficit.

Pseudodictamnion.

PSEVDODICTAMNON imbecillis dictamni vires habet.

Psimythion, cerusa.

CERVSA refrigerat & opplet.

Psyllium, herba pulicaris.

HERBAE publicaris semen secundi refrigerantium ordinis habetur, siccando humectandoq; medium est.

Psoricon.

LIBER VII.

Psoricon.

248

PSORICON, chalcitide duplicata, argenti spumæ mixta, efficitur vtriusq; tamen aceto prius detritis, ac in recentem ollam cōiectis, quæ diebus quadraginta sub fimo delitescet: sic enim maiore siccandi vim, tenuiorem & minus rodentem quam chalcitis, acquireret.

Quæ ab O magno incipiunt.

Oon, ouum.

OVI candidum & tenue, nullius plane rosionis compos, medio criter refrigerat. vtendum igitur eo in oculis, pudendorum vlcerebus, aliisq; omnibus malignis. miscetur etiam medicamentis emplasticis, quæ sanguinem suprimunt: luteum vero pari facultate præditum medicamentis temperatur ad inflammationem arcendam efficacibus: tostum vero magis siccet, minus lenit. Porro totum ouum aceto incoctum si assumatur, ventris fluxiones desiccet: si acerbum aliquod adiunxeris, vt, gallam, aut rhum, aut balauftium, ac frixeris, multo redditur efficacius: ambustis autem crudum impositum, protinus auxiliatur. Sorbile assumptum, pectoris vitia concoquit lenitq; & arteriæ asperitates leuigat. Præponetur autem recens veteri & gallinaceum reliquorum animantium ouis.

Ocimum.

OCIMUM secundo calefacientium ordini ascribitur: habet & humiditatem quandam excrementiam, propter quam neq; vtile est intus assumptum: extrinsecus autem inductum discutit, & concoquit.

Ocimoïdes.

OCIMOIDES, nonnulli philæterion nuncupant, inutilis quidem radix est: semen vero tenue est, & sine rosione siccet.

De medicamentis simplicibus quæ flauæ bili purgandæ sunt.

Cap. iiii

ALoës drachmā cum aqua mulsā mane datur. qui vespere eam exhibent, aut secundum cibum, noxam inferunt, quippe alimentū in membra digerit, flauam bilem vacuat minus, trium obolorum instar assumpta, vt quæ crassiora tantum excrementa abunde educat. Cæterum quum omnia purgantia medicamina stomacho aduersentur, sola aloë conducit. qui vero amaritudinem eius non sustinent, in catapotia coactum assument. Sciendum vero est, medicamenta ea non simplici quodam temperamento verbi gratia, caliditate purgare, (omnia siquidem calida, quale piper est, vacuationem molirentur) verum totius substantiæ proprietate, quo modo la-

Hh

PAULI AEGINETAE

pis magnes ferrum attrahere demonstratus est. Porro ex purgantium medicaminum numero ea quæ ventrem duntaxat emolliunt, primo libro sunt exposita: efficacioribus autem utimur vel ad materiam deriuandam, vel ad affectum induratum agitandum remouendumque, aut ad corpus reficiendum, mutandumque ipsius temperamentum, aut ad noxium humorem eliciendum. Iam vero sunt nonnulli etiam mixti ex prædictis modi, inuicem connexi. Cæterum purgationibus hos uti conuenit qui viribus pollent, & mente constant, primosque ætatis limites euaserunt, nondum vero ad extremos perueniunt, item qui stomacho robusto sunt, & copiosam materiam inutilem in corpore collegerunt, non multi adeo sanguinis compotes. Tempus autem purgationis, si nulla urgeat necessitas, verum maxime & autumnale opportunum est. Quæ bilem vacuent.

Q V AE bilem educunt, quouis anni tempore præterquam in hyeme recte usurpantur: ætate vero florida, & declinante: habitu sicco, musculofo, nigri coloris, vel rubri: viris magis quam mulieribus: item in quibus cibi continue corrumpuntur, aluus astricta est, amara bilis redundat, iracundis, paucam urinam reddentibus, cibo vvis sicco & calido. in affectibus, arquato, iecoris imbecillitate, pleuritide, phrenitide, angina, insania, cephalæa, lippitudine, erysipelate, lepra, febri, & quibus bilis superat. Datur aloë capite grauatis, lippientibus, siticulosis, & qui per somnum imaginibus torquentur sine febri, adhæc qui horroris discursum in corpore sentiunt, status acreis ædunt, intestinis roduntur, quibus stomachus in modice æstuat, aut nausea humoribus os eius rodentibus eueritur: postremo, quibus ob recrementorum abundantiam clyster nequit iniici: abunde siquidem inanit, sic ut totum corpus non commoueat, nisi copiosa admodum fuerit exhibita: bilem autem intestinis, aluo & stomacho inhaerentem educat. Veratrum conuenit & acuto & longo morbo laborantibus, qui medicamentum bili ducendæ idoneum requirunt, quales sunt qui insania, altera capitis parte (heterocranici dicuntur) humorum impetu in oculis decumbente, & pectoris affectibus torquentur: accommodatissimum est visceribus, vteri & vesicæ vitis medicinam requirentibus. Laudatur etiam ad longam asperæ arteriæ affectionem, arquatum, eruptiones quæ exanthemata dicuntur, impetigines, vel herpetas, vel erysipelata vel lepras. Veratrum nigrum bilem flauam potissimum e toto corpore citra molestiam educit, quam ob causam iis qui non grauius febricitant, magisque febri carentibus instar drachmæ exhibetur radicibus in mulla & aqua maceratis, aut cum melle catapotiorum modo verum ita exhibetur, ut ieiunium præcesserit. Sunt qui

misceant ei pulegium, vel saturiam, vel aliquod ex iis quæ subito
 transeunt, stomacho non inimica. Scammonia perinde ut veratrum
 purgat, magis flavam bilem: cæterum inter omnia quæ purgatio-
 nem moliuntur aduersissima stomacho est. datur igitur iis qui fe-
 bri carent & stomacho sunt meliori, ad pondus quatuor obo-
 lorum cum sale aut pipere, aut zingibere, aut quodam stoma-
 cho utili, quod protinus corpus permeet, aut etiam cum melle:
 item cum gummi quoque sunt catapotia. Colocynthis, hoc est,
 cucurbitæ sylvestris medulla bilem potissimum vacuat, & mucosa
 non a sanguine tantum trahit, quemadmodum veratrum & scam-
 monia, sed etiam a nervis & nervosis partibus instar drachmæ in
 aquæ mulsæ cyathis duobus, quibus & ruta incocta sit, epota: læui-
 getur autem accurate, quoniam asperitates ipsius interaneis adhæren-
 tes, vlcera concitant, & nervos consortij lege afficiunt. Exhibetur re-
 cte, capite dolentibus, nempe quum cerebri membrana, vel ea quæ
 calvariam cingit, vitata fuerit, ut, vertiginosis, heterocranicis, cepha-
 læa infestatis, comitialibus, apoplecticis, convulsis, ut in vtramlibet
 partem deprauata sit facies, qui cynicus spasmus dicitur, diuturno
 in oculos fluxu vexatis, orthopnoicis, suspiriosis, vetusta tussi con-
 stantibus, præterea iis quos articuli dolores, & renū aut vesicæ
 affectus male habent. Elaterium scammonia, modo euacuat, deli-
 gendum vero porraceum, leue, & anno non vestustius, triobolarū
 pondere cum lactis hemina læuigatum exhibetur. Tithyma-
 lus bilem elicit, non aliter quam elaterium & scammonia. dantur
 liquoris guttæ quatuor aut quinque cum polenta macerata, quæ sta-
 tim deglutientur. Nam in ore diu retentæ, linguam exulcerant, eiusque
 viciniam. Lathyrides bilem purgant sicut veratrum & scam-
 monia: offerentur igitur septem octo ve, & usque ad quindecim
 robustis sane & qui liberaliore indigent purgatione, mandu-
 cari præcipe, imbecillioribus & malo præditis stomacho, in-
 tegras ipsas deuorare. Peplii turionum qui semper sicci existunt,
 instar octo obolorum in mulsæ datum bilem educit, veratrum mo-
 do. & flatus difficit. Agaricum simileis cucurbitæ sylvestris vi-
 teis habet, tardum ad functionem obeundam, non autem stoma-
 cho admodum inimicum: datur læuigatum drachmis duabus cum
 mulsæ, sit autem albissimum, vehementer fragile, non adeo ligno-
 sum, neque teredinibus obnoxium. Iris Illirica simili modo
 purgat octo obolorum instar ex mulsæ assumpta. Sit autem
 nec vetusta, nec teredines experta. Centaurium minus bili &
 mucis purgandis aptum, coxendicum doloribus peculiariter con-
 tinent: iis ipsius drachmæ & semissis pondere in aquæ hemina de-

PAULI AEGINETAE

cocti ad dimidias bibitur. Tragoriani flos cum semine instar duarum drachmarum ex mulla datur, quibus etiam veratrum nigrum, verum flos ille, gravior quidem stomacho existit quam veratrum, minus autem purgat. Chamælaeæ drachmæ quatuor in mullæ heminis duabus ad quartas decoctæ, perinde ut veratrum, purgant. Nonnulli vero chamælaeæ & absinthij dupla portione catapotia fiunt exhibentq̃. Aristolochiæ clematidis, hoc est sarmentariæ seminis drachma in mulla pota, colocynthidis more purgat. Polypodij radix arida, si lævis mullæ inspergatur, aut cum ea conteratur, eundem quem colocynthidis effectum præstat.

Quæ bilem atram vacuent.

MEDICAMENTIS atram bilem ducentibus utemur præcipue in melancholicis, furibundis, iracundis, hominum confortia exosis, aut secessu gaudentibus, item in his qui dum a morbo reficiuntur, purgationem desiderant, autumno feruidiore, habitu sicco & parum musculofo. Epithymum laudatissimum est remedium inter ea quæ atræ bili vacuandæ sunt. dantur ipsius drachmæ quinque leuigatæ ex lactis hemina. Epithymum quod thymbræ suæ pernasceatur, ut epithymum similiter euacuat, sed imbecillius est. Pulegium atram ducit bilem instar acetabuli in mulla potum. Tragorigani heracleotici idem modus, uti pulegium vacuat, cæterum ambo desiccant. Alypi semen inferius atram purgare bilem pari epithymo mensura cum sale & aceto dictum est, intestina vero si fidei Dioscoridi accommodamus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio, quæ nunc alypias vocatur, exhiberi debet in mulla. Parthenium similiter siccum si potetur, eadem solet extrahere. Alysson cum sale epotum non aliter quam superiora expurgat.

Quæ pituitæ vacuandæ sint.

EORVM quæ pituitam educunt usus est in habitu frigidiore & senio confectis perq̃ hyemem, in resolutis, apoplecticis, inturgescuntibus tumore laxo fungosoq̃, quod oedema dicunt, insuper in his qui multum pituitæ in ventriculo, aut pectore, aut stomacho collegerunt, & in mulierum fluore, congruunt etiam copiosa emungentibus, crassa excreantibus, fastidiosis, & coxendicium cruciatu detentis, quum mucis articulis incubuerint, aut elephantice; maxime autem conueniunt iis qui aqua inter cutem laborant, cui nomen est anasarca. Syracis albi drachmæ pondus cum resina terbinthina æquali modo deuoratum, pituitam euacuat. Oleæ radicis cortex drachmæ instar cum vino aut aqua. Pyrethri oboli nouem ex aqua. Lychnidis seminis drachmæ duæ. Ciclamini radicis drachma cum hydromelite. Scordij drachmæ duæ

cum melle. Chamæpytis in pollinem detrita, exhibitæ in catapotis. Squamæ Cypriæ drachma semis cū resina pari in catapotis valentius purgat pituitam. Lauri foliorū viridium sesquidrachma.

Cucumeris sylvestris radicis corticis oboli duo. Ricini grana quadraginta, crotones dicti, putaminibus detractis eduntur, similemque effectum præstant. Apii dimidium quod ad radicem est manducatum: nonnulli id chamæraphanon appellant, hoc est, humilem raphanum. Bdelli drachmæ duæ ex hydromelite. Peculiariter autem gummi oculis defluentibus idoneum.

Quæ aquam educant.

AQUAM elicientibus vti convenit in his quos aqua subter cutem, ab vtre ascites dicta, male habet, in mulieribus albo fluore infestatis, item in iis quos vlcera fluida torquent. Squamæ Cypriæ drachma cum mulsa pota aquam educit: aceti vero momentum superforbere oportet, ne per vomitum reddat. Coccum gnidium cortice detracto læue cum melle cocto potum ne fauces attingat, aquas trahit, dantur autem grana aut viginti, aut vigintiquinque, aut triginta: valētioribus quadraginta. Euphorbiæ drachma cum melle cocto pota pituitam emolitur, magis autem aquas. Lonchitidis seminis oboli octo cum mulsa aquas purgant. Cnecron similitet aquas trahit cum polenta potum. Cnici seminis drachmæ quinque læuigatæ ptisanæ incoquantur cum salis momento, sorbenturque. Ammoniaci suffiminis drachma in mulsa pota aquam educit. Nonnulli vero lienosis id cum posca exhibent. Sambuci corticis radicis succus instar vnciarum duarum potus cum vino aquas educit.

De compositis medicamentis purgantibus.

Cap. v.

Catapota ex aloë.

Colocynthidis medullæ pars vna, absinthii succi pars vna aloës partes duæ, scammonie partes duæ: ex aqua granula ad erui magnitudinem finguntur, dantur vndecim numero.

Oxymeli Iuliani.

RVTAE, origani, singulorum quadrans, thymi comæ triens, anethi sescuncia, iridis vncia, mandragoræ radicis sescuncia, agarici sextans, tedarum pinguium vnciæ duodecim, cocci gnidii triens, lathyridum, alypiadis, singulorum quadrans, polypodii sextans, phylli, costi, spicæ nardi singulorum vncia, rheupontici sescuncia, scillæ, sambuci turionum, canopi, (qui est sambuci cortex) singulorum quadrans, asari vncia, pulegii quadrans, epithymi, veratri, aceri, singulorum sextans, si, amomi, hyperici, cumini, singulæ vnciæ, anisi sextans, acetosarii decem, mellis sextarii quinque: herbæ per triduum in aceto

H h iij

PAULI AEGINETAE

malescunt, deinde excoctis dum amplius dimidio consumptum fuerit, mel adicitur: ubi unita fuerint, & illis abiectis admiscetur la-
thyrides, costus, coccum gnidium, spica nardi læuigata, & si voles
postquam perfecte coctum fuerit oxymel, illa impones. Modus sum-
mus est vncia, aut pro virium ratione: benefacit podagricis affecti-
bus & comitialibus, ac in quibus vacuare simul & crassos humores
educere opus est.

Purgatio ad ducendum aquas quæ constat caryophyllo.

Aloës, epithymi, caryophylli, cocci gnidii, petroselini, rheupon-
tici, singulæ semunciae, euphorbii scrupuli quatuor, mellis quod satis
est, datur cochlearis mensura.

Purgatio ex rhodomelite confecta, Alexandri.

ROSARVM succi sextarii duo, mellis sextarius, scammo-
niae vnciae quatuor. summus modus est quinque cochlearia: leuior,
duo: medius tria. ALITER Mellis libra, rosarum succi libra, pi-
peris drachmæ duæ, scammoniae drachmæ octo, mastiches drachmæ
quatuor, zingiberis drachmæ duæ. ALIO modo, quo ego vtor,
Spicae nardi, asari, epithymi, singulorum semuncia: macerant in aquæ he-
mina per triduum: ubi mediocriter incoxeris, misceto aquæ rosarum
succi sextarii dimidium, mellis tantundem. Postquam ad usque spissi-
tudinem fuerint incocta, scammoniae fescuncia admiscetur.

Purgatio ex malis cotoneis.

MALORVM cotoneorum tostorum vnciae quatuor, pipe-
ris vnciae sex, scammoniae drachma, mellis vnciae quinque: trita ex-
hibentur cochleario instar vnciae, aut pro viribus.

Compositio dia citrii, quod est, ex malo me-
dico, stomacho utilis.

MALI medici corticis carnisque pondo in aquæ sextario vno
& dimidio ad tertias decoquitur, mellis sextarius dimidias adicitur:
ubi mellis spissitudinem ex coctione acceperint, inspergitur læuigati
piperis longi vncia, scammoniae tostæ in fermento tantundem.

Bucellatus purgans.

SCAMMONIAE tostæ vncia, piperis, apii seminis, singu-
lorum scrupulum, feniculi, anisi, singulæ vnciae, mellis libra: tosta
mediocriter instar vnciae dantur in condito.

Oliuæ purgantes.

SCAMMONIAE vncia, piperis tantundem, epithymi, cu-
mini torrefacti, petroselini rutæ, foliorum menthæ viridis, singulorum
drachmæ quatuor, laserpitii drachma, palmularum vnciae quinque
mellis tantundem, aceti heminae duæ, oliuarum colymbadum sexta-
rius, scissarum videlicet: quidam & gari momentum addunt. Mo-

us est quinque scrupula aut septem aut nouem.

Pastillus purgans.

SCAMMONIÆ drachmæ quatuor, euphorbii tñdem, phylli, piperis, singulorū drachmæ duæ, mellis libra dat̃ instar vnciæ.

Fulca purgans, & stomacho grata.

CVMINI, sceniculi singulorum vncia, pulegii, apii, anisi, singulorum semuncia, epithymi, scammonix, singulorum vncia, salis vnciæ duæ. Summus modus datur scrupulis duobus in posca, nonnulli etiam euphorbii scrupula quatuor adiciunt.

Vinum purgans in hydropicis.

SCILLÆ tres vnciæ, apii seminis vnciæ sex, piperis drachma, capparis radices drachmæ quatuor, cocci gnidii cortice exuti drachma, folii malabathri galbuli duo, vini heminæ duodecim, mellis sextarii tres: scilla contusa vino superfunditur, reliqua læuigata miscentur.

Halatia, quasi dicas ex sale confecta, purgatio.

SALIS communis torrefacti drachmæ sex, apii seminis, zingiberis, panis ficci, singulorum scrupula sex, anisi, piperis singulorum semuncia, scammonix, epithymi, singulorum vncia, datur circiter cochleare.

Compositio dia Hermodactyli, ad podagram.

HERMODACTYLI quadrās, anisi, cumini æthiopici, ameos, thymi summitatum, piperis albi, zingiberis, singulorum scrupula tria, epithymi semuncia exhibentur scrupulis quatuor. quidam scrupula sex dant mane cum condito, aut mulla, aut aqua calida.

ALITER eadem purgatio. Hermodactyli vncia, cumini æthiopici, anisi, agarici, zingiberis, singulorum scrupula sex, mastichæ, spicæ nardi, singulorum scrupula duo, musci filiqua, cnici scrupula, duo, datur quatuor scrupulis cum hydromelo, Scammoniam, quod stomacho sit inutilis, auersamur. Si autem liberaliore vacuatione opus sit, scammonix filiquas treis mensuræ admiscebis: loto exhibetur.

Catapotia, quæ constant lapide armenico, arthriticis potissimum exhibenda.

ALOES vnciæ quatuor, scammonix semuncia, agarici vncia, epithymi tantundem, lapidis armenici scrupula duodecim, cassiæ vncia, spicæ nardi vncia, scillæ tostiæ sextans, croci scrupula duodecim: rhodomelite excepta duobus scrupulis exhibentur.

Compositio dia Coronopodii, ad eadem efficacem, ad quæ ex Hermodactylo confecta, stomacho utilis.

ZINGIBERIS scrupula duo, piperis scrupulum, agarici

H h iiii

PAULI AEGINETAE

scrupula decem, cnici partis interioris scrupula quatuor, coronopodii radicis scrupula sex. dantur scrupula tria: quibus alius est difficilis filiquæ viginti tres, quæ faciunt omnino obolos septem, aut fere octo. ubi venter inanitus est, ad lauacrum duces, inde ouis & pane enutries.

Medicamentum ex Cyrenaico liquore ad febrem quartanam.

LACTIS cyrenaici, piperis, zingiberis, rutæ foliorum, singulæ drachmæ. datur ad nucis auellanæ magnitudinem.

Puls ad purgandum, tumoribus laxis, & elephanticis singulariter efficax, & in quibus humorem crassum glutinosumque enoliri voles.

CUCURBITIS duabus sylvestribus circumcisis semen eximetur, interiore ipsarum carne relicta, dulci oleo ipsas replebis, & proprijs operculis obtectas pernoctare fines, in sequenti die vacuato oleo cucurbitas in aqua decoques dum tabescant, deinde ipsis proiectis oleo aquæ temperato nigri veratri triobolum adiunges, scammonia drachmam: ubi iam cum his puliculam e similia, aut panem fsecum læuigatum incoxeris, inde ægroto dabis tenui pridie vso vinctu, ad nucum auellanarum, octo aut decem, aut plurimum quatuordecim magnitudinem, & portioni aquam calidam exhiberis.

Quomodo eos qui purgantur tueri conueniat, quidque faciundum ubi medicamentum purgans assumptum nihil profecerit. Cap. vi.

Summatim in omni purgatione efficaci, medicamentum homini quem certa prius victus ratione alueris, ieiunio & concoctione obita trades, ac a somno quo ad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu abstinere vsque ad consummatam purgationem compelles.

Ex commentarijs Philagri.

AT si in ediam non tulerit, aut quod ventriculi os ad bilem contrahendam expeditum ex longa penuria præcedente habeat, aut alia eiusmodi de causa dabitur ipsi panis ex vino aquoso, aut ptisanæ cremor aut chondri, idque nondum incepta vacuatione, (vt ne cibus corrumpatur) sed protinus ubi medicamentum fuerit epotum, sic enim nonnunquam ad celerem medicaminis motionem pondere suo opitulatur. Si vero quocunque medicamento ad aluum emolliendam assumpto quis non purgetur, neque vacuetur, nullo accedente periculo nihil moliendum est. At si magnitudo morbi virgeat, aut æger vellicetur, distendatur, & lancinationem expertus fuerit, clyster statim necessario iniicitur. Si ne sic quidem venter respondeat, corpore ro-

tionem & veluti euerfionem fuficiente, lauare liberaliter inungendo oportet vbi repletum eft grauaturq; fanguinis dimiffio cōgruet, præfertim vbi multi compos fanguinis homo fuerit, oculos rubros habeat, & emiffitios, non ex natura, fed acquifito ex medicaminis portione. Vbi horum nihil infestat, fed morfus & vellicatus affligit, a balneo cibum protinus offeres, vinum liberalius potui dabis, atque interea clyfterem inferes, nifi fubfiftat cruciatus, rufusq; lauabis. Efto autem oleum quod in aluum dabis rutaceum, aut ex alio quopiam flatus experte præparatum.

Si purgatio modum excedat. Cap. vii.

Si purgatio maior fit impendio, cutis infricari debet, & lauari calida: ante balneum vinum tenue, fuluum & flauum dari, tale fiquidem celeberrime in totum corpus diftribuitur: item panis ex eo madens, & malum punicum. Quod fi euacuatio perfeueret, artus vinctulis excipientur, quæ e fummo deorfum diftributa, constringant, & nonnihil fanguinis & fpiritus excipiant: dabiturq; potui theriaces ex carnibus viperarum momentum. deducit enim in cutem fubitoq; reuellit humorum in ventriculum confluentem, obtunditq; medicinæ purgantis quod ceu virofum eft & medicatum. huius penuria paffilos theriacos, præterea cōpofitionem diaspematon, & Philonium appellatam: imo etiam cucurbitulis fupra ftomachum, & cataplafmatis ex polenta & mulfo vti prodeft, deinde epithematis astringentibus: maxime vero ex totius corporis friftione, & medicaminum potu, adiuuantur. Aer ipsis vitandus qui frigidus nimium aut calidus exiftat: ille fiquidem materiam a foris intro compellit, fluoremq; augeat: hic difcutit, & vireis refoluit. At fi eft ex inteftinorum quæ medicamento irritantur, erofione, vacuatio augeatur cataplafmatis obducere commemorata oportet, & in aluum dare quæ acrimoniam retundunt, adipem anferinum fcilicet, vinum dulce, nardum, & confimilia.

De Hieris antidotis.

Cap. viij.

Hiera Antiochi.

Chamædryos, agarici, colocynthidis medullæ, ftoechados, fingulorum drachmæ decem, opopanacis, fagapeni, petrofelini, ariftolochiæ farmentacæ, piperis albi, fingulorum drachmæ quinque, cinnamomi, fpicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, croci foliorum, fingulorum drachmæ quatuor, mellis quod fatis eft, **A L I T E R.** Colocynthidis carnis drachmæ viginti, fcillæ toftæ, agarici, ammoniaci thymiamatis, veratri nigri corticis, scammonix, hyperici, fingulorum drachmæ tres, epithymi, polypodij aridi, bdellij, aloës, chamædryos, marrubij, calsiæ, fingulorum drachmæ octo, myrrhæ troglo-

PAULI AEGINETAE

dytidis, opopanax, sagapeni, petroselin, piperis communis & longi & albi, cinnamomi, croci, castorei, aristolochiae longae, singulorum drachmae quatuor, mellis quod sufficit.

Hiera Iusti.

EPITHYMI drachmae duodecim, matrubi, stoechados, chamædryos, veratri nigri, scammoniae, agarici, piperis longi, scillae tosta, singulorum drachmae sedecim, euphorbi, colocyntidis carnis, aloes, croci, gentianae, petroselin, guttae ammoniaci, sagapeni, singulorum drachmae octo, opopanax, polii, cinnamomi, myrrhae, spicae nardi, iunci odorati floris, pulegii, singulorum drachmae quatuor, aristolochiae longae & rotundae, vtriusque drachmae duae, mellis quod satis est: datur scrupulis duobus, aut tribus, aut quatuor cum mulla & sale.

Hiera Galeni.

CHAMÆDRYOS, piperis longi, piperis albi, stoechados, veratri nigri, scammoniae, spicae nardi, scillae tosta, (nonnulli etiam epithymi) singulorum drachmae sedecim, myrrhae, croci, ammoniaci suffiminis, euphorbi, singulorum drachmae octo: excipiuntur melle.

Hiera Rufi.

CVCVRBITAE sylvestris, quae sicyonia vel colocynthis dicitur carnis, drachmae octo, chamædryos drachmae decem, sagapeni drachmae octo, petroselin, aristolochiae rotundae, piperis albi, singulorum drachmae quinq, cinnamomi drachmae quatuor, vel cassiae octo, spicae, croci, polii, myrrhae, singulorum drachmae quatuor, mellis quod satis est.

Hiera Archigenis.

MARRUBII, agarici, chamædryos, colocyntidis carnis, stoechados, singulorum drachmae decem, opopanax, sagapeni, petroselin, aristolochiae rotundae, piperis albi, singulorum drachmae quinq, cinnamomi, spicae nardi, myrrhae, polii, croci, singulorum drachmae quatuor. arida tunduntur simul & incernuntur: opopanax autem, sagapenum, & myrrha contusa, mulla per noctem vnam in pila macerantur: deinde læuigant, & sicca his admiscunt melle optimo excepta reponuntur in vitreo vase aut plumbeo. hæc ratio omnium hierarum communis est. Summus ipsarum modus est drachmae duae: assumatur & salis drachma, mellis heminae duae, aquae quantum satis est. Quod si vehementiores ad purgandum voles efficere, quibus scammonia non inest, iniicietur, & his singulis ex illa obolus.

Quæ sedi & vmbilico illata purgent. Cap. ix.

Illitio sedis ad flatum excutiendos.

RVta cum melle in tenuissimum pollinem redigitur, vt vnus succus fiat, & penitissime intra sedem delinitur. Efficacissimum.

vero est si cumini momentu & nitri assumat, vel cyclamini succum; stappa exceptum imponitur, aut glandis forma melle appposito, flatus siquidem multi erumpunt, v. ventrem leuantes.

Perunctio sedis ventrem mouens, Chezanance.

ALV MEN cum melle læuigatum coquitur quoad fuluura reddatur, atque hoc sedes perungitur, facile enim copiosa citra laborem subducit.

Medicamentum quod vmbilico illinitur epomphalium.

dictum, ad aluum subducendam.

CYCLAMINI drachmæ quatuor, nitri drachmæ tres, veratri nigri & albi, singulorum drachmæ duæ, colocynthidis drachmæ tres, scammonix drachmæ duæ, elaterij succi drachmæ quatuor, cocci gnidij totidem, caricarum pinguium vnciæ duæ, fellis taurini vncia.

Aliud laudatissimum.

ELATERII, lathyridis, galbani, cyclamini, veratri nigri, singulorum drachmæ quatuor, colocynthidis carnis drachmæ octo, cucumeris syluatici recentis, scammonix, cocci gnidij, tithymali, singulorum drachmæ duæ, terebinthinæ drachmæ tres excipito hæc felle taurino, & vnguinis modo vtitor. Quidā vero adiungentes faui vncias septem & sicyonij quod satis est, emplastri modo imposuerunt.

Quæ medicamenta vomitum citent, & quomodo veratrum exhibeatur.

Cap. x.

Vomitum vtuntur & sani, qui ciborum humorum v. copia grauantur; & acuto morbo laborantes quum a pituita aut eiusmodi quodam infestantur. At medicamentis vomitum facientibus neque sani, neque acuta ægritudine occupati, vti permittentur; sed in longis profunt affectibus & præsertim induratis, quæ validam comotionem desideret, qualis est podagra, morbus comitialis a stomacho origine trahens, elephantia, aqua subter cutem, melancholia, & per similes. Aduersatur vomitus sanguinem excreantibus, malo præditis stomacho, & iis qui suffocationibus opportuni sunt. Promptissimum igitur ad vomitum ciendum est Cyprinum, digitis aut pinnis in id intinctis, de missisq; in guttur, item nardi gallicæ radicum drachmæ septem ex mulsa potæ sursum valenter purgant: similiter etiam radicum betonicæ, quæ cestron dicit, quinq; aut sex drachmæ cum mulsa sumptæ & daphnoïdis tria folia viridia in læuorem coacta comectaq;. Itē elaterij obolus in aqua assumptus, sursum pituitam & bilem expurgat: & herbæ pediculariæ grana quindecim cum mulsa crassiore, ex bulbis aut q; manducari solēt, si crudi assumant. Narcissi autem elixi sursum per vomitum purgant. idem facit apij radicis pars superior aeri proprior comesta, vocant eam nonnulli chamæraphanon, in?

PAULI AEGINETAE

ferior autem pars per inferna purgat, tota vero sumpta vtriusq; raphani prædictis minus quidem purgant, sed vtilius: cæterum conuenit ipsas acris & recetis adhuc minutim cõcisas, ante duas tres ve horas in oxymelite maceratas quam fieri potest multas, assumere, ter quater ve a coena vomitu excitato: semel autem ieiuni voment, & sæpe oxymel absorbeunt: vbi duabus horis inambulauerint, egelidam bibentes aquam, digitis aut pinnis in os demissis voment.

Quibus modis veratrum exhibeatur.

VERATRUM dari debet, vbi longi valētesq; morbi sunt, & spes ex alijs præfidijs adempta est, quod ægritudo omnibus ipsis fortior extiterit. Cõueniet autem siue continue infestauerit morbus, vt aqua inter cutem, elephantia, malus corporis habitus, resolutio, & id genus alia: siue statis temporibus repetat, vt morbus comitialis podagra. Porro quum plures hellebori exhibendi modi existant, simplicior quidem & præparatio potius ad id assumendum, talis est. Raphano arundine compuncto dissectoq; veratri albi optimi radicem præsegmina inferuntur: ac vbi vna nocte in eo permanserint, præiiciuntur: raphanus minutim cõcisus, cum oxymelite in dictum modum ægro exhibetur, nimirum vomitionibus assueto, atque is horis quot diximus interpositis ad vomitum cogendus est. At proprius veratri exhibendi modus hic fuerit. Veratri optimi sextans in aquæ hemina diebus quinque maceratus, ad aquæ tertias incoquitur: vbi expressum veratrum est, aquæ miscetur tantundem mellis, ex coctum vsque ad spissitudinem prædicto modo, laboranti exhibetur, præterquam vomere prius exercitato, etiam ieiuno, probeq; defuncto concoctione, & cui aluus responderit, vel sua sponte, vel elytere semen bis ve secundum virium rationem sollicitata. Omnium vero efficacissimus modus talis est. Dissectis veratri radicibus in sesami magnitudinem (nam in tenuissimâ redactæ pollinem virium efficacia stragulationes pariunt) veratri plurimū drachmas duas, modice vnam, imbecillioribus ptisanæ cremori aut alicæ, aut id genus alicuius incoctam, potui dabis: valentioribus ex aqua calida aut mulsa. Incipit autem purgatio post tres quatuor ve horas: quibus tardior est, si melius purgantur. Quod si vomitus lente oboriatur mulsa potui data, vomere æger cogendus est, pinnis oleo madidis in os demissis. si ne sic quidem proficiatur, in balneum deduci debet. Vbi iam vomere inceperit, si vacuatio paulatim respondeat, nullum ægro negotium facessere oportet. sin autem vellicatum aut conuulsionem experiat, hydrelæum potui dabitur, simul & in aluum ab inferiore parte indetur: quod alioquin in his qui helleborum assument, nonnunquam fieri solet, vnde medicamenti coaceruationē facilius ferunt. Si animæ

deficiat, naribus quæ odorem mouent admotis & consimilibus vi-
reis colligere, aliisque vt verisimile est superuenientibus casibus, ea-
dem accommodare oportet. At multa facta in inanitione, cibus dari
solanusq; permitti debet, & alia sicuti in his qui nimium purgantur
diximus, facienda sunt. Si perseveret vacuatio, cucurbitulas stoma-
cho defigere, & artus vinculis excipere conuenit. sin autem pro ra-
tione facta sit, mulsæ iusta portio propinabitur, qua superfluitates e
medicamento reliquæ eluantur: mox cibus boni succi offeretur. Iam
vero in iis qui medicamenta per os abominant, omnino autem hel-
lebori potionem requirunt, Antyllus huiusmodi quodam vsus est cly-
stere: hellebori albi drachmæ duæ in aquæ sextario per diem & no-
ctem vnā macerantur, sequenti die veratrum in aqua ad dimidias
coquitur, inde in aluum datur, vt vomitum concitet, superius purgat
paulo imbecillius quam veratri potio. Vbi abūde purgatum est, glan-
de acri imposita, aluus irritatur, vt quod injectū est reddatur, & æger
non amplius vomat. Facta excretionē, mulsæ semel bis ve intestinis
abluendis inicitur. ipse vero Antyllus tradit fieri etiam glandem ex
helleboro albo tuso cribratoq; deinde cocto melle excepto, ac cly-
steris modo ex helleboro præparati, superiorem ventriculum pur-
gare. verum hic est modus probatior. Nam purgationem partire in
vices nobis licet: pondus igitur sit veratri drachmæ duæ, cæterum
glans circumaptetur aut vinciatur stappa solidiore, cuius initium ex
trinsecus per sedem recipiatur, quo glandem vbi satis purgando pro-
fecerit, auferre possimus. hic modus purgat quidem absolutissime, nō
autem suffocationem aut aliud quoddam periculum inducit.

De differentia antidotorum.

Cap. xi.

P Ræfatio Galeni de antidotis in hunc modum habet. Medici-
nas quæ non extrinsecus impositæ, sed intra corpus assumptæ
affectibus medentur, antidota veteres nuncupant: cæterum triplex
ipsorum est differentia: quædam enim lethalium medicamentorum
gratia offeruntur: quædam ob bestias virus iaculanteis, quas Græci
ἰαβόλους appellant: quædam vero morbis ex prauo victu contractis
auxiliantur: nonnulla treis hos vsus promittunt, quemadmodum
etiam quæ theriaca dicitur.

Hedychroi, quod theriacen ingreditur confectio.

ASPALATHI radicis corticis, calami aromatici, costi,
asari, xylobalsami, phu, amaraci, mastiches, singulorū drachmæ sex,
carpobalsami, drachmæ duæ, mari drachmæ sedecim, iunci odorati
floris drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ vigintiquatuor, amomi,
calsiæ, rha, singulorum drachmæ octo, nardi indicæ, phylli, singulo-
rum drachmæ duodecim, myrrhæ drachmæ vigintiquatuor, croci,

PAULI AEGINETAE

drachmæ duodecim: vino primi meriti excepta, in pastillos coguntur, manu in opo balsamum intincta.

Quomodo pastilli scillini præparentur.

SCILLA luto aut crusta ex panificio & opere pistorio oblita, modice terretur, inde carnis ipsius partes, duæ, cum erui farinæ vnz capiuntur, simulq; læuigantur & finguntur pastilli.

Quomodo pastilli theriaci fiant.

SVMVNTVR viperæ quatuor aut quinque, fului coloris, & reces captæ, & quaternis digitis a capite & cauda amputatis, totaq; cute detracta & interaneis exemptis, reliquū corpus in fictili nouo cu anetho & sale modico discoquit, du spinæ a carnibus segregent: deinde his exceptis, ablatiq; accurate a spinis carnibus, et panis puri æquali modo addito, læuigantur omnia pariter, formanturq; orbiculi manu in opo balsamum intincta: in umbra refrigerantur.

Quomodo paretur theriace antidotum.

PASTILLORVM scillinorum drachmæ quadraginta octo, pastillorum theriacorum, pastillorum hedychoi, cinnamomi, piperis communis, lachrymæ papaueris, singulorum drachmæ viginti-quatuor, rosarum siccarum drachmæ duodecim, scordij, napi bumados seminis, iridis illiryæ, agarici, dulcis radicula, opobalsami, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, croci, zingiberis, rheu potie, quinque-foliæ radicis, nepitæ, iunci quadrati floris, marrubij, petroselinij, stoecha-dos, costi, piperis albi & longi, dictamni, thuris masculi, terebinthinæ, mastichæ chire, cassiæ nigre, nardi indicæ, singulorum drachmæ sex, polij floris, styriacis, apij seminis, fœlis, thlaspis, ameos, chamædryos, chamæpityos, hypocistidis succi, malabathri, nardi gallicæ, nardi, neu, gëtianæ, anisi, fœniculi seminis, lemnis terræ, chalcitidis tostæ, amomi, acori, carpobalsami, phu pontici, hyperici, acaciæ, gummi, cardamomi, singulorum drachmæ quatuor, dauci seminis, galbani, sagapeni, bituminis, opopanax, castorij, cetaurij tenuis, aristolochiæ fatimentis, singulorum drachmæ duæ, mellis attici pondo decem, vini falerni sextarii duo: coniectis in pilam, liquore hypocistidis, myrrha, sagapeno, dulci radícula, styrace, acacia, et opopanace, mellis momentum instillatur, contusaq; dissoluuntur: deinde vino supersubo, vt illa superet per triduum madescunt: inde reliqua contusa in unitatem coguntur, mel despumatum: cæterum in argenteo aut vitreo vase non adeo pleno medicamentū reponitur, frequenter operculum aufertur. Vfus eius est quum vrget necessitas in iis qui a feris commorati sunt, & venena assumpere, post annū ætatis septimum, sic vt instar nucis anellanæ, cum tribus vini cyathis, quotidie bis bibatur. Similiter facit ad eos, qui ex quadam latente causa periclitati sunt,

LIBER VII.

248

corruptela quæ corpus conficit, lethalis medicamenti qualitatem mitata, quemadmodum in pestilentia correptis potissimum accidit, semel quotidie. in alijs vero affectibus a decem annis usque ad viginti, usus eius celebratur, in tussi, thoracis doloribus aut laterum, si febris abest, cum mulso: si illa vratur, cum hydromelite sub nocte ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem exhibetur. Sanguinem autem excreantibus omnibus, si morbus recens est, ex posca: si vetustior, ex symphyti decocto, quantum faba Aegyptia explet, idque mane et vespere. At quos inflationes & torsiones circa umbilicum, aut morbus coeliacus male habet, ex aqua calida ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem mane assumet. ceterum appetentiam vehementer excitat, rigores, perfrictionem, & bilis vomitum, præsumptum ante accessiones discutit, menses ducit, et foetus mortuos eicit, fabæ Aegyptiæ instar potum ex mulsa. aut passo in quo ruta aut dictamnium decoctum sit. Item ad vocem abscissam valet & per se & cum duplicato tragaetho ex mulso aut passo potum, atque sub lingua retentum eliquatumque: lienosis, iocinorosisque ex posca, si scirrhus ad est, ex oxymelite, aut aceti scillini sesquiclytho: in nephriticis cum mulso circa fabæ Aegyptiæ magnitudinem: dysentericis tantundem cum decocto thus, mane & vespere. Ad lippitudines autem summe etiam in hunc modum temperatum facit: antidoti & opobalsami vnciæ duæ, mellis cyathus: mixta paulatim vngunt. Item dentes abstergit. plerique vero ut sanitatem ab iniurijs vindicent, noua Luna ad Græcanicæ fabæ magnitudinem ex eo sumunt, concoctione bene obita cum vno mellis cochleari, & duobus aquæ cyathis. Similiter etiam in peregrinationibus eo vtuntur, quum prauis cuiusdam aeris aut aquarum in itinere suspicionem habent.

Sales theriaci.

SVMVNTVR viperæ recens captæ numero quatuor, mox salis ammoniaci aut communis modius Italicus, deinde cum ipso in pilam coniecto tunditur in crassiores partes gentianæ sesquilibra, aristolochiæ rotundæ sesquilibra, centaurii tenuis comæ libræ duæ, cardamomi, marrubii, singulorum vnciæ sex, scordii, apii, chamædryos creticæ, singulorum libra, rutæ satiuæ seminis libra: melle attico in unitatem coguntur, & dimidia ipsorum pars in nouum fictile conicitur: deinde quatuor viperæ viuæ, quibus adduntur etiam scillæ teneræ recentes quinque minutim concisæ: hinc reliqua misturæ portio dimidia superiniicitur: ac ubi olla cooperta diligenter fuerit, tribus quatuorve foraminibus operculum ipsius pertundes, ut per ea vapor tostionis modum significet. Primum enim videbitur fumus exire copiosus, obscurus, admodumque turbidus, qui ignem bestias iam inuasisse nuntiet, quando te animum diligenter advertere conuenit,

PAULI AEGINETAE

ne tandem fumi huius aërem e viperarum exhalatu vitiatum inspicias. Postea, ubi vapor cessauerit, & tenuem quandam flammam perforamina eiaculatam conspexeris, tunc ipsa tosta esse quam optime censeto, atque ita fictili ab igne sublato tota die noctuq; refrigeratur. Deinde ollam aperito, exemptosq; inde carbones diligenter tundito, & cum hisce misturis incernito: rutæ sylvestris seminis, nardi gallicæ, stachyos Scythici, singulorum vncijs sex, petroselini macedonici, malabathri foliorum, singulorum vncijs quatuor, amomi vuæ, hormini seminis torrefacti, singulorum vncijs tribus, origani summitatum, thymi summitatum, singulorum vncijs nouem, baccarum iuniperi, piperis albi, piperis nigri, fœniculi, singulorum libris duabus, lazerpitij radicis vncijs decem, coriandri seminis, zingiberis nõ perforati, satyrii seminis vel radicis, pulegij montani, sefelis massaliotici, tordyli montani seminis, menthæ, singulorum vncijs sex, cassiæ fistulæ vncijs duabus, cinnamomi vncia. Porro ego sales ipsos præparauimus, non combustis bestijs, sed ipsarum pastillis quemadmodum in theriaca, sic vt hos iis quæ cum bestijs cremantur admiscerem, quo si quam in se amarulentiam haberent, eam per adustionem deponerent: tantumq; pastillorum modum inieci, quantum viperarum quaternio nem habere coniiciebam, atque hac ratione longe præstantissimi euaserunt.

Antidotum Mithridatis dia scincus.

MYRRHAE troglodyticæ, zingiberis cinnamomi, singulorum drachmæ decem, spicæ nardi thuris, thlipsis, opobalsami, iucci odorati floris, costi, stœchados, sefelis, galbani, resinæ terebinthinæ, piperis longi, castorei, hypocystidis succi, styracis, malabathri foliorum, singulorum drachmæ quatuor, cassiæ nigræ, pollij, piperis albi, scordij, dauci seminis, carpobalsami, cyphios, bdellij, nardi gallicæ, gummi, petroselini, opij, cardamomi, fœniculi seminis, gentianæ, foliorum rosæ, singulorum drachmæ octo, dictamni, anisi, acori, phyllis, singulorum drachmæ tres, mœu athamantici, acaciæ, alui scinci, hyperici seminis, singulorum sesquidrachma, vini & mellis quod satis est. Præparatur theriacæ modo. Galenus tradit ad eadem hoc valere, ad quæ illa præterquam ad viperæ morsus: in eos enim Theriacæ efficacior est.

Antidotum dia hæmaton, hoc est ex sanguinibus, ad omnia venenata, & lethalia medicamenta.

PIPERIS albi & longi, costi, acori, phyllis, anisi, dictamni cretici, singulorum drachmæ duæ, amomi, opobalsami, rutæ sylvestris seminis, fœniculi seminis, cumini æthyopici, anethi, anatis masculi sanguinis sicci, hœdi sanguinis, anserini sanguinis, anatis foeminae sanguinis

sanguinis, napi sylvestris seminis, singulorum drachmæ tres, gentianæ radicis trifolij, iunci odorati floris, lachrymæ thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ duæ, scordij drachmæ octo, petroselinij, polij, myrrhæ, nardi, singulorum drachmæ sex, castiæ drachmæ tres, lactis cyrenaj totidem, stœchados drachmæ quinque, asari drachmæ duæ, guttæ ammoniaci drachmæ tres, mœu athamantini drachmæ duæ, agatici tantundem, carpo-balsami grana viginti, mellis cocti quod satis est.

Oxymeli simplex.

ACETI quâacerrimi albi sextarius, aquæ sextarij duo, mellis sextarius, ad liquidioris mellis spissitudinem incoquantur, sic ut mel interea despumetur.

Acetum scillites.

SCILLAE albi coloris in taleolas concisæ libræ sex, quadraginta diebus in umbra siccantur, deinde ubi rursus purgatæ fuerint, in aceti generosi sextariis duodecim, diebus sexaginta in sole madescere sinuntur, vase bene operculato. post eum numerum dierum scilla ex aceto expressa proicitur, ipsum vero acetum de sæcatum transfunditur. Nonnulli vero scillæ libram in aceti sextarios sex coniiciunt. alij viridem scillam in acetum pari vtriusq; modo demittunt, sinuntq; usq; ad menseis sex, atq; hoc modo maiorem incidendi vim acquirit. Valet autem acetum scillatum collutum ad fluida oris vitia, & pleriq; interaneorum affectibus potum medetur, quibus exulceratio coniuncta non est. item aliis copluribus efficax est.

Oxymeli Scillinum

SCILLAE partis internæ tenerioris libræ duæ, aceti acris albi sextarij quindecim, piperis, petroselinij macedonici, singulorum vnciæ duæ, dauci, cretici, ameos, anisi, nardi gallicæ, ligustici, asari, cardamomi, spicæ nardi, amomi, rheu pontici, singulorum semuncia, sceniculi seminis, cumini, laseris, zingiberis, pirethri, hyssopi cretici, costi, pulegij, singulorum vncia, menthæ viridis fasciculus, rutæ viridis turiones quinque, mellis attici sextarius, sapæ sextarij duo, apii viridis fasciculus: interior scillæ pars alba contusa in acetum mittitur, finiturq; diebus septem sub caniculæ æstu madescere, deinde scilla sublata, arida quidem iam contusa: viridia autem non contusa in acetum coniiciuntur. Rursus post dies septem omnibus exemptis, mel & sapa aceto adiiciuntur, excoctaq; usq; ad spissitudinem in vitreum vas defunduntur, Cæternm præsidio hoc & ieiunus instar potionis vtere, & cū cibo instar cōdimēti. est. n. lōge vtilissimū.

Medicamentum Galeni e scilla, comitialibus potissimum efficax.

SCILLA minutim manibus contusa in vas in quo mel solet

PAULI AEGINETAE

colligi, demittitur, eoq; diligenter opeculato in loco ad meridiem spectante sub æstu caniculæ reponitur, quadraginta diebus post caniculæ sidus in superficie vase soluto scillæ corpus effluxisse deprehendes: exceptus igitur ipsius succus melle optimo edulcoratur, daturq; comitialibus quotidie cochleare, pueris exiguum, prouectis magnum. Ipsumq; scillæ corpus tritum cum melle datur chochleari, atq; hoc virtute secundum est.

Philonis antidotum.

PIPERIS albi drachmæ viginti, alterci drachmæ viginti, lachrymæ papaueris drachmæ decem, croci drachmæ quinque, piperethri, euphorbiæ spicæ nardi, singulæ drachmæ, mellis attici vel alterius generosi probe cocti quantum sufficit, datur prouectionibus ad nucis auellanæ magnitudinem: minoribus fabæ instar: pueris, ciceris. Medicamentum est quod dolorem sopit, & somnū acersit.

Athanasia dolorem leniens, pleuriticis accommodata,
authore Oribasio.

CASSIÆ drachmæ octo, spicæ nardi, amomi, croci, opii, styracis, myrrhæ, costi, singulorum drachmæ quatuor, mellis despumati quod satis est: datur quemadmodum Philonium.

Medicamentum ex duplici pipere, eiusdem effectus.

CARDAMOMI, castorei, opii, singulorum drachmæ tres, myrrhæ, costi, piperis albi & longi, galbani, singulorum drachmæ tres, croci totidem excipiuntur melle decocto, & ad fabæ magnitudinem exhibentur.

Medicamentum dia codion, id est, ex papaueris capitibus, & sapa.

CAPITA papaueris viridia minime aquosa octo decem ve, die postquam decrepta sunt, inquoquuntur cum dulcis radiculæ vncia, madefacta in sapæ sextario rursus inquoquuntur dum tabescant, ubi mediocris spissitudo facta est, ab igne sublata defunduntur: vsus medicamenti est in febribus ubi sospire opus est, & quum tenuis defluxio a capite in thoracem deferatur.

Medicamentum ex capitibus papaueris & melle:

CAPITA papauerum, vt dictum est, & dulcis radiculæ vncia, in aquæ pluuiæ aut puteanæ sextario donec intabescant excoquantur. ubi expressa fuerint, semisextarius melli decocto iniicitur: excocta vsq; ad spissitudinem. dantur in quibus præterquam quod dolorem lenire, & somnum conciliare oportet, etiam purgationis opus est, & abstersione eorum quæ in pectore aut pulmonibus renitentibusq; inhaerescunt.

Dia codion, compositum.

AQV AE, in qua papauernm capita decocta sunt ad prædictam commodè rationem, sextarius, vini dulcis heminæ duæ, mellis libra, croci, hypocistidis succi, singulorum drachmæ quatuor, conquantur vsq; ad spissitudinem, verum stomacho vtilius est medicamentum ex melle, capitum: papaueris decocto, & malis cotoneis præparatum: efficacius si præter capita, sertula campana & dulcis radícula aquæ incocta fuerint.

Eclegma ex marrubio, simplex, tabidis maxime accommodatum.

MARRVBI comæ libra in aquæ heminis sex decoquitur ad tertias, inde herba proiicitur, adiicitur autem aquæ mel: ea incoquantur vsq; ad mellis spissitudinem: instar cochlearis exhibetur.

Ex marubbio, compositum.

MARRVBI comæ, iridis illyricæ, hyssopi, pulegii, dulcis radicula, apii, singulorum sextans, caricarum pinguium quadrans, nuclei pini resinati tantundem: crassius contusa, arida cum caricis in aquæ sextarios tres demerguntur, coquanturq; vsq; ad tertias, illis exemptis, aquæ, mellis libræ duæ induntur & ad crassitudinem mellem incoquantur.

Medicamentum ex eruis.

AMYGDALARV M amararum sextans, farinæ erui triens, hyssopi, tantundem, iridis semuncia, nucleorum pini torrefactorum vnciæ duæ, mellis sextarius, vel quod satis est.

Medicamentum dodecatheon.

IRIDIS illyricæ triens, erui triens, hyssopi, vrticæ seminis, dulcis radicula, scœnogræci, singulorum sextans, bulborum, seminis lini torrefacti, singulorum triens, melanthii scrupula octodecim, pulegii scrupula sex, nucleorum pini torridorum sextans, pipetis scrupula sex, melis quantum sufficit.

Antidotum, soteria.

SPICAE nardi scrupula triginta nouem, myrrhæ scrupula viginti septem, croci scrupula triginta septem, castorii scrupula triginta nouem, opii scrupula triginta sex, petroselini scrupula quadraginta quinque, anisi scrupula nouem, apii scrupula septem, iunci odorati floris scrupula triginta sex, cassiæ scrupula duodecim, piperis longi totidem, sinonis seminis scrupula sex, styracis scrupula octodecim, amomi scrupula duodecim, seselis totidem, hedychroi, costi, asari, singulorum scrupula octodecim, mellis quod satis est.

Ex styrace bechicon, hoc est, tusi efficax.

AMOMI, cassiæ, singulorum sextans, styracis, spicæ nardi

PAVLI AEGINETAE

singulorum sescuncia, croci, piperis albi, singulorum vncia, mellis sextarius: exhibetur cochlearium:

Medicamentum Philoxeni, purulentis & longa defluxione infestatis idoneum.

RESINAE terebinthinæ drachmæ vigintiocto, nardi drachmæ sedecim, myrrhæ stillatitæ drachmæ sex, cardamomi, bulborum tantundem, croci drachmæ duodecim, galbani drachmæ sedecim, amygdala amara octoginta, mellis hemina: ex aqua potatur, quantum faba Aegyptia explet.

Eldra, multiplicis usus, vehementer enim desiccatur.

AMOMI scrupula sex, croci scrupula octodecim, dauci seminis scrupulum vnum & dimidium, foeniculi seminis scrupularia, cassiæ sesquiscrupulum, iunci odorati floris, scrupula quatuor & dimidium, ciunnamomi scrupula tria, hypocistidis succi scrupula quatuor & dimidium, sulfuris vnciae quinque, papueris seminis scrupula quinque, pyrethri scrupula tria, petroselinis sesquiscrupulum, iridis iuliyriæ scrupula septem & dimidium, alterci seminis scrupula tredecim & dimidium, spicæ nardi scrupula septem & dimidium, rutæ seminis sesquiscrupulum, anethi scrupula tria, cardamomi vnciae tres, rosarum siccarum scrupula quatuor & dimidium, nerii floris sesquiscrupulum, est autem veluti fibra ex qua oritur rosa, rhododapynes & rosæ ipsius singulorum scrupula tria, rhei scrupula sex, gentianæ scrupula sex, hedychoi sesquiscrupulum, tragacanthæ scrupula quindecim, lycii scrupula sex, citri arboris foliorum scrupula sex, ocimi seminis sesquiscrupulum, anisi scrupula tria, costi, myrrhæ, singulorum scrupula, sex bdellii scrupula sedecim, artemisæ succi scrupula tredecim, rhu syriaci scrupula viginti quinque & dimidium, asari, vteri mergi, lapidis iaspidis, singulorum scrupula tria, piperis scrupula quindecim, castorii sesquiscrupulum, cimolæ scrupula sex, sisomis scrupula nouem, styracis totidem, opobalsami scrupula duodecim, sefelis herbæ sesquiscrupulum, mellis vnciae vigintiocto, vini quantum satis est.

Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus.

MALORVM cotoneorum purorum libræ tres, coquantur in vini peruetusti sextariis tribus, deinde conteruntur: quibus piperis, anisi, ligustici, singulorum contritorum vncia admiscetur. Nonnulli etiam zingiberis semunciam indunt. quidam in vicem vini, acetosi sunt.

Medicamentum ex succis malorum, ad appetentiam abolitam & ægram concoctionem probatum.

MALORVM cotoneorum maturorum succi sextarii duo, mellis laudati tantundem, aceti sextarius, zingiberis vnciae tres, piperis

albi vnciæ duæ. incoquuntur ad spissitudinem. hoc Galenus ad eos qui perfrixerunt præparat: in quibus autem bilis redundat, sine pipere & zingibere conficitur.

Quomodo paretur melaplacontium.

MALORVM cotoneorum purorum libræ sex in vino coquantur quousq; intabescant, inde exemptæ conteruntur. nonnulli mellis libras octo adiiciunt, coquantq; igne lento, ferula agentes. vbi tam spissum totum euaserit, vt manus quodam modo non inquinet, etiam tunc addunt contusi piperis vncias tres, anisi tantundem, petroselini vnciam. Sunt qui zingiberis vnciam & mastiches tantundem misceant: deinde mixta instar semunciæ formant, & cum lauri folijs componunt.

Cydonatum contusum fragmentis saluis.

MALORVM cotoneorum purorum frustulatim concisorum libræ octo, in vini sextarijs totidem incoquuntur temperate, vt non dissoluantur, deinde mellis despumati libræ octo, piperis vnciæ octo, petroselini, anisi, singuli quadrantes, zingiberis quincunx, spicæ nardi sescuncia, caryophylli vncia, ipsis admiscuntur. omnia contusa ac modice incocta vsque ad iusculi spissitudinem auferuntur, quibus refrigeratis fragmenta simul cum iure componuntur.

Medicamentum dia trion pepereon, ex triplici pipere.

PIPERIS communis, albi, & longi, singulorum drachmæ septem, zingiberis, anisi, thymi summitatum, singulorum drachmæ duæ, mellis quod satis est.

Aliud, Oribasii.

PIPERIS albi vnciæ duæ, piperis nigri, & longi, spicæ nardi, cinnamomi, ameos, carpi, hyssopi, fefelis, dauci, petroselini, singulæ vnciæ, zingiberis drachmæ quatuor, mellis libræ tres.

Aliud.

PIPERIS communis quadrans, albi vncia, longi tantundem, petroselini, cinnamomi aut cassiæ duplicatæ, zingiberis singulorum vncia, mellis vncia vna & viginti, vel quod satis est. ego etiam thymi comæ vnciam miscui.

Diospolites.

CVMINI aceto macerati torrefactiq; vncia, piperis, zingiberis, singulorum vnciæ duæ, rutæ viridis sescuncia, nitri drachmæ duæ & semis: melle excipitur.

Medicamentum dia Calaminthes, id est, ex Calamintha.

PETROSELLINI, pulegii, seseleos, calaminthæ singuli quadrantes, apii, feminis vncia.

PAULI AEGINETAE

Medicamentum dia citrii, hoc est, ex malo medico, tarde concoquentibus efficax.

ACE TI heminae tres, mali medici carnis libra, hyssopi, rutae, singulorum fasciculus: per noctem in aceto madefacta ad tertias decoquuntur, expressaq; proiciuntur: aceto miscetur: mellis sextarius, rursusq; incoquuntur ad mellis spissitudinem. ubi incrassata fuerint, insperguntur asari, mēu, piperis albi, singuli sextantes: exhibetur cochleare mane, & dormituro.

Picra, hoc est amara, compositio Galeni.

ALOES drachmae centum, xylobalsami, mastiches, croci, spicae nardi, asari, cinnamomi, singulorum drachmae sex. Quidam addunt etiam iunci odorati floris & cassiae utriusq; drachmas sex. exhibetur drachma ex hydromelite.

Picra ex oxymelite, ad stomachicos, vterum, & aquam inter cutem.

ALOES vnciae quatuor, phylli vnciae duae, costi, cassiae, amomi, iridis singulorum drachmae, foeniculi radice corticis libra, mastiches, nardi gallicae, zingiberis singulorum drachma, piperis drachma, mēu drachma, aceti, mellis, utriusq; sesquialterarius: foeniculum in aceto prius excoctum, piicitur, deinde mel additur. Vbi usq; ad mel leam spissitudinem incoxeris, reliqua detrita insperges,

Medicamentum ex lupino iecore praestantissimum.

GENTIANAE, chamaepityos, petroselini, marrubii, succi arctii, sinapis, scolopendrii radice, panacis, minii, erythrodani, brassicae seminis, aristolochiae longae, piperis albi, spicae nardi, costi, erucae seminis, eryngii radice, polii, echii, eupatorii, baccarum iuniperi, lupini iecoris, helenii, pares modi: melle discosto excipiuntur, mulsoq; probe cocto, ad nucis auellanae magnitudinem dantur.

Theodoretus dia anacardion.

ANACARDIORVM fescuncia, croci, crassiae, philly, spicae nardi, cariophylli, mēu, agarici, iunci odorati floris, rheu, epithymi, singulorum drachmae quatuor, acori, piperis, singulorum fescuncia, aloes vnciae tres, saxifragae, mastiches, iridis illyricae, singulorum fescuncia, myrobalanorum vncia, mellis librae sex, vel quantum sufficit.

Theodoretus altera dia anacardion.

ALOES drachmae sexaginta, agarici drachmae vigintiquatuor, croci, cassiae, rheupontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulorum drachmae decem, costi, rutae seminis, piperis albi, singulorum drachmae octo, spicae nardi drachmae tres, xylobalsami, asari, chamaedrys, mēu, singulorum drachmae quatuor, mellis quod satis est. Nonnulli hic quoq; addunt anacardia duo, datur drachmis binis cum mulla.

LIBER VII.

252

Medicamentum cyphoides, ad iecorosos & pectoris vitia.

V V A E passæ carnis drachmæ vigintiquinque, croci drachmæ, calami odorati drachmæ duæ semis, bdellij drachmæ duæ & semis, cassiæ sesquidrachma, cinnamomi tres oboli, spicæ nardi totidem, iunci odorati drachmæ duæ semis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum drachmæ quatuor, aspalathi ramenti oboli duodecim, mellis drachmæ sedecim, vini quantum sufficit.

Aliud cyphoides, Alexandri.

C R O C I, cinnamomi, bdellij, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, calami aromatici, singulorū drachmæ duæ, aspalathi, iunci odorati floris, singulorum drachmæ tres, crassiæ, nardi, singulæ drachmæ, terebinthinæ resinæ drachmæ sedecim, vix passæ carnis drachmæ centum sexaginta, mellis sesquihemina, vini Chij quod sufficit.

Dia bacanu medicamentum, hepari accommodatum.

B A C A N I vncia, costi tantundem, phylli scrupula octo, piperis albi scrupula sex, spicæ nardi totidem, mellis quod satis est, datur cochlearium cum temperatura conditi.

Medicamentum Zopyrios.

M Y R R H A E drachmæ quinque, croci, cassiæ, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ tres, spicæ nardi drachmæ duæ, iunci odorati floris tantundem, piperis albi sesquidrachma, thuris drachma, costi drachma, mellis quod satis est.

Compositio pæonia.

S T Y R A C I S calamitis drachmæ sex, thuris amomi, croci, singulorum sescuncia, spicæ nardi drachmæ sex, phylli drachmæ duæ, piperis albi drachmæ sex, & communis octo, myrrhæ vncia, costi tantundem, mellis quod satis est.

Catapotia Dosithei ad iecur inscripta.

A L O E S vncia, spicæ nardi, phylli, costi, singulorum scrupula duo, agarici scrupula octo, mastiches scrupula tredecim, epithymi scrupula quatuor, rheu scrupulum.

Oxymeli splenicum, hoc est, lieni dicatum.

C A P P A R I S radicū corticis, scolopēdris, spicæ nardi, asari, tridis, iunci odorati floris, iunci quadrati floris, anisi, cumini, sceniculi, acori, ericæ fructus, singulorum vncia, myricæ foliorum, salicis foliorum, apij radice, thuris arboris, scillæ, singulorum vnciæ duæ, aceti sextarii tres, mellis tantundem, guttæ ammoniaci vnciæ tres, præparatum modo scillini, duobus cochlearijs exhibetur.

Oxymeli, calculosis efficax.

S A X I F R A G A E, betonicæ, graminis, adianthi, spicæ nardi, carpesii, asari, eryngij, singulorū vncia, petroselini macedonicæ, rutæ

li iij

PAULI AEGINETAE

feminis, singulorum semuncia, fœniculi viridis, iridis, scillæ tostæ, chamædaphnes, singulorū vnciæ quæ, capparis radicem corticis vnciæ tres, sili vnciæ duæ, aquæ, aceti, mellis, singulorum sextarii duo.

Phusca, ad conterendum calculos.

PVLEGII, mastiches, apii seminis, menthæ siccæ, singulorū vncia, salis communis torrefacti libra, coriandri seminis, spicæ nardi, anisi, ameos, singulorum scrupula sex, phylli scrupula quatuor piperis albi semuncia, vel communis vncia, lithospermi vnciæ sex, betonicæ totidem, aceti generosi sextarii quinque omnia contusa, cribrata, & in tenuissimum pollinem detrita, per triduum aceto madescunt: deinde diebus quadraginta insolantur; vbi vsus inciderit, nigrum ciccer, asparagi radicem, apium, & adianthum decoquis: in huius decocti misturam geminas duas aceti superinfundis, & ægro in calido balneo solio propinas. Nonnulli vero pulueris ex prædictis speciebus, scrupula duodecim cum posca dictarum herbarum iuri temperata exhibent, & nihilo minus medicamentum proficit.

Conditum calculos confringens.

PIPERIS albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonicæ, singulorum vncia, petroselini, phylli, singulorum sescuncia, rutæ syluestris seminis semuncia, mellis sextarius, vini ascalonitis sextarii sedecim.

Medicamentum ex sanguine hircino.

QVVM vva inceperit maturescere, hirci ætate florentis sanguinis in sole ficcati cochlearia duo calculosis exhibeto cum passo cretico. Quidam vero amomi & phylli, vtriusque treis vncias miscent. Alij etiam myrrhæ quatuor scrupula.

Ex cicadis medicamentum nephriticum,

LITHOSPERMI. raphidis piscis combusti, fœlis, singulorum vncia, ameos, cucumeris satiui, seminis saxifragæ, vuae passæ acinis exemptis, althææ seminis, phaseoli albi, lyciurii, singulorum semuncia, spicæ nardi, phumæu, lapidum ex spongis, singulæ drachmæ, adianthi, paliuri seminis interioris, sili sicci, rubi radice, graminis, polypodij, singulorum drachmæ tres, hircini sanguinis desiccati vt dictum est, scrupula sex, cicadarum siccarum sine capite, pennis, & pedibus, triens, piperis albi drachmæ sex, mellis probe cocti quod satis est. datur instar nucis auellanæ in condito tribus obolis, aut decocto saxifragæ, aut sili, aut radice asparagi aut rorismarini, aut quinque solij, aut struthij radice.

Medicamentum ex lithospermo.

LITHOSPERMI, betonicæ, saxifragæ, petroselini, piperis albi pares portiones cum melle excipiuntur.

LIBER VII.

253

Medicamentum ex marrubij semine.

PIPERIS albi & nigri, dauci cretici, cucumeris satiui seminis, foeniculi seminis, marrubij seminis, petroselini macedonici, pyrethri, zingiberis, phylli, singulae vnciae, mellis quod satis est.

Medicamentum ex lapide Iudaico, qui tecolithos dicitur.

SPICAE nardi, hyssopi, lapidis Iudaici, singulorum scrupula octo, piperis scrupula duodecim, zingiberis, petroselini, costi, saxifragae, singulorum scrupula sex, cassiae, apij seminis, singulorum scrupula tria, cyperi scrupula sex, ramenti eboris scrupula quatuor, cardamomi ligni scrupula sex, seminis lini scrupula quatuor, mellis quantum sufficit.

Medicamentum ex sylvestris maluae semine.

CVCUMERIS domestici seminis drachmae duodecim, alteri seminis drachmae sex, cicutae seminis drachmae tres, (alij sex) opij, foeniculi, maluae sylvestris seminis, croci, singulorum drachmae tres, apij seminis drachmae sex, cassiae drachmae quatuor, amygdala basilica decem, nuces auellanae totidem, asari drachmae quatuor: passo cretico excepta datur tribus obolis, si febris abest, cum sapa. Nonnulli melle excipiunt.

Medicamentum ex bellarijs nephriticum, vesicae & renum exulcerationi idoneum.

VVAE passae albae cui acini sint exempti, nucleorum pini recentium, singulorum vnciae duae, cucumeris seminis cortice ex uti, baccarum myrti nucleo ablato, amygdalarum amararum, palmularum pinguium, apij seminis, papaveris seminis, croci, singulorum drachmae, myrrhae vnciae duae: instar drachmae ex passo ieiuno propinatur.

Satyriacum antidotum.

ZINGIBERIS, satyrj superioris, singulorum drachmae octo, scinci caudae, meu, asari, petroselini, cardamomi, fefelis, singulorum drachmae quatuor, eruae seminis, cinnamomi singulorum drachmae tres, hormini, piperis albi, cnici seminis, singulorum drachmae duae, iunci odorati floris, spicae nardi, singulae drachmae, sanguinis hircini mystrum, datur drachma imbecillioribus cum lacte.

Catapotia ex xylomacere, dysentericis utilia.

XYLOMACERIS, opij, rheu, singulorum scrupula sex, gallae, myrrhae, singulae vnciae. excipiuntur vino spathite.

Podagrica remedia.

Medicamentum ex corallio, quod diacoralliu vocatur, podagricis idoneum.

RHEV barbarici, paeoniae, myrrhae troglodytidis, spicae nardi, singuli sextantes, phylli vncia, caryophylli grana quindecim, angal-

PAULI AEGINETAE

lidis phoenicei coloris quam vocant corallion, semuncia, aristolochiae longae vnciae quatuor, & rotundae totidem. datur instar scrupuli quotidie, concoctione probe defuncto. Incipiendum vero est ab æqui noctio autūnali, quod circa vigesimum quartum mensis septembris diem accidit, capiendumq; deinceps ad dies quinquaginta, deinde relinquēt quindecim dierum interuallo, atq; sic facere oportet quousq; dies quibus assumitur absoluantur trecenti sexagintaquinq;. Sub caniculæ ortu omnino abstinendum est, hoc est, a vigesimo quarto die iunij vsq; ad Augusti finē. Vitari debet venus, carnes præsertim suillæ, salsamentum, garum, beta, daucum, menta, & lactuca nō cocta, ponesq; piscium capita, cammari, tum qui molli, tum q; testacea cute præditi sunt, legumina omnia, & summatim quæ crassi succi sunt, vinum nigrum & liberalius. Balneum conuenit, & quotidianum exercitium, vel pedibus, vel equo, vel gestatione obitum. Qui vero habitu sicciore sunt, etiam si plenius nutriantur, non offenduntur.

Agapeti compositio ad podagram.

PHYLLI, rheu barbarici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, costi, chamædryos, singuli sextantes, aloës hepaticæ quincunx, hyperici, pæoniæ, singuli quadrantes, aristolochiæ longæ, phu, mēu, damasonij, anagallidis, singuli trientes: vtendi modus idem est qui in compositione dia coralli.

Compositio atactos ad podagram.

PHYLLI, mēu, damasonij, anagallidis cui flos est cæruleus, erythrodani, mastiches, croci, cassiæ, aloës hepaticæ, gentianæ, chamædryos, singulorum vncia, caryophylli, asari, piperis albi & nigri, singulorum semuncia, spicæ nardi, myrrhæ, rheu barbarici, pæoniæ radicis, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum vnciae duæ. Similis vsus est.

Procli cōpositio, podagræ & coxendicum doloribus accommodata.

CHAMÆDRYOS vnciae nouem, cetaurij vnciae octo, aristolochiæ vnciae septem, gentianæ vnciae sex, hyperici vnciae quinq;, petroselini macedonici vnciae quatuor, mēu vnciae tres, agarici vnciae duæ, phu vncia vna, mellis attici heminae duæ.

Medicamentum ex rebus septem constans, ad eadem.

HYPERICI, aristolochiæ longæ, singulorum vncia, centaury, chamæpityos, agarici, singulorum tres vnciae, chamædryos vnciae sex, gentianæ vnciae quinq;. Nonnulli etiam petroselini vnciam addunt, mellis drachmas quinq;. datur instar drachmæ.

De pastillis.

Cap. xñ.

Pastilli græcè trochisci a figura rotularum nominant. Tres sunt eorum species, alij namq; sunt potabiles, alij in aluum dantur, alij

delinuntur. Ex his igitur qui potantur, alij comprimunt aluum, aut sanguinem, aut aliam quamptiam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opplendo, aut desiccando eam cohibentes: quemadmodum qui constat spina ægyptia, & qui seminibus, confimilesq; alij dolore sopiunt, vel quod sensum obstupefaciunt, vt crocodes dictus, vel qd' humores diffundant, veluti ex aromatis confecti alij lienem, aut renes, aut tunc obstructione liberant, vt qui ex amaris amygdalis confit. Eorum vero qui in aluum induntur, nonnulli acrimoniam obtundunt, vt in dysenteris, quemadmodum ex pompholyge, amylo, terra samia, cum cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo inieci, nonnulli alui aut sanguinis profluium astringunt, sicuti qui alumine, acacia, & omphacio constant, qualis est qui Philippo ascribitur, vel ex spina Aegyptia, cum rosarum succo, aut plantaginis inditi: nonnulli adurentes, dysentericæ quæ vlcera depalcentia exercent, idonei: ex sandaracha, auripigmento, calce, charta combusta, confecti. Inferentur autem cum succo lenticulæ aut oryzæ, sic vt intestinum prius muria elotum sit, ægerq; cibum & potum antea assumpserit, ne aliquid medicamēti virtutis reliquum, ad stomachum rapiatur. Cæterum vti les sunt pastilli qui ab inferioribus partibus iniiciuntur, ad affectus potissimum qui infra vmbilicum infestant. Nam superius vis ipsorum peruenire non potest. At qui delinuntur simileis illis vireis obtinent: verum astringentes, in herpete, papulis, quæ dicuntur exanthemata, intertriginibus, sanguinis eruptionibus, & fluidis vlceribus, pficiūt: cuiusmodi est Andronius & Polyidæ, qui vero obtundunt, carbunculis & maleficis vlceribus expediunt: vtpote Leucus dictus, & Dialotariou. vrentes, sicut iam comprehensi, cuius generis habentur & Faustiani, serpentibus naturalium & sedis vlceribus, pterygiis, & carnosis narium vitiis accommodantur.

Pastillus aster dictus.

CROCI, opij, castorei, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, lemnis cretæ, mandragoræ corticis, singulorum triens, dauci, apii, anisi, fœselis, alterci seminis, styracis, singulorum drachmæ octo: vino læuigantur.

Pastillus trigonus.

APII seminis, alterci seminis, singulorum drachmæ duæ, anisi drachmæ quatuor, opii drachmæ tres: aqua teruntur.

Pastillus a seminibus Diaspermaton dictus.

ANISI, ameos, fœniculi seminis, singulorum drachmæ quatuor, apii seminis, opii, alterci seminis, singulorum drachmæ duæ: aqua læuigantur.

Pastillus crocodes, hoc est croceus.

ANISI, dauci cretici seminis, singulorum drachmæ quatuor,

PAVLI AEGINETAE

myrrhae, castorei, singulorum drachmae duae, croci, opii, singulorum drachmae tres, apii seminis, styracis, singulorum drachmae quatuor, alterci seminis drachmae sex ex aqua deteruntur.

Pastillus diarhodon.

ACACIAE, gummi, rosarum floris, balauftiorum, hypocistidis succi, gallarum, singulorum drachmae tres, rosarum viridium succi, plantaginis seminis, singulorum drachma, lycii Indici tantundem.

Pastillus dia coralliu.

ALTERCI seminis, thuris, singulorum drachmae octo, terrae samiae, cerallii, minii Sinopici, opii, singulorum drachmae quatuor, amyli, balauftiorum, singulorum drachmae duae: succo polygoni excipiuntur.

Pastillus dia electru, hoc est, ex succino.

HERBAE publicanis vnciae quinque, mastiches vnciae quatuor, succini scobis, iridis, croci, singulorum vnciae quatuor, opii vnciae duae.

Pastillus ex spina Aegyptia.

SPINAE Aegyptiae, rhu, thuris, acaciae, aluminis scissi, hypocistidis succi, gallae, lemniae cretae, corallii, symphyti, terrenae samiae, aloes, ladani, pares portiones vino subiguntur.

Alius pastillus, quem Galenus aprhodiasticon clidion scribit.

SATIVAE puniceae floris, spinae Aegyptiae, balauftiorum hypocistidis succi, acaciae, singulorum drachmae sex, lycii, rhu pontici, opii singulorum drachmae quatuor, myrrhae drachmae duae, excipiuntur vino myrteo, vel rosarum baccarum ve myrti decocto.

Clidion Oribasii, ad dysentericos & coeliacos.

GALLAE omphacitidis drachmae octo, opii drachmae quatuor, ex aqua singuntur catapotia. dantur terna aut quaterna.

Pastillus ex cornu ceruino dysentericis & sanguinem excreantibus salutaris.

COCHLEARVM drachmae duodecim, cornu ceruini combusti, gallae torrefactae, acaciae inarefactae, singulorum drachmae quinque oboli duodecim, baccarum myrti nigrae drachmae quindecim, opii siccati. hypocistidis succi singulorum drachmae quinque, labruscae floris drachmae sex, mandragorae radicis succi, terrae samiae quae alter dicitur, singulorum drachmae duodecim, rhu obsoniorum drachmae quatuordecim, malicorhi torridi drachmae septem, thuris drachmae ceto, piceae corticis exarefacti drachmae quatuordecim, alterci seminis siccati drachmae decem, rhus coriarii sextarii duo, vini nigri quantum rhu incoquendo vt vinum fiat crassissimum,

LIBER VII.

255

satis est, atque hoc percolato reliqua excepta in pastillos coguntur.

Pastillus Amazonum.

APII seminis, anisi singulorum drachmæ sex, absinthii comæ drachmæ quatuor, myrrhæ, piperis, opii, castorei, singulorum drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ sex: aqua subiguntur.

Pastillus ex amygdallis amaris.

ANISI, apii seminis, asari, amygdalarum amararum, absinthii comæ, paria pondera: ex aqua singuntur pastilli, qui drachmam pen-
deant. dantur febri carentibus ex mulso: febricitantibus cum hy-
dromelite.

Pastillus ex erica, lieni dicatus.

ERICA fructus drachmæ quatuor, piperis albi, nardi syria-
cæ, suffiminis ammoniaci, singulorum drachmæ duæ: ammoniacum
aceto soluitur, aridisq; admiscetur, singunt pastilli qui singuli drach-
mam expleant. exhibentur singulatim cum oxymelitis cyatho.

Pastillus ex vesicarijs, dia physalidon vocant.

CVCVMERIS sativi excorticati seminis vnciæ quatuor,
alterci seminis, cicutæ, singulorum vnciæ duæ, foeniculi, rumicis se-
minis, croci, nucleorum pini, amygdalarum amarorum, opii, singulæ
vnciæ, vesicariæ sextarii tres, vini quod sufficit.

Pastillus Philippi, ad dysentericos.

BALAVSTIORVM, acaciæ, hypocistidis succi, opii,
thu thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloës, rhæu pontici, malicorii, bacca-
rum mærti, singulorum drachmæ quatuor: excipiuntur vino austero,
forinturq; pastilli triobolares. dantur si febris abest, cum vino; fe-
bricitantibus, cum hydromelite.

Pastillus Musæ.

ALVMINIS, aloës, myrrhæ, atramenti sutorii, singulorum
scuncia, mali corii, croci, crocomagmatis, singulorum drachmæ
sex. excipiuntur vino.

Quomodo crocogma paretur.

CROCI vnciæ duæ, rosarum, amyli, myrrhæ, aloës, thuris, gum-
mi, singulorum vnciæ, costi, spicæ nardi, singulorum drachma: vino
subiguntur. At in capite de oleo crocino alia quoque crocomagma-
tis confectura dicitur.

Pastillus Nereæ ex Heræ commentariis.

MYRRHÆ, aloës, croci, singulorum drachmæ octo, alu-
minis scissi drachmæ centum: aqua excipiuntur.

Polyidæ sphragis.

ALVMINIS scissi drachmæ tres, thuris drachmæ quatuor,
myrrhæ drachmæ octo, atramenti sutorii drachmæ duæ, floris sativæ

PAULI AEGINETAE

punicæ drachmæ duodecim, fellis taurini drachmæ sex alias drachmæ sedecim, aloës vncia : vino austero excipiuntur.

Pastillonis pastillus.

SQVAMAE æris drachmæ duodecim, æris combusti, salis ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rasæ, thuris singulorum drachmæ octo, vini quod sufficit.

Pastillus Andronius.

SATIVAE punicæ floris drachmæ decem, gallæ drachmæ octo, myrrhæ drachmæ quatuor, aristolochiæ rotundæ drachmæ quatuor, atramenti sutorij, croci, aluminis scissi, crocomagmatis, misyos, thuris, singulorum drachmæ duæ: læuigantur in vino astringenti, vel aceto.

Pastillus Faustini.

AVRIPIGMENTI drachmæ duodecim, sandarachæ drachmæ sex, calcis viuæ drachmæ octo, chartæ cōbustæ drachmæ: myrti baccarū succo vel decocto excepta, in pastillos redigito, & cū myrti baccarum, lenticulæ, & rubi radicum decocto immittito.

Pastillus ex charta, dia chartiū appellatus.

CHARTAE combustiæ triginta duæ, calcis, auripigmenti, sandarachæ, singulæ vnciæ: succo plantaginis excipiuntur.

Pastillus cui nomen est thronus Marcellius.

CHARTAE combustiæ drachmæ decem, sandarachæ auripigmenti, squamæ æris, aluminis scissi, singulorum drachmæ quatuor, balaustrij drachmæ tres, opij drachmæ duæ, calcis nō restinctæ drachmæ tres, omphacij drachmæ, hypocistidis succi drachmæ tres: vino myrteo excepta coguntur in pastillos, qui drachmas quatuor pendean: vbi decoxeris in vino malicoriū, myrti baccas, & vsque ad tertias, dato pastillum vnum aut in totum quatuor, ex sex vini cyathis.

Pastillus a subere, dia phellou dictus.

GALLAE, chartæ, fæculæ vini, panis, singulorum concrementorum drachmæ quindecim, in alio habetur etiam cornu ceruini combusti drachmæ quindecim, auripigmenti drachmæ duæ, sandarachæ, calcis, vtriusque drachmæ quindecim, acaciæ cerusæ, singulorum drachmæ quinque, argenti spumæ drachmæ tres: vino læuigantur.

Bithynus.

MALICORII drachmæ decem, cadmiæ vnciæ tres, aristolochiæ, gallæ, panacis radicis, iridis, atramenti sutorij, aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamæ æris, mannæ thuris (nonnulli etiā costi) singulorum fescuncia: aceto subiguntur.

LIBER VII.

256

Pastillus dia castorii, ad vlcera, nomas & defluxiones.

CROCI, aloës, thuris, singulorum vncia, florum mali punicæ, aluminis scissi, castorii, mannæ thuris, æruginis rasæ, singulorum vncia, minii sinopici libra: excipiuntur vino veteri.

Pastillus dia castorii, colicis efficax.

MYRRHAE, castorii, singulorum scrupula sex, croci, opii, singulorum scrupula nouem, anisi, apii seminis, dauci seminis, singulorum semuncia, alterci seminis scrupula octodecim.

Pastillus dia cœnelæu, hoc est, ex vino & oleo mixtis sedis & naturalium vitiis utilis.

CER. VSAE vnciæ decem, argenti spumæ vnciæ quinque, thuris, recrementi plumbi, aluminis scissi, singulorum vnciæ duæ: vino marinæ experte læuigantur. in vsu vino & rosaceo aut vino & myrteo soluantur.

Pastillus ex lapide phrygio, naturalium vitiis accommodatus.

LAPIDIS phrygii combusti restincti q̃ ter, primum butyro vel rosaceo, deinde vino, postea melle, vnciæ duæ, rosarum floris vnciæ quatuor, malicorii vncia.

Pastillus dia lotarion, quod est ex loto syluestri ad sedis & naturalium vitia.

CER. VSAE, amyli, glaucii, croci, aluminis, æquales portiones: teruntur succo loti syluestris, aut vino.

Pastillus leucus.

TERRAE samie triens, pompholygis, cerusæ, amyli, singuli extantes, opii scrupula quatuor: aqua subiguntur.

Pastillus dia alicacabu, hoc est, ex vesicaria.

Spumæ argenti drachmæ vigintiquatuor, cerusæ drachmæ duodecim, aut vna & viginti, vesicariæ drachmæ octo, atramenti fustorii drachmæ quatuor, aluminis scissi tantundem, minii quod ad colorem satis est: aqua excipiuntur.

Pastillus ex duplici veratro, idem vero ex duabus acaciis.

ACACIAE nigrae & fuluæ, glutini fabrilis (in alio piscium glutinis) singulorum vnciæ quatuor, guttæ ammoniaci, glaucii, aloës, singulorum vnciæ duæ, thuris masculi, veratri nigri & albi, singulorum vncia: aceto scillino excipiuntur, quum vsus incidit, eodem vel communi soluta, ante balneum, & rursus post id inunguntur.

Pastillus Criogenes.

MYRRHAE, æris combusti, aristolochiæ rotundæ, ærugini

PAVLI AEGINETAE

rasæ, squamæ stomomatis, verbenacæ rectæ, aluminis rotundi, singulorum vncia, aceti quantum satis est. decerpi autem debet verbenaca, quum Sol est in ariete. Fit etiam emplastrum in hunc mundum: pastilli, ceræ, colophonix, olei, par mensura, aceti quod ad læuigandum pastillum sufficit.

Pastillus a nigro viridiq; colore dictus melanchlorus.

MYRRHAE, aloës, squamæ æris combusti, auripigmenti, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, chalcitidis, misyos, salis fossitii, atramenti sutorii, cerusæ, nitri, argenti spumæ, panacis radice, cadmix, malicorii, gallæ, aristolochiæ rotundæ, squamæ stomomatis, æruginis rasæ, singulorum vncia, aceti quod satis est. Fit etiam hoc modo emplastrum: pastilli vnciæ duæ, colophonix, ceræ, olei, singulorum vnciæ sex, aceti quod pastillo subigendo satis est.

Pantolmius ad chironia malignaq; vlcera, & defluxiones.

CASSIAE, æris cremati, cerusæ, argenti spumæ, æruginis rasæ, aluminis scissi, rotundi, liquidi, & lateritii quod plinthitis dicitur, panacis radice, aristolochiæ longæ et rotundæ, malicorii, atramenti sutorii, portulacæ, iridis astragalitidis, chalcitidis, misyos, guttæ ammoniaci, salis ammoniaci, æruginis ferri, squamæ æris, aloës, diphrygis, thuris gallæ, sarcocollæ, plumbi cremati, foliorum oleæ, soridis, myrrhæ, cretæ sutorix liquidæ, balauftiorum, spinæ Aegyptiæ, sulfuris ignem non experti, nitri, rhu rubri, rhu syriaci, chrysocollæ, rhus coriarii, acaciæ, salis spumæ, omphacii, auripigmenti, singulorum pares modi: cum aceto diebus triginta, sub caniculæ fiedere læuigantur.

Pastillus Nymphodoti.

APHRONITRI vncia, nitri alexandrini, saponis gallici, singulæ vnciæ, salis cappadocii, mastiches, gallæ, singulorum drachmæ quatuor, foliorum rosæ, amomi, amyli, singulorum vncia, phylli drachma, aluminis scissilis, costi singulorum drachmæ duæ, vini myrtæ quod satis est.

Pastillus ex thapsia, hemicranico dolori efficax.

SVCCI thapsiæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ octo, opopanacis, euphorbii, singulorum drachmæ sex, nitri, liquoris parthenici, singulorum drachmæ quatuor, piperis, sagapeni, singulorum drachmæ duæ, aceti quantum sufficit. Vbi vtendum est, aceto inunctum post horas sex abluito: at si voles remissiore vti, cerato pari exceptum illinito noctemq; finito.

Pastillus qui ano subiicitur, hyotheton dictus, ad dysenteriam, & ani dolores.

TERRAE samix, amyli, singulorum quadrans, croci sextās, acaciæ,

acaciæ, tragacanthæ, singulæ vnciæ, castorij thuris, lycij, singulæ sescuncie: in calidioribus, etiam opij semuncia adiicitur: herbæ pulicaris succo excipiuntur, singunturq; pastilli.

De medicamentis quibus aridis vtimur, & smegmatis.

Cap. xiii.

Aridorum medicamentorum quæ sane & catapasmata ab inspergendo, vocantur, alia vlcibus congruunt, alia cuti applicantur: ex iis quæ vlcibus faciunt, quædam cauis carnem inducunt, quædam ex crescentia reprimunt, quædam cicatricem generant, quædam vrunt exeduntq; nonnulla sanguinem coercent, Quæ igitur carni generandæ sunt, vel repurgando sordida, carnem creant, vt quæ constant ex eruo, aristolochia, iride, panace, myrrha, thure, aloë: vel humiditatem circumfluam desiccando, veluti quæ fiunt ex ære, diaphryge, squama, charta combusta, piceæ cortice, & spina, quæ & ipsa cicatricem obducunt: vel acrimoniam rofionemq; obtundendo, qualia sunt ex pompholyge, amylo, cerusa, sæce combusta, ostreis crematis, terra samia, & consimilibus, & quæ compositorum ex his vires habent. Ex reprimentibus lenia quidem sunt, quæ constant squama æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla: valentiora sunt, quæ atramento sutorio, ærugine, misy, chalcitide, ignem non expertis. Vrentia vero ex edentiaq; fiunt ex calce, auripigmento sandaracha, & sæce vini combusta, quam vocant spheclen, hoc est fæculam: atq; hæc omnia componuntur: cæterum in tenuisimum redacta pollinē, si vlcibus inspergantur minus rodunt: si spissiora, magis, idq; vrendo faciendq; crustam. Sanguinem recrementia aut astringendo, aut refrigerando, aut siccando, aut opplendo illum, coercent, quorum materiam capite de pastillis sumus exequuti. At eorum quæ cuti admoventur, alta abstergunt exteruntq; vt ex cimolia, pumice, lomento, fermento hordei, peponum carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutiunt, qualia fiunt ex veratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, semine roris marini, terra lemnia, sepiæ testa: atq; hæc, assumpta calce & auripigmento cum liquore aliquo, pilis abolendis idonea, & smegmata fiunt. Quædam capiti admoventur, vt fluxum ex eo ruentem desiccant, cuiusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio, & id genus aliis præparata, omnia vero smegmata cuti non iuncta commodari debent.

Cephalicus pulvis, capiti conueniens.

ERVORVM quincunx, iridis sescuncia, mannæ thuris sescuncia, aristolochiæ, squamæ æris, singulorum sescuncia.

Alius.

PICEAE corticis drachmæ sex, thuris drachmæ quatuor, pu-

PAVLI AEGINETAE

micis tantundem, iridis drachmæ duæ, resinæ siccæ drachmæ sex,
aristolochiæ drachmæ duæ.

Ex aloë, dia aloës, dicitur.

ALOE S drachmæ sex, erui drachmæ octo, mannæ thuris
drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ duæ.

Dialphecles, hoc est, ex fæce vini combusta, Manethonis.

CADMIÆ combustæ & illoræ vnciæ, terræ famiæ vncia,
fæcis vini combustæ vnciæ quatuor, lapidis specularis vnciæ qua-
tuor thuris vnciæ quatuor. quidam & amyli vncias quatuor ad-
dunt.

Melitera Oribasij

CHALCITIDIS, squamæ æris, gallæ, balauftiorum, aristo-
lochiæ longæ singulorum vncia, malicornij, aluminis scissi singulo-
rum semuncia.

Medicamentum ex ostreis, dia ostreon dicitur.

CADMIÆ, thuris singulæ vnciæ, ostreorum combusto-
rum vnciæ tres.

Medicamentum ex thure, dia libanu.

ARGENTI spumæ, thuris, squamæ æris, mali punici, amyli,
cerusæ, pares modi.

Aphroditarium.

THVRIS, squamæ æris, mali punici, amyli, cerusæ, paria
pondera.

Rhodia, ad supprimendum sanguinem, vlcera depascentia,

& ex crescentia.

GALLÆ crudæ drachmæ sex, gallæ combustæ restinctæq;
vino aridæ drachmæ duodecim squamæ æris nigri, si non sit, rubri,
drachmæ octo, atramenti sutorij, drachmæ viginti quatuor, aluminis
scissi drachmæ vigintiseptem: teruntur diebus sat multis.

Medicamentum xanthon, hoc est, flauum.

CHALCITIDIS combustæ drachmæ quadraginta, atra-
menti sutorij vsti drachmæ viginti, misyos cremati drachmæ de-
cem æris vsti drachmæ quinque.

Medicamentum a murino colore psaron dictum.

MISYOS quincunx, gallarum triens, chalcitidis sextans, qua-
mæ æris tantundem, atramenti sutorij vncia, æruginis rasæ sextans.

Medicamentum heliocæ, ad urens.

AVRIPIGMENTI libra, calcis viuxæ libræ duæ aqua
læuigato per dies camulæ, deinde siccatis vtitor.

Antheron.

CYPERI drachmæ octo, myrthæ drachmæ duodecim, sanda-
rachæ drachmæ tres, rosarū floris drachmæ duæ, croci drachma, cro-
comagmatis, aluminis scissi, iridis illyricæ singulorū drachmæ duæ

LIBER VII.

258

Medicamentum ex charta, quod Græci dicunt dia chartu, ad nomas oris potissimum & naturalium vlcera.

AE R I S squamæ, chartæ combustæ singulorum drachmæ octo auripigmenti, sulfuris viui, singulorū drachmæ duodecim, plumbi cremati drachmæ sex. Ad humidiores quidē sepedonas, sicco vtitori: ad ficcas, rosaceo macerabis, nonnunquam & melle cum rosaceo.

Medicamentum ex myrto syluestri, dia oxymyrhines appellatum, ad eadem.

R H V S coriarii vnciæ duodecim, myrti syluestris foliorum, sandarachæ, singulorum drachmæ octo, salicis foliorum siccorum, malicorii, singulorum drachmæ sex, aluminis scissi, chrysocollæ, aloes, chalcitidis crudæ, squamæ, auripigmenti, salis communis, singulorum drachmæ quatuor.

Medicamentum Massalioti.

N I T R I, opii, chrysochollæ, lapidis asii, sandarachæ, misyos, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, æqualia pondera: sicco vtitori. Smegma aridum quod Asclepios dicitur.

B A C C A R V M lauri, nitri alexandrini, salis torrefacti, salis cappadocici, stillæ ammoniacæ, aphronitri, pumicis, singulorū libra, veratri nigri, herbæ lanariæ, pyrethri sæculæ quæ est vini læx combusta, herbæ pediculariæ, sinapi, iunci rotundi, aluminis scissi, iunci quadrati floris, iridis, gallæ, singulorum vnciæ sex, sampsuchi libra, viticis seminis, pulegii, fatinæ fabarum, & lupini, singulorum vnciæ sex, chamæleontis nigri, sulfuris. gummi, thuris, piperis, cucumeris syluestis radicis, marubii, cimolix, pœoniæ, æsepiæ testæ, fœnugræci, phylli, costi, cumini, euphorbii spicæ nardi, singulorum vnciæ tres. Alexander autem præter hæc adiicit salis ex nitri fontibus salis Tragasei, singulorum libram, adarces vnciam, aluminis liquidi nardi gallici, cnici, cocci gnidii, graminis aridi, bryoniæ siccæ, singulorum treis vncias.

Smegma peponatum.

T H V R I S, mastiches, stillæ ammoniacæ. singulæ vnciæ tragacanthi fescuncia, succi vux acerbæ dodrans: peponis seminis recentis quadrans, similæ sextarii quinq; ouorum vnus & viginti albumina, iridis triens. quidam & veratri nigri sextantem miscent.

Aliter Critonis.

L O M E N T I modius: similæ sextarii quatuor: trifolii: glandis vnguentariæ, iridis illyricæ, singulorum libræ quatuor, guttæ ammoniaci, costi: singulorum libra ouorum tenuia aquata, peponum carnis sextarii duo, vux acerbæ succi tantundem: macerantur, redactaq; in pastillos siccantur, deinde confusa in cretaq; in vsu adhibent.

KK ii

PAULI AEGINETAE

ALITER. Tragacanthæ, thuris, mastichæ, guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ decem, omphacii, drachmæ quinque, similaginis sextarii quinque, candidi ouorum liquoris vncia, peponum carnis vnciæ decem: præparatur vt supra dictum est.

Sinegma quod capitis defluxiones exiccet.

NITRI Alexandrini rufi vnciæ quinque, salis communis torrefacti fescuncia, salis cappadocii vncia hæc aceto quam acerrimo macerata in patinam fictilem coniciuntur, atq; in furno vruntur, dum redigantur in carbones: inde refrigeratis leuigatisq; ad abstergendum vitior, vinum in balneo instillans.

Sapo Constantini.

ROSARVM siccarum, aloës, gallæ, malicorii, malabathri, sarcocollæ, singulorum tres vnciæ, balauftioru, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum vnciæ duæ, costi vncia, saponis gallici libra, excipiuntur iure lupinorum.

Puluis pilos abolens, vnde pilotrum dicitur, ad podagram.

MASTICHE S, thuris malculi, herbæ pediculariæ, veratri albi, spumæ argenti singulorum vnciæ tres, phylli, amyli, veratri nigri, lapidis asii floris singulorum vncia, alcyonii, pumicis tosti, cimolix, sampsuchi, singulorum vnciæ tres, spicæ nardi vncia. Nonnulli etiam aloës vnciam addunt. contusum in vase puluerem reseruato: vbi necessitas inciderit, oryzae cremor & ptisanæ in ollam conicitur; postquam inferbuerit, pulueris, saponis gallici, auripigmenti, aluminis scissi, sandarichæ, singulorum fescuncia additur, calcis viuzæ recentis libra. Vtitor vnguento mense ter. nono videlicet lunæ die, decimonono, & vigesimonono idq; vsque ad annum: post hunc, semel mense, quum vigesimumnonum luna diem agit.

De medicamentis liquidis quæ illinuntur, ad Oris vitia vnde stomatica dicuntur, ac guttur accommodatis.

Cap. xiiii.

Quanto rarior molliorq; est summa oris tunica, cute quæ corpus totum obtegit, tanto etiam magis stomaticorum medicaminum vsus euariat, Quum igitur inflammatio incipit, ea requiruntur medicamenta quæ humoris influxum repellant, cuiusmodi sunt, arida quidem, omphacium, galla omphacitis, succus rhu, hypocistidis, aluminis, cortex picæ, & thuris, balauftia, & generatim omnia quæ astringunt, ita vt insuauem ingratamq; & lethalem vim non representent liquida vero, succus mororum tum quæ batina, tum quæ fycamina dicuntur, item nucum viridum corticis, & mali punici præsertim acidi, & malorum contoneorū, multum amineumq; mel autem

per initia solum vt medicamenta adhæreant temperatur. at quum humor substiterit, misceri debent quæ concoquant & mediocriter dissipent, cuius generis est crocus, myrrha, & dulcis radicula succus. at per totū id temporis quod statum & declinationem intercedit, recte vsurpatur mixtum aliquod ambobus, repellente puta, & discussorio: & per initia quidem superabunt repellentia, deinde discutientia: in morbi declinatione solis vti discutientibus absq; abstrictione oportet, qualia sunt nitrum, aphronitron, organum, hyssopum, thymus, nepita, iris, belasa, cōsimiliaq;. liquor tunc lapa esto, tum quæ ex mulso decocto, tum quæ ex caricis & palmulis conficitur, ipsūq; dulce mustum cum melle: vbi vero veluti reliquæ quædam inflammationis remanserint, etiam sulfur ignem non expertum miscbimus: succum autem primum cū melle incoquemus, dum liquidioris mellis spissitudo fiat, inde sic arida in tenuissimum pollinem pertrita inspergemus, postea modice coquemus, quoad omnia exacte in vnitatem cogantur, quo facto in vitreum vas medicamentum transfundemus.

Dia moron simplex.

MORORVM succi sextarii tres, prius excoquantur dum tertia portio fuerit absumpta, adiectoq; mellis sextario, rursus incoquantur ad melleam spissitudinem.

Dia moron compositum.

MORORVM succi hemin sex vsque ad strigmenti crassitudinem coquantur, deinde admixto levis croci drachma, myrrhæ duabus, succi vixæ acerbæ vna, aluminis scissi ternis obolis, mellis hemina, quousque spissescant incoquantur.

De moris batinis, quæ rubi fructus sunt.

ITEM quod ex moris batinis constat, eodem modo præparatur, maiore vi astrictoria præditum.

Dia caryon, quod est ex nucibus, simplex.

VIRIDIVM nucum corticis contusi succi heminx quinque, mellis hemina, coquantur ad dimidias.

Dia caryon compositum.

PER initia quidem & in vigore oris inflammationum, misceri debent croci, & aluminis, singulæ drachmæ, myrrhæ duo, in declinatione vero ad discutiendum, nitri drachma, sulfuris tantundem, cum prædicta nucum corticis succi, & mellis mensura.

Medicamentum ex succo mali punici.

MALI punici cui nuclei sunt adempti dulcis succi sextarii quatuor, mali punici acidi succi sextarii duo, mellis sextarius, myrrhæ amineæ drachmæ octo, crocomagmatis, gallæ singulorum drachmæ octo, aluminis scissilis drachmæ quatuor, iridis illiycæ

K 4 iij

PAVLI AEGINETAE

drachmæ octo, omphacij drachmæ octo: conficitur quemadmodum quod moris constat.

Aliter idem.

M A L I punici dulcis cum corio suo cōbust; succi sextarii sex, mellis generosi sextarius, aluminis scissi vncia, myrrhæ semuncia.

Medicamentum e musto, dia gleucous dicunt.

M V S T I sextarii sex, gallæ, aluminis scissilis, singulorum drachmæ duæ, croci, myrrhæ singulæ drachmæ. Si lenire voles, dulce esto mustum: si repellere, austerum. quod autem neutrum est, mediam inter hæc vim obtinet.

Aegyptia stomatica.

M E L L I S pondo, olei bes, resinæ terebinthinæ sextans, croci drachmæ quatuor: in cacabo liquefiunt.

Medicamentum dia besafa, ex ruta sylvestri.

A N I S I feminis, apii feminis, iunci odorati floris, ameos feminis, aluminis scissi, tridis illiricæ, besafa, quod nonnulli harmala vocant (est autem ruta sylvestris) cinnamomi, myrrhæ troglodytidos, croci, gallæ, singulorum vncia, aristolochiæ longæ, calsiæ, crocomagmatis, rosarum siccarum, singulorum vncia, costi, hirundinum cineris recentis, singulorum vnciæ tres, nardi Indicæ, amomi, singulorum semuncia, mellis quod satis est.

Dulces vtilisq; potiones.

Cap. xv.

D Vlcium simul & vtilium potionum aliæ ex vino conficiuntur, coniectis in id quibusdam speciebus, exempli gratia, pipere, absinthio, casamo, aliisque compluribus, vnde etiam appellationem nonnunquam sortiuntur, aliquando melle admixto, interim non; aliæ ex aqua in qua decoquantur mala, vel rosæ, vel similia quædam, nempe vva acerba, mala punica, myrti baccæ, eoque mel optimū despumatum miscetur, tum quod firmum sit, tum quod dulce, interdum etiam vtile: si illud ex cipiās quod a cibyra in parvis vasculis asportatur, asterum: item hydromalum vinosum, quod etiam sine melle fieri nouimus. quæ admodum apomeli ex melle solo & aqua, citra alterius cuiusdā substantiæ misturam. Imo etiam ex vino confectæ potiones, quas & propomata Græci nominant, mellis despumati sextarium vnum, ad vini quaternos recipiunt, componunturq; citra coctionem. At quæ ex aqua & liquore fiunt, si quidem coquantur, vnum mellis ad tres liquoris, cuius duæ fere partes inter coquendum sint absumptæ, sextarios assument: sin minus, vnum mellis ad binos liquoris. cæterum quæ non coquantur, diu satis insolare prorsus oportet, & præsertim omphacomeli. Ex aqua vero temperatas potiones coquere conuenit, quod propter imbecillitatem facillime mutantur, omnes autem

in fictilia vasa exigua oblita transfundendæ sunt, iisq; tuto oper-
culatis in apricis locis vsquedum excoquantur reponendæ. atte-
nuantibus autem & probe aqua temperatis vti conuenit. Ompha-
comeli postquam musti modo inferbuerit crassumq; euaserit, tunc ope-
riri vas debet. his igitur quæ vino constant, quum febris abest, potis-
simum vtimur, vel solius voluptatis gratia, præter eas quæ scammo-
nia aut grano gnidio aut eiusmodi purgantibus medicamentis com-
ponuntur, vel propter eiusmodi affectus in quibus & medicamentis
in illas coniectis, per os vti licet. Ex aqua autem aut succo aliquorū
confecturæ febricitantibus conueniunt, interdum ceu hedysmata hoc
est dulciaria, quum morbus vino vti non permittit: interdum ceu
affectui commodæ, quemadmodum apomeli ad saluam educendam,
aut vrinæ citandas, aut aluum emolliendam, aut extenuandum hu-
morem: hydromalum autem & hydrorofatum siticulosis, febre ar-
denti pressis, resolutis, & stomacho vitiosis. Omphacomeli, myr-
tites, rhodostacton, hoc est, mel rosaceum, & rheetes, coeliaco
affectui, dysenterii, vomitionibus, aliisq; fluidis vitiis congruunt.
Iam vero his collutionibus subinde in stomaticis affectibus vtimur.

Hydromalum ex malorum cotoneorum succo.

MALORVM cotoneorum nucleis exemptis confusorum
succu sextarii duo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii sex, inco-
quantur despumando ad tertias. ALIUD. Malorum cotoneo-
rum frustulatim concisorum nucleis ablatis pondo quinque, in
aquæ fontanæ sextariis decem incoquantur dum intabescant. ab-
lata ab igne, refrigerata quæ eximuntur, expresso quæ succo pro-
ficiuntur, aquæ modo dimidia mellis mensura temperatur, ite-
rum quæ incoquitur despumando, quoad octaua portio absumpta
fuerit. Nonnulli vero ex dulcibus etiam malis similiter hydro-
malum componunt.

Hydrorofatum.

ROSARVM vnguibus exemptis libræ quatuor, aquæ
sextarii quinque, mellis sextarii duo.

Rhodomalum.

SVCCI malorum cotoneorum sextarius, rosarum trepondo,
mellis sextarii tres, aquæ sextarii quinque. Verum quoniam rosæ
non eodem tempore cum malis inueniuntur, conuenit eas cum melle
quando colliguntur componere, ac vbi mala prouenerint, totam com-
positionem moliri.

Omphacomelitis præparatio.

VVAE acerbæ succu sextarii tres, mellis sextarius: mixta die-
bus quadraginta insolantur, vel discoquantur.

PAULI AEGINETAE

Quomodo myrtites fiat.

MYRTI baccarum succi sextarii tres, mellis sextarius, ad tertias decoquuntur.

Apomeli ex commentarijs Philagrii.

FAVORVM melle scatentium alborum pondo, aquæ fontanæ trepondo & dimidium. confractis fauis unitisq; aqua cum melle incoquitur, duni & spuma ipsius & id quod veluti cerosum supernatat, particulatim relinquatur, atque tunc refrigerata diligenter transfunduntur.

Rhodostacti compositio.

ROSARVM quibus vngues sint exempti succi sextarios duos, mellis sextarium incoquito, despumans quoad quarta pars fuerit absorpta.

Rhoëtis confectio.

MALI punici succi sextarii tres, mellis vnus, ad tertias decoquuntur.

De colyrijs & adglutinantibus. Cap. xvi.

Varia ocularium medicamentorum materies existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particulae stirpium, et metallica his inferuntur. ex quibus alia acrimoniam leniunt, & veluti opplent obstruuntq; utpote pompholyx, spodium, amyllum, plumbum, terra samia, quæ aster dicitur, cadmia, eaq; omnia lota, & candidus oui liquor. Quibus ita utendum est, ut caput prius vacationem experiat, nam si repletum fuerit, metus est ne oculorum tunicæ humoribus distentæ perrumpantur. Alia contrariam his naturam obtinent, nempe acrem, recludendis vacuandisq; iis quæ diu impacta fuerunt accommodata, quemadmodum liquores Cyrenæicus, Medicus, Sagapenus, euphorbium, & consimilia. Nonnulla sordidis vlceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama æris, ipsumq; æs, chalcitis, misy, fori, flos æris, stimmi, concremata omnia. Quædam his vicina sunt, smectica ab exterendis sordibus appellata, cuiusmodi est auripigmentum, sandaracha, & lapidis asii flos. Sunt & astringentia, atque ex his quæ mediocriter id faciunt, vehementer lippitudini, vlceribus & defluxionibus conducunt, nempe rosarum folia, flores, fructus, spicæ nardi, phyllum, crocus, glaucium, & hypocistis. Quæ vehementiorem astringendi vim representant, oculorum claritati conducentibus potissimum medicinis miscentur, cuius generis est omphacium, acacia, balaustrum, satiuæ punicæ flos & galla. Alia concoquunt discutiuntq; ut myrrha, crocus, castereum, lachryma thuris, foenugræci succus. Porro ex compositis oculorum remedijs, alia delinuntur, simplicemq; appellationem habent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria vocantur. Quæ igitur delinuntur, omnem comprehensam materiam

recipiunt, omnibusq; conferunt affectibus: cæterum vere præsertim præparari debent, æstate siquidē virtus ipsorum perspirat euanescitq;, hyeme species gelu rigidæ temperari nequeunt. Conterere autem ea oportet liquore non copiose affuso, ne metallica subsidant, aromata supernatent, verum modice, vt sordium modo conterantur. Aqua vero pluuiialis erit, tum quod tenuis sit, tum quod modice astringat. Si quidem vino aut succo aliquo læuigare oportet, ipsa quoq; terenda sunt, metallica sane longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo: demum vbi satis læuia euaserint, gummi adicietur: in formam redacta, vasis maxime æreis aut vitreis riponentur. Cæterum iis quæ e succo conficiuntur, protinus vti licet: metallica vetustate redduntur meliora. Porro inter collyria arida quædam consumunt exteruntq; callos, ficos, vngueis, scabiosaq; vitia, e chalcitide, æruginē & misy composita: quædam lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accommodata, quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi fiunt. Sunt quæ præseruent, tueanturq; oculos ob humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia, stimmi, croco: omnia in tenuissimum pollinem coacta oculis applicant. At liquida collyria fiunt ex melle attico, opobalsamo, oleo ob vetustatem tenui, fœniculi succo, diuersorum animalium felle, liquore cyrenaico, aliisq; compluribus. Conferunt hebetudini, suffusioniq; incipienti, medicamenta quæ extenuent, calefaciant, purgentq;. Vtendum his est, & omniū acribus, vbi caput repletionē caret, sub dio, aëre puro, austro, non nimis frigido, neque item calido nimium. At agglutinamenta quæ anacolemata græce dicuntur, ex medicamentis præparantur quæ obstruunt, opplentq;, glutinant, stringunt, aut refrigerant, aut astringunt, ficcant ve, qualis est farinæ pollen, manna, terra samia, myrrha, cochleæ, acacia, opium, cum candido oui liquore. glutinantur fronti in quibus humor non intra caluariam delitescit, sed extrinsecus affligit.

Collyrium quod protinus dolorem sedet monohemerum appellatum, ad incipientem vetustamq; lippitudinem.

ACACIAE drachmæ triginta sex, gummi drachmæ trigintaduæ, cadmiæ drachmæ vigintiquatuor, æris cremati et eloti drachmæ octo, opij drachma: vino austro læuigantur. Medicamentum discutit & ficat.

Chiacum collyrium.

MINII sinopici, gallæ omphacitidis, croci, rosarum recentium vnguibus exemptis floris quem thylaca vocamus, gummi, singulorum vnciæ quatuor, opij vncia: vino aminæo, aut salerno, aut chio

PAULI AEGINETAE

austero teruntur. Sit autem vinum marinæ expers.

Cygnarium.

CADMIÆ vstæ elotæq; vnciæ sex, cerusæ lotæ vnciæ quatuor, pompholygis tantundem, amyli vnciæ duæ, tragacanthæ, opij torrefacti, gummi, singulorum vnciæ duæ, aqua pluuiali læuigantur.

Rubens cygnus.

CADMIÆ crematæ elotæ sextans, terræ samiz quæ aster dicitur tantundem, cerusæ triens, pompholygis bes, amyli sextans, opij sextans, acaciæ, tragacanthæ, singulæ vnciæ, gummi triens: aqua cœlesti subiguntur.

Albus cygnus.

CADMIÆ vnciæ quindecim, cerusæ vnciæ septemdecim, opij drachmæ octo, thuris drachmæ septem, amyli vnciæ septem, gummi drachmæ tredecim: aqua cœlesti teruntur.

Pelargon ad vlcera.

CADMIÆ, cerusæ, singulorum drachmæ vigintiquatuor, acaciæ, opij, singulorum drachmæ octodecim, gummi, tragacanthæ, amyli, singulorum drachmæ nouem, myrrhæ drachmæ tres, æris, croci singulorum sesquidonarius: aqua conteruntur.

Phæon ad oculos sanguine suffusos, & maguos affectus.

CADMIÆ teneræ drachmæ vigintiquatuor, cerusæ drachmæ sedecim æruginis rasæ drachmæ duodecim, stimmi drachmæ octo, aluminis scissi drachmæ tres, chalcitidis vstæ drachmæ tres, nardi Indicæ drachmæ quatuor, omphacii drachmæ duæ, æris drachma, squamæ æris drachmæ octo, ericæ fructus drachmæ tredecim lachrymæ papaueris drachmæ vigintiquatuor, croci drachmæ quatuor, castorii drachmæ tres, myrrhæ drachmæ sex, lycii Indicæ, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quatuor, rosarum recentium drachmæ duæ & semissis: vino falerno aut surrentino, aut aminæo, aut chio austero perteruntur. inungitur per triduum, aquæ instar dilutum ex fœnuhræci succo instillatum, deinde ex ouo aut lacte, postremo aqua crassius.

Collyrium ex decoctis, dia zematon dicitur.

CADMIÆ vnciæ sedecim, cerusæ vnciæ octo, amyli, opij, tragacanthæ, acaciæ, singulorum vnciæ duæ, gummi vnciæ sex: læuigantur decocto rosarum siccarum, melitoti, capitum papaueris, dulcis radiculæ, pari singulorum modo.

Collyrium dia hydrias, repellens.

LIQVORIS qui in vasis cerealibus topi modo concretus reperitur, libræ tres, cadmiæ vstæ & elotæ libra, cerusæ pompholygis, terræ samiz, qui aster dicitur, singulorū elotorum vnciæ sex

thuris vncia, myrrhæ tantundem, succi lini seminis, herbæ pulicaris, ptisanæ, fœnugræci, singulorum libra, tragacanthæ vnciæ sex, gummi libra.

Collyrium llambonis.

CADMIÆ vnciæ octo, pompholygis vnciæ quatuor, cerusæ libra, tragacanthæ, gummi, opii, singulorum vnciæ quatuor: aqua pluuiatili teruntur.

Cinereum, quod spodiæon dicitur, ad inflammationes, defluxus, & chemosin.

THVRIS, stimmi, singulorum drachmæ centum, cadmiæ, cerusæ, vtriusq; drachmæ vigintiquatuor, terræ samix, papaueris lachrymæ, singulorum drachmæ tres, gummi drachmæ quindecim læuantur oleæ coliculi succo. fit autem is in hunc modum: tenerioræ oleæ folia elota contunduntur in mortario, paululo aquæ superfuso, per linteolum exprimuntur.

Collyrium ex oleæ turionum succo tenerum, dia thalias vocatur.

THVRIS drachmæ quatuor, stimmi drachmæ quindecim, cadmiæ drachmæ vigintiocto, cerusæ drachmæ quadraginta nouem, terræ samix drachmæ octodecim, opii drachmæ sex, gummi drachmæ, plumbi vsti eloti q; drachmæ octo: excipiuntur oleæ turionū succo.

Dia thalias, ruffum.

AERIS cremati drachmæ duodecim, sandycis vnciæ vigintiquatuor, foliorum oleæ vnciæ duæ, opii tantundem, gummi vnciæ decem, vino spathite vel aminæo excipiuntur.

Dia smyrnon claudiacum.

GLAVCII, sarcocolæ, singulorū drachmæ quadraginta octo, croci drachmæ vigintiquatuor, opii, myrrhæ, lapidis hæmatitis, singulorum drachmæ sex, tragacanthæ drachmæ quadraginta octo, gummi drachmæ sedecim: vino Italico subiguntur. vsus est ex ovo.

Aliud dia smyrnon ad rhœadas & ægylopas.

CADMIÆ lotæ, lapidis hæmatitis eloti, singulorum drachmæ vigintiocto, myrrhæ, spodii Cypriæ singulorum denarii vigintiquatuor, opii drachmæ octo, croci drachmæ quatuor (alii octo) piperis albi grana triginta, gummi drachmæ sedecim: vino Italico teruntur, ex ovo adhibetur collyrium: si vitium sit recens, aquatum.

Stacticum Prosechii.

CADMIÆ, gummi singulorum drachmæ viginti, stimmi, atramenti sutorii, singulorum drachmæ octo, opii drachmæ quatuor decim, æruginis rasæ drachmæ decem, piperis albi drachmæ sex, croci drachmæ octo, misyos crudi tantundem, opobalsami drachmæ, quatuor: aqua conteruntur.

PAULI AGEINETAE

Hygidion Ammonij.

CADMI AE, æris, singulorum drachmæ sedecim, cerusæ, castorij, aloës, croci, singulorum drachmæ quatuor, squamæ drachmæ quinque, rosarum floris, plumbi vsti, singulorum drachmæ octo, lycij drachmæ tres, lapidis schisti drachmæ quatuor, opij drachmæ decem, acaciæ drachmæ quadraginta, gummi drachmæ quadraginta octo : aqua excipiuntur.

Olympos seu olympiacum.

ACACI AE, spicæ nardi, thuris, singulorum drachmæ octo, æris cremati elotiq, stimmeos vsti & loti, cerusæ concrematae lotiq, cadmix, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, opij arefacti, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ quinque, æruginis rasæ drachmæ tres, lapidis schisti, squamæ rubræ, lycij Indici, omphacij, singulorum drachma, castorij, rosarum floris, singulorum drachmæ duæ, phoenicobalanorum drachmæ quatuor, similiter ossa palmularum vstarum ligna numero quinque, gummi vnciæ quinque aqua pluviali superfunduntur, in qua commadescant tres dies totidemq, noctes, calami odorati, alterci seminis, rosarum siccarum, singulorum drachmæ quatuor, phylli drachma.

Nardinum.

CADMI AE, croci, gummi, singulorum drachmæ triginta sex, æris vsti drachmæ octodecim, stimmi, acaciæ, singulorum drachmæ triginta, nardi syriacæ drachmæ duodecim, opij, singulorum drachmæ sedecim : aqua subiguntur.

Theodotium minus.

STIMMI, acaciæ, singulorum drachmæ viginti, æris vsti drachmæ octo, erusæ drachmæ quatuor, myrrhæ totidem, æruginis drachmæ duæ, aloës, succi papaveris, lycij, singulorum drachma : pluviali aqua læuigantur.

Rhinarium.

LAPIDIS hæmatitis, lapidis schisti, singulorum drachmæ sedecim, æris combusti, cadmix, æruginis, singulorum drachmæ octo, opij drachmæ quinque, chalcitidis drachmæ duæ, gummi drachmæ octo : vino excipiuntur.

Xyster.

PVMICIS, misyos, ostreorum, singulorum crematorum vnciæ sex, cadmix, opij, chalcitidis vstæ, croci, aloës hepaticæ castorij, phylli, singulorum drachmæ duæ, stimmi, acaciæ, singulæ vnciæ, æris combusti vnciæ quatuor, myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor, spicæ nardi drachma, cerusæ drachmæ octo, gummi drachmæ quatuor aqua cælesti superfunduntur. Nonnulli etiam vinum miscent.

Hecatombe, ad cicatrices classas.

CADMIÆ vñtæ lotæq; æris cremati & eloti, vniuscuiusq; drachmæ octo, stimmos combusti, acaciæ rubentis, gummi, singulorum drachmæ quindecim, aloës, gallæ, æruginis vermicularis, castorij, lycij, spicæ nardi, croci, opij, myrrhæ cerusæ, hebeni ramenti, chalcitidis, singulorum drachma, rosarum drachmæ sexaginta: aqua pluuiali teruntur.

Collyrium ex cornu, dia ceratos dicitur, Galeni.

PLVMBI combusti, cornus ceruini cremati, singulorū vñciæ duæ, cerusæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepis testæ combustæ, æruginis, myrrhæ, gummi, singulorum vñcia: aqua pluuiali excipiuntur.

Collyrium e thure, dia Libanu nuncupatur.

THVRIS vñciæ sex, cadmiæ, pompholygis terræ samis quæ aster dicitur, amyli, gummi, singulorum vñciæ tres, cerusæ vñciæ sex, squamæ æris vñciæ quatuor, tragacanthæ vñciæ tres, opij vñciæ sex: aqua cælestis adicitur. Libanium.

CADMIÆ elotæ, amuli, singulorum denarij duodecim, cerusæ tantundem, spodij, pompholygis, terræ samis quæ aster dicitur, plumbi vñti & loti, tragacanthæ, singulorū denarij octo, opij denarij duodecim, gummi denarij quatuor: aqua pluuialis additur, & ouorū viginti albumina. Sunt qui etiam myrrhæ denarios quatuor addant.

Aster Magni.

POMPHOLYGIS, cadmiæ, cerusæ, singulorū drachmæ sedecim, plumbi drachmæ octo, amyli drachmæ octodecim, thuris drachmæ decem, terræ samis quæ aster dicitur drachmæ duodecim, myrrhæ drachmæ duæ, tragacanthæ, gummi, singulorum drachmæ octo: aqua additur. Vranium.

TERREÆ samis, piperis, singulorum vñciæ tres, spodij eloti vñcia, gummi vñciæ quatuor, stimmos cremati eloti vñciæ duæ, squamæ lotæ vñcia, opij drachmæ sex, cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ duæ: aqua pluuiatilis admisceat. Carnem inducit, repellitq;.

Collyrium ex succo fœnugræci.

CADMIÆ, tragacanthæ, singulorum vñciæ octo, cerusæ vñciæ triginta, amyli tñdem, opij vñcia. læuigant succo fœnugræci.

Collyrium Cleonis.

POMPHOLYGIS, plumbi, singulorum vñciæ quinque, croci fescuncia, squamæ æris quod stomoma dicitur vñcia, gummi vñciæ duæ: aqua pluuialis additur, aquatum illinitur.

Dia rhodon, hoc est, ex rosis, quæ septuaginta duas vñcias pendunt.

ROSARVM viridiū vñciæ septuagintaduæ, cadmiæ vñtæ

PAULI AEGINETAE

& elotæ drachmæ vigintiquatuor, æruginis rasæ drachmæ duæ, spicæ nardi drachma, squamæ æris elotæ drachmæ duæ, stimmos combusti elotiq; opij, myrthæ, singulorum drachmæ tres, croci drachmæ octo, amyli drachmæ duæ, gummi drachmæ vigintiquatuor: aqua pluuiialis admiscetur.

Album dia Rhodon.

CADMIÆ crematæ & lotæ, cerusæ, singulorum libra, amyli, opij, tragacanthæ, singulorum vnciæ tres, aloës fescuncia, gummi vnciæ tres, croci fescuncia, rosarum vnguibus detractis vnciæ sex: aqua miscetur.

Collyrium ex aloë, dia aloës nuncupatur.

CADMIÆ, cerusæ, aloës, singulorum vnciæ decem, rosarum viridium vnciæ sex, amyli vnciæ tres, opij vncia, tragacanthæ vnciæ duæ, gummi vnciæ tres: aqua pluuiatilis adicitur.

Crocium dia rhodon.

SPICÆ nardi, rosarum ficcarum, aloës, singulorum drachmæ duæ, alterci albi sesquidrachma, croci drachmæ quatuor & semissis, glaucij sex, sarcocollæ tantundem, opij drachmæ duæ, tragacanthæ vncia: aqua pluuialis additur.

Nili dia rhodon.

ROSARVM tenerarum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, papaueris obolus, gummi drachmæ quatuor: aqua coelesti excipiuntur.

Lynceus ad claritatem oculorum.

CADMIÆ, æris combusti, guttæ ammoniacæ, singulorum drachmæ duodecim, myrthæ, lapidis hæmatitis, opij thebani, singulorum drachmæ sex, aloës hepaticæ, fellis taurini, galbani, sagapeni, singulorum drachmæ quatuor, æruginis rasæ, opopanacis, salis ammoniaci, singulorum drachma, gummi drachmæ sex: aqua pluuiali terunt.

Proteus ad idem, cicatricesq; extenuat.

CADMIÆ, cerusæ, chalcitidis crudæ, singulorum denarij quadraginta, piperis sesquidenarius, liquoris cyrenæici drachmæ octo, croci denarij duodecim, opij thebani denarij decem, sagapeni denarij duodecim, oliuæ æthiopice denarij duodecim, auripigmenti, aluminis scissilis, singulorum denarij octo, myrthæ denarij duodecim, suffiminis ammoniaci denarij xx, opopanacis denarij sedecim, opobalsami denarij decem, gummi denarij viginti: aqua pluuiali excipiunt.

Collyrium ex succo fœniculi.

CADMIÆ drachmæ septedecim, atramenti Indici drachmæ sedecim, piperis longi drachmæ tredecim, & albi duodecim, liquoris cyrenæici drachmæ octo, opobalsami drachmæ sex, spicæ nardi drachmæ sex, sagapeni, opopanacis, singulorum drachmæ quinq; opij

drachmæ quatuor, euphorbiæ drachma, gummi drachma : succo ficulniculi lænigantur.

Collyrium ex opobalsamo.

CADMIÆ, cerusæ singulorum drachmæ octo, omphacii drachmæ quatuor, piperis albi vnciæ sedecim, opii drachmæ quatuor, opobalsami, gummi, singulorum drachmæ sedecim. aqua pluuialis additur.

Thalasseros.

CADMIÆ vnciæ octo, æruginis vnciæ duæ, atramenti Indici vnciæ octo, piperis albi vnciæ quatuor, liquoris medici vncia, opobalsami vnciæ ñ. gummi vnciæ sex : aqua adicitur.

Hermation.

GVTTAE ammoniaci, æris combusti, corticis thuris, singulorum drachmæ quatuor, æruginis drachma, gummi drachmæ quatuor : aqua coelesti excruciantur.

Collyrium malabathrinum, quod & Isotheon dicitur.

CADMIÆ drachmæ sedecim, æris vsti & eloti drachmæ quatuordecim, opii, lychni Indici, malabathri, nardi Indici, croci, aloës, singulorum drachmæ duæ, cerusæ drachmæ octo, castorei drachmæ duæ, myrrhæ drachmæ quatuor, acaciæ, stimmi, singulorum drachmæ quadraginta aqua teruntur. vsus ex ovo.

Crassius ex vino.

CADMIÆ, lapidis hæmatitis, & schisti, singulorum drachmæ quadraginta, æris vsti drachmæ triginta, chalcitidis drachmæ triginta duæ, papaueris seminis drachmæ tredecim : papaueris semen aqua decoquitur, succus expressus alijs adicitur, quæ læuigantur vino spathite vel aminæo.

Aliud ex vino.

ÆRIS combusti, cadmiæ placitidis, singulorum vnciæ nouem, lapidis hæmatici eloti vnciæ sex, croci, myrrhæ, aloës, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ tres, lychni Indici, spicæ nardi, singulorum sescuncia, piperis albi grana centum quinquaginta, acaciæ rubentis vnciæ nouem, gummi vnciæ tres : vino falerno aut aminæo teruntur.

Collyrium ex duobus lapidibus ad aspritudinem.

LAPIDIS hæmaticis, schisticis, calsiæ singulorum drachmæ octodecim, æris cadmiæ, opii, æruginis rasæ, singulorum drachmæ nouem, gummi tantudem, chalcitidis vsti drachmæ sex : aqua teruntur.

Aridum collyrium Galeni, quod oculos tuetur.

LAPIDIS phrygi minutim contusi vsti in ollula quousque incādescat, & restincti butyro non veteri, deinde iterum similiter cremati, extincti vino falerno, ac tertium vsti et extincti melle siccati libra, æris cremati, piperis albi, phylli, singulæ vnciæ, stimmi sescuncia :

PAULI AEGINETAE

omnibus in læuorem detritis quum medicamentum ab igne auferet, liquoris balsami non crassi (id enim arefcere medicamentum prohibet) sed lucidissimi vnciam iniicies. Vti autem eo conuenit in palpebris duntaxat, sic vt specillo illato tunicæ non attingantur, sed vt solum medicamentum palpebris apertis illinatur. Inungi autem debet non semel, verum sæpius, tum ante cibum, tum secundum ipsum, magisq; vbi iam lippitudo sentitur. Mirum enim est, quam omni alio medicamento securius ab iniuria vindicet.

Aridum dia crocu.

SARCOCOLLAE drachmæ octo, croci drachmæ quatuor, glaucii tantundem. inungitur frequenter die. Nonnulli vero aloën quoque miscent.

Aliud aridum ad siccam lippitudinem quæ xerophthalmia dicitur, sucofin, sepedonas, carnis excrecentias.

CADMIÆ drachmæ decem, chalcitidis drachmæ viginti, piperis grana quindecim, nardi gallicæ drachma teritur cadmia & chalcitis cum vino: vbi inaruerint, reliqua adiciuntur, cogunturq; in tenuissimum puluerem.

Hygra, hoc est, liquidum collyrium, ex Caucalide.

CAVCALIDIS succi, chamædryos, coronodis, interdum & othonnæ succi par mensura. Est autem othonna magnum chelidonium.

Aliud ad sycosin, quæ est veterrima palpebrarum asperitudo, encanthidas, & excrecentiam carnis.

MISYOS tosti drachmæ sex, atramenti sutorii drachmæ quatuor, mellis attici sextarius.

Erasistrati panchrestos hygra, mirifica est in oculariis vitiis, tonsillis, pudendis & auribus suppurantibus.

AE RÏS drachmæ sex, misyos tosti, myrrhæ, singulorum drachmæ tres, croci sesquidrachma, piperis drachma, vini chii & palsi cretici, vtriusq; sesqui hemina: omnibus in vino læuigatis, dū inaruerint, passum superfundit, & vsq; ad melleam spissitudinem incoquantur.

Agglutinamenta oculorum qui defluxionibus infestantur.

TERREÆ samix, mænæ thuris, myrrhæ, pares modi, ouia aqua to excepti, in lintheumq; illiti fronti imponuntur. **ALIVD.** Alterci seminis drachma, opii tantundem, myrrhæ drachmæ duæ, croci drachma, farinæ pollinis drachmæ quatuor, ouorum tostorum lutea duo, albumine oui excipiuntur.

De emplastris, & medicamentorum quæ in illa mittuntur coctione, tum qui ceræ modus cum oleo esse debeat, ex commentariis Antylli.

Cap. xvij.

Medicamentorum quæ emplastra ingrediuntur, alia sunt terrena, utpote metallica, lapidumque & terræ species, flores, cinis, & conchylia: alia sunt oleamenta, alia lachrymæ, alia liquari possunt: quædam liquores, quædam succi sunt: semina vero, herbas, & radices pauca recipiunt. Cæterum ex ipsis emplastris nonnulla sunt vulneraria, quæ enæma græcis quod cruentis iniiciantur: colletica, quod glutinent: & catagmatica, quod fracturis accomodentur, appellamus. Constare autem ex siccantibus non summe, uerū secundū ordinis absoluti, & tertii incipientis, oportet, cuiusmodi sunt salix, quercus cupressus, picæ & pini cortices, myrrha, thuris lachryma, bitumen, aloë, aristolochia, cinis sarmentaceus, cerusa, spuma argenti, & pleraque ex metallices. Coqui debent quousque manus non amplius inquinent. Porro quæ cicatricem ducunt emplastra & ipsa ex siccantibus componuntur, verum efficacioribus quam glutinatoria, quod genus est, æs combustum, squama tum æris tum ferri, ærugo, chalcitis, æris flos combustus, alumen, galla, plumbago, cadmia, pumex, & ostracea. Discutientia vero & calefacientibus & siccantibus modicæ fiunt, nempe aristolochia, thapsia, oleo veteri, & raphanino, melle, opobalsamo, pice, resina terebinthina, galbano, sale combusto, salis flore. Quæ emolliunt, ex argenti spuma, adipibus, medullis, oleo veteri, propoli, ammoniaco, styracei galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, vel radice althææ & cucumeris sylvestris, præparantur. Siccantia, ex sulfure, nitro, sale, cinere, & bitumine. Ad extrahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro, propoli, æruginē, fermento, stercore, sulfure, terebinthina. Quæ concoquunt, ex cera, ladano, vua passa, amomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, œsypo, adipe æruginē. Pus mouentia, ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chondro, butyro, adipe suillo & vitulino, thure, pice, resina. Quæ vero leniunt, argenti spuma constant, cerusa, oleo, anetho, chamæmelo, amylo, cera alba. Iam vero enæma dicta, recentibus adhuc vulneribus & fracturis iniici debent, adiutarique e summa spleniorum parte spongiis posca madentibus simul illigatis, solui tertio quoque die & rursus eadem splenia non alia accommodari oportet. At quæ emolliunt, extrahunt, discutiunt, concoquunt, & pus præterea mouent, post cataplasmatum ceratorumque usum adhibentur. Quæ leniunt etiam per initia statim, summis potissimum partibus applicantur. Cæterum quomodo coquantur, deinceps exequemur.

Basilicum tetrapharmacum.

C E R A E, resinæ colophonix, picis, seu taurini, pares portiones. Emplastrum ex succo lini seminis descutiens deterhensque

L I

PAULI AEGINETAE

OLEI veteris dupondo, ceræ vnciæ viginti, resinæ colophonix, adipis suilli, singulorū pondo & dimidium, argenti spumæ pondo, cerusæ vnciæ sex, succi lini seminis tantundem, farinæ pollinis vncia, thuris vnciæ quatuor.

Emplastrum ex melle, dia melitos dicitur.

ARGENTI spumæ, ceræ, olei, singulorum libræ quatuor, terebinthinæ resinæ libræ duæ, mellis, adipis suilli, singulorum libra.

ALIVD. Argentæ spumæ libræ sex, olei libræ quinq; & semissis, resinæ colophonix libræ septem & semissis, ceræ libræ tres & semissis, mellis libræ tres.

Emplastrum a succo dia chylon dictum.

ARGENTEAE spumæ pondo sex, olei, ætate quidem pondo septem, hyeme vero pondo nouem, fœnugræci semixtarius, lini seminis tantundem, althææ trepondo, althæa, seminaq; in viginti aquæ sextariis discoquantur, quousq; paululum ex ea relictum fuerit, inde succi pondo quatuor, exprimuntur miscenturq; oleo ac incoquantur dum ebullire desierint, post hæc argenti spuma in tenuissimum pollinem detrita inspergitur, postremo omnia igne non acti excoquantur vsq; dum dingitos intinctos non inquinant.

Emplastrum ex polline farinaceo, dia gyreos appellatum.

FARINACEI pollinis, guttæ ammoniaci, singulæ libræ, resinæ e picea derafæ, ceræ, adipis suilli, singulorū libræ duæ, succi lini seminis qd̄ satis est. Emplastru ab herbis botanicū dictū.

LAPATHI rhepæi, anchusæ chæro spelethi, hoc est, onocleæ, heptaneuri, plantaginis, singulorum vnciæ tres, olei libræ sex, adipis suilli tantundem: herbæ oleo excoctæ proiciuntur, reliqua cū oleo eliquant. Emplastrū ex hastula regia, dia asphodelu dicit.

HASTVLAE regix radicis succi libra, rosacei, chamæmelini, adipis anserini, singulorum vnciæ duæ, adipis suilli vnciæ tres, ceræ vnciæ quatuor.

Emplastrum e fermento, abscessus runipens.

FERMENTI, axungix, singulorum vnciæ sex, salis vnciæ quatuor, picæ resinæ vnciæ tres, ceræ vnciæ quatuor, aphronitri vncia, guttæ ammoniaci vnciæ duæ, mellis vnciæ sex, saponis vnciæ duæ. Emplastrum dothiene.

SUFFIMINIS ammoniaci pondo, nitri Alexandrini vnciæ sex, aphronitri tantundem, adipis suilli pondo duo, ceræ totidem, resinæ terebenthinæ pondo, olei veteris vncia, aceti qd̄ satis est.

Emplastrum ex radice lanaria, dia struthiu dicitur

strumas discutiens.

ARGENTI spumæ, radicis lanariæ, astrilochiæ singulorum

trēs, galbani, squamæ aris, aloës singulæ vnciæ, mannæ thuris sextans, itillæ ammoniacæ selibra, resinæ e picea vnciæ sedecim, aceti scillini sextarii quatuor, ad aridorum læuigationem.

Smilion ad abscessus.

O L E I veteris sesquilibra, argenti spumæ, nitri rubri, salis ammoniaci, lixiuij e ficu cui calx sit admista, protoſtachos dicitur, resinæ, singulorum libra, galbani, guttæ ammoniaci, singulorum vnciæ tres, atramenti sutorij vnciæ quatuor, ceræ vnciæ sex, æruginis, opopanacis, singulorum vncia, aceti, quod satis est: argenti spuma & ærugo in oleo coquuntur dum manus non inquinant, deinde reliqua admiscuntur.

Emplastrum dia scorodn, hoc est, ex alliis, ad rumpendum.

C E R. A E vnciæ sex, resinæ colophonix vnciæ quatuor, resinæ pitynæ hoc est ex picea arbore vnciæ tres, seui taurini vnciæ quatuor, nitri rufi fescuncia, allia pura viginti, olei dimidium sextarii: allia in oleo excocta prouincuntur, reliqua miscentur.

Emplastrum dia apyranu ad discutiendum.

A D I P I S anserini, & fassianorum, singulorum vnciæ tres, olei veteris vnciæ vigintisex, herbæ pulicaris vnciæ tres, vrticæ seminis, radicis apyrani viridis, singulorum libra, cera albæ vnciæ decē, emplastri quod dia chylon inscribitur vnciæ duæ, resinæ terebinthinæ vncia. Radix apyrani minutim concisa cum herba pulicari in oleo madescit semenz vrticæ per noctē & diem: ac ubi excocta fuerint, ipsa quidem prouincuntur: quæ liquari possunt, oleo mixta soluuntur.

Emplastrum pryme, ad duritias & scirrhus.

A L T H A E A E, palmularū, aut dactylorum qui nicolaī dicuntur, singulorum libræ duæ, foenugræci, lini seminis, singulorū sextarii dimidium, chamæmili, meliloti, palmularum corticis singulorū vnciæ sex, vini aminæi sextarii dimidium, spumæ argenti libra, cerusæ, resinæ colophonix, singulorum libræ duæ, ceræ, resinæ, terreben tinæ, singulorum libra, olei veteris libræ quinq, aquæ libræ duæ, panis aridi contusi cribratiq, libræ quinq: herbæ in vino decoctæ ex primuntur, succo panis immadescit, sequenti die læuigatur, argenti spuma, cerusaq, in aqua, deinde oleo iniecto incoquuntur, dum medicamentum digitos non coinquinet, inde reliqua adduntur, sublatis ab igne panis inditur, valideq, rudicula agitur. adiunguntur etiam æruginis rasæ, & salis floris singulorum vnciæ sex iridis, aristolochiæ, singulorū vnciæ sex, terebinthinæ resinæ libra.

Pelariō ex scoria argenti, dia elcysmates dicitur, ad similia abrasis.

C E R. A E, seui taurini, singulorum vnciæ quinq, scorix argenti vnciæ sex, resinæ colophonix vnciæ quatuor, picis, olei, singulorū

PAVLI AEGINETAE

vnciæ duæ scoria argenti arida læuigatur vino uel succo scœnugræci: quod si scoria desideretur, plumbagine vtimur.

Emplastrum ex althæa, podagricis aliisque duritiis accommodatum.

SVCC I scœnugreci, & lini seminis, & althææ, singulorum trepondo, olei dupondo: incoctis usque dum succus absumatur, colophonizæ resinæ pondo adiicitur, item terebinthinæ resinæ pondo, hederæ lachrymæ quadrans: vbi soluta fuerint, & ab igne sublata, ceræ pondo micitur, galbani triens: vtraque simul contusa solutaque rudicula agitantur.

Cissinum ad neruorum vulnera, punctus, & maxime diuturna.

SQVAMAE rubræ vnciæ quatuor & semissis, thuris vncia, misyos sescuncia, chalcitidis drachmæ quatuor, aceti sex: læuigantur æstiuo sole usque dum acetum fuerit consumptum, deinde solutis ceræ vncias octo, olei octodecim misceto. Si autem diuisus fuerit neruus & nudus sit, in vicem galbani, resinæ terebinthinæ vnciæ duæ induntur.

Melanchloron ad eadem, & cruentis aptum

MALICORII, æris combusti, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, aluminis scissi & liquidi, (alii vice liquidi rotundu ponunt) iridis, misyos, atramenti sutorii, chalcitidis, æruginis rasæ, cadmiæ, aloës, myrrhæ, thuris, panacis radicis, argenti spumæ, cerusæ, pares omnium portiones, teruntur in sole æstiuo cum aceto diebus pluribus, singunturque pastilli. Emplastrum vero fit hunc in modum: medicamenti vnciæ duæ, ceræ vnciæ sex, olei vnciæ octo, in neruorum vulneribus veteris, in aliis communis, temperatur.

Emplastrum ex senetione, quod dia erigerontos dicitur.

SENETIONIS succi libræ duæ, olei veteris sesquilibra, cyprini olei vnciæ quatuor, axungie veteris libra, resinæ terebinthinæ vncia, galbani semuncia, resinæ piceæ sex, æruginis, thuris, hyssopi medicamenti, singulorum vncia, squamæ æris scrupula octo, aeræ vnciæ decem, apochymatis vnciæ quatuordecim: oleum & succus ad sordium spissitudinem incoquitur cum adipe suillo: arida cyprino læuigantur, galbanum cum cera contunditur & cacabo demittitur, apochyma siquidem siccum fuerit, læue incretum ponderato inspergitur: quod in læuorem deteri nequeat, portione olei solutum excipiat, atque tunc omnia misceantur.

Emplastrum Musæi discutiens.

CERAE, axungie porcine, singulorum libræ, resinæ colophonizæ vnciæ sex, argenti spumæ libræ duæ vini generosi libræ quatuor adiiciuntur.

Ariobarzanion ad eosdem affectus.

ARGENTI spumæ sescuncia, cerusæ libra quincunx, aquæ

LIBER VII.

267

marinæ vnciæ vigintiquinq; olei veteris sesquilibra, buccinorū crematorum vnciæ septem & semis, ceræ rufæ vnciæ nouem, resinæ terebinthinæ vnciæ sex, thuris vnciæ tres, scrupula tria & dimidiū.

Emplastrum ex dracunculo.

CERAE, resinæ colophonix, picis aridæ, axungix, resinæ, singulorum libræ quatuor, guttæ anemoniacæ libræ duæ, dracunculi radicis libræ quinq; radix arida læuis aliis solutis inspergitur.

Pistacium.

CERAE, resinæ colophonix, adipis suilli, alterci foliorum tenerorum, vel succi eorum, æqualis modus. In Alexandria autē ceræ libræ duæ semis, alterci libræ duæ, axungix libræ duæ semis, colophonix resinæ libræ decem miscentur, magisq; discutit medicamentum.

Myrsinatum.

ARGENTI spumæ, cerusæ, sandicis, plumbi cōbusti & eloti, singulæ vnciæ, ceræ vnciæ sex, olei myrtei libra, vini quod satis est.

Emplastrum ex cerusa, vel ouis.

CERAE tractæ vnciæ sex, rosacei sesquilibra, argenti spumæ vnciæ duæ, cerusæ tantundem, amyli vnciæ, tres, ouorum quinque aquata.

Emplastrum, quod liquidum sit parygrum vocatum, Oribasii.

ARGENTEAE spumæ fescuncia, cerusæ tantundem, ceræ riens, pinguis suilli septunx, resinæ colophonix dodrās, lini seminis succi, olei, singuli dextantes: mirifice facit ad calcanei rimas. in vlce-ribus autem (inquit) vitant, nam ea tetri odoris reddit.

Emplastrum dia Cadmias, cicatricem inducens.

CHALCITIDIS vstæ vnciæ duæ, cadmiæ, mannæ, thuris, singulorum vncia, ceræ, resinæ colophonix, olei myrtei, singulorum libra, vini quod satis est.

Palmulatum, phoenicine dicitur.

AXUNGIAE veteris libræ duæ, olei veteris libræ tres, argēti spumæ tantundem, chalcitidis crudæ vnciæ sex: primum chalcitis cum oleo in pila commodiore læuigat, vel in sole: vbi sordium spissitudo facta fuerit, etiā spuma argenti prius detrita superiniicitur, postea adeps: postquam probe in pollinem redacta fuerint, leni igne incoques, quoad digitos non inquinent, palmarum rudicula agitans.

Emplastrum ex Anchusa, ambustis efficax.

CERAE albæ vnciæ nouem, rosacei vnciæ octodecim: his liquatis porphyridos anchusæ radicis siccæ læuissimæ vncias quatuor inspergito. ALIUD. Anchusæ radicis viridis, marrubii, gummi, singulorum vnciæ tres, decoctæ in olei vnciis nouem, piiciunt, oleo ceræ albæ vnciæ quindecim superiniiciuntur, omniaq; soluantur.

LI ij

PAULI AEGINETAE

Emplastrum ex Pompholyge, pompholygeron appellatum,
POMPHOLYGIS vnciae duae, argēti spumae vnciae tres,
læuigantur cum lini seminis succo, adiciuntur ipsis liquatae refrige-
rataeque ceræ vnciae sex, adipis anserini vel gallinacei vnciae duae, cha-
mæmelini vnciae sex.

Philocotyche, dolorem leniens, ad sedem utilis.

THVRSIS vnciae septemdecim, myrrhæ vnciae septem, opū
drachmæ quatuor, aluminis scissilis drachmæ duae, butyri drachmæ
quatuor, ouorum tenuium lutea quatuor, cadmæ crematæ & elotæ
drachmæ quatuor, pompholygis drachmæ sex, ceræ tyrrhenicæ dra-
chmæ octo, adipis anserini drachmæ sedecim, medullæ ceruinæ dra-
chmæ vndecim, plumbi cremati elotiq; drachmæ nouem, lapidis ha-
matitis drachma, hyssopi liquidi drachmæ quatuor, arida læuigantur
cum vino Italico, quæ liquari possunt, admiscuntur.

Emplastrum Amithaonis, ad articulos recenti cicatrice con-
tractos, conuulsosq;: est etiam ad extrahen-
dum efficax.

AMMONIACI, ceræ, bdellij, singulorū drachmæ octo, res-
inæ terebinthinæ, iridis illyricæ, galbani, singulorum drach. viginti.

Emplastrum Aristophanium emolliens.

PICIS libræ quatuor, apochymatis libræ duae, ceræ libra, opo-
panacis vncia, aceti hemina.

Emplastrum ex plumbagine ad calidas affectiones.

PLUMBAGINIS vnciae quatuor, spumæ argenti vnciae
duae, cerusæ tantundem, ceræ vnciae octo, myrtei libræ duae, vino læ-
uigantur arida.

Coracon ex oxymelite, ad naturalium vitia & no-
mas accommodatum.

GALLAE vnciae duae, squamæ fescuncia, chalcitidis, thuris,
singulorum vncia; teruntur aceto diebus complusculis, deinde mel-
lis vnciae quinque miscuntur, vbi vero seorsim ceratum feceris, ex
myrtei vel rosacei vncijs duabus, seu taurini vncijs octo, ceræ vncijs
quatuor: resinæ terebinthinæ vncia, mixta simul læuigato & vtitur
quemadmodum medicamento quod charta constat, tum ex peni-
cillo, tum ex linamento.

Emplastrum ex oxelæo.

ARGENTI spumæ pars vna, olei, aceti, singulorum partes
duae, nonnulli treis ponunt.

Emplastrum ex achathe, discutiens emolliensq;.

LAPIDIS achatis semiusti fescuncia, ceræ vnciae quinque,
resinæ frictæ vnciae tres, olei vncia.

LIBER VII.

258

Isis, cruentis accommodata, ad glutinandum, carnem iuducendum, & purgandum.

SQVAMAE æris, æris combusti, aristolochiæ rotundæ, singulorum drachmæ octo, aluminis scissi drachmæ sex, salis ammoniaci, thuris, guttæ ammoniacæ singulorum drachmæ octo, myrrhæ, aloës, galbani, singulorum drachmæ duodecim, dracunculi radicis succi drachmæ octo, ceræ libra, resinæ colophonix libræ duæ, olei veteris vnciæ tres, aceti quod satis est.

Athena, ad vlcera sordida, impacta, nervorum vulnera.

MALICORII, æris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ & longæ, salis ammoniaci, guttæ ammoniacæ squamæ æris, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, misyos atramēti sutorij, chalcitidis, æruginis rase, cadmiæ aloës, myrrhæ, propolis, galbani, singulorum vnciæ, ceræ drachmæ ducentæ, picis tantundem, resinæ colophonix drachmæ centum, olei vnciæ sex, aceti quod satis est.

Emplastrum dia dictamni, glutinans, ad canum morsus, & omnigena vlcera.

ARGENTI spumæ pondo duo, squamæ æris vncias sex, æris cremati vncias octo, aloës vncias octo, galbani vncias duodecim, olei veteris sextaræ duo, diphrygis vnciæ tres, gentianæ sescuncia, aristolochiæ, æruginis rase, singulorum vnciæ duæ & semis, dictamni tantundem, colophonix pondo, mannæ thuris vnciæ tres, guttæ ammoniaci vnciæ sex, propolis vnciæ duæ, ceræ vnciæ sex & semis, primum oleum cum argenti spuma incoqui debet dum incrassescat, nec digitos inquinet, deinde lebetē deposito æruginem & squamam iniicies, rursusq; incoques, dum manum non inficiant, iterumq; caccum ab igne tollens, resinam & ammoniacum incretum adicies mouens, donec feruere definant, mox in ignem repones, ac vbi modicē inferbuerint, æs & diphryges admiscebis, ac rursus coques vsq; dum firma spissitudo facta fuerit, deinde ceram iniicies, eaq; discocta vt digitos non coinquinet, propolia immittes, his abunde refrigeratis, mox aloē, mannā thuris, dictamnū, aristolochiam, gentianam, singula læuissima insperges.

Barbara, emplastrum quod cruentis protinus vulneribus iniicitur, & fracturarum callos firmat.

BITVMINIS Iudaici, picis aridæ, ceræ, resinæ, singulorum libra, terebinthinæ vnciæ duæ, argenti spumæ, vncia, cerusæ sescuncia, mannæ thuris vnciæ duæ, opopanax vnciæ duæ, zingiberis vncias duæ, olei vnciæ tres, aceti quod satis est.

¶ l iij

PAVLI AEGINETAE

Emplastrum ex salicibus, dia iteon appellatur, glutinans, cruenta excreantibus & purulentis efficax: thoraci impositum.

MISYOS, chalcitidis, æruginis, cerusæ, gallæ, aluminis scissilis & rotundi, cretæ sutoriæ, singulorum vnciæ sex, ceræ libræ duæ, resinæ picæ libræ duæ, picis tantundem, malicorii vnciæ sex, bituminis libræ duæ, salicis foliorum totidem, olei rosacei vnciæ quatuor atramenti sutorii vnciæ sex, aceti quod satis est. sunt qui terebinthinæ vncias nouem addant.

Emplastrum Nicolai ad recentia vulnera, & sinus glutinandos aptum.

SQVAMAE æris vnciæ quatuor, æruginis rasæ fescuncia, argenti spumæ tantundem, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum vncia, aluminis scissilis & rotundi, singulorum vncia, atramenti sutorii vncia, sulfuris viui vncia, gallæ omphacitidis vnciæ quatuor, salis ammoniaci vncia, misyos vncia origani, vncia, chamæleontis vncia, cadmiæ botryitidis vncia, veratri albi vncia, peucedani vnciæ tres, apii seminis vnciæ duæ, symphyti radice fescuncia, cerusæ fescuncia, mandragoræ succi semuncia, chalcitidis fescuncia, terræ famiæ, quæ asfer dicitur vncia, thuris masculi vncia, aloës vncia, bdellii vnciæ duæ, opii thebani tantundem, zingiberis troglodytici semuncia stillæ ammoniacæ vncia, foenugræci vnciæ sex, perdicii herbæ succi vnciæ sex, ceræ flauæ vnciæ tres, resinæ colophonæ libræ duæ, resinæ pitynæ hoc est e picea libra, polentæ tantundem, mastiches vnciæ sex, picis nigræ libræ duæ, olei veteris libra, styracis vncia, opopanax fescuncia, aceti quod satis est.

Ictuos ad strumas, abscessus, lienem, articulos: & coxendicum dolores.

ARGENTI spumæ denarii centum viginti, olei veteris sextarii duo, aceti sextarius, æruginis sesquidenarium, picæ corticis denarii octo, chamæleontis radice, euphorbii, hypocistidis succi, propolis, zingiberis, helenii, pyrethri, singulorum denarii sedecim, ceræ libræ tres.

Emplastrum Neronis, ad ictus, omnemq; particularum carnosarum dolorem.

OLEI veteris sesquilibra, argentæ spumæ libra, ceræ resinæ picæ, singulorum vnciæ septem & semissis, guttæ ammoniaci vnciæ quatuor, cerusæ tantundem, galbani, mannæ thuris, zingiberis, thuris, singulorum vncia.

Oxera, multiplicis vsus.

PICIS aridæ libræ duæ, ceræ libra, guttæ ammoniacæ vncia,

LIBER VII.

269

resinæ terebinthinæ sēlibra, galbani vnciæ duæ, mannæ thuris vnciæ duæ, aceti sesquiseptarius.

Aceratos, hoc est ceræ expers, emplastrum Galeni, glutinat, concoquit, vlcera ad suppurationem perducit, ex ricinino aut veteri oleo, medicaminis in linteolos illiti modo, solutum.

ARGENTI spumæ trepondo, olei ricinini, aut veteris pondos quatuor, aceti quam acerrimi dupondo æris squamæ nigræ, chalcitidis, æruginis, singuli sextantes: argenti spuma cum oleo incoquitur, dum strigmenti fiat spissitudo, deinde metallica compluribus diebus ex aceto læuigata adiiciuntur.

Emplastrum ex metallicis.

CHALCITIDIS vncia, misyos vnciæ duæ, squamæ æris vnciæ tres, thuris tantundem, colophonix vnciæ, galbani sescuncia, ceræ libra, olei quincunx, aceti quod satis est.

Armenia, fracturis accommodata.

CHALCITIDIS vnciæ quatuor, squamæ æris vnciæ duæ semis, æris cremati vncia, thuris vnciæ duæ, olei libra, aceti tantundem: coquuntur metallica in oxelæo, dum manum non inquinant, inde thus adiicitur.

Melæne Serapionis.

SPVMÆ argenti libra, ceræ vnciæ septem, guttæ ammoniaci vnciæ tres & semis, galbani, æruginis, singulorum denarii novem, resinæ colophonix vnciæ septem, myrrhæ drachma olei sesqui hemina: argenti spuma cum oleo incoquitur quousque digiti intincti non inquinantur, deinde adiiciuntur reliqua.

Anicetos, ab insuperabili vi appellatum emplastrum, glutinat, discutit, squamas separat, & ad articulos recenti cicatrice contractos valet.

BACCARVM lauri, iridis aridæ, thuris, singulorum drach. sexaginta, æris combusti drachmæ viginti, nitri, salis, ammoniaci, singulorum drachmæ viginti, pyrethri, herbæ pedicularis, seminis roris marini, grani gnidii, sinapis, columbarum stercoreis, aristolochiæ, cumini, æruginis, iunci quadrati, erucæ seminis, singulorum drachmæ octo, aceti heminæ duodecim: læuigantur sub æstu caniculæ, quousque acetum consumatur, deinde decocti caricarum crassissimi vnciæ novem adduntur, quibus mixtis pastilli fiunt, siccanturque. ubi vtendum est, pastillorum ipsorum vnciæ duæ læuigatæ aceto miscentur, resinæ vnciæ tres, ceræ tyrrhenicæ vnciæ duæ, olei tantundem.

Emplastrum ex lolio, dia æron dicitur.

PAULI AEGINETAE

PICIS libræ duæ resinæ picæ vnciæ nouem, ceræ tyrhēnicæ vnciæ quinque, olei vnciæ tres, bituminis increti vnciæ duæ, lolij farinæ sextarius, aceti quantum sufficit.

Emplastrum ex liquore sycamino.

ARGENTI spumæ, picis aridæ, seu taurini, singulorum vnciæ octo, terebinthinæ vnciæ tres, ceræ vnciæ quinque, æruginis rasæ, opopanacis, galbani, singulorum vncia, olei ricini, aut fusini, aut admodum veteris hemina, picis liquidæ tantūdem, liquoris sycamini cuius fructus sycomora dicuntur, hemina.

Emplastrum a duplici colore dichromon appellatum.

ÆRIS combusti, aluminis scissilis, guttæ ammoniacæ, singulorum vncia, ceræ libra, resinæ colophonix libra, seu suilli libra, aceti, quod satis est.

Inde conglutinans ad vlcera quæ serpendo depascunt,
& sanguinis sputum.

CERÆ, resinæ frixæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacynthi, singulorum libra, cerusæ, chalcitidis, misyos, cretæ sutoriæ, aluminis scissilis & rotūdi, gallæ omphacitidis, singulorum vnciæ sex, aceti quod satis est.

Emplastrum ex cinere aspidum, discutit strumias
& podagras.

RESINÆ terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudaici, singulorum drachmæ trecentæ sexaginta, ceræ, baccarum lauri, guttæ ammoniacæ, aphronitri, seu vitulini, singulorum drachmæ trecentæ quadraginta, lapidis pyritis, calcis viuæ, singulorum drachmæ centum quadraginta, cineris aspidum totidem, olei veteris hemina duæ: refrigerato medicamento cinis inspergitur. fit etiam sine cinere, quod nonnulli eum auersentur, & nihilominus etiam efficit.

Lexæna siccatur, discutitq.

SVFFIMINIS ammoniaci, plumbaginis, singulorum drachmæ centum, sinapis drachmæ octo, chamæleontis radicis drachmæ sedecim, resinæ colophonix drachmæ centum, squamæ æris, lanariæ radicis, singulorum drachmæ quinque, euphorbiæ, æruginis, singulorum drachmæ octo, aristolochiæ drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ octo, olei veteris hemina, raphanini quantum sufficit.

Aliter lexæna, noxia educit in superficiem, humoresq. euacuat.

ATRAMENTI sutorij vnciæ duæ, auripigmenti vncia, vetratri nigri, thoracum cantharidum, singulorum sesquidrachma, sandarachæ vnciæ tres, ceræ sesquilibra, resinæ frictæ libra, olei hemina duæ,
Macedonicum.

LIBER VII.

270

CERAE, resinæ colophonix, picis, seu taurini, lachrymæ thuris, pares portiones: eliquatis, ac sublati ab igne lachryma thuris inspergitur.
Sphæron ad ardore.

CER. VSAE, argenti spumæ, calcis viuæ, singulorum vnciæ tres, ceræ fescuncia, aluminis berenicarî, rosacei, singulorum vncia: liquefacta aridis superfunduntur, ac orbiculi formantur: quum vsus incidit, olei vncias sex liquato cum duabus ceræ, adicitoq; medicamento vnciam & agitato: refrigeratum ex aquæ vnciis nouem contundito, ego etiam ternas rosacei vncias addo.

Emplastrum ex ochra, inflammationem arcet, tum sponte, tum in iudicio tortis idoneum.

ÖCHRÆ atticæ libræ duæ, cretæ libra, argenti spumæ vnciæ octo, vino læuigatæ ceræ, resinæ colophonix, picis, resinæ piceæ, singulorû libræ, resinæ terebinthinæ vnciæ octo, olei libræ duæ, hunc in modum soluuntur: ceræ libra, olei veteris libræ tres, medicamenti libra vino contunduntur.

Emplastrum ex cedria, glutinat, discutit, abstergitq;.

CERÆ, picis aridæ, singulorum libræ, resinæ colophonix vnciæ octo, cedrini liquoris vnciæ sex: liquata simul incoquantur, dum digites non coinquinent.

Aliud emolliens.

CERÆ, picis, singulorum vnciæ octo, resinæ colophonix drachmæ vigintiquinque, propoleos drachmæ septemdecim, cedrini liquoris drachmæ viginti.

Emplastrum ex pumice, ad cicatricem ducendam.

MYRTEI libræ duæ, ceræ libra, pumicis cremati vinoq; restincti drachmæ sex, squamæ ferri quod stomoma dicitur drachmæ sex, æris vsti, cimolix, singulorum drachmæ quinque: super linamentum spongiamq; ex aqua accommodato.

Emplastrum paula, strumis & bubonibus efficax.

CERÆ, resinæ colophonix, nitri, singulorum libræ.

Emplastrum ex nitro, ad carbunculos.

NITRI tosti vnciæ tres, ceræ, olei, resinæ colophonix, singulorum sesquidrahma, liquoris cyrenæici aut medici drachmæ decem: imponitur in linteolis, solutum.

Emplastrum ex anemone.

ANEMONÆ vnguibus detractis vnciæ duæ, ceræ vnciæ quinque, olei vnciæ quatuor, resinæ vnciæ quinque & semis, colophonix resinæ libræ duæ & semis.

PAULI AEGINETAE

Emplastrum Macherionis viride, ad coxendicum crociatus,
articulos infarctos, & abscessus.

OPOPANACIS, galbani, æruginis, myrrhæ, iridis, guttæ
ammoniaci, aristolochiæ, singulorum vncia, resinæ terebinthinæ, ce-
ræ, olei omphiacini, singulorum vnciæ septem.

Viride aliud simplex.

RESINAE libræ tres, ceræ libra, æruginis rasæ sēlibra, thuris
drachmæ viginti quinque, aceti quod satis est.

Aliud viride, ad humida vitia, & carnis excrescentias.

RESINAE colophonix vnciæ sex, æruginis rasæ sēscun-
cia, ceræ vnciæ duæ, salis cappadocij vncia, rosacei vnciæ duæ,
aceti quantum sufficit.

Peganera ad pleuriticos.

RVTAE viridis pondo, butyri sesquipondo, resinæ terebin-
thinæ pondo & quadrans, hyssopi medicamenti tantundem, popa-
naxis quadrans, galbani tantundem, anethi pondo.

Emplastrum dia stactes, hoc est, ex lixiuio, coxendicum
doloribus, art: culaijs, & tumoribus oedema
referentibus vtile.

CERAE, olei veteris, lixiuū quod habet calcem admistam, sin-
gulorum libra, resinæ frictæ nitri alexandrini, nitri albi, resinæ tere-
binthinæ, singulorum vnciæ sex: vtrunq; nitrum lixiuio teritur.

Emplastrum e nitro ad abscessus, scirrhus, & tumores.

OLEI veteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiuū, singulorum li-
bra, resinæ terebinthinæ vnciæ sex, galbani, propolis, guttæ ammo-
niaci, singulorum vncia: præparatur quemadmodum superius.

Emplastrum ex sale, dia halon dicitur.

CERAE vnciæ quatuor, olei libra, salis communis vnciæ qua-
tuor, aphronitri tantundem, cerusæ vnciæ octo, aceti vnciæ duæ, ad
arida conterenda. ALITER. Salis communis, nitri, singulo-
rum vnciæ quatuor, ceræ, olei veteris, singulorum vnciæ sex, aquæ
marinæ quod satis est.

Emplastrum dia pternes, ex perna, tophos soluit.

PERNAE suillæ veteris pinguis, guttæ ammoniaci, casei ve-
teris vaccini aut caprilli, seui taurini, apochymatis quæ est nauiis ra-
sura, singulorum libra, medullæ ceruinæ vnciæ octo, hyssopi cerati
vnciæ tres, cyprini olei vnciæ sex, vini Aegyptij quod satis est.

Emplastrum dia cinnabareos, hoc est, ex cinnabari ad tophos
aliosq; omnigenos tumores induratos, di-
citur pamplethes.

ARGENTI spumæ libra, olei veteris sextarius, squamæ æris

LIBER VII.

271

VNCIA, æris vñti tantundem, cinnabaris scrupula octodecim, lapidis magnetis viui vncia, lapidis phrygii drachmæ sex, lapidis pyritis, cadmiæ, æruginis rasæ, thuris, singulorum vncia, diphygis vnciæ duæ, aloës sescuncia, galbani tantundem, lapidis onitis scythici scrupula octodecim, lapidis hæmatitis vncia, propolis libra scrupula vigintiocto, ceræ vnciæ septendecim, lapidis perdicitis vncia (in alio perdicati habet) betonicæ vncia scrupula octo, gentianæ vncia, aristolochiæ longæ & rotundæ drachmæ quatuor, chamæleontis nigri vncia, dictamni scrupula quadragintaduo resinæ aridæ libra, seu struthiocameli libra: lapides cum spuma argenti teruntur seorsim, adiectis salis floris libris duabus, donec totum absumatur.

Emplastrum ex auellanis, dia leptocaryon dicitur, ad articulorum tophos probatum.

LIXIVII quod calcem habet adiectam vnciæ sex auellanarum partis interioris vnciæ duæ, aphronitri vnciæ sex, olei veteris libra, saponis gallici vnciæ quatuor, mellis vnciæ octo, ouorum sex aquata, ceræ vnciæ decem, resinæ terebinthinæ vnciæ duæ læuigantur ex lixiuio.

Dia turpænes ceratum ad podagram, dolorem leniens mirabiliter.

QVINTO Martii mēsis die, olei communis sextarios duos lebeti in domo subterranea infundito, coquitoq; lignis e vite: vbi in-ferbuerit, turpænæ marini piscis librâ adiecto, asphalacis animātis, quod nonnulli madamudam vocant, sanguinis vncias quatuor, in-coquitoq; dum carnes piscis dissoluantur aut torresiant, deinde exem-ptis illis, olei & ceræ momentum adiecto in spissitudinem, vt mol-
lissimum fiat ceratum, quod linteolo illitum impones.

Emplastrum ex vrina muli, podagricis vtile.

VRINAE muli sextarii quatuor, argenti spumæ libræ duæ, olei veteris mystrum, trita diu omnia vt strigmenti spissitudo fiat, in-coquito donec digitos non inquinent.

Emplastrum ex lapidis asii flore Philagrii ad scirrhus.

PEVCEDANI radice, asii lapidis floris, si non adsit, salis, guttæ ammoniacæ, lanarum succidarum crematarum, singulorum vncia, aristolochiæ rotundæ, pumicis, canini stercoreis, æruginis rasæ, quæ æris, mīsyos, singulorum scrupula octodecim, castorii tan-undem, myrrhæ vnciæ tres, aceti quā acerrimi tātūdem, ceræ vnciæ octodecim, & semis, resinæ e picea, picis brutiæ, singulorum vnciæ octodecim semis scrupula sex, olei veteris quod sufficit.

Ex eodem Galeni.

CERAE, resinæ terebinthinæ, singulorum libra, lapidis asii

PAULI AEGINETAE

mannæ thuris, singulorum tres vnciæ, cyprini vnciæ duæ, aquæ lixi-
uæ quantum satis est.

Emplastrum ex sali, flore, articulariis in declinatione
accommodatum.

RESINAE terebinthinæ, resinæ frictæ, resinæ e picea, ceræ,
singulorum libra, picis aridæ, aluminis scissilis, salis floris, singuloru
se libra : coquantur in lobete.

Emplastrum quod nutriendæ vlcerum carni est.

ROSACE, resinæ terebinthinæ, mellis singulorū vnciæ duæ,
cerusæ, butyri, singulorum vncia, aliæ etiam thuris vnciam addunt.

Emplastrum Italicum ad purgandum sordida, inducen-
dumq; carnem.

ERINAEI (dico autem sylvestris ficus) tenerum corticem
oleo excoctum proicito, ceræ rufæ quantum satis est in oleo lique-
acito, in linamenta illito vtitur.

Entaticon, quasi dicas intensorium.

SATYRII, pudendi ceruini, scinci caudæ, singulorum dra-
chmæ duæ, erucæ seminis, pyrethi, seminis rorismarini, ceræ, singu-
lorum drachmæ quatuor, resinæ terebinthinæ drachma, oua passerum
troglodytarum tria stelliones transmarini tres, olei laurini vel irini
quod satis est : macerantur viui in aceto stelliones ad dies triginta,
vase cui insunt in fimo defosso.

Chryse, cruentis vulneribus accommodata.

THVRSIS, aluminis scissilis singuli sextantes, colophonix
resinæ libra, olei quadrans, auripigmenti sextans, aceti cum oleo
mixti, quod satis est.

Catagmatice quod est fracturis idoneum medicamen-
tum, Oribasii.

PICIS brutæ libra, vnciæ quatuor, argenti spumæ tantundem,
thuris vnciæ octo, resinæ terebinthinæ vnciæ quinque, seui taurini
libra, vnciæ quatuor, galbani, opopanacis, singulorum vncia, ceræ
vnciæ quatuor, olei veteris libra, aceti vnciæ quinque.

Catagmatice ad fracturas cum vulnere citraq; id factas,
ex commentarijs Heraclei.

PICIS aridæ mina, argenti spumæ tantundem, mannæ thuris
minæ dimidium, seui vitulini mina, ceræ tyrrhenicæ vigintifex, opo-
panacis vnciæ octo, æruginis rasæ, æris cyprini, singulorū minæ quinq;
& decima eius portio, resinæ terebinthinæ sesquimina et quinta por-
tio, æris vncia, ricinini, aut olei veteris hemina, aceti hemina semissis.

Liquidi hyssopi medicamenti præparatio.

SERTVLAE campanæ vnciæ quatuor, cardamomi vnciæ

duæ, lanarum bene fordidarum vnciæ sex; macerata in vini duobus sextarijs ad triduum incoquito, dum paululum fuerit reliquum. his ablatis miscentur vino olei vnciæ tres, coquanturq; dum exiguum supersit, atq; vino etiam tunc adiciuntur resinæ colophonix vnciæ decem, terebinthinæ tantundem: nonnulli vero & ceræ dextantem miscent, hyssopi herbæ vnciam, alijsq; incoquunt: alij lanas vino eluunt: vbi desiccarint, vinum cum fordibus lanarum addunt, quas pinon etiam appellat quum vsus incidit, treis ex eo vncias mittunt, tum reliqua vt comprehensum est.

De Malagmatis & Epithematis

Cap. xviii.

Inter ea quæ malagmata dicuntur, alia medijs corporis partibus iniiciuntur, longa inflammatione conflantibus, aut induratis, aut æstu flagrantibus, aut perfrictionem fluxionem ve expertis: alia articulis quibus humores sint impacti vel nervis refrigeratis, vel etiam alijs particulis scirrho obfessis congruunt. de his igitur tum in capite de emplastris tractatum est, tum vbi ad acopa ventum erit differetur. Porro inter malagmata medijs corporis regionibus accommodata, (epithemata proprie nuncupantur) quæ quidem stomacho, & iocinori admoventur, qualiacunq; illa fuerint roborantem ex astringentibus vim postulant. Sine his etenim vitæ aliquod discrimen intulerint, cum illa nempe stomachus & iecur communes aliarum partiũ alimentis, sint officinæ. Quamobrem eiusmodi medicamenta ex aromatis potissimum conficiuntur. Stomacho igitur iniici debent, si non concoquit, aut infirmatur, aut inflatione laborat, malagmata ex seminibus, meliloto, aloë, absinthio, sampsocho, nardo, & mastiche. Iecori autem ex myrobalano confecta, ammoniaco, pinguibus, & chamæmelino. At leni applicantur, quæ constant calce viua, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, ærugine, ammoniaco, & acetosis autē qui alui fluore laborant, ex œnanthe, alumine, melino, & alijs astringentibus præparata. atq; hæc etiam per abusionem cõmuniter malagmata nominant, & si diuersam a molliendo vim repræsentent. Si vero ardor viscera vrgeat, in febribus ardentibus, ex croco competunt malagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut intybi, aut herbæ feminalis, adipe suillo, & spuma argenti: si perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum, casamum, & piper recipiunt. Pectori, quum sanguis eiicitur, prosunt astringentia siccantiaq; ex alumine, salice, & bitumine. In tabe quæ phthisis dicitur, conducunt ex baccis lauri, marrubio, cardamomo, & lixiuio confecta.

Malagma ex sertula campana, dia meliloton dicitur.

C R O C I, nardi gallici, iunci angulosi, cardamomi, iridis, myrrhæ, singulorũ vnciæ duæ, sertulæ cāpanæ libra, stillæ ammoniacæ,

PAVLI AEGINETAE

atnuntidem, ceræ libræ tres, resinæ terebinthinæ libra, olei cyprini libræ tres, gleucini libræ duæ, bdellij vnciæ sex, nonnulli etiam cyphi vncias duas addunt, vini quod satis est.

Polyarchion ex commentario Galeni de compositione medicamentorum secundum locos.

CERAE, resinæ terebinthinæ, bdellij, suffiminis ammoniaci, cardamomi, iunci quadrati, singulorum mina, fertulæ campanæ, amomi, nardi indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, singulorum drachmæ xxv. olei cyprini hemina, vini Italici quod satis est præparato ac vtitor, interim meraco, interim cerato quod ex cyprino fit, soluto.

Aliter Polyarchion.

XYLOBALSAMI, costi, iridis, iunci quadrati, myrrhæ, iunci rotundi floris, cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches styracis, bdellij, amomi phylli, croci, casisæ, pyrethri, aristolochiæ longæ, singulorum vncia, guttæ ammoniacæ fescuncia, resinæ frictæ tres viciæ resinæ terebinthinæ libra, medullæ ceruinæ vnciæ duæ, ceræ libræ duæ, opobalsami vnciæ sex, vini vnciæ octo.

Philagrianum.

CROC I fescuncia, aloës, ammoniaci thymiamatis, bdellij, styracis, singulæ vnciæ, adipis anserini sextans, hyssopi medicamenti triens, palmularum sextans, ceræ libra, nardi selibra, melini vnciæ sex, vini quod sufficit ad sicca læuiganda: per triduum macerantur mouenturq; rudicula ter die, deinde inquoquuntur oleo, secundo die cardamomum aqua pridie maceratum, tertio autem crocus, vino. Nō nulli cum croco etiam alias quinque myrrhæ vncias adiiciunt: illis autem exemptis, oleum purum reponunt, omni vero specierum fæce in pastillos coacta siccataq; id habent quod crocomagma dicitur.

Mendesium.

DICTVM est Mendesium quod in Aegypto reperitur, vbi & Mendes, hoc est, caper colitur. Recipit autem olei balanini librā, alias sextarios decem, myrrhæ, casisæ fistulæ, singulorum vncias treis, resinæ terebinthinæ libram, in alio sextarios decem, cinnamomi vncias treis: hoc non decoquitur, sed aridis inditis diebus sexaginta agitur, inde liquefacta terebinthina in partem olei mittitur, postea rursus diebus aliis septem mouetur, atq; sic reconditur.

Marciatum.

MASTICHES, ceræ, styracis, singulorum vnciæ tres, hyssopi medicamenti semuncia, opobalsami fescuncia, nardini, gleucini, omphacini, singulorum vnciæ tres, medullæ ceruinæ fescuncia, terebinthinæ vncia.

Iniectio

Iniectio prima dia omphacos.

ASPALATHI, rudiculæ palmarū, fertulæ campanæ, iridis, iunci rotundi floris, xylobalsami, rosarum siccarum, calami aromatici, singulorum vnciæ tres, olei omphacini libræ decem, vuæ immaturæ lucci tantundem.

Iniectio secunda, ex caryophyllo.

AMMONIACI, spicæ nardi, costi, caryophylli, casfiæ, casami, singulorum vnciæ tres, in alio etiam habetur arnabo vnciæ tres, vini quod sufficit.

Iniectio tertia.

THVRI, guttæ ammoniaci, styracis, bdellij, myrrhæ, mastiches, singulorum vnciæ tres, vini, quod satis est, ceræ albæ vnciæ quinque opobalsami vnciæ sex, nonnulli vncias octo. Primæ iniectionis medicamenta pridie in vuæ acerbæ succo oleoque macerantur, secundæ seorsim in vino aminæo aut alio veteri ac odorato, mouenturque quotidie rudicula palmea: tertiæ ad triduum, post quod in cacabo nudente primæ iniectionis medicamenta inquoquuntur, quousque pauxillum succi vuæ acerbæ relictum fuerit: mox secundæ iniectionis species cum vino immittuntur: rectius autem fiet si prius alijs exemptis, puro deinde oleo ipsæ adiciantur, coquanturque donec pauxillum vini superfit, ne aduratur cleum: sublata ab igne eximito, superque adicito rursus oleo puro tertiæ iniectionis medicamenta, prius ex vino in pila soluta præter styracem quemadmodum prædixi, hic etiam cum alijs inditus prompte soluitur. Coques autem carbonibus quousque bene habere tibi videantur: sublata ab igne refrigerari finito, in sequenti die exceptis diligenter ex oleo calfactisque abunde, super ignem ceram adicito, inde sublata rudicula agitato: ubi refrixerint, opobalsamum admisceto, & vitreis vasis reponito.

Gleucinum, iniectio prima.

OLEI sextarii decem, musti aminæi sextarii sex, aspalathi vnciæ quatuor, palmæ fructus operimenti quod spathæ dicitur vnciæ sex, iunci rotundi floris tantundem, fertulæ campanæ vnciæ quatuor, rosarum vncia, myrrhæ vnciæ tres, foliorum lauri vnciæ duæ, arboris thuris vnciæ sex, xylobalsami totidem, inulæ campanæ vnciæ sex, aristolochiæ longæ vnciæ tres, iridis tantundem: hæc macerantur in musto.

Altera iniectio.

NARDI gallicæ vnciæ quatuor, casami, qui est balsami fructus vnciæ duæ, cyperi, casfiæ, spicæ nardi, asari, amomi, costi, sampsihi, singulorum vnciæ tres, calami aromatici, caryophylli, phylli, singulorum vncia, cardamomi vnciæ quatuor, balsamum vino odorato madescit.

Iniectio tertia.

MASTICHE S, triens, myrrhæ trogloditicæ, bdellij, singuli sextantes, ladani quadrans, styracis liquidi, thuris masculi, singuli

M m

PAULI AEGINETAE

trientes, opobalsami selibra, nonnulli & croci sextantem addunt: præparatur quemadmodum medicamentum ex vua acerba, nisi quod ceram non recipiat, hic autem septem diebus oportet species duarum iniectionum macerari.

Nardus cizicine, iniectio prima.

O L E I primi meriti sextarii decem, aspalathi, cypiarum, inulae campanae, iridis, xylobalsami, aristolochiae, cardamomi, iunci rotundi floris, singulorum vnciae sex, sampsuchi vnciae quatuor, herbae fabinae vnciae duae, nonnulli & calami odorati vncias duas immittunt: haec in vini odorati sextaris quaternis commadescunt.

Altera iniectio.

C A S S I A E, casami, arnabo, singulorum vnciae duae, spicae nardi vnciae tres, caryophylli vncia, costi, amomi, singulorum vnciae duae, nonnulli etiam nardi gallicae vncias duas addunt, atque haec in vino macerantur.

Tertia iniectio.

M Y R R H A E troglodyticae, aloës, thuris, singulorum vnciae duae, styracis vnciae tres, mastiches vnciae quatuor, opobalsami, vnciae sex, quidam & croci vino laeuigati vnciam miscent. præparato & hoc sicut comprehensum est.

Decamyron.

S P I C A E nardi, phylli, euphorbiae, piperis, costi, adarces, singulorum vnciae, mastiches sescuncia, opobalsami vnciae sex, nardini libra, ceræ librae tres.

Pentamyron.

S T I R A C I S vncia, mastiches vnciae duae, ceræ albæ vnciae tres, opopanacis vnciae quatuor, nardini vnciae quinque,

Euodes, a grato odore dictum.

C R O C I, aloës, mastiches, absinthii, styracis, oenanthae, casami, caryophylli, singulorum vnciae tres, nardi libra, ceræ tantundem, meli vnciae sex, palmulae duodecim, vini quod satis est.

Baion.

C A R D A M O M I, castae, oenanthae, nardi gallicae, balaustrorum, propolis, singulorum scrupula octo, herbae fabinae, casami, amomi, singulorum scrupula sex, iunci rotundi floris scrupula octodecim, iridis scrupula quatuor, caryophylli sesquiscrupulum, suffiminis Crinati vnciae duae, thuris, myrrhae, singulorum vncia, ladani vnciae sex, bdellii, mastiches, aloës, nardi, olei lentiscini, singulorum sescuncia, resinae acernae quae zygia dicitur, resinae piccae, resinae terebenthinae, singulorum vnciae tres, opobalsami vncia, guttae ammoniaci scrupula sex, ceræ vnciae sex, oenanthino liquida laeuigantur, aridaque contusa. in alio exemplari piperis quoque scrupula octodecim inuenio nonnulli & moschi scrupulum vnum addunt.

Galenium.

CROCI semuncia, aloës vncia, mastiches tres vnciæ, absinthij feminis scrupula octo, œnanthes tantundem, palmulæ maiores tres, ceræ vnciæ tres, olei melini vnciæ sex.

Erythrium.

STYRACIS vnciæ quinq, malorum cotoneorum vnciæ viginti, masuchæ vel masuaphij, croci, singulorum drachmæ decem, psichæ, cyphios, singulorum drachmæ quinq, œnanthæ vnciæ duas semis, calami, absinthij, singulorum drachmæ decem, caryophylli scrupula quindecim, guttæ ammoniaci scrupula decem, opobalsami scrupula sex & semis, nardi vnciæ quinq, resinæ colophonix, gleucini, mesini singulorum vnciæ decem, rolacei drachmæ decem, propolis vnciæ quinq, resinæ therebentinæ vnciæ decem, mellis conchlearia decem, phylli drachmæ decem, spicæ nardi tantundem, ceræ vnciæ septem & semis: vino falerno aut aminæo conteruntur.

Malagma Nili ad lienem, omnemq, duritiem.

CERAE pondo, ammoniaci pondo, olei cyprini pondo, croci semuncia, secundum alios vncia, aceti quantum satis est.

Citrinum.

CERAE, resinæ colophonix, singulorum libra, suffiminis ammoniaci, auripigmēti, calcis, aluminis, aceti singulorum cyathi octo, læuigantur arida in aceto.

Malagma quod ad Cureum autorem refertur.

PICIS aridæ libra, ceræ, resinæ picæ, guttæ ammoniaci, nitri, baccarum lauri aridarum, seui taurini, singulorum libræ duæ, farinæ fœnugræci sextarius, pollinis frumentacei tantundem, chamæleonis nigri radice siccæ libra.

Malagma ex stercore caprillo Oribasij, ad lienosos, hydropicos, & iecur induratum.

CYPRINI, aut vetustissimi olei libræ tres, ceræ libræ duæ semis, fimi caprarum, baccarum lauri cortice detracto, iridis illyricæ, singulorum sextarii decem, resinæ terebinthinæ libra, sinapis, nitri, cyperi, raphani feminis, capparis radice corticis, singulorum vnciæ tres, cucurbitæ syluestris carnis vnciæ duæ, fœnugræci vncia: interim arida excipiuntur liquidis, interim aceto macerata, quod si alius profuat, cucurbita iniici non debet.

Ex fimo caprillo sphongion, hydropicis efficax.

PICIS brutæ libræ duæ semis, nitri libra vna, cucurbitæ syluestris carnis, pyrethri, opopanax, cocci gnidij, singulorum vnciæ tres, capparis radice corticis, thuris, iridis, adipis taurini, elaterij

M m ii

PAULI AEGINETAE

squamæ æris, apñ seminis, lathyridum, singulorum vnciæ sex, bacca-
rum lauri sextarij dimidium, foenugræci farinæ semuncia, fellis tau-
rini vnciæ duæ, olei cyprini sextarij dimidium, ceræ libra, resinæ fri-
ctæ libræ tres, caprilli stercoreis montani, cachryos, cypri, carda-
momi singulorum vnciæ sex

Ex baccis lauri.

CERAE, resinæ, picis, baccharum lauri, seu taurini, singulorum li-
bra, nitri, guttæ ammoniacæ singulorum vnciæ sex, aceti quantum
sufficit.

Medicamentum dia spermaton, hoc est ex seminibus

CARDAMOMI, cyperi, herbæ sabinae, nitri, baccharum lau-
ri, casia, fertulae campanae, foenugræci, nardi gallicæ, apñ seminis
sampsuchi, anisi, panacis radicis, thuris, guttæ ammoniaci, terebenti-
nae, singulorum vnciæ tres, mellis, ceræ, nardi, singulorum libra, seu
taurini tantundem.

Malagma a foedo odore dysodes dictum, ad pleuriticos.

RESINAE picæ libra ceræ, rutæ viridis, cyprini, singulorum
vnciæ sex, sulfuris viui, oppanacis, sagapenti, singulorum drachma
quatuor, nonnulli, & galbani tantundem addunt.

Malagma dia sampsyschu.

CERAE pondo, resinæ terebinthinæ pondo duo, sampsuchi
baccarum lauri, foenugræci, singulorum sextarius, nardini quod satis est

Malagma apollophanis ad iecorosos.

CERAE drachmæ octaginta, resinæ terebinthinæ, mannæ thi-
ris, singulorum drachmæ quadraginta, mortario irini sedimento vn-
cto contunduntur.

Copton ad duritiem stomachi & iocinoris.

PROPOLIS vnciæ sex, styracis vnciæ duæ, mastiches vn-
cia, resinæ terebinthinæ semuncia, fæcis nardini quantum satis est.

Malagma ex cœnanthe.

OENANTHAE, aloës, croci, acacie, aluminis scisilis, rosari
ficcarum, absinthij succi, gallæ, omphacii, rhus syriaci, mannæ thuris
singulorum drachma olei myrtel, ceræ, vtriusque libra, palmulæ ma-
gnæ quinq; vini quod sufficit. Anthylium.

ALVMINIS scisilis semuncia, aloës vnci a, mastiches scr-
pulum, cœnanthes scrupula sex, omphacii scrupula octo, rosarum sic-
carum tantundem, rhu syriaci scrupula decem, spinæ Aegyptiæ toti-
dem, balaustiorum scrupula viginti, gallarum scrupula quindecim
ceræ vnciæ quinq; olei meli ni, quod sufficit.

Malagma ex vinaceis, dia gigarton dicitur.

CR OCI, sandycis, labruscæ, singulorum vncia, aluminis sicc

uncie quatuor, balauftiorū, omphacii, rofarum floris, myrtorum fic-
corum, singulorū vncie duæ, ceræ albæ libra, olei melini libræ duæ,
malorum cotoneorum vncie quatuor, dactyli qui nicolaï dicuntur
decem, vini aminæi quod satis est, vinaceorum aridorum vncie octo.
In vſu, medicamenti vnciis tribus, ceræ vnam miſces.

Anethine.

ANETH. Iviridis vncie ſex, ſertulæ campanæ vncie duæ, cha-
nemeli tantundem, capitum papaueris viridum decem excoctæ
uris libræ tres, & olei quod ſufficit: vbi vero conſumptum fuerit ius,
adipis ſuilli recentis libræ duæ addunt, tritisq; priuatim ſcillæ toſtæ
interioris vnciis duabus & medullæ ceruinæ totidē, omnia miſcent.

Ambroſia ad febreis arcendas apta.

ARGENT I ſpumæ libra, adipis ſuilli recentis vncie ſex, lini
ſeminis ſucci tantundem, ceræ albæ vncie nouem, rofacei libra, mel
is vncie tres, croci vncia, nonnulli etiam ouorum decem lutea
buruda addunt.

De acopis, inunctionibus, dropacibus, & ſinapiſmis.

Cap. xix.

A Copa inde nomen ſortiūtur, quod præcipue ad laſſitudinis, quæ
copos græce dicitur, nempe tenſiæ vlceroſæ & eius quæ offa
leſatigat, ſenſum conueniant, quanquam aliis quoque morbis com-
pulis ſint ex vſu. † Alia ſiquidem ipſorum calefaciendi vim ha-
bent, alia emolliendi. Quæ calefaciunt, pipere, pyrethro, ſemine ro-
riſmarini, & conſimilibus conſtant neruorum vitijſ, perfrictionibus
validis & quæ vix vlllo calore poſſunt euinci, accommodata. Quæ
emolliunt, durities, ſcirrhus, & infarctos articulorum ſinus diſcutiūt,
quorum materies capite de emplaſtris comprehenſa eſt. At emollien-
tibus quæ adarce, ſemine roriſmarini, euphorbio, cocco gnidio, &
d genus alijs componūt, in diuturnis affectibus, & qui ægre poſ-
ſunt elidi, quibus etiam ſinapiſmus congruit, vtimur. Porro ſpiſſitu-
dinem vniuerſa acopa inter cerata & emplaſtra mediam habere con-
uenit. Vnguina vero acopis ſimilia, liquidiorē propemodum ſub-
ſtantiam obtinent. At dropax duplicem recipit præparationem hæc
emplaſtro, illam malagmati conſimilem, nonnulli & calidum ipſum
ſolunt: materiam vero acopis & emplaſtris conſinem. Cæterum
ſum cataplasmatis exhibet, diuturnis affectibus iſdem quibus &
ſinapiſmus, vtilis, ideoq; ante illum aſſumitur, quo corpus ſinapi red-
datur idoneum, a ſinapiſmo adhibetur, vt affectus reliquias diſcutiat.
ſinapiſmus materiam quidem variam non habet, verū diuturnis po-
ſſimum affectibus poſt deprehenſam probatamq; aliorum præſi-
diorum vim, efficaciffimus eſt, vtiliſſime autem applicatur capiti in

M m iij

PAULI AEGINETAE

eius dolore, quem cephalæam dicunt, & quum altera dūtaxat ipsius pars affligitur, Græci heterocraniam vocant, in morbo comitiali, vertiginibus, & insania: pectori autem in suspirio, ortophnoea, hoc est, quum non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tussi longa. At in diuturna humorum e capite in fauceis destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & venter in longis iplozum morbis eodem obducuntur. Iam conueniens est præsidium sinapi coxëdicum & podagricis doloribus, omniq; parti resolutæ, aut alio quodam modo perfrictione expertæ, vt difficulter exalferi possit. At tunc profecisse satis id putato, vbi dolor subsequutus fuerit validus & caro liuidior altiorq; euaserit, & postquam ablotum fuerit, mitius pustulæ eruperint. Quod si etiam sensus perierit, animum adhibere negotio conuenit, parte quam obliueris sæpius detecta: nam si vel immodice adurantur ita affecti non perentiscunt. Præterea in acutis morbis, vtpote lethargo, profunda in somnum delatione (cataphora dicitur) & catocho, sinapi inducitur, per initia quidem, cruribus, vbi vero materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori patuerunt vt vix vlllo modo queant incalescere, iis crura & inguina sinapi oblinuntur. In his autem qui continua febre laborant, vlcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum locis ex carnibus, vitari debet sinapisimus: nam partes carnibus vacuæ si obducantur sinapi, vruntur, interim etiam nigrescunt.

† Hæc verba ita leguntur in nostris codicib. τὰ μὲν γὰρ ἀπὸν ἐστὶν θερμαντικὰ τὰ δὲ μαλακτικὰ τὰ δὲ ἀμυκτικὰ. Orosius tamen legendum putat ἀμυκτικὰ.

Bromion acopon.

CERAE, resinæ colophonix, singulorum libra, adipis suilli vnciæ quatuor, butyri vnciæ sex, althææ, scœnugræci, seminis lini, singulorum libræ duæ, olei libra, galbani vnciæ duæ & semissis, ex cocto succo cum oleo quousq; magna illius pars fuerit absumpta, reliqua cum cera & galbano adiiciuntur.

Acopon a varietate pœcilon dictum.

SUCCI altææ, scœnugræci, semini cinis lini, rutæ, cumini, singulorum libræ duæ, medullæ ceruinæ, olei veteris, adipis anserini, opobalsami, nardi, singulorum libra, ceræ, colophonix & resinæ, singulorum sesquilibra, euphorbiæ, resinæ terebinthinæ, opopanax, singulorum vnciæ sex, castorij vnciæ tres, herbarum vnde succus exprimitur, singularum libra iniicietur: coques vt superius.

Acopon Azanitzæ.

ADIPIS suilli libræ duæ, seui taurini, resinæ colophonix, hyssopi medicamenti, ceræ, singulorum libra, galbani vnciæ tres.

LIBER VII.

876

Acopon Basilij.

ALTHAEAE, chamæmeli, fertulæ campanæ, lini seminis, fœ-
nugræci, singulorum fescuncia, amomi vnciæ tres : hæc macerantur
in vini Ascalonij aut Cilicij sextarijs octo, per triduum, coquunturq̃
ad melleam spissitudinem, deinde succi libræ quinq; cum olei veteris
libris quatuor & semisse decoquuntur, quousq; modicum succi fuerit
relictum, adiiciunt butyri vnciæ sex, resinæ terebinthinæ vnciæ
quatuor, adipis anserini vnciæ quindecim, medullæ ceruinæ cum mo-
mento olei lævigatæ vnciæ quinque, ceræ albæ tres.

Lysiponium.

PIPERIS, castorij, styracis, mastiches, aloës, inulæ campanæ,
ridis, singulorum vnciæ quatuor, euphorbij, costi, guttæ ammoniaci,
nyrrhæ, sampsuchi, thuris, cyperi, casisæ fistulæ, semen rorismarini, sin-
gulorum vnciæ tres, adarcæ, amomi, bdellij, xylobalsami, singulorū
vnciæ duæ, malabathri, spicæ nardi, pyrethri, croci, singulorum vn-
ciæ, opobalsami libra, nardini, cyprini, gleucini, singulorum libræ
duæ, ceræ libra.

Acopon a foedo odore dysodes appellatum, ex opere de com-
positione medicamentorum secundum genera.

CERAE, resinæ terebinthinæ, singulorum drachmæ vigin-
ti quatuor, galbani, suffiminis ammoniaci singulorum drachmæ sex,
olei veteris heminæ duæ, medullæ ceruinæ drachmæ octo : vtitor
mero & diluto.

Aliud dysodes.

RESINAE terebinthinæ drachmæ sedecim, ceræ drachmæ
viginti octo, œsypi, mellis, singulorum drachmæ sex, medullæ cer-
uinæ vnciæ sex, stillæ ammoniacæ, galbani, aphronitri, baccarum
lauri, singulorum vnciæ sex, olei veteris sextarius, vini cyathi duo,
quidam etiam castorij drachmas treis admiscunt.

Barbaricum, dia euphorbiu, ad coxendicum dolores,
& alia pleraq̃.

OPONACIS vncia ceræ tyrhenicæ libra, resinæ terebin-
thinæ libræ duæ & semis, galbani vncia, stillæ ammoniacæ vnciæ
duæ, euphorbij, castorii, piperis albi, singulorum vnciæ duæ, medullæ
ceruinæ vnciæ quatuor, œsypi tantundem, lemnestidis (est autem ad-
arce) semuncia, olei styracini, laurini, jrini, amaricini, singulorum vn-
ciæ sex, olei veteris libræ duæ, hedychroi vnciæ sex.

Acopon cui nomen est, pyxis.

RESINAE colophonis sesquilibra, resinæ terebinthinæ vn-
ciæ octo, guttæ ammoniaci vnciæ tres, thuris vnciæ nouē, olei vete-
ris libræ duæ, succi lini seminis libra, lactis vaccini tantundem, adipis

M m iij

PAULI AEGINETAE

anferini vnciae sex, butyri vnciae octo, ouorum vigintiquatuor albumina, præparatum buxco vase reponitur.

Acopon ex abiete Galeni.

ABIETIS seminis cocti modius Italicus, hoc est, sextarii duo decim, olei librae quindecim, ceræ librae quatuor, resinæ strobilinæ aut terebinthinæ vnciae quatuor. Contusum abietis semen, oleo iniicitur. Vbi quadraginta diebus in eo fueris, expressum proiicito, mixtis reliquis vtitor, ad labores spontaneos, resolutiones, & articulorum perfrictiones. At si necessitas virgeat, coquere oportet semē abietis cum oleo mixtum, ne nimium aduratur, & aquæ sextarii sex quatuor, idque in podagricis & articulariis affectibus.

Aliud ad idem.

OLEI heminae vigintiquinque, id est, sextarii duodecim & semis, fructus abietis modius, hoc est, libra semis, resinæ abiegnæ librae tres, strobilinæ vel terebinthinæ librae tres, ceræ libra.

Acopon ex nigra populo, dia ægyros dicitur, ad eadem.

LOCO fructus abietis, nigrae populi fructus æqua portio additur, & reliqua similiter illi præparantur.

Vnguentum Zosimi ad tremulos celebratum.

RESINAE picæ vnciae sedecim, ceræ vnciae quatuor, olei veteris libra, opopanax vnciae duæ, adarcæ vncia, euphorbiæ tantūdem, nitri vnciae quatuor, aphronitri teneri totidem: nitrum, euphorbium, adarce cum vino læuigantur, deinde adiicitur opopanax, simulque in læuorem teritur, seorsim autem quæ liquari possunt, cum anchusa ad colorem accipiendum eliquantur, refrigerata excipiuntur.

Dropax Gallus, Oribasii.

RESINAE colophonis quæ thus redolet, picæ & lignosæ dictæ, quæ sola in Italia nascitur, apochymatis, picis aridæ, ceræ, singulorum librae quatuor, resinæ frictæ vnciae quindecim, picis brutæ librae duæ, nitri libra, bituminis, galbani, adarcæ, pyrethri, singulorum vnciae sex, opopanax, euphorbiæ, veratri albi, piperis, singulorum vnciae quatuor, sulfuris viui vnciae tres, castorei, ammoniaci, vix passæ sylvestris staphis agriya dicitur, singulorum vnciae duæ, olei ficorum libra, opobalsami vnciae sex.

Aliter simplex.

CERAE pondo, picis siccae pondo, picis brutæ pondo, resinæ picæ sesquipondo, frictæ pondo & quadrans, loco prius nitro exterso imponitur.

Quomodo sinapismus fiat.

FI CVS siccatæ pridie in aqua tepida macerari debent, die inanti probe expressæ valenter læuigari, deinde acre sinapi, cuius-

modi est syriacum ægyptiumque priuatim conteri, diluto illarū affuso, factaque massa admisceri, & siquidem vehementem sinapismum uoluerimus inducere, parteis duas sinapis cum vna ficuum temperabimus: sin imbecillem, e contrario: si medicriorem, æqualeis. Cæterum sinapi antequam deteratur, aceto commadescens, ut nonnulli faciunt, languidius euadit. At sinapi ablato, etiam balneum utile est. Si dolor vehemens ruborve accesserit, & pustulæ, linteolum succo maluæ aut foenugræci cum rosaceo madefactum imponemus, deinde rosaceo cerato cum cerusa utemur. Verum in resolutis in quibus sensus labefactus est, cura adhibebitur, ut sæpius partem retegamus, inspiciamusque. Quum enim admota non percipiant, sæpe immodice exusti sunt. Item caprarum fimus cum aceto illius sinapi est efficacior, & præsertim in coxendicum doloribus.

Acopon ex atramento librario, cutis ruborem peculiariter inducens, in iis, quibus altera capitis pars dolet, ex commentarijs Alexandri.

EUPHORBII, atramenti librarij, singulorū drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis albi singulorum vnciæ tres, croci drachmæ duæ, aceti quod satis est ad hæc probe læuiganda, utque spissitudo sordibus similis ipsi fiat: quo facto illines, a media superciliorum parte incipiens, ad usque tempora tota, præsertim si æger pilis careat: ubi refrigerata fuerint, rursus illines: & quum præsidium bene profecerit, in balneum hominem deduces.

Quomodo diuersa olei & vnguentorum genera conficiantur.

Cap. xx.

Inunctionum vnguentorumque vel olei generum quæ vnguenta re præsentent, alia sunt simplicia, vna olei specie iniecta, alia composita ex pluribus conflata. Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur, verbi causa, rosaceum, chamæmelinum, susinū. quædam ex fructibus, & seminibus conficiuntur: quædam ex surculis quibusdam nempe rutæ, qui etiam simul cum oleo coquuntur. At cum nullus florum coctionem recipiat, insolantur potius, verum si validæ odoris gratiam repræsentent, & pluribus diebus constantem, ex insolatu tenuius ipsorum oleum magisque utile redditur, quemadmodum rosaceum & chamæmelinum. Qui inuolidiores sunt faciliusque dissolui possunt, minus insolatum tolerant, ut quorum virtus prompte euanescat, utpote lilium & viola. Ex iis quæ fructibus et seminibus constant, nonnulla illis integris oleo iniectis conficiuntur, veluti melinum, nonnulla cōtusis vel læuigatis, oleamine ipsorum sequestrato, vel expressis ipsis in conchulas: vel ex aqua calida, sic ut ipsa dis-

PAULI AEGINETAE

gerantur, exempli causa, carpinon, sesaminum, amygdalinum, lentiscinum, laurinum, ricininum, raphaninum, atque eius notæ alia. Porro quæ ex stirpibus odoratis componuntur, præparari potissimum solent, illis oleo incoctis cum vino vel misto, vel aqua, atque iisdem deinde exemptis. Liqueoribus autem quibusdam oleo temperatis, interim & adipibus vel medullis, ex huiusmodi aliquo exactam olei spissitudinem sortita, simplici sermone vnguenta vel inunctiones nominantur, ut gleucinum, nardinum, sicyonium & cyprinum. Sunt quæ acopa crassitudine representent, ceram aut resinam aut eiusmodi quippiam recipientia, vocanturque myracopa, veluti decamyron, amaracinum, atque his similia. Iam vero aliqua vna vice coquantur, quæ non diuersam recipiunt materiam, sicuti metopion, mastichinum, sicyonium: aliqua duabus tribusve, & quatuor iniectionibus. Primum contumacioribus incoctis, ut aspalatho, spatha, thure arbore, lauro inde aromatis, phyllo, spica nardi, amomo, herba sabina: postremo liqueoribus, adipibus & medullis. Si autem eueniat, cera quoque & resinis inditis. At balsami liqueor neutiquam coquitur, sed post absolutam coctionem vnguento mediocriter refrigerato instillatur. imo ex ipsis vnguentis sunt quæ nullam coctionem recipiant, sed tantum misceantur, quale est medesium. Nonnulli vero viride vnguentum reddere cogitantes, ubi ab igne sustuletint, in olei sextarium in tingunt, æruginis rarsæ in exactum detritæ læuorem sescunciam, immiscentes, quemadmodum in cyprino & amaracino. Cæterum simplicia quidem vnguenta specierum quæ in ipsa mittuntur, naturam vel eorum ex quibus confusis facta sunt, obtinent, ut oleum veluti materię rationem obtineat. At quæ variam magis compositionem sortita sunt, tota eorum natura ad calidum inclinata est, sed quædam valide calefaciunt emolliuntque, ut etiam articulis recenti cicatrice obductis & sinibus eorum infarctis cōueniant, veluti metopium, mendesium, marciatum: mediocrius autem est pentamyron, quemadmodum decamyron valentius ut etiam summa rodatur: mediocriter autem calida tenuiaque dico. At vero modice calida extenuant leniunt & concoquunt, quale est susinum, amaracinum, irinum, crocinum, foliatinum. Alia præterquam quod calefaciunt, abunde siccant inciduntque, veluti cyprinum & sicyonium. Alia calefaciunt quidem insigniter, sed vires magis confirmant, unde stomacho potissimum & visceribus resolutis competunt, qualia habentur mastichinum, nardinum, et gleucinum. Valentius adhuc corroborat, quod ex vua acerba conficitur. Iam nonnullis vnguentis ob gratum duratam odorem vtuntur, ut foliato, spicato, commogeno & quæ moschelæa, quasi dicas, ex musco & oleo confecta nuncupantur.

LIBER VII.

278

Rosacei confectio.

ROSARVM rubrarum detractis vnguibus marcescentium die nocteq; vna, vnciæ tres, olei omphacini sextarius, vna diligenter cōstricta ne perspirent, insolabis sub dio diebus quadraginta, atq; sic repones non in pauimento, sed assere. Aliqui vero vice insolatus in puteum vnam diebus quadraginta mittunt, vt ex frigiditate odoris gratia conseruetur. Alij vero ipsam sub terra defodiunt.

Chamæmelinon.

CHAMÆMELI floris sine albis foliis marcescentis, per diem noctemq; vnam olei sextarius Italicus. vase lintheo simplici confecto vt perspiret, insolatur, idq; diebus quadraginta, inde secure hoc percolatum repones.

Anethinum.

ANETHI viridis comæ arefactæ vncia, olei dulcis sextarius Italicus. Simili modo insolantur, fiet autem & pro temporis ratione anethinum cum insolatus desideratur, ficei enim anethi comam decoquētes cū oleo in cacabo vtunt, & chamæmelinon similiter: verum hæc imbecilliora sunt iis quæ ex viridibus fiūt & p̄sertim insolatis.

Liliaceum alijs sūsinum dicunt, quod in Susis forsitan reperiatur.

FOLIORVM alborum liliorum similiter marcescentium vnciæ duæ in olei sextarium Italicum coniectæ exacte circumstringuntur, ne euaporent, & per triduum insolantur, inde primis exemptis proiectisq; aliæ duæ vnciæ iniiciuntur per triduum subsequens, atque sic reponuntur.

Sūsinum compositum.

OLEI sextarii tres, calami odorati libræ quinque, myrrhæ vnciæ quinque, cardamomi libræ tres, lilij foliorum vnguibus ablatis arefactorum libra, cinnamomi vnciæ tres, croci cilicij vnciæ quinque: tota confectio tribus iniectionibus distinguenda est. Primū myrrha & calamus odoratus, vino ad dies quinque macerata ter die mouent, inde oleo medice incoquuntur, deinde cardamomum aqua maceratum triduo mouet, similiterq; rursus cum oleo ad horam vnam incoquitur, inde exemptis illis tertiam liliorum partem oleo puro inferemus, tribus diebus post his quoq; exemptis reliqua liquorum tertia portio immittetur, iterumq; post triduum exemptis proiectisq; primis, postremo tertia pars cum croco læuigata iniicietur. Secundum alios tres dies ablato oleo cinnamomum cōtusum indetur. Huius in vicem, arnabo, aut carpesium, aut cassiæ duplicatum, atque reponetur.

Violaceum.

VIOLACEVM præparant, modo purpurearū, modo cro-

PAULI AEGINETAE

cearum, modo candidarum violarum foliis vngue delecto, trium vnciarum pondere coniectis in olei omphacini sextarios quinque Italicos: circumstricta exacte, ne perspirent, ad dies decem insolantur, tertioq; eadem mutantur ad triduum, quemadmodum lilia: ad repositionem autem pauca iniiciunt exacte arida.

Melinum.

HOC efficitur ex malis cotoneis extrinsecus panniculo involutis, & in frustra cum suis corticibus dissectis, deinde vnciiis ternis illorum, in decem olei omphacini sextarios Italicos coniectis, arque quadraginta dies insolatis.

Sesaminum.

SESAMINVM oleum fit, contusis vel læuigatis sesamis, expressisq; per fiscellas in cochleis, oleo ipso seu in aqua calida segregato, vasisq; vitreis reposito.

Raphaninum.

EODEM modo fit raphaninum in Aegypto, ex semine raphani qui tenuem radicem habeat confuso segregatoq;.

Ricinum, siue cicinum.

HOC quoque similiter in Aegypto fit, ex semine ricini quod croton dicitur, pari modo confuso aut læuigato.

Aegirinum.

VERNO tempore oleum fit Aegirinum, hoc est, ex nigra populo, quum resina circa semen copiosa existit: etenim grana populi confusa vnciiis quatuor in dulcis olei sextarium immittunt, diebusq; quadraginta insolant, vel horis tribus in lebe decoquant, atq; sic exempta reponunt.

Amygdalinum.

CONFICITVR hoc quoque sicut prædictum, amygdalis amaris iisq; puris, contusis, aqua modica irroratis separatisc; vt comprehensum est. Nonnulli tusa amygdala vnciiis duabus dulcis olei sextario Italico immissa, in cacabo decoquant.

Amygdalinum, quod & metopion dicitur.

AEgyptii huius olei inuentores metopion ipsum nuncupant, quod galbanum recipiat: germen autem vnde galbanum nascitur, metopion appellatur. Hæc recipit, olei omphacini sextarios viginti, amygdalarum amararum libras duas, cardamomi libram, unci rotundi floris, calami odorati, carpobalsami, singulorum libram, myrrhæ, galbani, singulorum vncias sex, resinæ terebinthinæ, libras duas, vini odorati ad arida imbuenda sextarios quatuor, mellis attici libras treis: resinam & galbanum in læuorem redacta ex olei parte soluta, reliquis incoctis adiciemus, necnon ipsum mel: mixta vero accurate omnia ab igne tollentes, quum tepidum est medi-

camentum eximimus, nam refrigeratum concrefcit.

Balanion.

BALANINVM oleum perinde vt simplex amygdalinum præparatur, ex quereis glandibus.

Caryinum.

HOC quoq; vt supra dictum ex vetustis nucibus conficitur.

Laurinum.

PVRVM quidem laurinum simili ratione & lauri fructu cōfit, mixtum vero hæc recipiet: maturarum oliuarum sextarium, cum duobus baccarum lauri miscemus: teruntur omnia exprimunturq;. Nonnulli æqualem amborum portionem miscent.

Lentiscinum.

LENTISCINVM oleum laurini modo ex lentisci semine conficitur, idq; bifariam & per se, & cum oliuis immaturis.

Mastichinum.

MASTICHINVM simplicissimū quidem fit, chizæ mastiches vncia, omphacini olei sextario Italico immissa, excocta q; in cacabo. Nonnulli vero absinthij & styracis, singulorū vnciā adiūgūt.

Mastichinum magis varium.

OLEI sextarij quinquaginta, inulæ campanæ libræ quinque, xylobalsami libræ decem, iunci rotundi floris libræ quinque, cardamomi libræ septem, mastiches libræ quinque, xylomastiches libræ octo, resinæ terebinthinæ libræ tres, absinthij comæ libra, vini odorati sextarij quinque, aquæ sextarij decem: arida vino ante tertium diem macerata oleo miscentur, & aqua horis sex coquantur ac mastiche & terebinthina iungitur: accurate mixta excipiantur, refrigerata transfunduntur.

Sicyonium simplex.

RADIX cucumeris sylvestris marcida duarum vnciarum pondere in olei sextarium Italicum mittitur, atque in lebetē coquitur, fitq; sicyonium.

Sicyonium compositum.

OLEI sextarij decē, cucumeris sylvestris radice derafæ pōdo, serpylli, fertulæ campanæ singulorum vnciæ sex, tedarum picæ pinguium, althææ singulorum vnciæ quinque, scolopendriæ vnciæ sex, fœnugræci sextarij duo. Fœnugræcum aqua primum die vno prius commadescet, deinde exemptū inditur com memoratis vna cū oleo, & vini sextarijs duobus, omnibusq; incoctis adiiciuntur medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ vnciæ quatuor, adipis gallinarum totidem, rursus exemptum oleum in aliud vas transfunditur: Nonnulli ipsum post coctionem diebus quadraginta insolant.

PAULI AEGINETAE

Aliud ficyonium efficacious.

ELATERII succi sextarii tres, aristolochiae rotundae & longae, styracis, inulae campanae, hyssopi, iridis, cucurbitae sylvestris, pulegii, origani, cyperi, thuris arboris, centaurii, foliorum lauri, singulorum vnciae duae, olei sextarii quinque. Mista incoquito dum parum succi relictum fuerit.

Cyprinum ex commentariis Posidonii.

OLEI sextarius, iunci quadrati, inulae campanae, iridis, singulorum libra, sampuchi, hyssopi, viticis seminis, eleisphaci, singulorum vnciae tres, iunci quadrati floris libra. Reliqua omnia pridie in vino macerata coquuntur cum oleo horis sex. Excepto oleo puro, iuncus quadratus iniicitur. Siquidem adfit viridis cum teneris virgultis non concisis, sin minus, certe aridus contusus cum aquae momento coquet sesquihora. At si voles ipsum tingere postquam ab igne fuerit ablatum, indito æruginis purae sesquilibram. Posidonius autem acrimoniam æruginis vitans, a coctione (inquit) triduum dimittes oleum in cacabo bene humido, & tingetur ita ut virtus ipsius non offenda.

Alia scriptura cyprini.

CYPERI foliorum, lauri foliorum, iridis, cyperi, eleisphaci, singulorum quadrans, thuris arboris, aristolochiae longae, viticis seminis, singulorum triens, inulae campanae, aspalathi, singulorum vnciae sex, rutae vnciae duae, cupressi vnciae duae, olei sextarii decem. Haec prius vino madefacta, incoques oleo. ubi exemeris iniice, rursus xylobalsami, xylocalsiae singulorum vncias quatuor, sampuchi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singulorum vncias tres, opopanax vncias duas, iunci quadrati floris vncias sex, æruginis vnciam.

Amaracinum.

INVLAE campanae pondo, xylobalsami librae viginti, cyperi librae octo, iunci rotundi floris, aspalathi, herbae sabinæ singulorum librae octo, opopanax, amaraci seminis singulorum librae duae, olei primi meriti sextarii duo, vini odorati sextarii quinque. Alia omnia superius dicta primam injectionem habet vino prius macerata, secundam herba sabinæ, atque illa quidem horis sex incoquantur, hoc autem tribus: nonnulli etiam hoc tingentes æruginis vncias tres iniiciunt.

Irinum.

IRIDIS, aspalathi, cyperi singulorum librae quinque, opopanax vnciae tres, anchusae vnciae duae, olei sextarii triginta, aquae sextarii quindecim. Sunt qui adiciant iunci rotundi floris vncias sex, calsiae vncias tres, xylobalsami vncias sex, nardi gallicae tatumdem, omnia confusa aqua pridie macerantur, inde oleo diebus quinque incoquantur in lebeco ad sex horas: reponiturque unguentum.

LIBER VII.

280

Crocinum, in quo & alterius crocomagmatis confectura explicatur.

OLEI omphacini odorati libra, calami odorati, myrrhæ troglodyticæ singulorū vnciæ quinq; cardamomi vnciæ septem, croci cilicij vnciæ sex. primum iniiciatur calamus & myrrha vino læuigata, & ante vnciæ modo reposita, piperis albi grana quadraginta, myrrhæ troglodyticæ drachma, tunfa, cribrataq; teruntur rursus in mortario adiecta olei nardini libra. vt autem medicamentum reddat nigrius, nucum cortices combustos detritosq; in mortario adiecito: inde opobalsami cochlearia tria, ceræ sesquilibram admisceto.

De œnanthariis.

Cap. xxi.

Non quod œnanthen, hoc est, labruscam habeant hæc, (nonnulli enim ne œnanthen quidam recipiunt) sed ex vino & flore liliorum nomen hoc sortita sunt. Vfus œnanthariorum quod quosdam odoris gratia duntaxat & deliciarum adhibetur, sic vt qui eis vtuntur, a lauacro perfundantur: & mensæ ipsis per spongiam oblinantur. At apud eos qui recte vtuntur, etiam sunt præsidia tum in resolutis, tum in iis quos syncope premit, si roborantibus stomachi cataplasmatis admiscantur. Item in iis, qui se a morbo præsertim febrili recolligunt, vbi lauacro egrediantur per totum corpus diffundentur: naribusq; admovebuntur, adhuc spirantibus. Trahitur enim in altū, & spiritum animale, vitalemq; confirmat. Adhæc vtilia sunt ad morbum pestiferum vitandum, cum eiusmodi mutationem aer sustinet. Refertur autem huiusmodi vnguentum ad Posidonium auctorem, a quo vocatur mesopotamenon.

Oenanthini confectio.

CASSIÆ, myrrhæ, thuris, phylli, amomi, mastiches, costi, caropobalsami, opobalsami, singulorū vnciæ tres, styracis pinguis vnciæ quatuor, vini odorati aminæi, Italici sextarij decem, contusa omnia, cribrataq; styracem vero minutim concisum cōponito in vrnā oris ampli, cum foliis liliorum pridie refrigeratorum, e domo vna in alteram & vnguibus detractis, sint autem lilia numero trecenta. deinde vinum adiecitur, & opobalsamum, mista, commotaq; ante iniectionem, & constricto vrnæ ostio quadraginta diebus insolantur. Balnei vsus est in virium ex morbo recreatione. Domus irrorabitur vnguento, vasaq; & spongiæ intinctæ faciei admoventur.

Alia confectio, nostra.

COSTI vnciæ tres, spicæ nardi, arnabo, caryophylli, singulorū vncia, amomi vnciæ tres, cassiæ, œnanthes, calami, singulorū vnciæ nouem, styracis, opobalsami, singulorum vnciæ quatuor, lilia trecenta,

PAVLI AEGINETAE

vini falerni sextarii decem. Simili modo præparatur.

De suffimentis & cyphi. Cap. xxi.

CYPHIS materia inter medicamenta quæ potui dantur & antidota existit, vsus est eius incensi ad odorem gratum conciliandum, quemadmodum & suffiminum. Interim naribus admouetur, vt destillationes ex capite in subiectas partes concoquat, grauedinesq; & obstructione liberet, purgetq; cerebri ventricolos, item pestilentia libus morbis euitandis. Iam per os quoque assumitur, tum ad hæc, tū ac ea quæ pectori inhærescunt, concoquenda, nec non ad frigidiores iccoris affectus, vnde & Ciphoides appellata antidota veteres inuenerunt. Miscetur autem compositis medicinis, præcipue epithematis & antidotis.

Rosatum suffimen.

COSTI, amomi, myrrhæ, cassiæ singulorum vncia, styracis, chix, bdelli, conchulæ Indicæ, musci, ladani, singulorum drachmæ duæ, rosarum purarum vnciæ vigintinouem, opobalsami modicum, vini quod sufficit,

Suffimen lirinum: quod crinaton dicunt.

LILIORVM vngue defecto libra, styracis primæ notæ, vnciæ nouem, spicæ nardi, vnciæ tres, costi, caryophylli, amomi, mastiches, conchulæ Indicæ combustæ, mellis, singulorum fescuncia, opobalsami vnciæ quinq;, vini quantum satis est, læuigata coguntur in pastillos.

Cyphi magnum quod vocant solare, ex rebus triginta sex confectum.

STYRACIS, myrrhæ, ladani, aspalathi, inulæ campanæ, singulorum vnciæ sex, nardi gallici, phylli, cupressi seminis, guttæ amoniaci, strobili, splanchni aut loco ipsius conchularum Indicarum maiorum, carpobalsami, singulorum vnciæ tres, cassiæ, irridis, seselis, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, singulorū vnciæ quinq;, rosarum siccarum, croci, spicæ nardi, herbæ sabinæ, hastulæ regix radicis (aliq; succi) singulorum vnciæ quatuor, lacaphthi, hoc est, picæ corticis vel alterius cuiusdam arboris vnciæ nouem, costi, iunci rotundi floris, singulorum vnciæ duæ, iuniperi maiores quadraginta, minores quinquaginta amomi resinæ terebinthinæ, palmulorum purarum singulorum libra, ficuum siccatum granis exemptis, vuarum passarum acinis ablatiis, singulorum libræ duæ, mellis despumati libræ quinq;. Posidonius etiam vini odorati sextarios treis adiicit.

Aliud cyphi, quod rebus viginti octo constat lunare appellatum.

BDELLI, inulæ campanæ, singulorum vnciæ septem, iunci rotundi.

LIBER VII.

281

rotundi vnciæ duæ, spagni vnciæ quinq, iuniperi minoris quinquaginta, cardamomi vnciæ quinq, aspalathi vnciæ septem, casliæ fistulæ vnciæ quinq, spicæ nardi vnciæ duæ, cyperti vnciæ quinq, hastulæ regie radicis, herbæ sabinæ, singulorum vnciæ quatuor, cupressi seminis, nardi gallicæ, malabathri cum folijs, rosarum siccarum, singulorum vnciæ tres, costi, croci, singulorum vnciæ duæ, ladani, myrrhæ, singulorum vnciæ septem, caricarum pinguium, vuarum passuum acinis exemptis, singulorum libræ duæ, strobilorum vnciæ octo, resinæ terebenthinæ libra, styracis vnciæ septem, palmularum pinguium libra, mellis, libræ quinq, vini odorati quantum satis est.

Confectio masuche, quod nonnullis masuaphion vocatur.

Cap. xxiii.

M Elioti sextans, xylobalsami, aspalathi, herbæ sabinæ, myrrhæ, amomi, iunci rotundi floris, foliorum lauri, myrrhæ stylatitiæ, styracis, calami odorati, sampsuchi, singulorum vnciæ duæ, irridis vnciæ quinq, phylli, croci, singulorum vncia, opobalsami semuncia, gummi libra, rosarum siccarum vnciæ sex, vini quantum sufficit.

Ex commentarijs Antylli, de pessis.

Cap. xxiiii.

P Essi mulierum locis admoventur, cæterum generales ipsorum differentie tres existunt, alij siquidem emolliunt, alij astringunt, alij aperiunt. Emollientes inflammationibus vteri, exulcerationi, perfrictioni, strangulatu, auersioni & inflationibus accommodantur. Fiunt autem ex cera tyrrhenica, cyprino, susino, pinguedine anseris aut gallinæ, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, scœnugræco, & quæ sunt eius generis. Aperientibus vtimur, quum purgationem suppressam irritare statuimus, aut vuluam cōiuentem compressam ue comedare. Præparantur hi ex melle, artemisia edictamno, brassica, succo dulcis radiculæ, porro, succo ruræ, scammonia, & similibus. Astringentes in contrarium aperientibus vsum exhibentur, nam fluxum muliebrem cohibent, et ad apertum contrahunt vterum, proapsumq; reprimunt. Materia vero astringentium prius in capite de collyniorum etiam modo comprehensa est. Cæterum conuenit pessi crassitudinem instar strigmenti & paulo spissiore facere, deinde lanam linamento tortili similem, duplicatam in medicamentum tinctam ori vuluæ condere, sic vt stuppam prælongam habeat alligatam, quo pessus facile possit extrahi, quando visum fuerit.

Pessus crocodel, ad inflammationes, auersiones, duritias.

& inflationes.

CERAE albæ, medullæ vitulinæ, singulorum drachmæ sed-

Nn

PAULI AEGINETAE

olm, medullæ ceruinæ drachmæ undecim, adipis anserini drachmæ octo, adipis gallinæ drachmæ octo, mastiches drachmæ quatuor, hyssopi medicamenti drachmæ tres, mellis drachmæ duæ, croci drachmæ octo, rosacei quod satis est: crocus lacte muliebri læuigat. Pessus ab aureo colore dictus chrylos, emolliens.

Laudatissimus.

CROCI drachma, œsypi tantundem, medullæ ceruinæ drachmæ duæ, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, singulorū drachmæ tres, ouorum tostorum lutea sedecim, irini & rosacei quod satis est ex æquo.

Pessus Libanius, menseis euocans & vuluæ vitij singulariter accommodus.

NARDINI vnguenti vnciæ sex, ceræ tyrrhenicæ vnciæ quinque, fusini vnguenti vnciæ quatuor, adipis suilli recentis, vnciæ tres, anseris & gallinæ adipis, medullæ ceruinæ, amaracini vnguenti, singulorum vnciæ duæ, seui taurini, resinæ terebinthinæ, œsypi, singulorum vncia: lebece eliquantur, omnesq; reliqui pessi.

Enneapharmachus.

ROSACEI vnguenti, ricinini, resinæ terebinthinæ, ceræ mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ & butyri pares portiones.

Titianus emmolliens.

CERAE vnciæ sex, resinæ colophonæ vnciæ quatuor & semis, seui taurini vnciæ quatuor, guttæ ammoniaci tantundem: ammoniacum aqua soluitur.

Pessus Aegyptia.

MELLIS, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei vel fusini, & croci, singulæ partes: in quibus autem inflammatio abest, et scrididis, æruginis dimidiam addunt.

Gone ad concipiendum,

BUTYRI vnciæ sex, hyssopi medicamenti, medulli ceruinæ, adieci anseris & gallinæ, resinæ terebinthinæ, aloës, singulorum vnciæ tres, ceræ, thyrrhenicæ vnciæ sex, rosacei libræ duæ, myrrhæ, cassiæ, singulorum vnciæ duæ, spicæ nardi vncia, mellis quod satis est.

Quomodo medicamenta quæ emplastra ingrediuntur, coqui debeant.

Argenti spuma.

IN medicaminum coctionibus argenti spuma cum oleo decoquatur. Conuenit autem læuigatam rursus ex oleo conterere, vt fordidum fiat spissitudo, inde leni igne continenter excoquere, mouendo, initio igitur intumescit & in bullas attolitur: ubi vero iam fere satis incocta fuerit, colorem fæci similiorem recipit. Modus coctionis est, quum a tumore subsidet, & manus non inquinat.

LIBER VII.

282

Plumbago.

PLUMBAGO similiter argenti spumæ exquoquitur, sed eo usque dum non modo digitos non inquinet, verum etiam ex igneo colore in rufum & vehementer floridem elanguescat.

Aes crematum.

AES crematum non protinus ab initio ad coquendum iniicitur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit. finis coquendi est quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superet, & emplastrum rufum efficiat.

Sori & diphryges.

SORI & diphryges demittuntur & ipsa inter coquendum lebeti diphryges autem sicut & squama, eousque coquitur, dum colore reliqua vincat. sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum reddatur, digitosque non inquinet.

Chalcitis.

CHALCITIS incoquitur æris modo, coctionemque ipsius metimur inde, si emplastrum fulvum magis & phoeniceum evaserit.

Flos æris.

ÆRIS flos similiter æri coquitur, sed eo modo qui communis esse coctioni solet.

Atramentum sutorium.

ATRAMENTVM sutorium in media coctione emplastro inditur, coctum vero vehementiorem eius colorem efficit, & si alia ei non resistent, nigrum.

Misy.

MISY postremo adicitur, quamdiu autem coqui debeat, proprie definitum non est.

Auripigmentum & sandarcha.

AVRIPIGMENTVM & sandaracha in coctionis fine iniiciuntur.

Plumbumustum.

PLVMBVMustum in media coctione adiungitur.

Cerusa.

CERVSA in alba emplastra postremo mittitur, sic enim colorem conferuat, magisque albescit: in nigra autem, principio: cocta enim largius, nigrescit.

Aerugo.

ÆRVGO viridibus emplastris post coctionem iniicitur. In quibus neutriquam ollæ inditur, sed cum aceto detritæ ipsi manentique in pila reliqua superfunduntur. In melinis emplastris, quum semicocta est confectio, immittitur: nam moderatam consequuta coctionem, melinum quasi mali cotonei colorem efficit. at in his quæ diprosopa, & dichroma dicuntur, per incicia statim æruginē in coquimus. in quibusdam enim per coctionem primum melinum colorem inducit, qui duplicem repræsentat, postremo fulvum:

N^o II

PAVLI AEGINETAE

Alumen.

ALV MEN plerunq; secundum coctionem additur, peculia-
rem vero coctionis modum nullum habet.

Minium, cadmia & pompholyx.

MINIV M in fine admiscetur, cadmia & pompholyx per
initia immittuntur. Sal nitrum, sulfur.

SAL & nitrum in medio coctionis, sulfur in fine addicitur, co-
ctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

Terra & lapides, pumex, conchylia.

TERRA M omnem & lapides plerunq; ad coctionis finem
iniicimus, item pumicem & conchylia combusta.

Oleum & reliqua pingua.

OLEV M si quidem per initia fuerit iniectum, resinæ aut pici
liquida, emplastrum non spissescit, quare ubi crassa euaserint incocta,
recte indetur, reliqua vero pingua salis expertia, iuxta mediam co-
ctionem adiungere conuenit.

Vnguenta.

VNGVENTV M irinum coctionem quidem fert, sed cypri-
num & rosaceum minus. reliqua neutiquam, quare ad finem coctio-
nis immitenda sunt. Cera.

CERA priuatim sola non coquitur, ut quæ aduratur, neque cū
resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissaturq; verum super
inicitur, vel oleo puro, vel oleoso cum quodam metallico incocto,
aut resinæ, aut pici prius incoctæ, ac prius quam reliqua quæ possunt
iniici spissescit. Resina.

RESINA arida, cum cera immittitur: liquida ante omnia alia
ipsa priuatim decoquitur, nisi admodum paululum eius assumatur.

Pix.

PIX ante reliqua omnia additur. modus autem coctionis, liqui-
dæ, dum inspissatur: aridæ, maxime dum amplius non amplius inter
coquendum ebulli, neq; inturgescit.

Apochyma pix nauibus derafa.

APOCHYMA leuigatum cribroq; ab excrementis suis se-
cretum, emplastro posteaquam coctum fuerit, inspergitur. Si autem
molle fuerit, cum oleo soluitur: sed prima ratio conquendi e actior
est, quod scilicet in secunda pondus non conseruetur.

Bitumen

BITV MEN inter initia iniectum coquitur, non autem id in
leuiorem deterere oportet, quoniam asperitudines huius oliuarumq; gra-
nis interioribus simileis, obtinet. Quapropter incrasiores particu-
las confringendū est, coquendumq; in aceto, sic ut non agiletur vsq;

dum ebullire desinat. Ego vero (inquit Timocrates) in oleo decoquens, voti compos euasi.

Propolis.

PROPOLIN emollire & discoquere oportet. siquidem a coctione neutiquam diffunditur. Atsi & ceram emplastrum recipiat, propolin cum illa quemadmodum & galbanum, contusam iniiciemus.

Ammoniacum.

AMMONIACVM circiter mediam coctionem iniicitur: detritum vero si potest fieri & in tenuem redactum puluerem inspergere conuenit: sin minus, cum liquore quodam læuigatum iniicere: si emplastrum cruentis vulneribus adaptabitur, cum aceto aut vino: si fistulis aut strumis, omnino cum aceto: at si molle futurum est, qualia sunt quæ ano accommodantur, cum aqua: inde in sordium spissitudinem coactum aliis refrigeratis infundere, ne effruescat.

Opopanax.

OPOPANAX multo post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex vino, aceto uel prius læuigandus est.

Galbanum.

GALBANVM neutiquam coctionem tolerat, verum emplastro ab igne sublato, quo spissescat, sic ut digitos non inquinet, emollitum inditur.

Sagapenum.

SAGAPENVM tunditur in pila, & teneriusculum redditum cum emplastro ubi ab igne sublato fuerit, emollitur.

Aloë.

ALOE secundum coctionem inspergitur.

Lachryma papaueris.

LACHRYMA papaueris pridie in aqua modica maceratur, inde in pila læuigatur, mox etiam emplastrum ei superfunditur.

Thapsia.

THAPSIA inspergitur postrema, vel liquore quodam læuigatur.

Bdellium.

BDELLIVM in læuorem pertritum, emplastro ab igne iam sublato inspergitur: at si pingue existat & læuigari non possit, sagapeno similiter ipsum contusum, ac in emplastri figuram coactum, post coctionem simul cum emplastro molliemus.

Thuris lachryma, & manna.

LACHRYMA thuris & manna coctione iam absoluta insperguntur, in sordium spissitudinem coacta ex melle modico aut aceto, aut aqua aut vino, si emplastrum liquorem recipiat.

N n iij

PAVLI AEGINETAE

Myrrha.

MYRRHA ubi iam coctio finita est, inditur.

Semina, radices, & herbæ.

SEMINA, radices, & herbæ nullam coctionem sustinent: læ-
uigatis igitur et in pila etiamnū subsistentibus liquida superfundunt.

Qui ceræ modus cum oleo esse debeat.

QVOD si vnguiua quæ Græci a leuanda lassitudine acopa
appellant, conficere constitueris, oleum ceræ quadruplum immittes:
at si liquidum ceratum, vt in fracturis præparamus, duplicatum. Si me-
dicamentum quod emplastri figuram habeat efficere cogitauerimus,
portionem olei ceræ æqualem miscemus, si aer ambiens modera-
tus extiterit: at si cera vetus aut squalida, aer frigidus fuerit, oleū paulo
copiosius quam cera erit: quemadmodum & si cera pinguis, aer exi-
stat calidus, paulo minor olei portio erit, paulum autem hoc, mediū in
vtramlibet partem excessus duodecima erit portio, etenim vndecim
& tredecim olei vncias, ceræ libræ admiscebis.

De medicamentis inuicem succidaneis ex commentarijs

Galenī.

Cap. xxv.

IN Alexandria (inquit) muliere quadam morbo periclitante, cum
quæsissem lichnidem, nec eius fuisset data copia, nisi protinus vice
lichnidis vsus fuisset acanthi semine, periisset mulier: Vnde rogatus
ab amicis ad hanc succedentium inuicem medicaminum expositio-
nem veni, secundum literarum seriem exorsus.

VICE Abrotani, origanum.

Abinthii, abrotanum.

Acanthæ, cerasiorum acanthus.

Acanthi seminis, lychnis.

Aconiti, radix iridis sylvestris.

Acori, asari radix.

Actes, hoc est, sambuci, acantha.

Adianthi, aphroselinum.

Adipis vulpini, adeps vrsina.

Adipis ceruini, adeps anserina.

Adipis suilli, adeps vulpinus.

Aeruginis ferri, excrementū ferri.

Aethiopice oliuæ, lachrymæ aca-
ciæ partes duæ.

Agarici, euphorbium.

Agriostaphidis, hoc est, sylue-
stris vix passæ, dactyli Syriaci

Alicacabi, semen solani.

Aloës. Galenus Agalochi, cen-
taureum, & impressus Pauli co-
dex, aloës Indicæ, aloës viri-
dis folia vel glaucium, vel ly-
cium, vel centaureum.

Aluminis, sal fossilis.

Amianti, aphroselinum.

Ammoniaci thymiamatis, pro-
polis.

Ammoniaci salis, sal Cappadoci.

Amyli, aridus pollen.

Amygdalarum amararum, absin-
thium.

Anacardi, psycha herba.

Anchusæ, hyacinthus.

Aracis, hoc est cicerculæ, se-
samum.

Aristolochiæ rotundæ, aristolo-

chia longa.

Argemones, seriphion.

Armeni lapidis, atramentum Indicum.

Asbesti, hoc est calcis viuae, ad arce.

Asii lapidis, gagates lapis, vel sal ammoniacus crematus.

Aspalathi, hoc est bituminis, pix liquida brutia.

Aspalathi, ericæ semen.

Asphodeli radicis, betæ succus.

Auripigmenti, sandaracha.

B

Balsami liquoris, myrrha stacte.

Bdellii, spagnus aromaticus.

Buccinorum, ostrea.

Buprestis, blattæ pedentes.

Butyri, lac bubulum concretum.

C

Cadmia, leucographis Aegyptia

Calamintha, menta sylvestris.

Calami odorati, sphagnus.

Cantharidum, phalangia.

Capparis radicis, radix ericæ, vel myricæ.

Cardamomi, cyperis ammoniaca.

Cassia, cinnamomum.

Castorei, blattarum, pedetium intestina.

Cedri baccarum, ladanum.

Cerauni, leucographis.

Ceræ lomentum cum propoli coquitur, & contunditur.

Ceruini cornu, caprillum cornu.

Cerussa, crementum plumbi.

Chamaedryos, rumicis sylvestris radix.

Chamaemeli, anthemis.

Cicios, hoc est, ricini, sordes palmarum.

Cicutæ, semen coriandri.

Cinnabaris, rhodoerides.

Cinamomi, cassia duplum.

Clinopodii, heliotropium.

Cnidii seminis, semen viticis.

Colocynthis, semen ricini quod est crotonis.

Colophonix, apochyma, seu pix derafa nauibus.

Comaræ, ammoniacum thymia.

Coralli, moly.

Costi, cedrinæ baccæ. Galenus,

costi, ammoniacum, baccarum

cedri, baccæ lauri.

Cotyledonis, anacardium.

Crinanthemi, aphrodisium.

Croci, crocomagma.

Crocodyli adipis, adeps canis marini.

Crocomagmatis, aloë Indica.

Cymini, semen brassicæ.

Cymini Aethiopici, melanthii.

Cynosbati, halicacabi semen.

Cyperis, iuniperus maior.

Cypheos, carica cremata.

Cyrenæici liquoris, syriacus liquor.

Cucumeris, anchusa.

D

Dauci seminis, semen fil.

Dictamni, salvia.

Diphrygis, lapis phrygius.

Dorycnii, semen alterci.

Dracunculi, apobrosimum Galenus addit Damasonii, eryngii.

E

Ebeni, lotinum aridum.

Ebisici radicis, folia mori.

Elateris succi, eiusdem herbæ succus.

Elelisphaci, hoc est salutaris, nepita.

Na liij

PAULI AEGINETAE

Hellebori nigri, radix papyri.
 Eneaphylli potamogiton.
 Ericæ seminis, galla omphacitis.
 Erini foliorum, fimus ciconiæ.
 Erysimi foliorum herba lanaria.
 Erucæ seminis, erysimi semen.
 Feculæ vini cōbustæ, sandaracha.
 Fellis cameli, fel ascalabotæ.
 Fellis muris aranei, fel cameli.
 Fellis hyenæ, fel perdicis.
 Fellis viperæ, fel ichneumonis.
 Fici liquoris, liquor mori.
 Fimi palumbini, fimus columbæ.
 Fimi Aluri, fimus ichneumonis.

G

Galbani, sagapenum.
 Gentianæ radicis, apij odorati
 radix.
 Glycyrrhizæ succi, lycamini suc-
 cus.
 Gongilidis, hoc est rapæ, helio-
 tropium.

H

Hederæ succi, persicus liquor.
 Hippuris, chamæpytis.
 Hormini, lini semen.
 Humidæ picis, succus panacis.
 Hyacinthi, flos Isateos.
 Hyenæ adipis, vulpis adeps.
 Hyenæ fellis, fel perdicis.
 Hyosciami, quod est alterci, rubi
 canini semen.
 Hyperici, anethi semen.
 Hypocystidis succi, acaciæ spinæ
 succus.

I

Iridis Illyricæ, helenium odoratū.
 Iunci odorati, cardamomum.

L

Lachrymæ papaueris, succus mā
 dragoræ.

Ladani, sampsuchum.
 Lanariæ radicis, veratri nigri ra-
 dix.
 Lapathi radicis, pyrethri radix.
 Lapidis pyritæ, lapis pyrobolus.
 Lapidis phrygiæ, lapis argyrites.
 Lapidis magnetis, lapis phry-
 gius.
 Lapidis asii, lapis gagates.
 Lathyrinum, granum gnidium.
 Lauri baccarum, serpillum aridū.
 Lentisci, polygoni radix.
 Lepidij, erythrodanum.
 Lepidi radicis, folia capparis.
 Leporis marini, cæcer fluuiatilis.
 Leucini floris, struthion, seu la-
 naria.
 Ligni balsami, radix violæ can-
 didæ.
 Lini seminis, fabæ succus.
 Loti seminis, betæ semen.
 Lybistici, semen staphylini.

M

Malabathri, cassia vel nardus
 Indica.
 Magnysinæ vitreæ, labrum Ita-
 licum.
 Malorum cotoneorum, melilotū.
 Maluæ, scenogræcum.
 Mandragoræ, oleæ lachryma.
 Mandragoræ succi, doryenium.
 Mannæ thuris, cortex thuris.
 Mastichæ, lentisci medulla seu
 cor.
 Medullæ ceruinæ, adeps cerui
 vel medulla vituli.
 Mellis, sapa.
 Mellis Attici crudi, mel aliud des-
 pumatum.
 Mēu, myrobalanus.
 Myrsinites vinum, succus mori.

Misyos Cyprii, ochracigna.
 Muscerdæ, muscæ tantundem.
 Mororum succi, ruborum folia.
 Myrobalani, peucinum.
 Myrthæ trogloditidis, calamus
 odoratus.
 Myrti olei, lentiscinum.
 Myrti, succus mori.
 Misy torrefactum, diphryges.

N

Nardi Syriacæ, iuncus odoratus.
 Nepitæ, menta sylvestris.
 Napi, gongilidis semen.

O

Ocymi, silybrium.
 Ocymoides, sylvestica menta.
 Oenanthes succi, ampelini arboris
 succus.
 Olei ricinini, oleum laurinum.
 Olei veteris, duplum olei coquitur
 cum adipe suillo veteri.
 Oleæ lachrymæ, hypocistidis succus,
 Galenus oleæ Aethyopicæ lachrymæ.

Opocarpasi, liquor myrti.
 Opopanacis, lac sycamini.
 Orizæ, hordeacea farina.
 Oenithogallorum, anthani.

P

Papaveris liquoris, mandragoræ
 succus.
 Peristereonis, chamæleuce.
 Peucedani liquoris, succus glycyrrhizæ.
 Picis liquidæ, opopanax.
 Pityocampæ, vespæ, in Cedriam.
 Piperis, zingiber.
 Polypodii, radix chamæloxæ, vel
 chamæleontis.
 Polytrichi, absinthium.
 Propolis, ladanum.

Populi nigræ sarculorum, sam-
 psuchus.
 Psylli, lenticula palustris.
 Pterei, onori semen.
 Pulegii, hyssopus.
 Pyrethri, zingiber.
 Pumicis, terra Cretica.
 Phu, sphagnus.
 Phyci, anchusa.

Q

Quercus, chamæleon.

R

Rapæ, heliotropium.
 Radicis rumicis, Cinira.
 Raphanini olei, rhicininum.
 Recrementi plumbi, helcysma.
 Recrementi æris Cyprii, melan-
 teria Aegyptia.
 Resinæ picæ, resina terebin-
 thina.
 Resinæ colophonix, apochyma.
 Rhodoïdis, sinopis.
 Rhododaphnæ liquoris, viscus
 quercinus.
 Rosarum siccatum, Persææ folia
 sicca.
 Rhu, centaureum.
 Rubi canini, vesicariæ semen.
 Rumicis, pyrethri radix.

S

Sabini olei, oleum recininum.
 Sagapeni, picæ resina arida.
 Salamandræ, lacerta viridis.
 Salis ammoniaci, sal Cappado-
 cicum.
 Salicis liquoris, nigræ hederæ li-
 quor.
 Saluix, nepita.
 Sampsuchi, rhus culinaris siccus.
 Santonici, abrotanum.
 Satyræ, semen crucæ.

PAULI AEGINETAE

Scammonij, ricini.

Scillæ, bulbus.

Scinci, satyrium.

Scordij, albi papaueris caput.

Semperuiui, lactuca serapiadis, radix pæoniæ.

Semperuiui succi, lactucæ succus, aut folia.

Sepiæ testæ, pumex.

Serpylli, potamogiton.

Sesami, semen lini.

Sesamoïdes, expressum amaracinum.

Sinapis, cardamomum.

Sisonis, anisi.

Sisymbrij, ocymum.

Sphagni odorati, iuncus cultus.

Spheclæ, hoc est fæcis vini combustæ, sandaracha.

Stymmeos tussis, squama æris,

Styracis, castoreum.

Strobilorum, semen cucumeris.

Struthij radicis, radicis veratri nigri.

Sulphuris viui, sandaracha.

Syrici, spuma argenti.

De ponderibus & mensuris.

Pondus, grauitate dimensum iudicatur, mensura autem vasis capacitatem: vas autem, siccæ quantitatis aut humidæ mensura est, vt tres quantitatis quæ mensuratur, sint differentia, vna quidem ponderis, altera vero aridæ substantiæ qualis ea quæ in cumulum cogi potest, porro tertia humidæ est substantiæ. Cum autem multa prope infinita sint pondera & mensuræ, pro regionum diuersitate, & vntium consuetudine, de iis quæ omnibus in vsu communi sunt, vobis sermo erit præcipuus.

De notis ponderum & mensurarum.

QUONIAM vero nonnulli literis non integris, sed notis signisq; pōdera & mensuras demonstrant, satius fuerit, veteres in hac re imitari, & primum characteras ipsos exponere. Primum igitur x litera, cum superscriptum habet α, chalcum hoc est æreolum signat, exempli gratia, x. Si o habeat, choa, qd̄ est cōgium, x. Si v choe nicem, x. Si η, chemam, x. At κ si ε habet suprapositu, & lineam

Terræ Samiæ, leucographis Aegyptia.

Terræ erythriadis, calx Thebaïca. Galenus addit terræ teneræ, plumbago.

Thapsiæ, Elydriion.

Thapsiæ succi, chamæleontis nigri succus.

Thermuntiadis, lycopsolos.

Troximi maioumum, aut maiouulum.

Thuris, ampelites.

V

Vini Italici, vinum mendesium.

Vux acerbæ, galla omphacitis.

Vux passæ satiuæ, palmulæ.

Visci quercini, chamæleon niger.

Vulpini adipis, vrsinus adeps.

Vulturis finus, colubinus finus.

X

Xylobalsami, violarum albarum radix.

Z

Zingiberis, pyrethrum.

Cap. xxvi.

rectam, quæ per obliquum inferius cornu ipsius fecet, seratiu, hoc est
 filiquam notat, vt, ϵ Si ν superiectum est, cyathum κ . Si σ , cotylam,
 hoc est heminam, κ . At linea circumflexa quam nihil aliud circum
 stat, & quæ per obliquu ponitur, obolu notat, ω . Si duæ huiusmodi
 lineæ sint, quas nihil circunstat, duos signant obolos, $\omega\omega$ qui oboli
 grammæ, hoc est scrupulum faciunt. is notatur litera ρ , quæ ϵ literam
 habent annexam, recta quadam linea diuisum, $\rho\epsilon$. Duæ autem con
 iunctæ atq; altera parte in angulum coactæ, duobus κ literæ cornibus
 similem ad rectam lineam spectantibus, notant drachmam, quæ alio
 nomine vocatur olca, ϵ . proprie vero olca per λ scribitur, cui in
 medio litera σ sit addita, $\lambda\sigma$. Verum si λ adiectu i habet, libram fi
 gnat, λ . Nonnulli vero alteram λ literæ lineam oblique secantes.
 libram ostendunt, λ . At cum ρ litera in ipso sui angulo σ habeat,
 vnciam denotat, $\rho\sigma$. Quod si μ in summo vertice habeat opposi
 tum ν , minam refert, $\mu\nu$. Si ν , notat mystrum, μ . Si ϵ medicaminu, $\mu\epsilon$.
 Si σ , modium, $\mu\sigma$. Porro τ post se habens ϵ , & ν , signat tryglion, $\tau\epsilon\nu$.
 At ξ cui iuxta sit positum ϵ , xesten, qui sextarius, ostendit, $\xi\epsilon$. Si σ ap
 ponitur, oxybaphum id est acetabulum $\xi\sigma$. Aliqui vero extarium
 linea recta ξ secantes conficiunt, ξ . Sed μ adiectum literæ μ , hemi
 nam $\mu\mu$ addito ϵ , incumbente ipsis μ , ceramium valet. $\mu\epsilon$.

De ponderibus.

MINA Attica & Aegyptia habet vncias sedecim. Romana
 viginti. Libra vncias duodecim. Vncia drachmas octo. Drachma
 habet scrupula tria. Scrupulum, obolos duos. Obolus, filiquas duas.
 Siliqua, æreolos duos, & duas tertij partes.

De mensuris liquidis.

ITALICVM ceramium habet congios octo, Congius sex
 tarios sex, Sextarius cochlearia duo, quæ nonnulli triblia uicupant.
 Hemina idem triblium continet, mystra magna tria, acetabula autem
 quatuor. Nam magnum mystrum habet acetabulum. Acetabulum
 sesquicyatum habet. Cyathus, chymas paruas seu mystra parua duo.
 At si voles & ponderum liquidorum mensuram scire, permultæ li
 quidarum rerum secundum lancis momentum differentia habentur,
 vt in olei, vini, & mellis exemplo dicemus. Mel igitur vino ponde
 rosius quarta parte, itemq; decima est: quo fit vt fere tertia ponderis
 pars melli accedat: capit enim integram huius mensuram, & insuper
 trientem. Mel autem oleo ex media parte grauius est, continet enim
 totum olei modum, & ultra semissem. Vinum oleo nona parte super
 eminet, totum enim ipsius pondus continet, & nonam eius partem.
 Quo autem res fiat dilucidior, omnium mensurarum pondus sigil
 latim veluti de tabula depictum subiicimus. ex qua liquido constat,

PAULI AEGINETAE

per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt, oleum, vinum, & melle, ex ordine demonstrari.

	Olei	Vini	Mellis
Ceramiū Italicū habet	lib. 7 2	lib. 80	lib. 108
Congius	lib. 7.	lib. 10.	lib. 13. S.
Sextarius	lib. 1. vnc. 6	lib. 1. vnc. 8	vnc. 13 & S. 2 38
Hemina	vnc. 9	vnc. 10	vnc. 13 & S. 2 38
Mystrum magnū	vnc. 3.	vnc. 3. scrup. 8	vnc. 4. & S. 2 38
Acetabulum	drac. 18	vnc. 2. scrup. 12	drac. 27
Cyathus	drac. 12	drac. 12. scrup. 4	vnc. 2. drac. 2
Mystrum paruum	drac. 16	scrup. 20	drac. 9

ORIBASIVS secundum Adamatium author est sextarium Italicum vini mensura quidem vnciarum viginti quatuor esse, pondere vero vnciarum viginti. sextarium pondere mellis duas libras, & dimidiam habere.

De aridis.

AEGYPTIA artaba habet modios quinque. Modus ægyptius & Italicus chœnices octo. Chœnix sextarios duos. Sextarius, semisextarios duos quos & heminas vocat. Hemina habet cyathos octo. Atticus medimnus habet semisextaria, quæ hemiecta vocant duodecim. Hemiectum, chœnices quatuor, Ita medimnus habet minas quadragintanovem, sextarios nonagintasex. Huiusmodi autem mensurarum pondus exponere haud facile, quod aridarum rerum infinitæ iuxta momenti lancis rationem differentie existant.

Finis libri Septimi, Ioanne Guinterio Andernaco Medico interprete.



LECTORI.

Antequàm te ad lectionem Pauli conferas, scito aliquando uerbum digerere positum esse pro discutere. Item mannam pro tenuiore parte thuris. Cachry pro flororis marini.

INNIS ANDER

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS


IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS

IN LIXVE PRIMVS



IOANNIS ANDER

NACI IN LIBRVM PRIMVM

PAVLI AEGINETAE COM-

MENTARIVS.



CAPVT I.



VANDOQVIDEM gravidis. Primum hoc caput Pauli ad uerbum ex quinto Oribasij sumptum est: in quo gravidis multa superuenire legimus: inter cetera stomachi redundatio- Stomachi nem, ut Pliniano more loquar, quam Paulus uer redundatio bo τῷ περισσῶνεν significat. Id si Hesychio περισ- & Suidæ credimus, a canibus caudam mouen σαισις

tibus: aut potius, quod hic etiam magis congruit, a fluctuum agitatione tralatum est. In grauida enim sanguis menstruus, qui ante conceptum stato tempore, expurgari solebat, copiosior in utero collectus quam pro fœtu adhuc exiguo ad stomachum regurgitat, ibiq; exundans, nauseam excitat. In prima nostra uersione erat, Nausea, sicuti etiam Aristoteles libr. 7. de historia animalium ponit. ἐτι δὲ ναυτίαι, inquiens, καὶ ἔμετοι λαμβάνουσιν τὰς πλείους. id est, prete ναυτία. rea nausæ & uomitus plurimas infestant. Aetius πλάδ' & σμάχου ait, quod est nimia humiditas stomachum debilitans, non ut Orosius putabat, sola imbecillitas. Nam Galenus Commentario secundo in primum de morbis uulgaribus, ait τὴν περιτλὴν ὑγρότητα πλάδ' οὐκ εἰωθεν ὀνομάζειν, hoc est superfluam humiditatem, pladon appellare consueuit, de Hippocrate dicens. Idem Commentario secundo de ratione uictus in morbis acutis ἐφ' ὧν καὶ προσέειπεν, ὡς ὁ μὲν ὑδάτης οἶν' & πλάδ' ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ τούτέστιν ὑγρότητα, καὶ ἄτονίαν ἐμποιοῖται. hoc est, in quibus etiam adiecit, uinum aquosum, Pladon, id est, humiditatem & imbecillitatem in superiore uentre excitaturum.

Sputa crebra. Quia stomachus ex humiditate languet, eoq; os ipsum tenui sputo assidue plenum existit: Græca dictio est πτυελίζαν: πτυελί- quam Galenus in priore prædictionum interpretatur, πτύειν πολλάκις, ζαν. hoc est spuerere frequenter.

COMMENTARIUS

καρδια Stomachi erosio. Quando ab acrioribus humoribus irritatur, mor-
μός. **καρδιαγμός,** quasi dicas cordis morsus. Veteres autem olim os uentricu-
 li cor appellauerunt, nimirum ex situs uicinitate: quia cor prope os uen-
 triculi situm est, ut ait Galenus, & ipsa rei euidentia docet. eundem affe-
καρδιακ ctum Galenus etiam **καρδιαλγίαν** uocat libro secundo de placitis Hip-
ρία. pocratis & Platonis.

Cibi fasti- Cibi fastidium. Nimirum ex uitiosis humoribus stomachū infestā
dium. tibus, si Galeno credimus, græca dictio est **ἀσιτία**, quæ signat cibo ab-
ἀσιτία. stinere, & inedia uti, sicut Grammatici nobiles interpretantur. Gale-
ἀσιτοι. nus etiam libro. i. τὸν ὠδὸν καὶ τὴν ἀσπίδα differentiam inter. **ἀσίτης** &
ἀπόσιτοι **ἀπόσιτης** ponit hisce uerbis. ὅτι τῆς ἀνδρείας ἀσίτης ὀνομάζου-
ἐνδρεκτοι σιν οἱ ἐλλείψεις τῆς μὴ προσενηκαμλίης σιτία, τῆς δὲ ἀπείρας μ-
 λήους προσίεσθαι, ἀποσίτους καλοῦσιν. hoc est, quod Græci appetem-
 tia carentes uocāt, Asitos, eos sane qui cibos non assumunt: illos autem,
 qui assumere oblatos auersantur, abhorretq; Apositos, omnibus est ma-
 nifestum. Ibidē **ἀπόσιτοι** παλίων γδυμάτων διετέλεον: quasi dicat,

ἀσιτία. omnium ciborum fastidio laborabant. Erit itaq; **ἀσιτία** abstinentia à
ἀποσι- cibo in totum: **ἀποσιτία** fastidium quidem, sed ut aliquid tamen assu-
τία. matur, quod Galenus ostendit lib. i. de causis symptomatum, grauidariū
Fastidium accidentia enumerans in hac uerba, βραχέα σιτῶν μὴ τ' αὐτῶν
abstinentia πρὸς τὴν ἀποσιτίαν. Hoc est quod mulier pauca comederet ob fa-
 stidium. Hippocrates in Aphorismorū cōmentario quarto: ἀπυρέτω ἐόν-
 τι ἀποσιτία. Galenus interpretatur ἢ μὴ ἀποσιτία τὸ αὐτὸ δ' ἡλὸς
 πρὸς ἀνδρείαν. Rursus in libello de uictu priuatorum: ὁκοσοισι δὲ ὁ δ' αὖ αἱ
 γίνονται ἐκ τῶν σπλάγχων, ἢ ἐκ γυμνασίας, ἢ ἐξ ἄλλης τινὸς ὁδοῦ

ἀσιτ **πείρας,** τουτέοισι συμφέρει αὐτοῖς ἀσίου. Hoc est, quibus
 dolores uiscerum oboriuntur, aut alia quadam obambulatione, his con-
 uenit in abstinentia conquiescere His omnibus animaduersis, legendū
Corrigit uidetur **ἀποσιτία** pro **ἀσιτία**, id quod ex sequenti oratione cuius me-
locus Pau diocriter sagaci licet deprehendere. Nam Paulus singulorum accidentiū
di ipressi. remedia tradens, ἀποσίτους δὲ inquit nō, ἀσίτους. quanquam nō igna-
 rus sim aliquando authores, alterum pro altero usurpare: ut ē capite. 35.

Orosius. Verum cum utraq; hic ponantur, ἀποσίτοι, & ἀσιτοι exacle intelli-
Castigator genda sunt. Miror hoc Oroscium qui in alijs corrigendis nihil facit reli-
Basilienis. qui, non aduertisse: Castigatorem uero Basiliensem, qui Paulum Græcū
 germanicis typis excusum edidit: tum hoc, tum alia pleraq; præterisse,
 notata alioqui dignissima.

Vina fulua. Vtpote frigidioribus naturis accommodata: tum ad con-
coctionem, tum ad succi bonitatem procreandam, ut ex Galeno didici-
mus. Aut enim li. 12. Methodi ἔτοι πάντες οἱ οἶνοι κίρροι, καὶ θερμοὶ καὶ
ὀρώδεις εἰσὶ καὶ τῆς συστάσεως μέσοι ττε ὑδατῶδων καὶ τῶν παχέων. κίρροι.
Hoc est, omnia hec uina fulua, tum calida, tum odorata sunt & sub-
stantiam habent inter aquosa & crassa mediam.

Color hic fuluus, qui Grecis κίρρος dicitur, proximus est flauo qua-
si dicas in pelucido flauum: hinc etiam flauus color & fuluus eidem se-
per ei accommodantur. Id quod ex Galeno licet condiscere, libro. 5. de sa-
nitate tuenda ubi habet, σκόπον ἔχων οἶνον κατὰ μὲν τὴν σύστασιν
αἰτὶ τὸν λεπτότατον αἰρεῖσθαι, κατὰ δὲ τὴν χροῖαν, ὃν ὁ Ἱπποκρά-
της εἰσὶν κίρρον καλεῖν, δυνάτο δ' αὖ καὶ ξανθὸν ὀνομάζειν αὐτόν.
Id fere sonat, huc consiliū dirigens, ut uinū substantia quidem tenuissi-
mum semper: colore autē, quem Hippocrates κίρρον, id est, fuluū nomina-
re consuevit: possis et eundem flauum appellare. Galenus alibi τὸ κίρ-
ρον χρῶμα δυνάτο αὖ λέγειν πυρρὸν ὡχρὸν. Hoc est, fuluum colore
possis rufum pallens dicere. Sunt qui hunc colorem latine Giluum nun-
cupent: ego malim ex Galeni interpretatione fuluum conuertere Pliniū
secutus: qui hunc colorem inter alios uino attribuit non giluum. Siue au-
tem dicas gilua flaua, aut fulua, nihil interest, modo obserues plerunque
uina ex uetustate hunc colorem induere.

At medicamenti nomine Superius commemorata ad cibum refe-
runtur: sequentia cum medicamenta adhibentur, quæ stomachum ex ni-
mia humiditate imbecillum corroborent, exiccentq; ὡς φάρμακον δὲ.
id est, ut medicamentū uero habet textus, ego nomine medicamenti uerti.

Ralix Pontica. Hoc est, rhaponticum, uim habet corroborandi sto-
machum imbecillum: uide Dioscoridem. πειραιῶν.

Extrinfecus præcordia. Hoc est, qua parte uentriculi os habe-
tur. Abusus est Paulus dictione πειραιῶν, quæ apud Galenum præcor-
proprie significat membranam, seu tuniculam, cor ambientem, aut
se maius, cordis inuolutum. Quia uero os uentriculi olim cor appella-
batur, excusari potest, ut Pericardion pro regione externa, sub qua
illud delitescit, accipiatur. Plinius libro naturalis historię. 11. mem-
branas septi transversæ, præcordia appellauit, quod cordi prætendan-
tur. Galenus autem & Hippocrates πειραιῶν totam illam re-
gionem appellant, quæ à mucronata cartilagine, utraque in parte ad
umbilicum usque porrigitur. Celsus autem latine lingua in Medicina
princeps, præcordia nominat. Ceterum ex hoc Pauli loco constat, plicanda.

Color ful-
uus.

κίρρος.

Flauus.

πυρρὸς.

ὡχρὸς.

πειραιῶν.

Præcordia

Præcor-

dia apud

Plinium.

πειραιῶν

δίων.

Sub carti-

lagineum.

Medica-

mēra affe-

ctu stomā-

chi ubi ap-

plicanda.

COMMENTARIUS

ubi os uentriculi affectum est, ante non ad dorsum applicanda remedia.

Recentiores
res qdam
apud Lug-
dunū Me-
dici,
Linacri
uerfio.
Galenii
cus 13.
Methodi,

Nonnulli autem Medici apud Lugdunum dorso admoueri præsidia, ut in inflammatione gula uolunt, erroris occasione sumpta ex loco quodam Galeni in. 13. Methodi perperam à Linacro Anglo conuerso. Habet autem in hunc modum tralatio. Verum gula, quæ proprie uocatur Stomachus, cataplasmata super spinam dorsi imponimus, non autem ad pectus: idem facimus, & cum phlegmone os uentris laborat. Multo melius sonat græca. ἄλλ' ἐπίγει τε κενρίως ὀνομαζομένου στομάχου καὶ τὰ κατὰ πλάσματα κατὰ τῆς ῥάχεως ἐπιτίθειν οὐκ ἔμπεδον, ὥσπερ ὅταν τὸ στόμα τῆς γαστρὸς φλεγμονῇ, id est, Sed gula quæ proprie nominatur Stomachus, etiam cataplasmata super spinam dorsi applicamus, non antè, quemadmodum (intellige) facimus in anteriore parte cum os uentriculi inflammatur. Huic sententiæ ipsa rei euidètia, quæ ex Anatome apparet, ad stipulatur.

Præcordia contegere. Hoc loco usus est dictione, ὅ ποχόνδριον: cū hic eundem locum quem superius in uomitu uoluerit, intelligat.

At eas quæ cibum fastidiunt. Græcè est τὰς δὲ ἀποσίτους. Remedium fastidientium ponit, quanquam superius ἀσίτων scriptum erat.

Oenanthe. Hoc est, uua syluestris uitis, ut ait Dioscorides: ad uerbum hæc ex Oribasij quinto transcripta sunt. Auicennæ interpretes eundem locum turpiter corruerunt.

Error O-
roschi.
κίτλα.
Malacia.

Citta. Oroscius Cittam male interpretatur picam: non enim pica morbus est apud latinos, sed malacia: à græco autem uerbo κίτλα possis dicere picam, sed apud idoneos authores usurpatum non est, Galenus originem huius mali tradit libro primo de Symptomatum causis in istum modum μοχθηρὸν δὲ ποιητήτων ἂν ἐπιθιμῶσιν οἷς ἂν εἰς τοὺς τῆς κοιλίας χιτῶνας ἀναποδῶντι περὶ πῶμα μοχθηρὸν, εἴωθε δὲ τοῦτο γίνεσθαι μάλιστα ταῖς κακοχύμοις γυναιξίν, ἐπειδὴ αὐτὰς κνήσωσι, καὶ καλεῖται κίτλα τὸ πάθος. Hoc est: Præuas autem qualitates appetunt in quibus uitiosum aliquod recrementum in uentriculi tunicas est insinuat, id quod mulieribus, præsertim succis præuis obnoxiijs, ubi in utero

Malacia
stomachi.
Aduerte
locos Pau-
li & Gale-
ni.

habere cœperint, accidere consuevit, ac uitium appellatur κίτλα. & Plinius libro. 28. cap. 7. malaciam stomachi appellat.

Id tertio à conceptu mense. Galenus libro citato, καὶ τοῦτο πάθος χουσιν αἱ πλείους αὐτῶν ἀχρεὶ τῷ δούτερον, καὶ τρίτον μῶν ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ παύονται, id est, ac complures ipsarum hoc affectu usque ad secundum & tertium mensem laborant: quarto autem infestari desinunt.

Id quod in vtero est. Sic interpretatus sum κύημα, quasi dicas conceptum: nondum enim factus dici potest, si Galenum, ex quo fere omnia haec sunt derivata, his verbis loquentem intelligamus: κατὰ μὲν τοὺς πρώτους δύο μῶνας, ὁ λίγον ἐπισπᾶται. τὸ αἷμα τὸ εἰς αὐτὸ τὸ ἔμβρυον, ὡς ἂν ἐτι μικρότατον ὑπάρχον, ὅταν μὴδ' ἔμβρυον ἴδῃ πάλαι καλεῖται, κατ' ἐκείνου τὸν καιρὸν, ἀλλ' ἐτι κύημα, id est, in primis sane duobus mensibus factus paucillum sanguinis ad se attrahit, ut qui minime adhuc existat, quando ne factus quidem tunc appellari debet, sed potius conceptum. Et reliqua verba Pauli in Galeno ordine inuenies.

Iam labor & longior. Remedium est fastidij, & malacie stomachi, quae prauos cibos et alienos à natura appetit, verū malacie magis. Grace est in oībus exemplaribus cū impressis, tū manu scriptis quotquot mihi uidere contigit, ὅστιτοι δὲ καὶ οἱ πρόνοι &c. Hoc est ad uerbum, bene commesse faciunt & labores, quod perinde est ac si dicas bonorum ciborum appetentiam faciunt: ut qui superfluitatem ac redundantiam humorum discutiant, unde prauorum excitatur appetitus. Clamat hic Orosius Corp' & me errasse qui ὅστιτοι pro ὅθετοι legerimus. Quando quidem uero superius fecit mentionem ἀποσιτῶν & ἀλλοκότων ὀρεγουσῶν, non absurde ὅστιτοι in remedio ponitur. Præterea si remedium est malacie potius quàm fastidij, labor, certe ὅστιτοι recte dicuntur πρόνοι, quod bonorum ciborum, malacia autem malarum rerum appetentiam facit. Sed parum refert, an ὅθετοι legas.

Quæ vero mulier citra labores. Grace est ἀταλαιπώρης, id est, ἄταλαιπώρης sine exercitio aut labore. Nam ταλαιπωρία laborem & negocia uitæ apud Hippocratem significat cum alibi, tum in libello de uictu priuato. τὰς δὲ παχέας χρεὶ ὅσοι βούλονται λεπτοὶ γενέσθαι τὰς ταλαιπωρίας νήσιος εἰς ντὰς ποιεῖσθαι ἀπάσας. Hoc est, crassi qui tenues uolunt fieri, omnes labores ieiuni subibunt.

Verum acria. Ut piper, gingiber, nasturcium, aliaq; id genus quæ calore suo stomachi superflua consumant.

Oedemata. Tumores sunt ex pituitoso humore collecti, qui digitis prementibus cedunt: uarijs etiam morbis superueniunt. Vide Galenum de Tumoribus præter naturam.

Lauantur. Græcus codex impressus κατανίζειν pro κατανίζαν ha bet. Superfundere etiam significat.

IN II. CAPVT.

A Etate nec nimium. Ex hac clausula Græca μήτε δὲ νεωτέρῃ, red didi: nec nimium adolescens, hoc est, quæ sit in ipso uigore etatis: quo

COMMENTARIUS

Mulier a- nimirum corpus absolutum iam est, & copioso abundat sanguine. **dolescēs.** infra uiginti quinque sit annos, nempe adolescens, corpus adhuc incre-
scit, & alimentum minus habet perfectum. Eoq; νεώτερά uerti adole-
scens. Nam ab anno quartodecimo usque uigesimum quintum, etas uo-
catur adolescentia. Ab anno trigésimo quinto, multis solent menses ces-
sare, aut omnino pauci fluere, eoq; alimento minus ad factum alendum
abundant.

Nutrix non multo ante. Quia sanguis tunc ubertim ad mammas
confluit, unde lac copiosius etiam suppeditatur.

Masculum. Hippocraticum est, propterea quod laborato magis, pro
boq; nutrimento ex sanguine pollet, & minus excremento.

Condimenta. Sic dicuntur que liquoribus quibusdam ut aceto &
sapae, alijsq; cōdiēdis indūtur aromata, siue semina odorata quod genus
sunt cuminū, anisum, feniculū, grecis dicuntur ἀρωματισ et ἀρωματῆς.

ἀρωματῆς Lege i textu τὰς ἀρωματῆς δὲ ἀρωματῆς καὶ ἀρωματῆς πρὸς ἀρωματῆς.
τα. Venere nutritrix. Galeni præceptum ex primo de sanitate tuenda: quia
ex hac menses prouocantur, & lac odoris gratiam in deterius mutat.

ἀρωματῆς **Manus humerosq;.** Exercitationem nutrirī idoneam præscribit;
σας. qua uidelicet partes superiores agitate sanguinem copiosum lacti gene-
Condime rando suggerant. Dicit enim Galenus sanguinem optimum gigni exer-
ta. citatione moderata, cibus tum boni succi, tum iusto tempore, modo-
que assumptis. Præterea potione tēpestina modiceq; sumpta. Græce est,
ἀλατω, id est, molat.

IN III. CAPVT.

I Audatissimum. Galenus lib. 1. de sanitate tuenda ad uerbum om-
nia comprehendit. De urgui autem ex Dioscoride libro. 2. sumptum
est, quod autem ad lucem debeat inclinari, de suo Paulus adiecit: quem-
admodum etiam de probatione.

IN IIII. CAPVT.

I Ac viciatum. Ex quinto Oribasij transcripta sunt remedia nimi-
rum lactis uiciati: que tum corporis totius purgatione, tum uiclu-
ratione constant.

Vomitus. Oxymelite. Hic uomitus facillimus est, aliquando additur radicu-
la que raphanus dicitur minutim concisa horis duabus in oxymelite
madescit. Deinde ea proiecta, oxymeli assumitur. Vel radiculam esse

oportet, deinde aquam tepidam bibere. Valentiores uomitus ciendi modo septimo libro traduntur.

Laboribus. Nam exercitatio calorem prouocat: qui frigidum, uisco- sumq; humorem calefacit, extenuatq;.

Cibum præcedentibus. Alioqui plus noxæ quàm commodi affer- rent: imo plus pituitæ generarent, dum uidelicet cibum prius quàm esset concoctus, in membra digereret.

Salsamentum. Græce τάρυχον ἐστὶ, quod conditam thymi carnem τάρυχον significat. Cuius generis & Cybia sunt: quo nomine Plin. Pelamidem concisam appellat. Pelamidem uero Thymum, qui nondum attigerit an- num. Idem a recenti partu Cordyla dicitur.

Carnibus suillis. Ad obtundendam nimirum humoris biliosi acrimo- niam. Nam humida & crassi succi, ijs qui concoquere possunt, utilissi- ma. Habet autem uiscosi aliquid, quo iecur & renes obstruat: cetera ex omni- um animantium genere que pedibus fidunt, ut ait Galenus, salu- berrima. Porro indistincte dixit Paulus carnibus suillis, cuius pu- ta etatis esse uelit omittens. Nam floride etatis hominibus ac sese exer- citantibus iuxta magnitudine adulti, inclinantibus, qui adhuc incre- scunt, porculi conueniunt. Minimorum caro excrementis generandis est: uetulorum siccitate, & duritia displicet.

Esus por-
culorū
fumentis
etate ua-
riatur.

Sapaxq; & vini dulcis. Galenus libro πρὸς τὸν δὲ χυμῶς καὶ κακοχυ- μῶς, contrarium fere scribit, docens biliosis, quibus lac acrius tenuius- que esse solet, uinum dulce nequaquam conuenire. His uerbis: τοῖς χολω- δέξέροις σώμασιν, ἢ τε ὅτε φυσικῶς δυσκράσιον, ἢ τε δι' ἐπίκτη- τον ὁ πῶσιν γεγονέναι, ὅτε φαλερίν. ὅτε τῶ λήτης κίρρὸς γλυκύς ὅτε ἄρσοι. ὅτε δ' ἀέσβι. ὅ δ' ὁ ὡς τὸς τε καὶ κίρρὸς ὁμοί. τοῖς προειρημέναις ὡν ὡδὴ τῶ δ' ἐστὶ πίνεσθαι. θερμοὶ γὰρ ἅπαντες οἱ τοῖς τοι μήτ' ἐν χολώδεσι, μήτε τοῖς ἐξ ἐγκύσεως ἢ καυμάτων πολλῶν, ἢ ἐν δέξις ἢ λυπῆς, ἢ ὡρε, ἢ χώρε καὶ κατασάσει θερμῇ, διδόναι τοῖς τοῖς οἶνον. ἐξ ὑπεναντίας μὲν ἐν ἀγαθὸς ἅπασιν τοῖς θερμαίνε- σθαι θεομύοις, φλεγμῶδεσι, καὶ ψυχραῖς κρείσσει, καὶ χυμῶν πλῆθ' ὡμῶν ἠδ' ἀκόσιν, ἀργῶς βίβουσιν ἐν χωρίῳ ψυχρῷ καὶ χει- μῶν, καὶ κατασάσει ψυχρῇ καὶ ὑγρῇ. τὰ τοῖς μὲν ἅπασιν ἀγαθὸς ὁ κίρρὸς οἶνος καὶ γλυκύς. ἐναντίος δὲ τοῖς ἐναντίος ἔχουσιν, id est, Biliosiori corpori, siue ex temperamento naturali, siue qualicumque ascī- titio, nec falernum, nec dulce tmolites fuluum, nec aruissimum, nec Les- bium odorum & fuluum predictis simile potui est idoneum. Quippe om- nia id genus uina calida sunt, eoq; nec biliosis natura, nec ex īsolatu, aus

Collatio
locorum
Pauli &
Galenī.

COMMENTARIUS

alijs ardoribus, uel inedia, uel tristitia, uel anni tempore, uel regione, & calido aeris statu huiusmodi uinum exhibendum est. E' contrario salutare est omnibus qui calefieri desiderant, pituitosis, frigidis temperatura, ijs qui crudorum humorum copiam coaceruarunt, in ocio uiuentibus: in loco frigido, hyeme, & statu aeris frigido, humidoq;. His inquam uniuersis fuluum ac dulce uinum salutiferum est, contrarium ijs qui secus habent. &c. Quid igitur hic dicemus, ratione alimentis exhiberi. Nam antea dixerat ἡ τρεφὴ δ' ἐξ ὅλων ἐστὶν αὐτῶν ἀνὰ λόγον τῷ πάχῃ. Hoc est, Alimentum uero ex omnibus ipsis crassitie respondet: puta qualem substantia crassitiem obtinet, tale etiam nutrimentum, nempe crassi succi producant. Sic igitur ijs quibus lac tenue est, conuenit. Quamquam muliebris etiam sexus, respectu masculini, frigidior existat, deinde sanguis tenuis, & serosus esse potest, acris, non etiam statim biliosus, ac calidus.

Cucurbitula etiam. Ut uidelicet sanguinem ad partes eas ex alijs attrahat. Caute uero ad mamillas defigenda est. Caro enim mollis cum sit, facile intumescit, cucurbitulaq; repleta difficile auellitur. Quod si hoc acciderit, sponsia calida illi superponi debet, sic enim laxatur. Sin minus, pertundetur.

Melanthium. Dioscorides hoc docet lac extrahere, in qua re miror castigatorem Orosium, papauer nigrum uertere, quod contra omnem medicinam est, ne dicam piaculum, praebeere ad lactis generationem uehementer refrigerantia adeo ut soporem inducant, & quidem uolenter nec sine incommodo naturae. In Graeco exemplari legendum quidem ei assentior pro γλυκὺν, γλυκεῖ, quod praeterijt Gemusens. Melanthium uero apud nullos autores papauer nigrum signat, etiam si conueniret instituto. Ita sunt quidam ad uituperandum alios proclines, ut saepe ipsi in multo grauiore errores incidant.

Calida prius. Graece est θερμῶν προσαιώνσαντες legendum, non προσαιώνσαντες, ut habent codices impressi, quod neuter Aristarchus uel Orosius uel castigator Basiliensis aduertit. Dicitur etiam καταιώνσαντες à uerbo καταιώνειν, quod significat καταυτλήειν, & καταχούειν. Galenus in primo ad Glauconem. τῶν δὲ σπλάγχνων προιοῦσαι καταιονοῦντα τε καὶ καταπλάττοντα τοῖς μαλάττειν καὶ χαλαρῶν διακαμνίσις, hoc est uisceribus autem prospicere oportet, superfundendo, obducendoq; ea quae emollire possunt, & laxare. Leoniceus uigendo uertit.

Prius emulcto. προαμέλεσαν passiuè positum est, cum medium

Error Orosij.

Textus Graecus corrigatur Melanthium quod gith dicitur.

προσαιοειν. καταιονσαντες.

alioqui sit.

Ieiuno. Hic proprie positum est ἁσίτω, ut facile intelligas in initio primi capitis pro ἁσίτῃς legendum ἁποσίτῃς.

Cibus solidior. Galenus primo de sanitate tuenda puerum uult nutrirī lacte, quoad primores dentes emiserint. Deinde cibo solidiore, utpote pane, leguminibus, carne. similibusq; sed omnibus prius commansis. Græce tantum est σίτις, quod per se cibum simpliciter signat, uerum lactis σίτιον. ratione solidior intelligendus uenit.

Si autem imprudentibus. Græce est, εἰ δὲ λαδόντα πληρωθῇ, id est. Si autem latentes repleti fuerint. Sed uerbum λαυδώνω in eiusmodi locutione, recte conuertitur, imprudentibus nobis, aut nescijs, id quod etiam Budeus annotauit.

IN VI. CAPVT.

Pustulis quæ quod puero. Post educationem infantuli morbos enumerat, quibus in ea ætate confluere solet, uocatq; Græce ἐξανθήματα. Exanthemata.
ματτα a uerbo ἐξανθῶν, quod est efflorescere.

Ad summa eruperint. ὅταν δὲ ἐπανθῇ, quod est in extrema eru-
perint. Ut ἐξανθῇ sit simpliciter se in altum promere, ἐπανθῇ uero in
sta magnitudine & figura per summa apparere. ἐπανθῇ

IN VII. CAPVT.

Grauedo. Græce est κόρυζα. Sic enim Celsus lib. 4. interpretatur, qua nimirum pituita ex capite defluens, nares claudit, nocem obtundit, tussim mouet. κόρυζα.

Melitismi. Ita dicuntur, sicut sinapismi, cum melle pars oblinitur, melitismus, cum sinapi. sinapismi. μελιτισμός.

Copioso calido. In Græco deerat θερμός quod est calido. Sic enim
magis aperit & discutit si quæ sunt superflua. μῶς.
Textus
Græcus
mutulus.

IN VIII. CAPVT.

Discocto. Hoc est probe cocto, quod Græci dicunt ἀπέφθον.

IN IX. CAPVT.

Tendinum. Quos hic uocat tendines, considerato, an musculorū buccam mouentium, an nervos à cerebro dentium radicibus adherentes
unde sensus ipsis communicatur, an tendines alios malis. ἀπέφθον
Tēdines.

Anisum. Impressi codices habent ἀνῆθον, hoc est anethum, quod ipsum quoque alium sistit. Sed Oribasius habet anisum. Ex Oribasio.

Calide. Non calidis potentia, sed calide ætli alius sisti debet. Græce
θερμῶς non θερμῶς legendum.

COMMENTARIUS
IN X. CAPVT.

ἄφθας. Aphtha. Celsus lib. 2. cap. 1. Proximum est ut infantes adhuc pueros serpentia ulcera oris que Greci ἄφθας nominant, exerceant. Varys interim coloribus apparent, pro humorum ea gignentium natura.

IN XIII. CAPVT.

πτῦγμα. Tamenti modo. Græce est ἐν τῇ πῶ πτῦγματ' significat autem idem πτῦγμα quod πίλημα, σφόδρον ἐρίξ, σὺν σρεμμα ἐρίων, hoc est. lapsus lane ut Celsus ait, uel circulus.

Heliotropion. Celso herba solaris dicitur. Ab herbarijs uulgaribus nouo indito nomine uocatur herba cæcri cū scorpoides potius appellatur. Sed quia scorpio incognitus magis ē, à cæcro appellationē traxerūt.

Cucumeris. Cucumis statim in Pepones, & Melopepones degenerat, figura tantum & quantitate inter se dissidentes: cum magnitudine excessere, pepones uocantur, cum uero rotundi formam & effigiem mali referunt, facta ex pepone, & malo appellatione.

IN XIII. CAPVT.

Iam uictus rationem præscribit ab infantia usque ad ætatem inclinantem, que non tam ex Medicina, quàm Philosophia petita est, quimos etiam Galeno, ut non solum corpus, sed animum quoque curet.

Liberiore. Græce est. ἐν ἀνέσει, hoc est, cum animi remissione, à uerbo ἀνίμι, quod est, licentia permitto, aut solute indulgeo.

Ελαφρῶς. Leuiora. Græce quidem τρυφᾶς αὐτοῖς προσφερεῖν ἐλαφρῶς, hoc est, alimenta ipsis leniter præbere, reddidi ego leuiora, utrum malis accipe. Hec dixi, ne uiliigatores ullam calumniandi occasionem habeant, si uel tantillum immutauerim.

IN XV. CAPVT.

Exercitatio. Totum hoc caput ex. 2. Galeni de sanitate tuenda transcriptum est, ex quinto uero Oribasij. in eodem uero hæc clausula aliter legitur Græcus codex Pauli impressus habet, δ' αἰ μὴ τε πλὴν δ' ὠμῶν, ἢ ἀπὲ πτῶν, μὴ τε σιτίων, μὴ τε χυμῶν, ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν ἢ ἐν τοῖς ἐντέροις, hoc est: Non debet crudi, incoctiq; siue cibi, siue humoris copia aut in uentre, aut in intestinis contineri, pro ἐν τοῖς ἐντέροις.

Galenus habet ἐν τοῖς ἀγγείοις, quod est in uasis, cui lectioni ego assentior. Intestina siquidem concoctioni proprie dicata non sunt: demde uentris dictione etiam ipsa comprehenduntur. Verū ut cōcoctio altera in uentre, altera in uasis administratur: ita distributio ex intestinis prima: altera ex uasis obitur. Hæc non aduerterunt Orosius, & Basiliensis castigatores. Omitto quod etiam ἐκ τῆς γαστρὸς in eodem fere Galeni loco

Erratum
Orosij.

COMMENTARIUS

Apothepia. Exercitationis oīs pars ultima est apothepia ēē
dicas recreatoria, nam corpus expurgat, & lassitudinem arcet.

IN XVIII. CAPVT.

αὐτῇ
↓ 15.

INter frictions. Paulus hoc ex secundo Galeni iam dicto libro a
uerbum mutuatus est. Galenus autem ex commentario Hippocratis
qui inscribitur κατ' ἰατρειὸν, in hunc modum αὐτῇ 15 δῶκε
λῦσαι, δῆσαι, σαρκῶσαι, μινῆσαι. ἢ σκληρὴν δῆσαι, ἢ μαλακὴν λῦ
σαι, ἢ πολλὴν μινῆσαι, ἢ μετρίην παχύναι. Hoc est, frictio pot solue
re, ligare, replere, minuire. Dura ligare, mollis soluere, multa minuire.

IN XIX. CAPVT.

αὐτῇ
15.

INter vocis exer. Hoc est ex quinto Oribasij transcriptum. Galenus
huius exercitationis fere non meminit. Est autem dictio Græca αὐ
φώνησις, quæ signat exclamationem uociferationemq; qualis in cant
editur, & lectione clara, orationeq;. Verbum αὐφώνῃν pro uoce con
tendere interpretari potes.

IN XX. CAPVT.

Lassitudi
nes.

Negligen
tia Oro
scij.

αἰλθερεῖς
Egelidum

Tepidum

Vlcerosa. Exercitationum genera persecutus, nunc ea quæ illis sup
uenire solent, enumerat. Sunt itaque lassitudinis tres numeri diffi
rentiæ, ulcerosa, tensoria, & inflammatoria, seu ut Græce dicā, φλεγμ
νώδης, in 3. Galeni de sanitate tuenda ad uerbum explicat.

Quo tendi videntur. Græce impressi codices, τῆκεδαι, quod est l
uari, consumi; habet pro τῆνεδαι nō tamē hoc aduerterunt Oroscius
& Gemusæus. In eodem capite χαλάτου δὲ σωτεταγμλίον, pro χ
λάτου δὲ σωτεταγμλίον, quod est, sane laxatur, quod distentum est.

Oleo dulci atque egelido. Hoc est: Ex maturis oliuis quarum ba
cæ iam nigrescere inceperint, druppas appellant, cōfecto. Egelido, hoc ei
tepidum, ut soli expositum fieri solet. Id Græca dictio uidetur innuere αἰ
λθερεῖς

Egelidum δὲ εἰς, si grāmaticis credimus, qui exponunt ὅτι ἡ λῖξ δὲ εἰς μανθὲν τ
id est à sole excalfacto. Quid si hyems, aut frigidum alioqui tempus si
quo sol non solet, aut certe parum nos excalfacere, tunc ne etiā soli ex
ponendum ut incalascet. Sane friuolum esse puto quod Oroscius au
fert, & pro tepido tantum poni ut postea in lassitudine inflāmatoria
gitur, εἰς λουον τε εἰς πολὺ χλιαρὸν, quod est: Oleum igitur copiosum t
pidum adhibendum. Verum ideo me reprehendere uidetur Oroscius, qui
Egelido dixerim, putans hoc frigidum significari, male me hercules in
thoribus latinis uersatus. Celsus egelidum in eodem sensu quo ego mult
in locis usurpat, ut lib. 4. cap. 11. Neque ea ipsa frigida, sed potius ege
da danda est. Quomodo etiam Linacer eundem locum in Galenum an

me uertit, qui antea corrigendus erat. Scio quidē apud ueteres in usu fuisse post lassitudinem unctionem, uel in sole, uel ad ignem, si hoc pacto uolet intelligere ελιδέεσς, uerū hoc omni tēpore non est perpetuum.

Vnctio. Non est in grecis codicibus impressis, aliquot autem scripti Instaurat manu habent, & sensus exigit. Quid enim est, si referatur hęc dictio, lectio Pam continua, ad quietem. Multa quidem esse debet, nō tamen perpetua, quod li. σωεχὴς significat. Iam Galenus ipse et Oribasius habet, ἀλειφὴ σωεχὴς, hoc est, unctio continua. Legendum itaq; in Paulo pro μάλις σωεχὴς, quod est maxime cōtinua, ἀλείμματα σωεχὴ, unctiones assidue. Hoc omiseras. Gemusæ, qui maior cura omnia & mutila aliquando in Gemusæ Paulo legi, quā dictione una, aut altera ex Galeno, unde hęc trāscripsit, us. sententię autoris adiuncta: utrum maius sit peccatum, alij iudicent.

Apothērapie exercitationem. Quę tum in motu, tum in frictione, & pauca, & mollis, & tarda sit. præterea solum similiter calidum. Protinus autem in lauacra frigida exilient, ut nimirū ipsis robur, in cute una cum calore cōstet, quemadmodum ait Galenus lib. 3. de sanitate tuenda. Lege in codice greco, ἐν τοῖς λείπτροις ἐκ τῆς &c.

Boni succi. In codicibus impressis perperam habetur δὲ ὅς pro δὲ. Corrigē textus. χυμῶ. Gemusæus omisit & hoc & superius.

IN XXI. CAPVT.

A Strictio. Gale. lib. 3. de sanitate tuenda. inquit, Voco ita meatuū cutis uiciū. quo supuacua trāsmittere prohibetur. ἡ γένωσις grecis appellat. ἡ γένωσις quid.

Oleumque ex. Hoc Oribasius debet. Is enim lib. 5. ad uerbum ex Galeno prius mutuatus erat. Verum in hoc dissentiunt; Paulus habet αἰγὴν ex populo nigra confectum, Oribasius ἄκοπον αἰγὴν. Galenus acopon ex abietis semine, τὸ δὲ τὸ ἀπὲρμα. τὸ δὲ τὸ ἀπὲρμα. Habes apud Paulū li. 7. acopon ex abiete, acopon ex populo nigra. & oleum ex eadem populo, omnia eiusdem facultatis. Nam loco fructus abietis, nigre populi fructus, æqua portio, apud eundem autorem ponitur.

IN XXII. CAPVT.

Hoc capite de lassitudinibus agit, quę citra exercitationem aut motum corporis sua sponte, nempe ex humorum superfluatorum copia accedūt. Galen. eas lib. 4. de sanitate tuenda persequitur amplissime.

Si his peractis. Hoc est, Si omnibus commemoratis præsidij malum cessarit, ad consueta munia paulatim transeundum est. In Paulo deprauata est lectio græca, habetur enim πρὸς τὰ σωήθη κατὰ λόγον, pro πρὸς τὰ σωήθη κατ' ὀλίγον, quod corrector Basiliensis omisit. Linacer

Corrigē textus.

COMMENTARIUS

rursus, conuertit. κατ' ὀλίγον.

Quā mittere
dus san-
guis.

Si enim vires cōstent. Quod est cum sanguinis plus, succi uero ma-
li minus in corpore redundat. nā in sanguine vires naturales deprehendū-
tur. Si igitur paululum uel citra sanguinem restitum uel ultra processum
est, audacter mittendus est. Si plurimum nequaquam.

Galenī sen-
tentia.

At si crudi humores. Hi enim in iecore, & uentre manentes, tem-
poris spacio paulatim concoquuntur, efficiunturq; benigni. eoq; seruari
debent, qui tales humores collegerunt, in omni quiete, prae cordijs probe so-
mentorū praesidio munitis, non autem sanguis debet eis detrahi, quoniam
uirium robur his non adest ut Galenus ait in θεωρητικῷ πρὸς φλε-
βοτομίας in hanc sententiam, & δὲ γὰρ ὁ πότε πλεονεχέων χυμῶν

Crudis ui-
riū robur
deest.

ἢ θεωρητικῷ τοιούτων, ὡς κελεύεται φλεβοτομεῖν ὁ λόγος ἐλέγχεται.
& ὡμὴ γὰρ τῶν τοιούτων διαμέσῃ & πᾶσι. Praeterea purgatio his dari non
debet, quia concocta, non cruda medicamentis sollicitare oportet.

Oxymeli-
tis facul-
tas.

Oxymel. Intellige simplex. Id enim cum etatibus, tum naturis uni-
uersis, ut ait Galen. & praecipue pituitosis ad sanitatis securitatem ser-
uit utilissime, dum omnes meatus arctos aperit, ut nusquam crassus, uel
glutinosus humor adhaere scat.

Erratum
Oroscij.

Apomeli. Fit hoc melle à fauis expresso, & aqua fontana. Verum
non simpliciter ex melle & aqua, ut putat Oroscius. Vide Galenum lib.
4. de sanitate tuenda, & Paulum lib. 7.

IN XXIII. CAPVT.

Senectus. Ex quinto Oribasij, quintoq; Galeni de sanitate tuenda. In
Paulo autem Graecus codex impressus deprauatus est, habet enim ἐ-
πανόρθωσις δ' αὐτοῦ δὲ τῶν θερμαινόντων τε καὶ ὑγραίνόντων ἀμὰ
τοῖς θερμαίνουσι, hoc est: Corrigitur autem ea calefacientibus, & hume-
stantibus unā cum calefacientibus. Superfluum ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι.
Oroscius & Gemuseus non aduerterunt.

Erratum
Oroscij.

Frictio. Cum oleo scilicet adhibita, quae uitale robur excitat, & mo-
dice calefacit, unde & distributio nutrimenti faciliior, & nutritio prom-
ptior consequitur.

ὡμογέρον-
τες.

Viridis se-
nectus.

Imbecilliores. Ut qui decrepita potissimum etate sunt: etsi alij alijs
celerius senectutis incommoda experiantur. Quicunque igitur uel crudi
adhuc senes, quos graeci ὡμογέροντας appellant, uel decrepiti, imbecil-
liores uiribus existunt naturalibus, ter die cibum assument, idque hanc
ob causam potissimum: nempe quod una uice multum assumere nequeunt.
Deinde, etiam si sumant, concoquere nequeunt, quare melius est cibum
partiri in tres uices.

Ac fici maturæ. Hæ paulo innocentiores, immaturis: mediocriter Ficus, tamen in usum adhibita. Ante cibum alium assumi debent, eo quod si non citò per aluum descendant, corruptionem in ventriculo subeunt, & alios secum cibos corrumpunt, id quod de omnibus fructibus fugacibus intelligendum est.

Per hyemem vero caricæ. Hæ incidendi, extenuandi; nim habent, quo nomine aluum citant, renesq; expurgant. Cum nucibus uerò simul commestæ ad omnia præstantiores existunt, atq; hinc nonnulli qui medicamentorum aduersus lethalia confecturas perscripserunt ficus aridas cum nucibus, & ruta præsumptas omnium illorum præsens esse remedium tradunt.

Si nullum in dextra. Galenus libello. τὸν δὲ δυχμίας καὶ κακοχυμίας inquit: τὸν ἰσχάδων δὲ δόξιν αὖ τὴν ἐναντία λεγὼν ἀληθὲν, ἢ κακοχυμίας γὰρ αἵμα καὶ δυχμίας αὐτὰς εἰς πνεύσας τε καὶ υἱανὸν ἐχούσας. ἐὰν γὰρ αὐταὶ διεξέρχονται κατὰ τὴν γαστέρα, καὶ ἢ ἀπ' αὐτῶν ἀναδράσῃ τροφοί. δις τετὶ δέρματος, καὶ ἢ νεφρῶν. υἱανὰ τε εἰσὶ καὶ δυχμοί, βραδυώουσαι δὲ κακοχυμότες αὖ πῶς γίνονται. id est: De caricis aut si quis contraria pronunciet, uere dicere cōse-
ri queat, nēpe bono maloq; esse præditas, morbidæ cuiuslibet et salubris par-
ticipes. Si nāq; p aluum descendant, ac alimentū quod ab eis puenit, in
corpus distributū, iecur renesq; trāsferit salubres sunt. & succi benignio
ris: sin remorentur, prauioris quodāmodo fiunt. In textu hoc Galeni ha-
bes διατέτῃ δέρματ, quod est, per cutem, male pro διατέτῃ πᾶ-
τ. Hoc in codice nuper impresso Gemusæus castigatōr præterijt.

Textus.
Galenus ut-
ciatus.

Ante cibum. Alui subducendæ gratia: quæ etiam oliuis, ut Galenus in commentario de alimentis docet, & damascenis sollicitatur.

IN XXVI. CAPVT.

Q Vandoquidem vero. Ex quinto Oribasij sumptum est. Græ. Corrigi-
cus textus deprauatus in Paulo est, pro ἐπεὶ δὲ δέδαντα le-
gi debet ἐπεὶ δὲ τῇ ἐξαιρέσει & cetera. quod annotauit Orosius. Verum in
hoc grauissime peccat, dum alios reprehendit quod τείμματι uerterit
frictione, cum Galenus, Paulus & Oribasius semper dictionem τεί-
ψιν & ἀνάτριψιν, pro frictione usurparint. τείμμα uero apud gram-
maticos, Suidam, Hesichium, Budeumque nostrum pro detrimen-
to accipitur, ueluti cum lapides atteruntur, aliæ aliæ res minutissi-
mæ deteruntur. Quid hic commodius erit quàm puluis? qui ex me-
dicamentis contritis effectus sit, & corpori admotus in balneo.

Pauli le-
cio.
Erratum
Orosij.
τείμμα.

COMMENTARIUS

Erratum Orosij. Addidi hic, aqua indito, ad sensum explendum. Præterea errat Orosius qui λέει μλι. id est, dum lauatur, uertit, post balneum, cum eiusmodi smegmata in balneo soleant adhiberi. Sed frictionem intelligit, quam ipse textus sequens eum admoncat. Nam à balneo acopi usum præscribit: in balneo, aliorum erit. Reliquit textum uiciosum corrector Basilienensis.

Propoma. Summatq; propoma. Vsum sum dictione græca, quod si re nulla apud latinos extet, quæ ad unguem eam referre possit græci autem uocant προπόματα quæ ex uino sunt, & melle dissipato. Nā Paul. lib. 7. inquit, ἀλλὰ καὶ τὰ μλι ἐξ οἴνου σωτὶδέ μιν α, αὖ δὴ καὶ προπόματα καλεῖσι, τὸ μέλι & ἀπαφριδέντ & α λαμβάνει πρὸς τέσσαρας τὸ οἶνον, καὶ σωτὶδεταὶ μὴ ἐφόμιν α.

IN XXVII. CAPVT.

Corpus decoloratum. Vita letior, citra curas, & melancholiam actiones naturales non habet impeditas, unde sanguis primum co-
βί & δ qui, deinde toti corpori distribui pot. Græce est. βί & δ φροσύνης, hoc φροσύνης est, uita leta, & iucunda, προσωής βρώσις est προσφιλής, quod si-
προσ- gnat chara, grataq; commestio.
ωής

Pastillos. Græca dictio est κόλλικας, à nullo fere grammatico expro-
βρώσις. sita. Galenus autem ex Hippocrate interpretatus est τροχίσκος, quod
κόλλικες hic optime quadrat. Magni alioqui uiri in hac uoce decepti sunt, qui pro glutinantibus quibusdam rebus usurparint.

IN XXIX. CAPVT.

**Corrigi-
codex.** **M**EL coctum. Exemplaria græca deprauata sunt, habent enim καὶ μέλι ἐφθόν τὸ σκληρὸν ἄγων, pro τὸ σκληρὸν ἄγων εἶναι, hoc est quod durum nimis sit, causam addit, cur mel coctum dentibus noceat.

IN XXXI. CAPVT.

IN superiore ventre. Ex quinto Oribasij transcriptum est, ἄνω uer-
ti in superiore uentre, in quo fit concoctio. In eo si diutius immorentur perniciacia sunt & dura.

**Germani-
ca impres-
sio.** **Ventos contrarios.** Nihil oculis magis incommodat quam uentus contrarius, eoq; miror, cur Germanicus corrector mutauerit ἐναντίως, hoc est contrarios in ἐναντίως, quasi dicas cause authores.

IN XXXII. CAPVT.

PLURIMUM noxæ ciborum. Similem habet sententiam Galenus in commentario Aphorismorum. ἰ. ὁ τὸν γὰρ ὑπερπληρώσει τὰ ἀγγεῖα ποτῶν ἢ σιτίων τὸ διαξέσθαι κινδυνώσιν αὐτοῖς, ἢ καταπνεγῆναι ἢ καὶ σβεδῆναι τὸ ἐμφυτὸν αὐτὸ θερμὸν καὶ ἀπερ καὶ ἀπώλλοιτο

ἄλλοι τινες Hoc est: Cum enim uasa potu, aut cibo repleta supra modum fuerint, periculum ne ea rumpantur, aut ipsi suffocentur aut etiam calidum nativum ipsum extinguant.

Vomitu igitur. Post vomitum autem os coluendum, dentes, oculosque, & totam faciem postea praecepit Oribasius. Id nisi fiat, dentes eis qui vomunt, computrescere. Sollicitari autem vomitus debet aqua tepida statim assumpta.

At si neque descenderit. Signa repletionis uenarum commemorat. At sanguinis redundantia proprie πληθώρα grecis dicitur. πληθώρα pro omnium humorum separatim plenitudine accipitur. πλησμονή pro repletionem tum potus, tum cibi, & uentris & uenarum usurpatur.

IN XXXIIII. CAPVT.

Cibus in ventre Hoc sumptum est ex sexto Galeni de sanitate tuenda. Fit autem sepe, ut cibi corrumpatur, aut nimia copia in gesti, aut qualitate praua donati, aut tempore incōmodo assumpti aut ipsius uentriculi afflicti uicio. Quomodo aut corrupta educantur, Galenus ample docet. Inter cetera uomitum commendat ex uini dulcis potu. Sed Pauli textus impressus in omnibus exemplaribus deprauatus est, habet enim δι' οὗ πότεως καὶ γλυκέως, pro δι' οὗ πότεως γλυκέως.

πληθώρα
πληθω.
πλησμονή.
πλησμονή.
πλησμονή.

Corrigi
textus
Pauli.

Quae mediocriter purgant. Sunt enim quaedam medicamenta, quae admodum grauitur, & magno cum naturae detrimento purgant. Itaque mediocria hic praecipit, quae sepius per interualla sumi possunt: qualis est pira dia aloes, cuius compositionem habes in septimo descriptam.

IN XXXV. CAPVT.

Veneris haec sunt commoda. Ex Oribasii lib. I haec sunt transcripta. Ante commoda autem docet, quibus uenus noccat: tum partibus corporis, tum temperaturis. Noxia itaque uenus est inquit, pectori, pulmonibus, capiti, & neruis: item siccis natura, & frigidis. Caueri etiam debet post repletionem, cum cibi, tum uini, item post uocationem ex uomitu factam: purgationem & si uenter sua sponte fuerit solutus. Praeterea si cibus nondum sit concoctus, aut si aegritudo quaedam infestat.

Eoque melancholicis. Vide Aristotelem in problematum sectione. 4. ad finem, nimirum quod flatu redundant. Semen autem decessio flatus existit. Sed quid de insipientibus dicemus, an & illi flatus habent? Ego sane opinor uenerem insipientibus conuenire, quod seminis qualitas quae uirilitatem & ut dicam graece θυμὸς homini conciliat, si in corporibus alioqui temperamento calidis, copiosior impertiatur, ex θυμὸς solet μα-

COMMENTARIUS

via fieri. Semine autem excreto, animus ille remittitur & qualitas imminuitur. Galen. optime de ueneris usu scribit in commentario qui inscribitur, ἱατρικὴ τέχνη, uerba ipsius in hunc modum habent: ἀφροδισίων δὲ κατὰ μὲν ἐπικούρου οὐδεμίαν χρῆσιν ὑγιεινὴν, κατὰ δὲ τὸ ἄλλῃδ' ἐκ διαλειμμάτων τηλικούτων ὡς ἂν τῶν χρῆσεσι, μήτε ἐκ λύσεως αἰδοῦν εἶναι, καὶ κορυφώτερον αὐτῶν αὐτοῦ δοκεῖν γένοιται. καὶ οὐ πνούσων. ὁ δὲ κορυφὸς τῆς χρῆσεως, ὅταν ἀκριβῶς μέσον ἢ τῶν ἐξοδῶν περιστάσεων ἀπασῶν τὸ σῶμα μὴδ' ὑπερπεπληρωμένον, μὴτ' ἐνδεές, μὴδ' ὑπερφυγμένον, μὴδ' ὑπερθερμασμένον

Venus corpus i-
tegrū requirit.
curum sane nullius ad sanitatem usus est. Sin autem uerum fateri uelimus, conducit, si tanto temporis intervallo exerceatur, ut ex ipsius usu nec resolutionem corpus sentiat, & leuius quàm fuit euasisse, perspirantiusq; uideatur. Tempus autem coeundi est, cum ex omnibus quæ foris accidunt medium exacte corpus obtinuerit, neq; uidelicet repletum nimis sit, neque inane, neque refrigeratum impendio, neque ex calfactum: neque siccatum, neque humectatum immolice.

Cæterum alij etiam. Due dictiones contrariæ in græco ponuntur, nempe ὀσίτοι τε, & ἄσίτοι, quanquam improprie si Galeno credimus, ἄσίτοι ponitur pro ijs qui fastidio laborant. Nam id ἄπόσιτοι significat, ut superius annotatum est. Sed positum est opinor, ut ἄπὸ λαγῶν, hoc est, sine uisceribus, pro eo qui parua uiscera habet, ἄφωνος, hoc est, uoce carens, pro illo qui paruam uocem edit, ὀσίτος cibi appetens. Superius nēpe capite primo positum uidetur pro ὀσίτης ποιῶν. hoc est, cibi cupidus faciens. Nam ὀσίτοι δὲ καὶ οἱ πόνοι. καὶ αἱ μακροτέραι ἀποδ' ἡμῶν. i. iam uero & labores & longiores profectioes cibi appetentiam faciunt. Verum alius ὀβητοί legendum putat.

Celsus.
At vehementes. Celsus eleganter libro primo hanc sententiam ex græcis confirmat his uerbis. Concupitus uero, neq; nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat, frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione etatis & corporis scire licet, eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur.

Contrariæ sententiæ. Antequam somnus inuadat. Ex Oribasio hæc particula sumpta est: & uideri possit Galeno contraria. Is enim libro primo de sanitate tuenda ex Hippocratis sententia hunc ordinem obseruat. Labor, cibus, potus, somnus, uenus, & hæc omnia mediocria. Paulus ante somnum uerem inuendam censet, redditq; rationem non certe inualidam. Sed in-

298
colligendum est secundum cibum, non statim, sed concoctione obita: ni-
hil etiam refert, si somnus aliquis brevior præcesserit: sequatur autem
prolixior: ex quo vires recolligentur.

Frigus superueniens. Bisariam legitur in grecis exemplaribus, Varia le-
Germanicum habet ἡ ψῆξις αὐτῆς ὡς ἡ ψῆξις, hoc est, frigus urgens, ut etio.
ualens. Alia habent ἡ ψῆξις ὡς ἡ ψῆξις, quasi dicas superueniens. Ita quoq; Gemusæ
Oribasius habet. Nescio cur Gemuseus mutauerit. us.

IN XXXVIII. CAPVT.

Capite grauantur & anxij fiunt. Hoc caput ex Oribasij libro pri-
 mo transcriptum est. Vbi etiam graece habetur, καὶ ἀσώδεις γίνον-
 ται, quod est, & anxij fiunt, confluanturq;. Orosius alios reprehен-
 dens, ex Marcelli Florentini Dioscoridis interpretis sententia uerten-
 dum censet ἀσώδεις ex repletione cibum fastidientes. At Galenus in
 commentario libri secundi προῤῥητικῶν Hippocratis hoc modo inter-
 pretatur. διπλῶς γὰρ γίνονται ἀσώδων τῶν καμνόντων, ἢ αὐτὰ μὲν
 τρεῖς ποιοῦν, ἢ δὲ αὖτις ὑπὸ σώματι βαρυνόμεναι καὶ μηδὲν φέ-
 ρειν σχῆμα ἔχουσιν. ἢ τρεῖς δὲ ὅταν τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς ὑπὸ μοχ-
 λῶν δακνῇται χυμῶν. οἱ πρότεροι μὲν ὁλετῆρας διακινεῖται ναυ-
 τιώδεις δ' εἰσὶν οἱ δὲ ἄτεροι. Id est: Cum bisariam egrotantes fiant
 ἀσώδεις, uno quidem modo, quum uirtus a corpore grauat, nullamq;
 ei figuram ex facili tolerat, altero autem cum os uentriculi à uiciosis
 humoribus mordetur, priores quidē affecti sunt pncioso, posteriores ne-
 ro nauiseabundi existunt &c. Hoc itaque Pauli contextu prior significa-
 tio accipienda est: non secunda, quam loquidē uirtus seminis copia mul-
 tum grauat. Deductum autem ἀσώδεις est ab ἄσῃ: quae dictio fre-
 quens est apud Galenum & Hippocratem primum ἐν σφοδρίᾳ signans:
 deinde fastidium acerbis humoribus stomachum rodentibus excitatū,
 unde et uomitus ἀσώδης dicitur. Nolo hic commemorare, quā multi
 etiam celebres uiri in eius interpretatione sint decepti. Legendum est
 ἀσώδεις, non ἀσσωδεις, quod etiam ἀσόμεναι dicitur.

Aliorum. In codicibus græcis impressis habetur αλω, hoc est. sale, pro ἄλλων, quod est, aliorum, quum lectionem et sensus, & Galenus in sexto de sanitate tuenda approbat. Nos antea quoque advertimus.

Semen uiticis. Græcus codex habet καὶ σπέρμα του λίνου: hoc est
 & semen lini, pro σπέρμα του ἄγνου, quod est semen uiticis. Sic etiam
 habet Oribasius. Item superius iam fecerat Paulus mentionem seminis
 lini. Hoc non aduertunt Oroscius & Gemusæus.

COMMENTARIUS
IN XXXIX. CAPVT.

Piper myrrham cum dulci. Calida perfrictionem expertis praescribit: quae nimirum habitum ipsorum restituant. Nescio autem cur Orosius legendum hic censiat cum uino albo, cum nullum eius generis calidum sit, nec odorum, quale Paulus requirit. Melior itaque lectio cum uino dulci, quale est fuluum, frigidis aut temperamento, aut ex accidenti accommodatissimum, si Galeno credimus, & ipsi euidetiae.

Orosius
falso emē-
dat.

IN XL. CAPVT.

ΣΥΚΑΥΣΙΣ. SI qui vero. Graece est *ἐγκαυσις*: quod ad uerbum sonat adustio uel exustio. Galenus libro secundo κατὰ τόπον proprie dici affirmat, de ijs qui exuruntur in sole. Celsus: Si quis in sole exustus est, huic corpus & caput oleo persundendum.

Συκαυσις
quid.
Celsus.

Paulatim. In impresso est κατὰ λίγον, quod est secundum rationē pro κατὰ λίγον id est paulatim, cuius contrarium sequitur ἀδρόως, quod idem significat quod uniuersim, subito ac una uice.

Lectio e-
mendata.
ἀδρόως.

IN XLI. CAPVT.

Cibos ualentis materiae. Ex quinto Oribasij traducta sunt: uoco autem cibos ualentis materiae, quae probe & multum nutriunt: ut Celsus alia ualentis, alia inedia, alia imbecillae materiae libro secundo commemorat: uocatq; ualentissimum, in quo plurimum alimenti est. Graeci uocant *τρώφιμα*.

Cibi ualē-
tis mate-
riae.

τρώφιμα

Et iis quidem obl. Graecus codex deprauatus est habet enim *χαίροντι μὴ δὲ τῶτοις*. Id est, oblectetur, neque ob haec pro *χαίροντι δὲ τῶτοις* omissa negatione μὴ. Sic legit Oribasius, quod etiam Orosius, annotauit: sed Gemuseus omisit.

Instaurata
lectio.

IN XLII. CAPVT.

Quoniam laboriose uomentibus. Hoc caput ex primo Oribasij sumptum est. Vomitus primum uictus ratione excitatur: deinde medicamentis &c. Victus ratione excitatio utuntur etiam in secunda quoque ualitudine: praeterea in acutis fere morbis, quum bilis, aut pituita in stomacho superat. Medicamentis uomitum facientibus, neque sani, neque acuta egritudine occupati utentur. Nam ea longis tantum affectibus, & induratis conueniunt. Hinc etiam ueteres cum nihil in medicina spei deprehendissent, ad uomitum solebant confugere. Id quod hodie etiam empirici quidam sine ulla ratione facitantes, optimis quibusque medicis laudem praeripiunt. Nam ea medicamenta propinant

Vomicus
quot mo-
dis exci-
setur.

Empirici
nostre x-
tatis.

que suprà infrà ualentissime purgent: quæ si æger ferre possit, sanitati plurimum restituitur: sin autem moritur, audaciæ suæ & temeritatis patrociniū habent, quod scilicet morbus fuerit desperatus, tot medicis antea curationem frustra molitis. Cæterum quando potissimum uomitus sollicitari debeat, Polybus in libello de uictu priuatorum docet. Sex mensibus hybernis in quiens, uomitu, æstate clysterijs utendum est. Quia enim per hyemem pituita in uentre generatur, uomitu eam euacuari precipit: æstate uero bilem supernatantem, deorsum reuellere. Quæ sententia Hippocrati contraria Aphorismis uideri queat: ubi habet: Aestate superiora magis, hyeme inferiora medicamentis sollicitare oportet. Hic dicemus: ex sententia Galeni, totū corpus si purgare uolueris, æstate per superiorem uentrem, hyeme per inferiorem medicandum est. Si. cut in Aphorismis dictum inuenimus. Etenim redundantibus, purgatio medetur, illuc quod uergunt adhibita. Adhibita. At si ab incremento humores in parte aliqua prohibere uolueris, per opposita reuellere con- ducit. Melancholicus autem humor quocunque in loco fuerit, per inferio- ra educi debet. Cæterum alijs singulis mensibus bis uomunt: alij per lon- giora interualla: alij nullo tempore præscripto, sed quoties aut uino, aut cibo plenior se ingurgitarint. Qui autem uomere bis in mense uult, in- quit Polybus, & post cū Celsus, melius consulet, si biduo continuarit, quàm si post quintumdecimum diem uomu- rit. Galenus autem nihil re- ferre dicit si ex interuallo non continuatis diebus uomas. Porro uomitus quomodo medicamentis excitetur, septimo libro est comprehensum.

Polybus
Quando
uomitu u-
tendum.
Collatio
fniarum.
Quo totū
corpus
purgari de-
bet, &
quō par-
corporis.
Humeres
ne cre-
scant p op-
posita re-
uellendi.
Quando
uomēdū.

ΕΤΥΘ.

Ferculum ex fabis. Græce uocatur ΕΤΥΘ. Galenus interpretatur libella de euchyma his uerbis. ΕΤΥΘ ονι δνομα ζω το εκ των ερεχθων των οσπριων η χερσων των σκδαζομενων &c. Verum quod sequitur in codice καὶ τὰ πιονα τῶν κρεῶν, hoc est, & pinguiore carnes, ubi le- gendum censio καὶ τὰ πλεονα τῶν κρεῶν, quod est, & copiosiores car- nes, scilicet fabarum. Nam ex leguminibus hæc commemorat Paulus. Non sum autem ignarus, pinguiore carnes, ut est suilla aliorumque Neglexit animalium uomitum posse excitare. Verum Oribasius nobiscum sentit Orosius. & contextus requirit.

Verum non solum. Hoc quoque superiorē lectionem confirmat. Nam χυλοι, hoc est succi seu cremores non de carnibus animalium di- citur, si quid iulico, sed de leguminibus aqua maceratis: aut de herbis, si mentio earum fuisset facta. Dixi autem cremores, secutus Varronē & Celsum, qui uocant cremorē pisanæ, aliorumq; granorum, ac leguminū. Irrites. Parum absolute dixit irrites, digitis eo perunctis: intellige

Chyli le-
guminū.

COMMENTARIUS

in os demissis.

Instaura-
da lectio.

Ne cesset vel intermittat. Manca uidetur sententia græca: *με-
τικὸν δὲ καὶ τὸ μὴ αὐτὸν καὶ διαλέπειν ὡδὶ τοῖς ἐμέτοις*, quod est:
Eum qui uomere debet, nō oportet nec cessare, nec intermittere. Quid hoc
est, nisi ponatur aliquid, quod termini eius signet? Nam hoc pacto perpe-
tuus, uomitus, aut simile quippiam intelligi possit, quod quā sit absur-
dum, omnes eruditi norunt, addendum ergo in codice græco *ἄχρῃς αὖ*

Oroscius
& Gemu-

ἄπαντα λυποῦντα ἐκβάλη. id est, Donec omnia, quæ infestant, eis
cerit. Ut est in Oribasio, quod Oroscius & Gemuseus præterierunt.

scius nimi-
um in alto
rū erratis
occupati.
Epithymi
dolis, non
animad-
uersa ab
Oroscio.
Varieta-
tes clyste-
rum.

IN XLIII. CAPVT.

MAne epithymi drachmam. Nusquam inuenio minus epithymi
pondus ad alium ducendam. Alii drachmas tres propinat, alij qua-
tuor, alij quinque. Nec opinor drachmam unam quippiam proficere, eò que
mendum forte est. Item Paulus in septimo drachmas quinque præbet.
Auicenna usque ad quatuor.

IN XLIII. CAPVT.

Clysteribus vtendum. Quemadmodum balnearum præfecti, lap-
dum sordes lutumque abluunt, ita clysteres uentriculi & intestino-
rum pituitam & bilem detergent, qui pro humoris diuersitate etiam ua-
riari solent: alij præterea lenes, alij acres habentur. Item triplici liquo-
ris mensura constant. Sūma est, tres hemine, media, due, minima, una.
Si Oribasio credimus, eoque miror Paulum hic semiheminā ponere, quod
fere apud nos dimidia libra est: quæ parum adeo ruacuabit.

IN XLV. CAPVT.

Vtimur etiam gland. Et hoc & superius caput ex primo Oriba-
sij transcriptum est. In calce habetur græce *παρέσεις αἰδοῖου*
quasi remissionibus, aut relaxationibus, uel resolutionibus. Sed *παρέ-
σεις* & *παράλυσις*, ita differunt, quod illa partē aliquā corporis obsidet:
hæc uero totū corpus. Dicuntur etiā *παρετοὶ* resoluti in aliquo membro.

IN XLVI. CAPVT.

παρέσις.
παράλυ-
σις.
παρετοί.
ἀποφλε-

Hvmores in capite. De medicamentis agit quæ materiam ex ca-
pite tum per os, tum per nares detrahunt, ac potius detrahendi mo-
dum præscribit. Ac primum Græco uocabulo *ἀποφλεγματισμόν* ap-
pellat. Scribonius compositione nona exponit his uerbis: Si per os ma-
gis detrahre materiam uisum fuerit, suadebimus pyrethri radiculam
commanducare: atque subinde hiantem pati fluere saliuam. Celsus
etiam lib. 4. cap. 2. explicat: Gargarizare his, quæ saliuam mouent, in-
quiens: Nam aut manduntur ea medicamenta, aut in gargarismata

γχατισ-
μός.
Materiam
per os de-
trahere.
Saliuam
mouere.

adhibentur. Recte igitur interpretabimur, & Latine ἀποφλεγμα-
 τίζεν, saliuam mouere. Alterum medicamentum quod per nares ca-
 pit purgat, ἐξ ῥῖνον uocatur. Solet enim hoc per cornu, quod ῥινεύ-
 τος dicitur, naribus infundi. Ibi paulisper commoratur, materiam ē
 capite detrahit. Tertium ab illitu διαχρῖσθαι nuncupatur, quod pala-
 to, columellæ, & narium foraminibus applicatur. Verum hoc in uniuersū
 sum intelligi debet, nullum ex comprehensis modo medicamentis esse ad-
 hibendum, nisi toto prius corpore purgato.

Sapa. Græci hoc uocant σίρωον, & ἔφημα. Galenus libro 3.
 κατὰ γένη. cap. 11. αὐτὸς αὖ ἐστὶ τῶν προχίσκων ἢ κυκλίσκων, ἢ
 ὅπως αὖ ὀνομάζεν ἐδέλοιτις, ὡς εἰς ἐστὶ καὶ ὁ πολυείδου δι' ἔφημα
 τὸ ἢ σιρώου, καὶ γὰρ καὶ τοῦτο καλεῖν ὡς αὖ αὐτὸς βουλευθεὶς ἐξέ-
 σῳ σοι &c. Solutio igitur uno pastillorum aut orbiculorum, aut quomo-
 docunque uosare libet, ē quorum numero etiam est qui Polyide ascribi-
 tur, ex Sapa, quam Græci ἔφημα uel σίρωον, uel quomodocunque hanc
 quoque uelis, appellant. Est autem sereum uel hepsema, uel sapa, in-
 genij non nature opus, musto ad tertiam usque partem mensura de-
 cocto. Quod ubi factum ad dimidiam est, defrutum uocamus. Hæc
 Plinius libro decimoquarto cap. nono. Idem libro uigesimo tertio,
 cap. secundo: Vino cognata res sapa est: musto decocto, donec tertia
 pars supersit. His consentit Leontinus agriculture scriptor Græcus, in
 hunc modum inquit: τὰ δὲ κούους καλλίσου ξεσῶς ἢ, οἶνου καλλίσου
 ξεσῶς ρ'. ὑδὶ τῆς ἑφῶν καὶ ἀπαφρίζων, ἐξάρετον ποιήσεις.
 Hoc est: musti optimi sextarios octo, uini nobilissimi sextarios cen-
 tum, ad tertiam coquens, despumansq; eximiam saram conficies. Colu-
 mella refert quosdam partem quartam eius musti quod in uasa plum-
 bea coniecerunt, nonnullos tertiam decoquere. Verum id ex aliorum
 sententia recenset. His accidit aliud sapa nomen Latinum, Calenum
 scilicet, quod deprauatum est in Palladio, mutatumq; in Caroenum,
 quod uir quidam non mediocriter in literis uersatus putat ex Palla-
 di seculo manasse, apud ueteres tum Græcos, tum Latinos in usu
 non fuisse. Verum rem penitus introspectanti Calenum apud Strabo-
 nem urbs est Campaniæ, in cuius agro uinum optimum & dulce na-
 scitur. Plinius libro quartodecimo, cap. 16. ijs præponi solebant Ca-
 lena. Legendum itaque censeo apud Palladium: Modus his & uirtu-
 tem mutabit, & nomina. Nam defrutum à defruendo dictum, ubi
 ad spissitudinem ualde despumauerit, effectum est: Calenum, cum
 tertia perditā, due partes remanserint: sapa, ubi ad tertias redacta

Sapa.

Defrutū.

Leōtinos

Calenum

COMMENTARIUS

descenderit &c. Quemadmodum igitur σίραιον ἔφημα, & ἔφητον apud
 Voces cō Hippocratem inter se confunduntur, ita apud Latinos sapa, & defrutū.
 funditur. Cum ipse Columella lib. 12. scribat mustum quando dulcissimi saporis
 decoquitur ad tertias, & decoctum sicut supra dixi, defrutum vocatur.

Quod autem ori illinitur tale est: sapo. Hoc sumptum est ex li-
 bro. 2. de Compositione medicamentorum secundum locos ad calcem: uer-
 ba ita sonant: ἄλλο διαχειρὸν σάματ' & σάπωνα διὰ τὸν τὸν
 χυλῶ χρίσον, τὰ κατὰ τὸ ἔρρεισκον, καὶ τὸν κίονα τῷ σάματ' &
 τὸ δ' αὐτὸ τῷ τὸν ἔρρεινον ἐστίν. Id est, aliud quod ori illinitur. Sapo-
 nem betæ succo dilutum palati regionibus & columellæ illinito. Idem ue-
 ro hoc est per nares infunditur &c. Deinde sequitur paulo post, δὲ πορὶ
 σω δὲ πολλὰ κίς ἐχρησάμην φαρμάκῃ ἐγχεομένῃ τῇ ἐννὶ μελαν-
 θίῳ ποτὲ μὲν ὅξιν δ' εἰμὶ διαβρέχων πρό μίαν ἡμέραν, ἔτα τῇ ὑ-
 σερσίῃ σὺν ὅξιν πάλιν λείον, καὶ ἐγχεῶν εἰς τὴν εἶνα δὲ τῶν μν-
 κτήρων. Hoc est, facili aut paratu jubinde usus sum medicamento melā-
 thio, quod naribus infunditur, interim sane aceto acri pridie macerās, de
 de postero die ex aceto rursus leuigans, infundensq; narium foraminibus
 &c. Ex priore igitur contextu Galeni, Pauli lectio corrigenda uenit le-
 gendūq; pro σίραιον, quod est sinapi, σάπων, hoc est sapa. Cui lectioni a-
 stipulatur etiam Oribasius lib. 1. Est autem teste Plinio Sapo gallorum
 inuentum rutilandis capillis, ex seruo cinere, liquidus & spissus. Hoc nō
 aduertit Orosius, tam seuerus aliorum castigator.

Leſtio
 corrigitur
 Hoc nō ad-
 uertit O-
 roſcius.

IN XLVII. CAPVT.

Quæcunque vrinæ ciendæ sunt. Omnia ex Oribasio pene descri-
 pta sunt, nisi quod post rutam, addit Oribasius, aut anethi ra-
 dices uſte. aut crinis eorum cum melle. Cæterum quibus de causis men-
 ses retineantur interim, tertio libro abunde condiscēs.

Vulvæ subiiciuntur. Græci uocant medicamenta proprie, quæ lana
 excepta naturalibus conduntur, πρὸς δὲ τα, quales sunt pessī disti, aut
 penicilla, collyriaq; ut apud Aristotelem in. 2. de generatione: τὰς δὲ γυν-
 ναῖκας βασιανίζουσι τοῖς τε πρὸς δὲ τοῖς, ἐὰν δὲ ἰκνῶνται αἱ δὲ σμυκ-
 πρὸς τὸ πνέουσι τὸ εὐραδὲν κατὰ τὸν ἄνω καὶ τοῖς ἐγγεῖσις. Hoc
 est, mulieres autem iſs quæ uulvæ i sinuantur, explorant, num odores
 ad spiritum qui foris aduenit, ab infernis partibus sursum perueniant,

προδιδ-
 τά.
 προσίει-
 δαι.

item iſs quæ illinuntur &c. quod Hippocratis ex suffitu aromatum ad
 nares & os delato cognoscit tradit. Cæterum προσίειδαι ueniunt à uer-
 bo προσίειδαι, quod priuatim signat, subiicit naturalibus mulierum.
 Dioscorides lib. 1. cap. 1. προσίειδαι δὲ ὡς κολλῦριον μετὰ μέλιτος,

ἐμβρυα κατασπῶσι. Hoc est: radices iridis collyrii modo cum melle naturalibus fucinarum subiecte fictus excutunt. Hinc etiam προσδέματα derivantur, idem quod προσδέτα. significantia. Dioscorides de eo libro loquens δ' ὡς αὖν δὲ ἔχει ἐμμήνων ἀγαθόν, καὶ τῶν τοῦ τὴν ὕψος εἶναι παθῶν ἀγαθόν ἐν προσδέμασι, κατὰ τλήμασι καὶ πυρίασεσι, Subilicere quod Latine sonat: Menstrua uero edunt, & uulnē affectibus medetur, in pressis subiecta, superfusionibus & fomentis. Quemadmodum igitur προσδέτου apud Grecos usurpatur, ita subicere, apud idoneos Latine scripturę scriptores. Id quod ex Celso licet deprehendere, libro 5. cap. 21. ubi habet: Sed alia quoque utilia sunt, ut ea quę feminis subijciunt: πέσ- Orosius hoc neglexit, σος Greci uocant.

Aut allium. Lege in codice Greco ὃ σκόρδον λέγον προσδέμελον, non ut habetur impressum ὃ σκόρδον λέγει προσδέμελον. Id nec Orosius, nec Gemusæus aduertit.

IN XLVIII. CAPVT.

Svdorem eliciunt. Quemadmodum alius quotidie respondens, & Recremēta. urina, aliāque recrementa reddita sanitati faciunt, ita sudor etiam cum opus est, effusus, non mediocriter corpus conseruat. Ex cibo igitur dum concoquitur, duo recrementa generantur, alterum, quod crassius est, crassioribus intestinis transmittitur, alterum quod tenuius, cum chylo adhuc fertur. In iocinore chylus in sanguinem conuersus, ad cauam uenam transit; Quem ubi serosi illi humores, quod excrementum tenue appellamus, eo traduxerunt, non conuenit, ut diutius in corpore maneant, ideoque renes caue uenę non procul à iocinore adherent, qui illos recipiant paucos sane adhuc aquoso humore sanguini permixto, uel uiculi causa, qui & ipse purgari per cutis meatus debet, uocaturque sudor. Si itaque copiosior successu temporis collectus fuerit, ut iam onus uenis existat, artificio elici Orosius debet, natura uidelicet cessante, uel ob meatuum densitatem, uel ob aliā non aduenit, causam. Scribit itaque remedia quedam Aegineta, quę ex Oribasio omnia mutuatus est.

Similiter inspersa. Codex impressus uterque habet ἐμπλασσομελην, quod est emplastri modo adhibita pro ἐμπλασσομελην, id est, inspersa. Non enim simplicia enumerata, materiā habet, quę illi possit. Orosius et Gemusæus præterierunt, in aliorum erratis custigandis occupati.

IN XLIX. CAPVT.

Laudatissimus. Quemadmodum uino, escis, exercitatione, uigilijs, somno ac uenere, alijs alias uti proratione ætatis expedit, ita de aere

COMMENTARIUS

quoque indicandum quem optimum in pulmones trahere, omnibus iusta salubre est. Transcriptum est hoc caput pene ad uerbum ex Gale. 1. de sanitate tuenda, & Oribasio.

Galenus. Pestilentem auram exhalante. In codice impresso habet $\delta\epsilon\lambda\mu\tau\eta\rho\iota\omicron\nu\ \acute{\alpha}\nu\epsilon\rho\alpha\iota\ \acute{\alpha}\nu\ \acute{\alpha}\pi\epsilon\mu\pi\omicron\nu\tau\epsilon$, hoc est exitialem perflatum sursum mittente. Galenus unde hac mutuatus est, $\acute{\alpha}\pi\omicron\pi\nu\epsilon\omicron\nu\tau\epsilon$ habet, quod est, respirante, exhalante: quanquam parum refert, hoc, uel illo modo legas.

Nota morborum publice grafsanti am. Hoc igitur modo. Hippocrates iudicium hoc maximum in morborum causis cognoscendis tradit: nempe si omnes, cuiuscunque etatis, ac temperaturae fuerint, morbis conficelētur, aerem autorem esse intelligemus: ut postea in secundo uolumine discēs.

IN L. CAPVT.

In lib. de euchymia & caco-chymia. **A**Quarum. Ex eodem Galeni loco haec transcripta sunt. Autor autem hic noster ad sanitatem tuendam etiam aquae bonae usum facere testatur. Si quidem fit interim, ut alibi Galenus memoriae prodit, ut totus exercitus prae aquae usu de uita periclitetur.

ἀτέραμνα. Aegrae concoctionis. In Graeco $\acute{\alpha}\tau\epsilon\rho\epsilon\mu\nu\alpha$ male pro $\acute{\alpha}\tau\epsilon\rho\alpha\mu\nu\alpha$ legitur. Quae dictio proprie de leguminibus dicitur: nempe concocti difficultibus ob duriciem. Galenus in libello, quomodo boni maliq; succi generantur, in hunc modum ait: $\acute{\epsilon}\nu\iota\alpha\ \delta\epsilon\ \tau\omicron\omega\nu\ \delta\eta\mu\eta\tau\epsilon\rho\iota\omega\nu\ \sigma\pi\epsilon\rho\mu\alpha\tau\omega\nu$, οὐδ' ὅλως ὀγκοῦ ὄσαι πέφυκεν ἐφ' ὅμλιν α κεκλήκασι δ' ἀτέραμνα τὰ τοιαῦτα τῶν παλαιῶν ἐλλώων τινές, id est: Nonnulla uero cerealia je minima nequaquam solent intumescere, cum coquuntur, uocarunt autem eiusmodi ex ueteribus Graecis nonnulli $\acute{\alpha}\tau\epsilon\rho\alpha\mu\nu\alpha$, quasi dicas rebellia, perniciaciaq; Aristoteles $\acute{\alpha}\tau\epsilon\rho\alpha\mu\nu\omicron\nu$ ὕδωρ pro cruda aqua dixit in quarto de generatione animalium $\delta\iota\delta\ \kappa\upsilon\ \acute{\alpha}\tau\epsilon\rho\alpha\mu\nu\alpha\ \acute{\upsilon}\delta\alpha\tau\alpha$, καὶ ψυχρὰ, τὰ μὲν ἀτεκνία ποιῶ, τὰ δὲ θυλυγονία. Hoc est: Quare etiam cruda aqua, & frigida partim sterilitatem, partim fœmellarum procreationem efficit. Ceterum $\acute{\alpha}\tau\epsilon\rho\alpha\mu\nu\omicron\nu$ habet contrarium, $\tau\epsilon\rho\alpha\mu\omicron\nu$. Theophrastus in octauo: τὸ δὲ $\tau\epsilon\rho\alpha\mu\omicron\nu$, καὶ $\acute{\alpha}\tau\epsilon\rho\alpha\mu\omicron\nu$ λέγεται ὡς ὁ πρῶτος μόνον. Quod est: Teramum & ateramum de leguminibus tantum dicitur.

Instaurata lectio. Aut terram colatur puram. Paulus non habet, puram, sed Galenus unde haec transcripsit integra sententia sic habet: $\acute{\omega}\varsigma\ \delta\ \acute{\omicron}\ \sigma\omega\nu\ \gamma\epsilon\ \pi\rho\acute{\omicron}\ \tau\epsilon\ \tau\alpha\varsigma\ \acute{\alpha}\nu\ \alpha\tau\omicron\lambda\acute{\alpha}\varsigma\ \acute{\epsilon}\rho\acute{\epsilon}\ \acute{\alpha}\gamma\alpha\sigma\iota\nu\ \acute{\alpha}\iota\ \pi\eta\gamma\alpha\iota, \kappa\upsilon\ \delta\ \acute{\iota}\lambda\lambda\epsilon\ \pi\acute{\omicron}\rho\omicron\nu\ \tau\iota\nu\epsilon\ \eta\ \gamma\eta\varsigma\ \delta\iota\ \kappa\theta\acute{\epsilon}\iota\tau\alpha\ \kappa\alpha\ \delta\alpha\rho\acute{\alpha}\varsigma$. &c. Hoc est: ut quantum ad Orientem solem fons erumpit, & per meatum quendam aut terram puram colatur.

FRigidam lauationem. Hoc est in aqua frigida lauationem, quam
 Graeci ψυχρολουσίαν uocant. Celsus libro primo frigida etiam la-
 uationis meminit. Aestate aptissima sunt & caro, & olus, potioq; dilu-
 tissima frigida lautio. Hec non omni conuenit etati, sed ubi iam corpus
 iustam impleuerit magnitudinem. Nam in adolescente, incrementum
 eius remoratur. Hoc quoq; ex Oribasii libro citato transcriptum est.

Frigida
lautio;

lis qui nullo uictus. Qui enim cibis, crassi succi, maliq; usi sunt, ijs
 statim ex frigida meatus ocluduntur, per quos disenti, euocariq; debe-
 bant. Graece est προσυχὶν quod signat, ut contigerit, nulla ratione ha-
 bita, quemadmodum faciunt, qui nec debito tempore, nec pro naturae mo-
 do, aut exercentur, aut cibum sumunt. Exacte autem uiuunt, qui exerci-
 tationes ante cibum moderatas subeunt, & quamdiu libet, ut ait Gale-
 nus dormiunt, ad concoctionem scilicet obscundam, nec balneis à cibo
 utuntur, postremo qui cibos medijs ordinis tenuium, crassorumq; assumunt,
 quales sunt exquisitissimi, maximeq; inculpati, tanquam in symmetria
 excessuum constituti. Huius generis sunt panes optime elaborati, car-
 nes gallinarum, gallorum, animum, phasianorum, perdicum, columbarum,
 attegenarum, turturum, turdorum, merularum, omniumq; passerulorum,
 praeterea piscium sassaquilium. Quanquam qui plurimis exercitationibus
 utuntur, ut agricolae, nautae, alijq; id genus tam exacto uictu opus non
 habent, quippe caloris beneficio qui laboribus excitatur, etiam crassi
 succi cibos tuto assument.

Exacte ui-
uētes qui

Porro mulis. Qui nimirum sole feruente iter fecerunt, aut laboris
 quid subierunt, totum corpus stipulae modo aridum habentes, ij ubi in
 aquam frigidam se proiecerint, iuuantur: potissimum qui ualentibus sunt
 uiribus, & frigido sole affueti.

IN LII. CAPVT.

Naturalium balnearum. Vocantur balnea naturalia, quae sua
 sponte talia proneniunt: alia calida per se, alia calefiunt. Ga-
 lenus libro primo de simplici medicina illorum mentionem facit. Pli-
 nius libro. 31. cap. 6. ubi in hunc modum habet: Est autem utilis sul-
 phurata neruis, aluminata paralyticis, aut simili morbo solutis. Bi-
 tuminata, aut nitrosa utilis est bibendo atque purgationibus. Plerique
 in gloria ducunt plurimis horis perpeti calorem earum, quod est inimi-
 cissimum: namque paulo diutius quam balneis uti oportet. Haec lenus
 Plin. In Germania certe plurimis horis quotidie utuntur, nec à cibo po-
 tuq; interim abstinent, corpore etiā nullam ante euacuationē p medica-

Balinea
naturalia.

Differētia

Vsua

C O M M E N T A R I V S

menta experto, quod contra omnem rationem est, præterea uno balneo & paralytici, & sanguinem spuantes & lienosi, alijsq; affectibus obnoxij utuntur.

Aquarum naturalium. Sola aqua potabilis teste Galeno humida est. Caterarum nulla humectare potest, quod uidelicet non sint exacte aqua. sed mixta & adulterata, accepto nimirum aut alumine, aut chalcitro, aut sale, aut id genus aliquo.

I N L I I I. C A P V T.

NON alienum est Celsum ex Hippocrate eleganter transtulit eandem fere sententiam: Eo tempore anni inquit, calidis omnibus potius utendum est, uel calorem mouentibus.

Pluribus uti laboribus. Querere aliquis possit, cur pluribus utendum laboribus per hyemem, cum calor ipse genuinus sit amplior tunc quam alio tempore, testimonio etiam Hippocratis, qui ait uentres hyeme & uere calidissimi sunt. Ex calore autem concoctio optima, inde probus sanguis, ex hoc autem omnes corporis partes aluntur. Quare paucioribus laboribus hoc tempore quam alio utendum est. Siquidem calor naturalis per se copiosus, & efficax, non opus habet ut plus nunc excitetur quam in ipsa æstate, aut alia anni parte. Huic quaestioni sic respondere non dubitem. Calidissimi quidem uentres hyeme existunt, naturali calore, hoc est, temperatissimi. Particulae autem corporis magis refrigerantur hyeme, ac nonnullis ad uentris usque regiones penetrat. Quapropter etiam si probe concocti sint in uentriculo cibi, non tamen exactam in iecinore mutationem recipiunt sed aliquatenus ea frustrantur. Præterea totius corporis uene ab aere circumfluo refrigeratae haud similiter ipsos transmutant. Accedit ciborum copia, quam tunc una cum pituitosioribus qualitatibus assumunt: unde etiam humor crudus colligitur, qui laboribus & exterioribus particulis recalcascentibus concoqui, digeriq; debet.

Plus esse Hippocrates, aut Polybus eius discipulus ait: τὸ μὲν χειμῶν & ἐδιέν ὡς πλεῖστα, πίνειν δὲ ὡς ἐλάττω. αἰῶνι δὲ καὶ τὸ πρῶτον ὡς ἀκρετέστατον. quod Celsus in hunc modum interpretatur. hyeme plus esse: minus, sed meracius bibere conuenit.

Vere autem ineunte. Vide libellum Galeni: cui titulus est, quos & quando purgare oportet.

A laboribus conuiuiscendum. Intellige ijs quibus per hyemem usus fueris. Semper enim exercitatio corporis necessaria, uerum minor nunc, & facilius, ne calor naturalis, qui a sole tunc uocatur, etiam per

Sic est Polybus de ratione priuatorum. Quid cur hyeme laborandum magis.

Solutio.

Polybus. Celsus.

hanc magis dissipetur.

At in autumnno. Celsus eadem fere habet: per autumnum, inquit, propter cibi uarietatem, periculum maximum est. Itaque neque sine ueste, neque sine calciamentis prodire oportet, precipueque diebus frigidioribus, neque sub diuo nocte dormire, aut certe bene operiri.

Poma. Græce est ὀπωρέας. Nam pomum generale uocabulum est, & quicquid apud Græcos opora continet, complectitur. Discrimen ponit De ὀπωρέας. moeritus inter oporas & acrodrya. Quicquid herbaceo fructu uiret lignosi nihil exterius habens, ut duracina pyra, mala damascena, pruna, ἀκρό- opora, apud Græcos dicitur. Acrodrya uero contra nominantur, que putamen exterius lignosumque fructum continent, ut malum punicum, castanea, pistacea, nuces, ut eumque genus Salgami nomine complectuntur latini, a quo Salgamarius originem duxit. Celsus eodem loco iam citato: Celsus. poma inquit, nocere quidam putant: quæ immodice toto die plerumque sic Pomaz assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur, ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Galen. optime utriusque uocis significatum ex primit Commentario τῶν δὲ χυμῶν καὶ κακοχυμῶν, in hunc modum: τῶν δ' ἄλλων οἱ μὲν ὠρεῖται καὶ μὲν οἱ καὶ εἰς κακοχυμῶν, καὶ οἱ κακοχυμῶν πᾶσι τῆς. ἔστι δὲ διαφθορῶν ἐν τῇ γαστρὶ φερόμεναις δὲ πληθύνει πλεονάζοντες, ὥστε καὶ τὰ μῶρεα ἢ δ' ὀνομάζονται ἰδίως οἱ ἐλκυστοὶ ὀπωρέων ἐν σπύροις καὶ σφυλαῖς ὅσων, ἀμείνων μὲν ἐστὶ τῶν εἰρημνίων. & τὰ δ' ἄλλα τῶν ἀκρόδρυων εἰς κακοχυμῶν ἐστὶ &c. Hoc est, aliarum uero arborum fructus fugaces, omnes, maligni sunt. Sin autem in uentre computauerint, medicamenti uenenosi naturam induunt, sicut & mora &c. Quam autem Græci proprie nominant oporam, ficibus & uuis comprehensam, prædictis est potior. Plinius compositionem quandam Oporimen appellat ex fructibus generatam, ut confundat differentiam quæ inter oporam & acrodrya existit. Tu igitur si uoles operam fructus omnes appellabis ὠρεῖται καὶ εἰς κακοχυμῶν, horarios fructus.

Post æquinoctium. Intellige autumnale, quod ad octauum calendæ Octobres, uel ad sextum incipit, ut Florentinus Agriculture scriptor memoriæ prodidit. Consuit itaque Paulus, ut si forte humores uel melancholici, ael adusti in corpore redundant, ante hyemem in autumnno purgentur. Siquidem bis corpus in anno recte euacuatur, si plethoricum, sanguinis dimissionem: si malis scatet succis, purgatione. Vere, humorum qui ex hyeme sunt contracti: autumnno, qui ex æstate reliqui uisionem sunt experti. Quare in duobus æquinoctijs fere, sani corporis euacuationem molimur, ad futurorum accidentium præcautionem.

Quando
purgandū

COMMENTARIUS
IN LIIII. CAPVT.

Facilis pæditus. Hoc caput ex libro primo Oribasij sumptum est. Vult autem Paulus in omni uitæ genere, ut semper consuetis utamur. Quod enim contra consuetudinem est, nocet. Neque enim ex nimio labore subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus labor sine graui noxia est. Qui igitur in laboribus uitam agunt, si facile siccunt, mutatio nem non consulit. Qui in otio degunt, sani neque hi ad labores sunt con gendi. Siquidem natura consuetis gaudet. Verum ut m. diocris exercita tio summum corpori presidium conciliat, ita ocium, extremum adfirit malum, ut alibi Galenus ait, præsertim si corpus densum, quod nō ex fa cili diffletur, contigerit: sin autem natura est rarum, perspiratum non im pedito, apti sique nutritur humoribus, etiam si non exercitetur, uix mor bis est opportunum. Siquidem per meatus, quicquid fuliginosum uisco sumq; fuerit, diffletur, expelliturq; ac qui taleni corporis cōstitutionem, fabricationemq; habent, à græcis uocantur ὁ δὲ πῦρ. Exercitium hoc loco intelliges, ex præscripto institutum, quod multi ante cibum, uti expedit, subire nequeunt ciuilibus negotijs, aut alijs etiam distric. is igitur si meatuum cutis raritas & amplitudo fauet, etiam sine exerci tio sanitate aliquandiu frui licet.

Ois muta
tio subita
noxia est.

Consuetis
al qd tri-
buedum.
Densi.
Rari.

ὁ δὲ πῦρ
ἡ δὲ σῶμα

Imo nec eos. Hippocrates hanc sententiam in aphorismorum secun do confirmat: τὰ δὲ ἐκ πολλοῦ χρόνου συνήθεια, καὶ ἡ χεῖρα τῶν ἁσυνήθων, ἡ σπονὲν ἔχειν ἔσθαι. Hoc est: Quæ longo tpe cōsuetæ sunt. etiam si insuetis sint deteriora, minus molestare solent. Nec ea de exerci tijs tantum, sed omnibus quæ ad corpus attin. nt, accipienda ueniunt.

Necessi-
tas purga
tionū con
tra eos q
nunq me-
dicina utē
dū docēt.

In omnibus autem his. Galenus id libello περὶ δὲ χυμῶν, καὶ κα- κοχυμῶν probat in hunc modum: Multi eiusmodi uitæ institutum se- quuntur, ut ipsis non liceat, uel ante cibū probè exercitari, uel satis op- portune cibū sumere, uel alimenta feliciter concoquere: qui sane à mor- bis immunes permanere non possunt, nisi ex intervallo alui subdu- ctione sibi prospiciant: interim purgatione, cum tempestiua sanguinis detra- ctione &c. Quanquam Paulus etiam intelligit ut quotidie alius bis, aut certe semel respondeat inculcate pro assumptorum ratione. Id nisi fiat, certe sollicitandam esse docuimus.

IN LVI. CAPVT.

Vomitionibus. Quandoquidem plerisq; necessitas incidit, nauigio per mare proficiscendi, Paulus etiam hic remedia malis obuenien- tibus enumerare uoluit, Oribasium secutus libro quinto: facit igitur ui- ni mentionem, quod maxime stomacho uomitionibus turbato cōuenit

Vocat autem graece οἰνάριον quasi dicas uillum, sicut etiam ὀξείδιον τὸ οἰνάριον.
 ὁ ξείδιον.
 ἄπρ' μέλιτ' & pro oxymelite.

Polentæ polline. Hoc est tenuiore parte farinae ordaceae tostae. Vo-
 co autem pollinem cuiuscunque partem subtiliorem, non tantum farinae
 triticeae, ut putat Orosius. Nam Celsus, Scriboniusq; theris pollinis me-
 minit. Plinius preparationem eius lib. 18. cap. 7. docet: Polentam quoq;
 graeci non aliunde praesunt. Pluribus fit haec modis. Graeci persusum a-
 qua ordeum siccant nocte una, ac postero die figunt: deinde molis fran-
 git. Graeci pollentam ἄλφιτον nominant: tenuiorem eius partem, ἄλφι-
 του παπᾶλιν.

pollen po-
 lentæ.
 Errat O-
 roscius.

ἄλφιτον.
 ἄλφιτον
 παπᾶ-
 λιν.

IN LVII. CAPVT.

QUum immodice corpus. Ex Oribasij quinto, methodi uero Ga-
 leni decimoquarto haec fere transcripsit. Ceterum medici offi-
 cium est, ut intemperies corrigere, continui diuortium, committere, ita
 quoque amputare, & praescindere, quod magnitudine, uel numero redun-
 dat, rescire autem, & fingere quod desit. Verbi causa, cum corpus ex
 corpulentia eò deuenit, ut nec ingredi sine molestia, nec sedem propter
 uentris molem contingere, nec respirare libere possit, hanc liquare &
 tollere, aequè nimirum, ut quando corpus ali desinit, huic quoque rescien-
 do prospicere. Paul. graece dixit ὁ τὸν εἰς πολυσάρκιαν ἀμετρον ἐκ-
 τράπη τὸ σῶμα. Hoc est: Cum corpus in corpulentiam immodicam de-
 uenerit. Celsus plenum corpus dicit & obesum.

πολυσάρ-
 κία.

Calidior & siccior. Graecus codex non habet καὶ ξηροτέρῃ, id est Lectio ca-
 & siccior. Ex Galeno autē addendum uenit, quod Gemusaeus praeterijt. Rigata.

Citas exercitationes. Graece dixit Paulus ὁ ξεία γυμνάσια, quod
 ad uerbum sonat, acuta exercitia. Galenus in commentario libelli de
 ratione uictus priuatorū interpretatur fere quod decimoquarto docuit:
 ἡ ταχέα κίνησις τὴν θερμασίαν ἐπιπλεῖον ἀνέχεσθαι τῆς τοῦ
 σώματος. Quod est: Velox motus calorem amplius augens, corpus liquat.
 Idem igitur est ὁ ξεία & ταχέα. Celsus cursum, multam obambula-
 tionem, omnemq; uehementem exercitationem panit. ταχέα.

Iuuat itidem crassos insolatus. Crassos hic intelligo, quos graeci κατὰ
 κατὰ σάρκους, πολυσάρκους, παχέας nominant. His opponuntur σάρκος.
 λεπτοὶ ἰσχυροὶ, κατ' ἰσχυρὰ, & κατὰ λεπτοσάρκεις. Celsus πολυσάρ-
 Contrarios inter se uocat, plenum, & tenuem, gracilem & obesum. In
 solatus at, graece dicitur ὑλίωσις, qđ Celsus interpretatus est sol inurēs: παχέας.
 & οἷς calor, quāquā Orosio id nō placeat, hōi in bonis auctoribus πα-
 λιώσις.

COMMENTARIUS

rum uersato.

Fallitur
Orosius.

Præbire autem non debent. Hoc intelligendum est nimirum, ne cibus statim in corpore distribuatur. Contrariam plane sententiam habes apud Polybum: quam Celsus deinde interpretatus est: sed nonnihil euariat. Græce primum sic habetur: καὶ τοῖς σιτίοισιν ἀδικοῦν, προπεπρωμένους δὲ τοὺς κεκαλεμένους, καὶ μὴ πάλιν σφόδρα ψυχρὸν, hoc est. Et cibos aggredi, uino prius temperato, & non admodum frigido assumpto. Celsus inquit, semel die assumpta epula, & uini non perfrigidi potio i iuno in cōsuetudinē adducta. Galenus autem sententiam corrigēs dicit legendum μὴ δ' ὅλος δεξιὸν quod est, neq; omnino calidi.

Μονοσι-
τεῖν.
ὀλιγοσι-
τεῖν.
Galenus
non semel
sed modi-
ce.

Semel tantum die. Græci hoc uocant μονοσιτεῖν. Galenus autē in commentario nuper citato locum hunc quasi corrigit, καλλίον inquit, αὐτὸν εἰρηδοῦν πρὸς αὐτὸν μὴ μονοσιτεῖν, ἀλλὰ ὀλιγοσιτεῖν, hoc est: Præstaret dictum ab eo fuisse, non semel epulas assumere, sed modicas. Quidam enim ex ijs qui semel tantum cibum sumunt, multo plus ingerunt, quàm qui bis capiunt.

IN LVIII. CAPUT.

Vina cras-
sa.
Linacri lo-
cus.

Crafsij suc-
ci cibus.

Q Vum extenuatos. Hoc caput ex decimoquarto Methodi Galeni sumptum est. Commemorat autem uictus rationem extenuatis accommodam. primum quidem uinum crassum, cuiusmodi sunt nigra & fulua Italica uel Asiana, aut etiam Hispana. Linacra autem methodi interpretes uertit οἶνον παχὺν, uinum pingue, quæ ratione, uel quem secutus autorem nescio. Dicuntur autem uina crassa, quæ succum crassum habent, multumq; alunt. Cibus autē crafsi succi, qualis est, alica, percina caro, panes furnacei, & textuacci, tragus, oua, lac, caseus, magnaq; piscium pars. Qui cibi crafsi, omnes adnutriendum sunt ualentissimi: et si probe in uentriculo ac iocinore concocti fuerint, sanguinem benignum generare solent.

Contrarij
loci.

Exercitatio modica. Omnia exemplaria Pauli impressa habent γυμνάσια δὲ βραδέα. Hoc est, exercitia autem lenta: & optime quadrat lectio superiori sententiæ, quæ de crafsis extenuandis habetur, nempe huic, Citas exercitationes Galenus autem in Methodo, omnibus codicibus attestantibus, legit βραχέα, hoc est, modica. Celsus in simili sententia de replendis tenuibus dicit conuenire, modicam exercitationem. Rursus Galenus in cōmentario superius citato dicit extenuatis eadem

Apud Po-
lybum.

fere ex usu esse: ὅτι δὲ, inquit, καὶ γυμνάσια, βραχέα τε γυμνάσει-
ται βραδέα, καὶ μετὰ τροφῇ. Quod est: Ita uero etiam exercitia, et pauca, & lenta, & post cibum habebit. Sume igitur utramuis lectionē.

Ego se.

cutus sum Galenum in methodo, unde hæc sunt descripta.

Deinde frictione dura. Hæc sententia & mutila, & deprauata Lcō emē-
existit in Paulo. Quid enim per hæc uerba intelligas: καὶ πειτὰ σκληρὰ data.
μὴ πολὺ πιλουῶτες τὸ δέρμα &c. Corrigenda instaurandaq; est ex
Galenī libro sexto de sanitate tuenda, in hunc modum: καὶ πειτὰ τρεῖς Oroscius.
σκληρὰ μὴ πολλῇ πιλουῶτας τὸ δέρμα. Hoc est: Et postea fri- castigator
ctione dura non multa cogentes cutem, quo densa, duraq; euadat. Hæc Basilienis.
Oroscius & castigator Basiliensis non aduerterunt.

Iis qui pallido. Iram, motusq; animi præcipit decoloratis, ut uideli-
cet inde sanguis in exteriores partes trahatur: sicut alij quibusdam me-
dicamentis eò alliciunt.

IN LIX. CAPVT.

EXtenuantur plerunq; Vide Galenum in decimo quarto Methodi
medendi, ubi etiam horum curationem plenius persequitur. Picatio πίττωσις.
nis mentionem facit, quæ πίττωσις dicitur græcis, hoc est, pix membris
oblita, hyeme bis, æstate semel, idq; frigidis & humidis, aut utroq; tem-
peramento simul donatis. Nam siccis & calulis eiusmodi medicamenta
adhiberi non debent.

IN LXI. CAPVT.

DEntient, incrementq;. Hoc & superius caput ex commentario
Galenī sumptum est, qui ars medicinalis inscribitur. Deest autē instaurata le cūo,
in, codicibus Pauli impressis dictio καὶ, in capitis principio. Lege igitur le cūo,
τρεῖς ὁδόντας φύσει δὲ πον, καὶ αὐξηθήσεται. Hoc est: Dentes ci-
tius producent, & augebuntur.

Is ob consuetudinem. Puta liberaliorem cibum sumptum conti- Consuetu-
nue, ocium, totamq; deniq; uictus rationem: quod apud Galenum κατὰ do acqui-
συμβεβηκός, hoc est, secundum accidens, contrarium huic uocat κατὰ lita natu-
φύσιν, ex natura. Veluti alij nati grandioribus uenis, corpore ad gracili- ra.
tatem idoneo ex ocio diuturno, cibusq; tum ualidis tum copiosis crasse-
scent, alij exilibus uenis præditi ex labore assiduo, curis, uigilijsq; & ci-
bis extenuantibus usi in obesitatem prolabuntur.

Nigri ipsi pili existunt. In codicibus Pauli impressis hæc tota sen- Instaurata
tentia desideratur: φανερὸν: ut adsit, necessaria ad disputationem de tem- lectio.
peraturis uidetur. Nam altera diuisionis pars existit. Repone igitur ex Hoc est ad
Galenō in arte medicinali in hunc modum post οὐκ ὀλίγω θερμοτέρ- uerit
ρον. μέλαινα δ' αὐτοῖς αἱ τρίχες, καὶ ἡ σὰρξ ἀπίμελθ. εἰ δ' ὀλίγω Oroscius.
μὲν εἴη θερμότερα, καμπτὸν δὲ ὑγρότερα, μαλακὴ τούτοις ἐστὶν, Oroscius.
καὶ σὰρξ καὶ πολλή, καὶ τὸ χρώμα συμμιγὲς ἐξ ἐρυθροῦ καὶ λευκοῦ.

COMMENTARIUS

ἢ φαίοντων ὀλίγω θερμότερα.

Restitutus
locus.

Color autem & capilli. Hic quoque mutilus est codex græcus, habetur enim: τὰ δὲ τῶν τριχῶν τ' χροιάς, pro τὰ δὲ τῶν τριχῶν, καὶ τῆς χροιάς. Nec aduertit hoc Gemusæus. Color itaq; totius corporis, hoc est albus, maxime erit si illud uehementer fuerit frigidum, capilli quoque rarissimi enascentur, si illud tale fuerit: sin minus, minus illa quoque erunt intensa. Hoc itaque est pro proportione.

IN LXII. CAPVT.

καμα-
κός.

EXiguu[m] sane caput. Hæc quoque ex arte medica Galeni transcripta sunt. Præuam, inquit, cerebri structuram indicat. Nam quod in tentorijs præstant pali quos græci καμακός appellant, & in edibus parietes, id nimirum in animalibus ossium substantia. Quippe ad huius imitationem cætera omnia in animante solent effingi, mutariq; ut si caluaria sit rotunda, necessario cerebrum tale fuerit: quemadmodum etiam si oblonga sit, talem quoq; figuram cerebrum induet. Si itaque paruum est caput, ea quæ ossibus adherent, exigua, aut mutila esse conijcimus.

Figura p-
fecta.

Figura. Nempe quæ ab oblongæ spheræ potissimum similitudinem structa est. Alia uero capitis figura uertice acuminato, qualem Thersites habebat apud Homerum, deprauata est. Naturalis itaque, priorem ac posteriorem partem prominentiorem habet. Deprauata, altera eminentiarum caret. Interim utraque: quare etiã suturas præter naturam habet.

Si optime sit disposita. Galenus dicit: Si ualidam habet ceruicem, alijsq; ossibus optime sit constituta.

Plerumq; igitur. Retuli ad eminentias. Nam figuram non potest. Vult itaque Paulus nonnunquam etiam fieri, ut capita etiam bona existant, quamuis eminentiæ à nature modo recesserint.

IN LXIII. CAPVT.

MINimeque ab omnibus exteris. Ex eodem Galeni commentario sumptum est: dicit autem exteris, quod idem sibi uult ac si dicas, extrinsecus accidentibus quæ calefaciunt, refrigerant, siccant, & humectant. De pilis etiam in libris de facultatibus naturalibus cōprehensa à Galeno reperiatur.

Summaum circa. In fine capitis hæc clausula habetur. Sonat autē græce τὰ χύ γηγοι τὰ πῶδ' τὴν κεφαλὴν ἅπαντα εἰσιν. Hoc est ad uerbum: Cito senescunt in ijs omnibus quæ circa caput sunt. Quasi dicas: Omnes capitis partes potissimum, mature senium testantur.

Fluctuationes. Sic interpretatus sum græcam dictionem κλύδω. κλύδω
 νας. Ventriculi est parum ea quæ ingesta sunt, comprehenduntis, cuius
 coquentisque, fluctuationes experiri. Male impressum est in Galeno
 græco nuper edito Basilæ, κώδωνας pro κλύδωνας.

Calidis cibis. In impresso codice erat, πολλοῖς pro θερμοῖς. Nec
 aduertit Gemusæus, tot manuscripta exemplaria iactans. Galenum ui
 de in arte medicinali. Castigatus
 locus.

IN LXV. CAPVT.

Non modo uētriculus. Ex eodem Galeni libro, eodemq; fere loco
 transcripta sunt. Post hæc aut uerba: Cor, pulmo, & iecur, senten
 tia Pauli manca uidetur. quidquid Gemusæus dixerit de epitome. Quid
 enim est, quin etiā bibentes, non cessant, uel ut græce dicā, κῆ μὲν δὴ κῆ
 πίνοντες οὐ πίνονται, nisi alia præcesserint? Integra igitur sententia
 apud Galenū sic habet: οὐ μόνον ἡ κοιλία διψώεις τε κῆ ἀδίψους
 ἐργάζεται, κῆ ψυχροῦ κῆ θερμοῦ πόματ' ὀρεκτικούς. ἀλλὰ καὶ τὰ
 κατὰ θώρακα σπλάγχνα καρδία, καὶ πνέμονα: ἀλλ' οἷγε ὅτε τῶν
 τούτων θερμότητά διψάντες, ἐπιπνεύουσι τε πλέον, ἐκφυσώσι τε
 μακρόν, ἀποδύνονται τε κατὰ τὸν θώρακα τοῦ καύματ', οὐχ
 ὥστε οἱ ὅτε τῶν κατ' ἐξῆς κατὰ τὸν πνέμονα, κῆ μὲν δὴ πίνοντες
 οὐκ ὀύδ' ἐπὶ ἡ συχάζουσιν. Hoc est ut interpretatus sum, restitue igitur
 tur, si uidetur codicē: Prius tantū erat: Non solū, uētriculus sitim uel ad
 Lectio in
 staurata.
 fert, uel arcet, ac frigida calidæq; potionis appetentiā facit sed et quæ i
 thorace continentur uiscera, cor pulmo, & iecur. Quin etiā si biberint,
 nō statim sitire desinūt &c. Quā integra hæc sit oratio, doctis iudican
 Præterit
 tū relinquo, meo certe iudicio apponēda uidentur, quæ ego textui inserui
 Oroscius.
 ex Galeno Miror Oroscii hunc locū præterisse: Gemusæum aut non ca
 Gemusæus
 stigasse ex ueteribus exemplaribus quibus se abudare sæpius triumphat.

Recrementa ipsis interueniunt. Hoc est, crassæ humiditates &
 pituitosæ arteriam asperam, per quam uox editur, intercipiunt. Græ
 cum uerbum est ἐντέχεια αὐτοῖς. Alias signat, insident, inhaerescunt si
 Græcorum grammaticis fidei accommodamus. ἐντέχεια

IN LXVI. CAPVT.

Ac præcordiorum regio. Hoc est qua præcordia incipiunt. Gre
 cus codex habet: κῆ τῶν κατὰ τὸν πνέμονα ὅσα τοῖς πλη
 σίον, quasi dicas ad uerbum: Et præcordiorum quæ his propinqua
 sunt. Hoc est, & partes præcordiorum his pectoribus uicine hirsute
 sunt. Mox sequitur: Magna uero ex parte quod textus græcus in Oroscius.
 Omitit
 c ii

COMMENTARIUS

impresso tatum his uerbis continet: ὡς ἐπιτοπολὺ καὶ τὸ, pro ὡς ἐπ-
τοπολὺ δὲ καὶ, atq; sic corrigito. Paulo post: Quinetiam, in græco im-
Lectiōes presso est καὶ μὴ γένοιτο ἢ &c. tu corrige ex Galeno καὶ μὴ τοι καὶ ἢ,
castigate. requirente id sensu Rursus pusillanimes, negligentes, peccore glabro, co-
dex græcus plane deprauatus est. Habet enim ἄτολμοι, καὶ μάστιγα εἰ-
ψιλὸν αὐτοῖς τὸ γέρον, pro ἄτολμοι καὶ ἀμέλιτοι, καὶ ψιλόν. Hæc
Gemusæus castigatōr non aduertit, sic nec superiora Orosius.

IN LXVII. CAPVT.

Locus ca-
stigatus. Hoc caput etiam ex eodem Galeni commentario, ut superiora quæ
de temperaturis agunt, quasi transcriptum est. Caterum in clausu-
la uenæ duriores græcus codex deprauatus est. Habet. n. αἱ φλέβες ξηραὶ
qđ est uenæ sicca, pro αἱ φλέβες σκληρότεραι. Hoc est uenæ duriores.

IN LXVIII. CAPVT.

Lectiō ca-
stigata. Porro si humiditas calori fuerit coniuncta, hispidos quidem
minus, tales. Vtrunq; exemplar impressum mutilum est, desidera-
tur enim ἡ πον. Nam legendū est, σιωελδούσης δὲ ὑγρότης & τῇ διε-
μότητι, ἀάσιον μὲν ἡ πον οἱ ποιοῦτοι. Hoc Gemusæus præterijt.

IN LXX. CAPVT.

Quum itaq; calida. Totum hoc caput ex sexto Galeni de sanita-
te tuenda iuxta principium, & Oribasii quinto sumptum est:
conuenit autem recte ut postquam temperaturarum notas descripserit,
intemperierum remedia subiungat.

Motus ce-
leres. Sollicitudo & vigilæ. Post has dictiones, καὶ κινήσεων ἀπασῶν
ὀξύνων. Hoc est, & omnes celeres motus. Sic enim uerto ὀξύνων, quod est a-
cutum. Recte autem dixit celeres motus: ut qui corpus calefaciant im-
pensius.

Humidæ & calidæ natura. In græcis codicibus impressis, tantum
instaurata humidæ, habetur. Legendum autem ex Galeni sensu id requirente: αἱ
lectiō. δὲ ὑγρὰ καὶ θερμὰ τῇ φύσει. &c. Quod est: Humidæ uero & calidæ
natura. Nam ubiq; apud Galenum habes, humidæ & calidæ naturā, pu-
Calida & humidæ. tredini sunt obnoxia, quod lib. 1. de febrium differentiis hisce uerbis cō-
firmat: εἰ τοι μὲν τὰτα γὰρ σίπεται πᾶσι δ' ὅσα θερμὰ, καὶ ὑγρὰ. Hoc est
Nam omnia quæ calida & humida sunt, facillime computrescunt.

Rheumaticis, plethoricisq;. Vfus sum græcis dictionibus, opera
dedita, quod medicis admodum sunt familiares. Poteram autem dixisse,
fluxionum & redundantie morbis, quemadmodum Linacrus. Sed ne-
scio quid energie habent uoces græcanicæ.

Porro de fluxionibus, Recte quadrat. Nam superius dixit, rheu-
ματισμοῖς.

maticis patent morbis. Vocantur autem grecis ἀπορροιαί corporis de fluxus, nunc in hanc nunc in illam partem: quales experiri saepe solent humidi temperamento & calidi.

Lauacris. multa exerc. Trifariam haec lectio apud autores uariatur: apud Paulum habetur, ἀπορροιαὶ δὲ προνοεῖν χρὴ διὰ τε λουτρῶν καὶ γυμνασίων πολλῶν καὶ πρὸ τροφῆς. Hoc est: Defluxionibus prospiciendum est, lauacris, exercitijs multis, & ante cibum &c. Oribasius legit καὶ τῶν ἀπορροιαῶν δὲ προνοεῖν χρὴ διὰ τε λουτρῶν καὶ γυμνασίων πολλῶν &c. consentit fere cum Paulo. Galenus autem in hunc modum ait: ὥς τε καὶ τὸν ἐπισταυῶτα τῷ ποιούτῳ σώματι τῶν ἀπορροιαῶν προνοεῖν χρὴ διὰ τε γυμνασίων ὥς ἐφ' ἑκὼν καὶ λουτρῶν καὶ τροφῶν πλείονων, ἐκ κρίσεων τε τῶν δι' οὐρῶν, καὶ γαστρὸς γινωσκίων &c. Hoc est, Quare qui huiusmodi corpori tuendo praeficitur, prospicere ijs debet quae ab ipso defluunt, tum exercitijs ut dixi, tum balneis & cibis pluribus, tum uero ijs quae per uentrem & urinas redduntur, excernendis &c. In hac oratione mendum plane est: quid enim sibi uult, cibis pluribus? cum corpus defluxionibus opportunum sobriam potius uiuendi rationem requirat, quam multorum ciborum ingestione, nem qui ipsi saepius fluxiones solent excitare. Legendum itaque existimo in codice graeco λουτρῶν πρὸ τροφῶν πλείονων, quod est: Lauacris ante cibum pluribus. Nam ut exercitatio cibum praecedens, ita balneum quoque, superflua corporis discutit, subsequens autem cibos crudelitatem, eoque praedita symptomata procreat. Sed cui auctori assentiemur, alius habet pluribus balneis, alius pluribus exercitijs. Superius semel dixerat, multa exercitatione. eoque hic etiam referendam puto dictionem pluribus, ad exercitijs. Haec non aduertit Censurus nec Orosius.

Lectio notatu digna instaurata.

Omisit Orosius

IN LXXI. CAPVT.

Inter frigidas. Hoc totum caput ex sexto libro Galeni de sanitate tuenda sumptum est: ex Oribasij autem quinto. Enumerat autem tres frigidae intemperiei differentias, frigidam & siccam, frigidam & humidam, frigidam & mediocrem in siccitate & humiditate. Harum singularum remedia ordine enumerat. Inter qua Paulus recenset ἀλουσία τε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ λεπτότερα, quod est balnei abstinentia, exercitia plura, & tenuiora. Vbi legendum existimo ex Galeno, sensu id exigente. ἀλουσία τε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ διὰ τοῦ λεπτότερου, hoc est: Balnei abstinentia, exercitia plura & uiculus ratio tenuior. Hoc praeterierunt Orosius & Gemusaeus.

Locus re-
stitutus.

COMMENTARIUS
IN LXXII. CAPVT.

Intemperies sicca. Hoc autem caput ex septimo methodi ad uerbum transcriptum est; ubi docet, quæ potissimum intemperies, seu alterationes facilius reparari queant. Enumerat autem siccitatis differentias tres: quas etiam alibi comprehendit. Verum Pauli codex græcus statim in principio capitis deprauatus est. Habet enim ἡ δὲ τῆς ὑγροπαγῆς ὁσίας πρὸς ταύτους. Quod nihil fere significat. Corrigito igitur in hunc modum: ἡ δὲ τῶν ἐκ τῆς ὑγροπαγῆς ὁσίας σωεσάτων, ἐκτακέντων, καὶ τρίτη πρὸς ταύτους. In textu latino sum interpretatus græca, quæ desiderabatur. Castigator Basiliensis hoc quoque præterit.

Castiga-
tor Basi-
liensis.

Ex humore concreto. Galenus addit, sicut caro & adeps, Paulus compendij causa omisit. Cæterum caro & adeps nihil aliud sunt, quam humor concretus: caro quidem, sanguis ui assimilatrice in carnem reductus; adeps autem humor extra uasa elapsus, ex frigidityte congelatus, concreuitque.

Chondrum ptisanæ modo. Chondrus omnino fit ex xea, ut in sequentibus docebitur.

Ptisana, πτίσσειν duxit originem, quod ordeum unde preparatur, tundendo deglubatur, ac suo cortice castratum, usui seruetur. Hordeum mundatum officinæ uocant: tunditur enim hoc, nec molitur.

Quo picatores utuntur. Unguentum hoc alias dropax uocatur, quod picem recipit. Vide Paulum in septimo ad calcem. Solet partibus emacratæ adhiberi. Administratio græcis πίττωσις, quasi picatio: qui adhibent πίττωται dicuntur.

πίττω-
σις.
πίττω-
ται.

Iam uero multæ. Græcus codex non habet δαφιλῆ, hoc est, multa: uerum sensus exigit, ut contraria opponantur sibi δαφιλῆς καὶ μέτριον. Sic etiam Galenus habet: μὴ γὰρ ὁ δαφίλει ξηρότητα καὶ ἀπερὺ πόκετ, μὴ πανὺ πολλὴ θερμότης. Hoc est: Ab hinc uero iuncta sit multæ siccitati ut dictum est, non admodum multa caliditas. In sequenti sententia, restitue græcum codicem, ac lege: ἐπὶ μὲν τῆς τοιαύτης ὑπαλλάξεως τῶν πρὸ τῶν ἀγῶνιν φυλάξεσθαι. Que Orosius, & castigatores Basilienses omiserunt.

Codex
Græcus re-
stitutus.
Omiserunt
aristarchi

Tepidos lactis modo. In Græco codice est, χλιαρὰ δὲ τὰ ἐδέσματα καὶ γαλακτώδη. Hoc est, Tepidos autem cibos & lacteos offeremus. Galenus lib. 7. Methodi dictionem γαλακτώδη interpretatur, χλιαρὰ δὲ, inquit, τὰ ἐδέσματα προσοίσομεν ἢ καλεῖν ἐδῶ ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς γαλακτώδη, quod est: Tepidos autem cibos offeremus quos medicis uocare lacteos consuetudo est. Idem libro undecimo Actij

Quæ sint
galacto-
de.

τὰ ἄλβυλὰ καὶ τῇ κρᾷ σιγαλακτῶδι. Hoc est albule, et tempera-
mento lactea balinea, quod est, tepida lucis iam emulsi modo. Cel-
sus tales cibos, lib. 4. cap. 11. in hunc modum inquit: Aqua neq; ea ipsa
frigida, sed potius egelida danda est. Ibidem: Si vero tormina sunt, oportet
et frigidis et humidis fomentis stomachum fouere: uel si uenter dolet,
ipsam egelidis, sicut uenter ipse mediocriter calentibus inuenitur.

Quod si ad vomitum sint idonei. In Græco codice mutilatus lo-
cus est, in hunc modum: εἰ δ' αὖτις δ' αἴως ἔχοι. διὰ τὸ φανίδω ἐμέτω,
adde post ἔχοι dictiones duas πρὸς ἐμετόν, quod Gemusæus castiga-
tor non aduertit, uolens in compendio eiusmodi intelligi.

IN LXIII. CAPVT.

QUæ igitur attenuandi. Olim ueteres maiorem uim in uictus ra-
tione ponebant, quam in medicamentis: ubi uel humor uicio-
sus emendandus, uel morbo uenienti erat prospiciendum: alia nimirum
ratione, quam huius seculi Medici facitantes: qui statim cum quis de
particula aliqua conqueritur, ad ualentissima etiam medicamenta con-
fugiunt. Cæterum Paulus noster hæc ex commentario Galeni cui titu-
lus est, de iis quæ bonum malum uel humorem gignunt sumpsisse uide-
tur. Habet ille in hunc modum: καὶ διὰ τὸ τοῖς ἰατροῖς εὐρεθῆναι τὰ
κληθέντα πρὸς αὐτῶν ὑγιεινὰ φάρμακα τῆς λεπτοῦς αἵματος
δυνάμεως ὄντα. τούτοις γὰρ ἔργον ἐστὶν ἐκφράτειν μὴ τὰς συνὰς
διεξῶδες. ἀπορῶν πτεν δὲ τὸ προσπλάττομενον γλίσχρον ἐκ τῶν
χυμῶν τοῖς ἀγγείοις, τέμνειν δὲ καὶ λεπτύνειν τὰ παχέα τῶν ὑγρῶν,
ἀλλ' ἐὰν πλεονάσῃ τε ἐν αὐτοῖς, ὡς ῥῶδες, ἢ πικρόχολον ἐν τῷ χολό-
νῳ, ἢ μελαγχολικὸν ἀπορῶν γάσσεται τὸ αἷμα. Hoc est: Quamobrem
medici salubria ab ipsis uocata medicamenta inuenerunt, omnia fa-
cultatis attenuatoria: siquidem munus ipsorum est artos transitus pa-
tenter reddere, succorum lentorem uasis adhaerescens abstergere:
humorum crassitatem incidere atq; extenuare. Sin autem serosum quip-
piam in eis redundet, uel sanguinem biliosum temporis interuallo, uel
melancholicum efficiunt &c. Sunt autem medicamenta salubria, cibi
loco medicamentorum sumpti, quibus per sanitatem utimur.

Porro quæ incrassandi. Ex eodem commentario transcripta
sunt, ubi in istum modum habet: τὰ δὲ τῆς παχέως καὶ γλίσχρης γε-
νῶντα τε χυμοὶ ἐδεσμάτα τροφιμώτατα πάντ' ἐστὶ, καὶ πεφθῆ-
καλῶς ἔτε τῇ γαστρὶ, καὶ τῷ πνεύματι. χρεῖσθ' ὅσα μαγειρὰ πέφυκεν, ἀ-
μειπτότατα δὲ τῶν ἐδεσμάτων ὑπάρχει τὰ μεταξὺ τῶν λεπτῶν
τῶν τε καὶ παχῶν τῶν. Quod est: Cibo uero crassos, uiscososq; humo-
res

Restitu-
tus locus.

Salubria
medica-
menta q̄

C O M M E N T A R I V S

res generantes, omnes & ualētissimæ sunt materia, & si probe in uen-
triculo, & hepate fuerint concocti, benignum generare sanguinem as-
solent: uerum inculpatissimi inter cibos sunt, qui tenuium, crassorumq;
medij habentur.

Qui sese exercent, & quantum libet. Galenus hæc ita habet:
ὁ τοῖς μὲν γὰρ αὐθιγῶσι τοῖς οἰοντ' ἐστὶ γυμνασίοις τε πλείοσι χεῖρ' ἔχειν,
καὶ κομᾶσαι μεχρὶς περὶ αὐτὸν ἐθέλωσι, καὶ βίον ἔξω τῶν πολιτικῶν ἀ-
σχολιῶν ἢ ἑλῶται τοῦ τοῖς ἐγχωρεῖν, καὶ τὰ παχύχυμα καὶ γλισχεῖ
τῶν ἐδεσμάτων ἐδίειν. Hoc est: quibus itaque exercitijs pluribus ui-
liet, & quàm diu libet dormire: ad hæc qui uitā ciuilibus negotijs ua-
cantem degunt, & cibos crassi succi, & uiscosos tuto assument.

Porro quemadmodum. Ad uerbum ex eodem loco transcripta
sunt. Galenus autem addit rationem: neutiquam enim, inquit, aliquis
egrotabit, si opportune prospiciat, ne concoctione unquam frustretur,
Exercita- item ne à cibo ualidam quandam ambulationem subeat. Quippe sicut
tio. exercitatio cibos præcedens, plurimum conseruande sanitati conducit:
sic quælibet secundum cibos commotio, nocentissima est. Nam alimen-
tum antequam sit concoctione elaboratum, ex uentriculo distribuitur.
Vnde crudorum humorum copia in uenis collecta, omnigenas morborū
species procreare solet, nisi protinus labore assiduo fuerint discussi, uel
concocti, ac in sanguinem commutati.

Varia ciborum genera. Plinius lib. 11. c. 52. Homini cibis utilissi-
mus simplex. Aceruatio saporū pestifera, & condimēta pernitiosiora.

I N L X X I I I I . C A P V T .

Lactuca Ex libris de alimentorum facultatibus fere mutuatus est
omnia Paulus. Itaque cum dicit, eoque somnum accersit, intellige,
uesperi commanducata, ut Galenus uti solebat. Valenter nutrit, græca
τετ'φι- dictio est τετ'φιμ'θ', quasi dicas, nutriens ualde, sic enim docti interpre-
μθ. tantur uocem istam.

Ita boni succi. Galenus, cum alia omnia olera paucissimū sangui-
nem generent, sola lactuca non multum quidem nec uiciosum gignit,
nō tamen absolute βύχμων, hoc est boni succi, laudabilē & benignū.

Intybus. Intybum. Alias græcis σείσις dicitur, in satium & agrestem diui-
ditur. Quamquam græci per cichorem tam domesticum quàm agre-
stem intelligant. Satius intybus duplex, unus latioribus folijs, lactu-
cæ similia, quem nos endiniam, corrupto nimirum uocabulo appella-
mus. Alter folijs strictioribus, multis capillamentis per radicem tran-
suntibus. Hoc loco intybum, intellige potissimum, quam uulgo Endi-

uiam nominamus, in acetarijs usitatam.

Brassica marina. Forte ea est herba, quam officinae soldanellam uocant circa maritima nascentem, nisi Dioscorides folia longa brassica huic attribuisset, quae in Soldanella non sunt: aut longitudo defoliorum ordine uenit intelligenda.

Endluia,

Soldanel-
la.

Blitum & atriplex. Blitum olus rubrum quod in cultis se attollit, cuius folia iuribus incocta sic ea inficiunt rubore, ut nigelli uini dilutum colorem representet: à quo rubrum olus etiam ab olitoribus uulgo uocari. Radice non una nititur, sed contra ceterorum fere olerum morem multiplici prolixa non in rectum tendente, betaceis frondibus, sine acrimonia fatuis, semen corticem profert racematim singulis ramis insidens. Atriplex flore aureo prodit, caule interdum purpureo, interdum candicante, ramoso, folio bliti, cum pubescit herbaceo, cum senescit, flammeo, nonnunquam in luteum languescente, semine foliaceo, simplici radice in altum ascendente, ex quo multa se promunt. Dicitur etiam Dioscoridi Chrysolacanum.

Chrysol-
canum.

Scolymos. Paulus & Aetius scolymon à cinara diremerunt: hanc officere stomacho, illum prodesse iudicantes. Idem etiam Galenus, ex quo sua mutuati sunt illi, in 2. de alimentorum facultatibus testatur. Alij tamen Graeci nullum aliud inter haec discrimen ponunt, quam quod scolymos ferus sit, & syluester: cinara uero, domita cultu, feritate exuta, mitior & altilis: cuius cibus, licet stomacho sit grauis, non protinus à scolymis natura, uiribusque degenerauit. Verum ex coctura noxa, quae prius referebat, amolitur: us additis quae etiam Galenus enumerat.

Atractylis. Haec duas habet species, una mitior est cnico satiuo similior, caule rectiore ac rigido, exili. Itaque pro colo antiquae mulieres utebantur, atque hanc proprie attractylida nominabant, semine candido, gradus amaro. Ab officinis dicitur hodie syluestris cartamus. Quibus Syluestris
cartamus. dam sanguinea uirga nominatur quod uulso ramulo cruore modicum profundat. Altera species hirsuta, caulibus sonchi, torosis, humi reptantibus, semine minuto, frequenter amaro, & pilis barbato, flore luteo, ut prior. Cruor est ex uulnere secti exit: haec officinis uocatur, cardus benedictus.

Cardus

Apium hipposelinum, sion, myrnion. Quum apium absolute benedictum apud autores ponitur, hortense uenit intelligendum, quod uulgo Petroselinum dicitur. Semina quae à pharmacopolis passim uenduntur, eleoselini sunt, id est, palustris apij. Hipposelinum à Romanis olus atrum dicitur, non autem ab equis nomen sumpsit, ut quidam uoluerunt, sed à magnitudine sua. Nam apud Graecos ἵππος in compositione solam

C O M M E N T A R I V S

magnitudinem signat, in ijs maxime rebus, quibus nihil peculiare habet. Id quibusdam putatur apium, quod Galli, Ache, Germani eppich nominant, Ferraria uulgo appellant apium Macedonicum. Dissentiunt autores in Hipposelino & Smyrnio. Alij Hipposelinum, olus atrum nominant, alijsmyrnion, quidam diuersa olera hac iudicant, quidam eadem. Nam Plinius ait: Olus atrum hipposelinum Graeci uocant, alijsmyrnion. Theophrastus idem uidetur cum Plinio dixisse. Galenus smyrnion olus atrum uocat, Romanorum secutus nomenclaturam. Dioscorides & Plinius de ijs priuatim ut genere diuersis gerunt. Forte ea herba est, quam Galli leuechram nominant. Sion, Latinis dicitur Lauer, frutice pusillo, in profluentibus aquis emicante, habitu subrecto, pinguiq; latis ac luxuriantibus folijs, olus atro similibus, minoribus tantum, odoratisq; Officina berulam uocant.

Berula.

Eruca. Notissima herba est, in acetarijs utimur, ob gustus acrimoniam. Graeci ἐρύκωρον, Galiracetam appellant.

Ocymum. Recentiores Graeci, qui de re herbaria scripserunt basilicum, hoc est, regium appellant: quod nomen apud omnes fere nationes hodie usurpatum uidemus.

**Gingidiū.
Cherese-
lium.**

Gingidium simile est scandici. Gingidium forte est herba ea quam uulgo Cherefolium appellant: non autem quam Plinius Cherephylion nominat. Olus fuit Pauli & Gal. temporibus tritissimum in usu. Scars dix syluestre olus est, ac uilissimum, si Plauto credimus.

IN LXXV. CAPVT.

**Aspara-
gus.**

A Sparagus. Per hanc dictionē intelligi uolo, quæ primum in lucē p-
deunt olerū germina, priusq; in folia explicentur, recentissimosq; tu-
riones qui edēdo sunt. In summa, primos cauliculorū partus cōprehēdo.

IN LXXVI. CAPVT.

Bulbi.

Bulbi. Bulborum facies, ut olim ueteribus fuit cognita, ita nunc
maxime cum officinis, tum medicis pace eruditorum dixerim, in-
cognita est. Sunt autem cepæ modo tunicati, & fronde cepicia, tereti,
angusta, in mucronem desinente, cauliculo dodranti, in cuius fasti-
gio flos emicat purpureus, ut in scilla circumactus. Agri Gallici, appe-
titus appellationem indiderunt, quod meram excitent cibi auilitatem.
Verum genus hoc quod in hortis copiosiore coma uiret, nucleis graci-
lioribus nunc porretam, nunc unionetam à porri, uel unionis, tum sa-
pore, tum forma uocant. At non solum propriae cuidam plantæ bulbi
nomen inditum est, uerū etiam rotundæ radices suis membranis tuni-
catae Bulbi nominantur, siue pluribus capitulis coagmententur, uno folli-

culo omnes ambiente, sine quadantenus distinctæ separentur, quales sunt croci, liliorum, narcissi, scyllæ, &c.

Pastinacæ vero, dauci & cari. Ad uerbum ex Galeni libro citato transcripta sunt. Pastinacæ species satis sunt cognitæ. Dauci uero & cari non item. Sunt porrò tres Dauci species à Dioscoride descriptæ: *Officina- riu daucus* quam hodie in officinis habemus, syluestris pastinaca est, ut sapor, odor & tota delinatio ostendunt. Nulla autem dauci species apud Dioscoridem pastinaca syluestris est, sed tertia tantum huic comparatur muscario. Verus Daucus ex Creta exportari debet. Huius semina & *Verus daucus.* radices in usum medicum ueniunt: aliarum specierum semina tantum. Quia uero Dauci & syluestris pastinacæ eadem propemodum uires existunt, ea pro dauco uti licebit.

Cari. Officinæ carui dicunt Serapionem suum, aliosq; Barbariæ scriptores secutæ. Non tamen semen hoc carui quod Pharmacopola uen- *Cari.* dunt, respondet Serapionis descriptioni. quippe crassius hoc esse dicit quam cyminum, officinarum autem multo minus cymino est. Caros igitur forte una ex nostratibus dauci speciebus erit, si semen etiã à Dioscoride exiguum descriptum, respiciamus.

Ampeloprasum. Caule proslit bicubitali, folijs porraceis, sed angustioribus, flore candido, radice bulbosa. Prouenit in uinetis, unde à na- *Porrūni- nea.* talibus ampeloprasum quasi uitigineum porrum Græcis nominatur. Nostrates officinæ uineale porrum appellant.

IN LXXVII. CAPVT.

TVbera. Hæc ex terra sagina conglobantur, sine medulla, uena, cortice, solo undiq; circumdata, nullis fibris, nullisq; capillamentis. nixa, nec extuberante loco in quo gignuntur, aut rimam agente, nec ipsa terre coherent. Galli hæc trusia nominant. Itali xunesta tarenso la. Vere effodiuntur, nec ultra annum durant.

Fungi. Istorum origo prima è limo & acescente succo madentis terre, aut radice ferme glandifera. Initio spuma lætior, dein corpus membranæ simile, mox partus. Cortice, medulla, neruo, uena carent.

IN LXXVIII. CAPVT.

CHondrus. Magna scriptorum recentiorum dissensio est, & adhuc *Chōdrus.* sub iudice lis est. Num scilicet chondrus & halica diuersa inter *Halica.* se sint, cum apud Paulum distinctim scribantur, an idem, cum apud autores Græcos chondrus, pro halica Romana sæpius ponatur. Apud recentiores autem Græcos ambæ dictiones coniungantur: Ut in Actij sermone 9. cap. 10. in hunc modum, τροφὴν δὲ διδόναι χορὴν ἄλικθ μετ' οὗ λούκῃ. Quibus uerbis precipit cibum dari

C O M M E N T A R I V S

chondrum alicæ cum uino albo. Item disceptatur, an hæc semina fini-
naturalia per se, an potius res facticie. Certe quantum ad primam
controuersiam attinet, collatis multorum autorum scriptis, chondrus
uidetur antiquorum in usu fuisse, si Galeno de uictus ratione in mor-
bis acutis credimus, quanquam libro. 1. de alimentis nomen eius apud
antiquos perrarum fuisse prodat, ut fere sibi ipse contrarius uideatur.
Alicæ uero teste Plinio, res Romana est, neque Pompeij magni etate
in usu fuisse traditur, nec pridem excogitata. Paulus noster ambo quasi
consimilis usus ac facultatis, frequenter coniungit, ut libro 3. cap. 31.
ἔστω δὲ σοὶ ἄρτος πλὴν τὸς ἐκ ψυχρῶν, ἢ ἀλγῆς, ἢ χόλιδος. Id est:
Panis tibi esto lotus è frigida, uel alicæ, uel chondrus. Sic itaque col-
ligo, ut secunda quoque discordia dirimatur, chondrum & alicam eis-
dem fere modis fieri, non autem semina, aut fruges esse per se. Pau-
lus autem dicit alicam chondro in omnibus respondere, nisi quod uen-
trem magis astringat. Nimirum propterea quod chondrus fiat ex zea
quæ Italis & quibusdam Germanis spelta nominatur hodie. Frumen-
ti genus inter triticum et hordeum medium. Alicæ uero ex tritico fiat
quicquid dicat Palladius de hordeo semimaturum. Et hodie nobis pul-
frumentacea uocatur: ptisanæ cremorî colatitio similis. Errant qui
alicam ex zea, chondrum ex tritico fieri autumant. De chondro con-
sulant Dioscoridem & Constantinum libro. 3. de re rustica. Interin-
uideas apud ueteres hæc duo confundi, ut quod alicæ tribuendum sit
chondro tribuant. Inueniasq; uarias uel chondri, uel alicæ conficienda
rationes. Non etiam audiendi sunt, qui far apud Romanos dictum
chondrum esse arbitrantur: cum & ipsum far testimonio Archige-
nis frumenti quedam sit preparatio, ex zea nimirum & frumento
Plinius testatur populum Romanum farre tantum ex frumento ter-
centum annis usum fuisse.

Panes:

Inter panes firmilissimus. Vfus sum dictione Celsiana, firmissi-
mus, pro eo quod est alimenti plurimum præstans, quanquam in compa-
randi gradu τροφικώτερος habeatur.

**Syncomi-
stus.**

Synchomiston. Hunc alio nomine Galenus autopyron appellat.
quod ex omnibus sue farinæ partibus citra ullam detractiōem con-
stet, inter furfuraceum & similageum medius, syncomistos quasi con-
fusaneus dictus, quoniam castratus non sit, sed omnia simul tulerit
furfures, utriculos & similam.

Polenta. Vide Galenum libro. 1. de alimentis, ubi polentam quam
Græci ἀλφιτα nominant, recenset, ex hordeo nouello mediocriter to-

Ita fieri. eamq; ueteres militibus panis loco dare solebant.

Maza. Cum polenta liquore conspergitur, atq; subigitur, maxe ap Maza. pellationem assumit: Hinc quidam eruditus offam appellat.

Oryza. Hoc frumenti genus Gallicum, Germanicumq; uulgus de- Oryza, tracta priore litera Rizon appellant.

IN LXXIX. CAPVT.

EX leguminibus. Legumina, inquit Galenus ea ex cerealibus se- Legumi-
minibus appellant, quae panificio non accommodantur, ut puta fa- na.
ba, pisa, cicera olentes lupinum, oryza, eruum &c. Galenus uocat
ὀσπρια & χεδρίπια.

IN LXXX. CAPVT.

DE temporarijs. Sic interpretatus sum ὥριος: quasi dicas hora- ὥριος.
rios. Nam Galenus ceteriq; graeci id anni tempus, horam appellat: ὥριος.
in quo medio canicula sidus oritur, ad quadraginta usque dies perdu- Fructus.
rans: quo tēpore omnes temporarij fructus, aut tempestiui, ut Plinius
ait, proueniunt. At Galenus non solum horarios dici censet, quod eo tem- Fructus
pore nascantur, sed ut à conditaneis discernantur. Sic et Plinius apposi fugaces.
te dixit, de persico, quia non aliud fugacius. Hoc est quod minus duret.

Omnia poma. Graece est ὅλη ὁ πῶρος. Sic antea interpretatus sum
quicquid herbaceo fructus uiret, lignosi nihil exterius habens. Proprie
uero Galenus oporam nominat libello τῶν δὲ δρυμίων καὶ κακορυ-
μίων, ficus & uuas: ut Paulus sequenti capite etiam indicat.

IN LXXXI. CAPVT.

EX cerasiis. Galenus commentario iam citato in hunc modum de
tempestiuis illis fructibus praecipit. Sunt autem arborei prope dixe-
rim uniuerſi fructus, uiciosis succis donati, praeter quas uocant casta-
neas. Haec si quidem exactam in uentriculo concoctionem adeptae, nu-
triunt, uerum succis crassioribus: malis nequaquam. Aliarum arborum
fructus temporarij omnes maligni sunt, nam si in uentriculo computre- Aliquan-
ſcant, medicamenti deleteri naturam fere induunt sicut & mora, licet do uicio-
lis utē dū.
ea persicis dictis & prunis moderatiora sunt. Tamen corruptelam nihi-
lominus illic prauam sustinent &c. De usu horum paulo post ait: A ui-
ciosis semper abstinendum, nisi cum aegroti astate totius corporis sicci-
tatem caloremque emendare conantur. Conueniunt enim tunc poma,
pira mora, cerasia adsumpta. Cucumer uero, pepo & melopepo, item
praecocia dicta, uel persica modice tunc manducari debent.

In uniuerſum astringentia. Vide Galenum libro. 2. de alimen-
tis: ubi rationem tradit: cur rethori cuidam astringentibus sumptis

COMMENTARIUS

post alios cibos laxantes uenter fuerit solutus. Ibiq; hæc Pauli sententia copiosius explicatur.

Prime mē
sæ qui ci-
bi conue-
niunt.

Etque primum exhiberi debent. Idem Galenus libro supra nominato confirmat in hunc modum. Omnes cibi qui prauum succum cum humiditate, & lubricitate obtinent, ex facili descendunt, eoq; prima mensa sumi debent.

Duracina.
Constanti
nus.

Duracina. Sunt qui lectionem hanc deprauatã putant, uelintq; legi pro duracina, rhodacina. Iulia plane ratione ualida nitentes. Galenus quidem & alij uetustiores hoc uocabuli non usurpant, uerum recentiores græci, uti Paulus, hoc cum Rhomanis commune habent. Vocantur autem duracina, quod corpus ipsorum pertinacius ossi hæreat, quam ut auelli queat. Græci δωρακινὰ, uel δουρακινὰ dicunt latinos ferimitati. Constantinus lib. 10. de agricultura. ἐπεὶ δὲ ἡ δὲ ἰσχυρὰ τὸ δωρακινὸν ταχέως γινέσκειν. Paulo post, ἐπεὶ δὲ ποιήσεις τὰ δωρακινὰ ὅσα φυτόν ἐστιν τὰ φυτὰ.

Druppæ

Druppæ. Plinius lib. 13. ca. 26. Oleum & Omphacium est. Fit duobus generibus, & totidem modis ex olea & uite: olea adhuc alba expressa, deterius ex druppa. ita enim uocatur, priusquam cibo matu- ra sit, iam tum colorem mutans &c. Græci δρυπητὶς appellant.

Pistacea.

Pistacea. Vide Plinium. Fructus est ex nucum genere, qui è Syria apportatur: Crescit arbore omnino nuda præterquam ramorum cacuminibus. Hæc enim comantur densiore folio, angusto, maiore tamen quam lentisci, subruffo surculis dependentibus pince nucis similitudine. Lutetia in quibusdam hortis est uidere nunc. Officina pharmacopolarum uocant fistica aut fisticorum grana.

Fistica
officina.
Sirica.

Vide an
recentiores
cum uete-
ribus con-
ueniant.

Sirica. Galenus ita uocat Ζιζιφῆα à recentioribus græcis appellata: quæ officina sephistiariorum iuiubas nuncupant. Recentiores maxime commendant hunc fructum, ut boni succi. Galenus ut prauo donatū reijciendum putat. illi præterea stomachum gratum, hic concoctioni rebellem prædicat. item illi aluo subducendæ conuenire, hic astringere aluum. Actius recentior, calore & humore temperata tradit, eoq; sanguinis acrimoniam edomant probum succum creant, serosum sanguinis humorem eliciunt. Decoctum eorum tussim & difficultatem spirandi lenit, pectori, renibus, uescicæ, prodest.

IN XCII. CAPUT.

Molles. Addidi cute, & paulo post, dura carne, dixi, ne ex simplici uocum interpretatione contraria inter sese posita uideri possint. Sunt itaq; pisces hi molles cute si attingas, duri autem carne, ut Ga-

lenus habet lib. tertio de alimentis. Nihil in capita præcedentia sum
commentatus quod & facilia, & ex Galeni libro iam citato sint om-
nia fere decerpta.

IN XCIII. CAPVT.

Cartilaginea. Hi pisces superioribus sunt contrarij, nam duram Selache
habent cutem: molem autem carnem. Cæterum Galenus selache Pisces.
dictos affirmat, ἀπὸ τοῦ σέλας ἔχειν, hoc est, quia splendorem ha-
beat eorum cutis.

IN XCVII. CAPVT.

ITaque somnus. Galenus libro tertio de causis pulsuum in hunc mo- Soni gene
dum somni generationem describit: ὁ μὲν γὰρ ὑπνὸς γίνεται ὅτι ratio,
ἐμφύτου θερμότητος καὶ τοῦ ὁρμῆ καὶ μακροῦ τινος καὶ ξηρότητος πλεονα-
πρὸς τὴν τροφὴν ἐπετραφείσης. καὶ διὰ ὁρμῆς καὶ ὑγρότητος ὁρμῆς
καὶ τοῦ σπινθῆρος ἐκτὸς ἀποταίνεσθαι. ἐστὶ δ' ὁ μὲν πρότερος ὑγρὸς τε
καὶ κατὰ φύσιν, ὁ δὲ ὁρμῆς ὁρμῆς, οἱ δὲ ἐν κώμασιν τε καὶ
ληθαργίᾳ. Hoc est: Et enim somnus fit, cum naturalis caliditas, uel ob
defatigationem quandam & maiorem siccitatem ad alimentum conuersa
est, uel ubi propter nimiam humiditatem foras nequit exire. Prior san-
est salubris, et secundum naturam. Secundus autem dictus, qualis in coma
te & lethargo &c. Paulo post: τῶν δ' ὑπνῶν τῶν κατὰ φύσιν,
ὡς περὶ οὐκ καὶ τῶν ἐξηγέρσεων ἢ γενέσεως οἱ καὶ πρὶν εἶναι, δεο-
μῆν οὐ μὲν ἄμα, καὶ ἀποροῦντες ὑγρότητος διαφυλάττειν τοῦ κατὰ
φύσιν ἐν τοῖς ζώοις θερμῶν, καὶ ὁρμῆς τοῦ το σπινθῆρος εἰς τὰ σπλάχ-
να, καὶ τὴν γαστέρα τῶν ὑπνῶν γινόμενων. αὐτὰρ ὁρμῆς ὁρμῆς ἀπολαύ-
σαντες τὰς τῆς ὥρας κατὰ φύσιν ποσότητας ἔχειν, ὅτι θερμὸς
σεως ἀποτελεῖ μῆν. &c. Hoc est: Somnorum uero naturalium, sicuti et
am uigiliarum generatio existit qualis antea exposita est, nepe ut somni
fiant cum naturalis animantium calor indiget quidem simul et destituit copio-
sa humiditate, eoq; ad uiscera et uentre commeat: ut autem uigiliae, cum idē
calor hac humiditate potitus fuerit abunde, ut iam naturalē habeat qua-
litate &c. Nam ex alimenti confectione multa uaporosa humiditas in
ipso calore, meatibus, omnibusq; particulis intermedijs suggeritur.

Virium animalium requies. Hoc est, ipse quidem non agunt, sed Mutua ui-
naturalibus subsidium adferunt: eoq; præcipitur recte, ut dum fit conco- rium sub-
ctio, etiam in uigilantibus, abstinetur a lectione, disputatione, aut co- idia.
mitatione graui, ne uis naturalis alio distrahatur, nam mutuo sibi fe-
gunt auxilia, impedimenta q;.

Tempus somni optimum à cibo. Intellige, non statim: nam somni.

COMMENTARIUS

Somnus statim à cibo, caput replet, ut etiam plethorica dispositiones, si Galeno in aphorismis fidem accommodamus.

Terminus autem somni. Non sunt audiendi qui unum omnibus terminum somni prescribunt. Nā alij celerius, alij tardius concoquunt: hi plus assument, illi minus. Quare Galenus recte in commentario de euchymia & cacoehymia tradit. Quibus itaq; exercitationibus plurimis uti licet, & quam diu libet dormire, ij & cibos crassi succi, & viscosos tuto assument. Que ita græce sonant ὅσοις μὲν γὰρ αὐτῶν ποιοῖσι οὐτ' ἐστὶ γυμνασίοις τε πλείοσι χρῆσθαι, καὶ κομᾶσθαι μέχρι περὶ αὐτῶν ἐθέλωσι &c. ut supra dictum est.

IN XCIX. CAPVT.

Cataphora.
καταφε
ρεσθαι.

Cataphora. Dictio græca est, à uerbo καταφέρεσθαι, quod est obdormiscere uehementius. Vnde etiam καταφορικὸς ὕπνῳ dicitur. Latine interpretari possis, grauis aut uehementis soporis impetum. Galenus sub hoc nomine, alios affectus soporosos uidetur comprehendere, καταφορὰς inquiens, βαθεῖας ἐργάζεται. αἳ δ' ὀνομάζουσι ἀποπληξίας, καὶ κάρους καὶ κατοχάς. Hoc est, Cataphoras profundas efficit, quas nominant apoplexias, & caros, & catochos.

In epistola Dioclis habetur σωαγχλὼν ὑπὸ κτῶρ. In qua uitium esse puto. Nam quid sibi uelit ὑπὸ κτῶρ, non satis intelligo. Angina enim omni tempore solet excitari. Nihil itaque mali erit, si legas προὑπὸ κτῶρ νυκτὰ λῶπα.

FINIS LIBRI PRIMII commentariorum.


COMMEN

COMMENTARIO³¹³

RVM IN PAVLVM AEGINE-
TAM LIBER SECVNDVS.



CAPVT I.



LIBER hic secundus de febribus, & earum
accidentijs facili tractat compēdio, ex Galeni
opere de medendi ratione ad Glauconē magna
ex parte transcriptus. Nonnulla uero Paulus
noster ex opere de Crisibus, pauca ex Prognos-
ticiis Hippocraticis, quaedam ex alijs auctori-
bus sumpsisse uidetur. Ceterum à morbis simi-
laribus auspicaturum se dicit, qui quatuor cō-
stant intemperaturis. Quia uero calida omnium est efficacissima, me-
rito ab hac appellationem desumpsit, febres, morbos nominans simi-
lares, qui nimirum etiam simpliciores dicuntur. Compositos in tertio
quartoq; uolumine persequetur.

Oribasij compendio. Iulianus olim Imperator medicinam suo
tempore uagam amplam, que intelligens, praestantissimos ex omni re-
gione medicos Romae colligendos magno studio curauit, delegitque ex
uniuerso illorum numero septuaginta duos, qui diuersis antiquorum au-
torum monumentis euolutis examinatisque, necessaria magis in ar-
tem medicam compēdiosa ratione comprehenderent. Hi igitur omnes,
sua prius ratione & uia, singulatim explicata, uno tandem consensu
scribendi prouinciam Oribasio ut facile principi, doctissimoq; tradi-
derunt. Is uaria Galeni opera aliorumque nonnullorum perscrutatus
in compendium quoddā septuaginta duobus libris comprehensum (tot
enim fuerant conuocati medici) artificiose redegit. Paulus autem Aegi-
neta opus hoc maius esse animaduertens, quam ut iter facturo circum-
ferri possit: aut ab homine tenuioris fortunae comparari, in septem
tantum libros constrinxit.

Ex Galēisane. In graecomale legitur ἐκ τῶν Γαλιεῶν ὡς μὴ ὡς
μάλιστα. Hic ὡς est superfluum: ac legi debet Γαλιεῶν μὴ ὡς μάλιστα. Castigaē
d
codex.

COMMENTARIUS

Hos & Oroscius, & castigator Basiliensis praterit.

IN II. CAPVT.

Ἰδεός. V Na vice. In greco est ἰδεός, quod cumulatim signat, ac una uice. Celsus dixisset semel. Cōtrarium huic κατὰ μέτρον, et κατ' ὀλίγον, quod est, particulatim, & paulatim, multisq; uicibus. Quando scilicet morbi in abscessum finiunt pluribus diebus fit crisis.

IN III. CAPVT.

Græcus codex uiciosus. N Eq; enim capitis. Ex Galeni 1. de diebus decretorijs hæc transcripta sunt. Desideratur autem in Paulo uocula, δέ, habet enim πυρετός εἰς βάλλον, pro πυρετός δέ εἰς βάλλον, quod neglexerunt Aristarchi.

Aliquem latere. Galenus addit emphaseos gratia καὶ αἰσθηκόμεται & ἄν, hoc est, etiā si stupidissimus, et ab omni alienus se iu fuerit.

IN IIII. CAPVT.

νεκρώσις. L Ethales notæ. Subsequentescilicet, facies cadauerosa, sano quā dissimillima, ut quæ mortuum imitetur, unde græcis νεκρώσις dicitur. Nam si ex Hippocratis sententia, similis sit sani, præsertim ipsius, qui nunc egrotat, faciei, optime sperandum est. Porro notæ hæ sunt in morbis acutis, diuturnis, animi defectionibus, doloribus, item omnibus defunctis. In faciei autem, quod imprimis appareant, & uim obtineant maximam. Cadauerosa, quoniam natura debilitata, non amplius sanguinem & spiritum in hanc suppeditat.

Laurentianus. Nares acutæ. Ita Celsus interpretatur. Nescio cur Laurentianus Nasus compressus uerterit, quod græcis dicitur ὀξεία ῥίς. Sunt autem nares acutæ, aut ob aliquā causam carnosas animalium partes cōsumētē, corrumpētēq; aut ob debilitatē caloris natiui, qui non magis in extimas corporis partes extēdi potest, sed i uisceribus solis exiguus remanet. Quo fit, ut nō amplius tantū sanguinis, aut spiritus in partes illas affluat. Cum autē in naso ossee partes et humide carnosæq; sint, inuicem commissæ: deinde quum ossee propter terrestre ipsarū substantiā similes permaneant, humidiores autem consumi facile possint, et in se concidere ob inopiā tum spiritus tum sanguinis, fit ut nasus gracile scat.

Oculi concaui. Ob easdem causas fiunt: sed quāto extremo naso humidiores, mollioresq; existunt, tanto citius cauantur. Imo etiā spiritus animalis copiosi participes existunt, & caloris non pauci, quibus ipsi destituti merito contrahuntur. Cadauerosa igitur facies quæ sequentia apud Hippocratem obtinet, in diuturnis sæpe morbis uisitur: raro per initia, ob quod & periculosissimum est, & in acuto morbo prorsus

lethale: tanquam ne occasionem quidem habuerit à tempore. In morbis autem longis non adeo lethale: ita nec in frigido loco, hyeme, statu aeris frigido, & senectute: quia morbus nature respondet.

Si hæc neq; Aut tali aliqua manifesta causa, minus periculosum est, quam si ob morbi maliciam, et si præstaret, neq; ab eiusmodi causis uirtutem prorsus debilitari Celsus optime hanc sententiam lib. 2. exprimit latine. Si hæc, inquit, ita sunt, ut neq; uigilia præcesserit, neq; uentris resolutio, neq; inedia. Dixit autem Hippocrates neq; ex uigilia: quia ex hac oculi, ueluti chorda ex siccitate tenduntur.

Vigilia.

Vacuatione. Intellige per alui profluvium, & mordicationem ut Galenus apud Hippocratem interpretatur. Verum Hippocrates habet τὰ τῆς κοιλίας ἐξυγίαισιν ἢ σφοδρῶς, quod est: Alius uehementer humectata. Celsus dixit uentris resolutio. Paulus uti dictione κενώσις.

Vacuatio.

Aut inedia. Hippocrates dixit λιμὸς ὅτι, quasi famelicum aliquid, aut fames quædam Paulus ex Galeno ἀσιτία, hoc est, inedia, Ceterum & alui resolutio uehemens, & inedia corpus siccant, adeo quandoque, ut per se emortuam hanc faciem inducant.

Inedia.

Si oculi lumen refugunt. Hoc est, auersantur, ob uisorie facultatis imbecillitatem. Quæ quum propter instrumentorum affectionem laborat quemadmodum in lippitudinibus, aut ob alium quendam fluxum præter naturam quidem est, non tamen mortale: cum autem per se afficitur, lethale.

Illachrymant, non ex quadam. Hippocrates habet τὸ γὰρ τὸ ἐκ τοῦ φθύωσιν, ἢ δ' ἀκρῶς ὡς ἀπὸ σφοδρῶς. Hoc est: Si enim lumen refugit aut illachrymât citra uoluntatē: nimirum ob facultatis rectorie imbecillitatē. In Hippocrate additur: ἄπὸ σφοδρῶς, quod est, puctūtur. Celsus simpliciter dixit, si præter hæc oculi quoque lumen refugit, et illachrymant. Paulus autē pulchre distinguit causam tum exteriore tum interiore, quæ sane utraque lachrymas sæpe in oculis mouet.

Hippocrates.

Celsus.

Ad hæc si alter ex his minor. Quæ nota facultatem ipsam dispensantem emori significat.

Quæque in ijs alba. Sicut in lippitudinibus quibusdam & ebriosis nonnullis. Iudicium uero est plenitudinis in cerebrorum membranis: interim & inflammationis. Vtroque enim modo sanguis ad oculorum uenas exprimitur. Album oculi pars est pupillarum ambien-

Album oculi.

Aut nigricent. Refrigerata scilicet. Refrigeratur autem emortua. Idcirco mali colores perpetuo apparent.

COMMENTARIUS

Crassior pituita. Græce λιμου, quod Plinius libro uigesimo tertio, capite primo dixit, græco usus uocabulo, uel, inquit, si lemæ in oculis erunt. Nos Celsum imitati libro secundo, de indicij mortis, quod caput

Pituita ex Hippocrate transtulit, diximus, pituita. Habet ille, pituita q; in ijs apud Cel-
sum in o-
culis pro
græcorū
λιμου. innatans nouissime angulis inhaerescit. Cæterum Galenus Lemas expo-
nens, dicit semicoeli alimenti esse recrementum. Nam facultas oculum
dispensans imbecilla allatum nutrimentum nequiuit concoquere. Iam
funt etiam lemæ in lippitudinibus tum ob humiditatis præter naturam
copiam, tum ob instrumentorum uicium.

Per somnum alba. Ex 14. cap. prognosticon Hippocratis sumpta uidentur. Ita uero apparent, ob imbecillitatem facultatis palpebras mouentis, cum citra causam exteriorem constituitur.

Stridere dentibus Hippocrates adiicit, quibus à pueritia consue-
tum non est. Fit autem ex cerebri offensione, & per se delirium signi-
ficat: cum delirio autem, mortem. Cæterum sunt stridores dentium, cum
Stridor
ex qui-
bus cau-
lis. temporales & masticatorij musculi modo conuulsorio mouentur. Qui-
busdam accidit, ipsis tantū musculis affectis, uel ab origine, uel postea
ex quadam causa. In nonnullis principio neruorum in eiusmodi affe-
ctionem deducto, unde potissimum illorum quæ ab eo nata sunt, conuul-
siones fiunt, ut hic neruorum musculus infertorum.

Aut in veste floccos legere. Hoc græce dixit Paulus unico uerbo
κροκυσ- κροκυσίζεν quod Hippocrates τὰς κροκιδ' ας ἀπὸ τῶν ἱματίων ἀ-
ζειν. ποτίλλειν dixit capite uigesimo octauo. Celsus hoc interpretatus lib.
secundo: ait: Si in ueste floccos legit, fimbrias q; deducit. Id autē fit cor-
poris humoribus ad caput exhalantibus. Quorū uapore purus ille pupil-
la humor inficitur, unde prædictæ oriūtur imagines, ut in suffusis. Vbi
enim niger aliquis, aut crassus antestat, lumen uisorium prohibens fo-
ras excedere pro humoris subsistentis natura, imagines generantur.

Si æger supinus. Hoc à decubitu iudicium sumptum est. Galenus
in prognostica Hippocratis capite septimo scribit, id neque ad salutem
neque ad mortem habere momentum, sed medium esse, aut parum ad
alterum declinare. At si consuetum agro est, ita cubare, & medicum
ingredientem non reucreatur, ex bonis signis est. Sin autem causa e-
tiam non est, & medicum reucreatur, malum est.

πᾶσι. Veluti resolutus. Græce est ὅλον παρειλην. Nam πᾶσι idē
quod παρὰ λυσις. Sed illa incertis quibusdam partibus, hæc in toto cor-
pore obuicire dicitur. Sit igitur, ueluti artubus resolutis. Forte idem
est quod dixit Hippocrates: καὶ χεῖρας καὶ τῶν ἁλόν, καὶ σκέλεα ἔ-

χειν ἐκτεταμένα. Hoc est, & manus & cernicæ & crura habere extensa non contracta. Celsus dixit, ubi supinus æger iacet porrectis manibus & cruribus.

Vel si etiam deorsum. Hoc inquit Galenus facultatis corpus gubernantis abolitionem testatur. Celsus dixit, ubi deorsum ad pedes subinde delabitur.

Spiritus. Hoc est, totam respirationem: frigidum, ob extinctionem caloris nativi. Græce est ἀναπνεῖν, quod est, respirare, Celsum sic ut dixi spiritum elidere.

ἀναπνεῖν.
spiritum elidere.

Item pulsus languidus Hippocrates pulsus non meminit. Languidus autem, quem alij obscuri uertunt, imbecillitatem uirtutis fatetur. Creber magnam necessitatem, deficiens per interualla, aut ut percipi uix possit, extremam debilitatem.

Sudore digeratur. Græce est ἰδρῶν συγκοπτικῶς, quasi dicas ἰδρῶν συκῶν, sudare ad syncopen. Vide Hippocratem. Celsus in Cardiaco dixit: Id συγκοπτικῶς, autem nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languente immodico sudore digeritur.

Pulsus vegetior. Græca dictio est βυσφυξία, quasi dicas, bona βυσφυξία, pulsatio. Hoc est mediocris magnitudine, frequentia et celeritate: æqualis sibi per omnia.

βυσφυξία.

Bene erga cibum. Paulo aliter sonant uerba græca, ὅτι ἔχειν πρὸς προσφοράς τὰς προσφορὰς. Hoc est: bene habere ad oblationem intellige cibi. φαί.

IN V. CAPVT.

SI quatuor particul. Quum nimirum materia est extra uasa. Sicut autem morbus totus quatuor, habet tempora: principium, augmentum, statum, & declinationem, ita quoque particulares accessiones. Vide Galenum de morborum temporibus, & de totius morbi temporibus, quem librum nos Latinitate donauimus.

Cuius extremus. Hoc est, longissimus, quasi dicas: Si longissime producat, in septimana iudicatur. Nam teste Galeno exacte peracutus is est, qui quartum diem attingit. Non exacte, qui ad septimum usque producit. Ita inter acutos, alius exacte acutus, qui ad usque diem quartum decimum producit. Non exacte uero, qui usque ad uigesimum durat, quanquam & ipse acutus sit.

Sin autem inde in quadragesimum incidit, acutus ex decedentia, quem græci κατὰ μετὰ πτωσιν appellant.

Quarto die crifim. Nam quarto plerunque solunt, aut occidunt. Si multum, ad septimanam perdurant.

COMMENTARIUS

Sed duodecim. Quæ accessionis longitudo maxima est, tertianæ exquisitæ diſtæ, quæ intra quartumdecimum, hoc eſt, antequam omnino præcreat, ſoluitur.

Longus. Talis morbus longus. Vt eſt quarta, & ſemitertiana, tertiana non n exquisita.

Acutorū duplex natura. At ſi particulares. Galenus libro 2. Duplex autem horum acutorum quoque natura eſt. Vel enim acceſſionum remiſſiones in exactam integritatem finiunt, uel continua, ſemper febris manet, quæ particulares acceſſiones non habet, materia in maioribus uiscerum uasis ſubſiſtente.

**Corrigi-
tur co-
dex græ-
cus.** Si quidem facies, & totum. Intellige primis diebus. Nam fieri po- teſt, longo tempore ex parua febre, ut corpus modice collabatur. Modi- ce autem dixit: quia nimium conſumi & præter rationem facultatis retentoriæ imbecillitatem teſtatur. In codice græco, ſuperflua eſt par- ticula εἰ. Nam legi debet: τὸ πρὶς σῶπον, καὶ τὸ λοιπὸν &c. non au- tem τὸ πρὶς σῶπον εἰ καὶ τὸ λοιπὸν, nam una hec uocula ſententiam peruerit, quod nec Oroſcius intellexit, nec Baſilienſis corrector.

**ἄσύνπτ-
των.** Si prorsus nihil. Græce eſt: εἰ δὲ παντὶ ἀπασιν ἄσύνπτων, quod eſt: Sin autē omnino nō collapsum eſt. Cæſus latinus lib. 2. cap. 4. de ſignis lōgæ ualeitudinis dicit: Vbi æger p ſpatio parū emacreſcit.

**Pulsus.
Magnus.
Citatus.** Ex arteriarum motu. Magnus pulſus, qui in omnem diſtantiā attollitur, fit ob magnum refrigerij uſum. Citatus, ubi magnitudo pul- ſus non ſufficit, additur Celeritas. Sicuti cum qui magno incedit paj- ſu non poteſt iter inſtitutum tempeſtius abſoluere, niſi eundem gra- dum acceleret. Creber, celeritatem adhuc adiuuat, dum breuem facit ab opere quietem. Veluti qui nunquam intermittit, uerū ſemper iter repetit, quod celeriter perficit atq; maximum uſum refrigerij indicat. Vehemens, robuſtis uiribus, natura ſtrenue ſe ad fuliginofa excremen- ta expellenda accingente.

**Paruus:
Tardus.
Rarus.** Contrarius longum. Hoc eſt: Paruus, tardus, rarus, languidus. Paruus quia tantus color non eſt, qui refrigerari ualido requirat, aut uiribus imbecillis, materia ue oppreſſis.

Quatenus calidæ, & vrentes. Subaudi ad tactum. Hec ſumpſit ex lib. primo Galeni ad Glaucōnē capite de curatione doloris capitis.

Deliteſcentes. οἱ οὐ σμυχόμενοι, græce eſt. Interpretantur autem grammatici σμυχόμενοι ἀφανίζόμενοι, quod eſt, non apparētes. Ga- lenus utitur hoc uerbo, præterquam in libro ſupra citato, ſecundo etiam de indicatorijs diebus. Qui nanque inquiring, ad quartumdecimum,

aut vigesimum diem morbi prorsus acuti exciderunt, hi plane inceperunt tanquam *συχρό μλν* lento motu. Nihil refert etiam si interpre- *συχρό μλν* teris, mitiores & lāguide. Habetur in codice Græco ante *συχρό μλν* οί νοί. dictio *μαλακώτεροι*, fac tu *μαλακώτεροι*.

IN VI. CAPVT.

Magna ex parte. Recte dicitur, magna ex parte quoniam plurimi longi affectus teste Galeno libro secundo de diebus decretorijs, etiam excretionibus finiuntur, sed non manifestis. Potissimum autem abscessibus, & concoctione. Qui enim ad quartumdecimum crudi sunt, non ante quadragesimum solvuntur.

IN VII. CAPVT.

Dierum decretoriorum. Antequā dies ipsos enumeremus, apte *Dies de-* prius dicitur, cur ita appellentur, Græci uocant, *κρισιμους* quasi cretorij *quid-* iudicij dicatos. In quibus natura cum morbo pugnante, iudicium ex- *qui-* pectatur, natura ne morbum sit superatura, an morbus naturam. Hoc autem fit, quando facultas alicui siue qualitate, siue quantitate, siue utroque corpus offendentis, operi suo ualentissime se accingit: quæ uere Crisis dicitur. Hæc autem singulis diebus potest accidere, teste Galeno, sed non æque frequenter, nec æquali fide. Hinc Paulus noster inquit: Dierum decretoriorum alijs ægris frequenter, cum fide, nempe cum excretionem quadam copiosa, aut abscessu non obscuro. Post quæ morbi recidua timenda non est.

Salubriter. Græca dictio est *ἀγαθός*, quod est bene: quo die morbus ad sanitatem desinit, eoq; dixi salubriter.

Perfekte. *τελειός* interpretatus sum perfekte, iudicat autem is dies perfecte, qui nihil amplius in morbo facit reliquum.

Manifesto. Hoc est: Quo cum excretionem, aut abscessu quodā euidenti morbus solutus est.

Insigniter. Paulus dixit græce *ἐπισήμως*, Galenus *δυσήμως*, quasi cum bonis signis. Hoc est, qui prius à contemplatorio indicatus sit.

Iam intelligendum uenit, naturæ motus proportionibus definitis fir- *Natura* *motibus* *ordinatis* *guberna-* *tur.* ri, & circuitibus ordinatis, cum morbi materiam superauerit: prohibetur autem quum non plane superauerit. Septenarij igitur circuitus ualidissima sunt uirtute præditi: mox quaternarij: quadam uero extra hos excidunt: quos coincidentes, seu intercalarios nominare licet. At perfectus circuitus est, ex tribus septenarijs compositus, qui nimirum uiginti constat diebus. Vnde liquet non omnes septenarios inuicem separari, sed nonnullos coniungi, ut etiam quaterniones. Nam

COMMENTARIUS

hi teste Oribasio in ipsis partibus à precedente numero incipiunt: post ipsas uero partes absq; precedente numero procedunt. Porro secundus septenarius circulus à primo disinctus est, testimonio Hippocratis ex Aphorismo quarto decimo libri secundi, secundi septenarij, octauus dies initium est: tertius septenarius circuitus secundo coheret. Vnde fit ut non eadem proportio post quartumdecimum diem seruetur. Nam ab ipso quartodecimo, qui finis secundi est, tertius incipit: post uigesimum diem, idem circuituum ordo perpetuo consistit. Hinc est quod apud Hippocratem probetur maxime, post septimum, quartumdecimum, uigesimum, uigesimuseptimus, trigessimusquartus, quadragesimus. Respondet ergo trigessimusquartus, quartodecimo, quippe qui ex duobus septenarijs sit coniunctus. Et quadragesimus, uigesimo, ut qui tertium septenarium coniunctum expleat. Eadem ratione commendat sexagesimum, octuagesimum, centesimum, centesimum uigesimum, ut perfectos circuitus. Iam quaterniones ita habent. Secundus & primus coniunguntur: tertius à secundo separatur. Quartus autem tertio, & quinto coniungitur: quintus iterum sexto. Atq; post uigesimum, ut in septenarijs proportio seruetur. Concidunt eis nonus, quintus, & tertius.

Sunt itaq; potentes ad iudicandum septenarij: mox quaterniones. Quartus enim dies morbos qui primo non desinunt, soluit. Undecimus quos septimus non discussit. At si maior morbus sit quam ut quarto die crism subeat, certe solutio ipsius in eodem preparatur: septimo autem finis morbi adijcitur. Qui uero morbi septimo die non finiunt, undecimo natura soluere molitur. Atque sic in ipso uel decernit, uel quartodecimo preparat. Ac omnibus pulchre euenientibus, nullo admissio errore, ad quaternionum circuitus iudicia omnino perueniunt. Erratis autem quibusdam admissis, in coincidentes, seu intercalarios recidunt, quanquam in facta iam crisi iudicanda, praestat eam in nono factam esse, quam octauo, ut quae sit tutior, & fidelior: Itaq; differunt quaterniones ab intercalarijs, natura & usu: natura ut dictum est: usu, quod ad futurae crisis cognitionem sufficiant. At morbi acuti impari dierum numero, longi pari iudicantur. Inuadunt quidam morbi secundum diem priore grauiorem habentes: quartum tertio, & totas accessiones in diebus paribus, qui longorum morborum iudices sunt. Protinus autem ut acuti propter accessionis uehementiam finiuntur, hi etiam secundo die interficiunt, & quarto: uerum sexto plurimos. Ceterum dies intercalarij, tertius, & quintus, non minus quam quartus decernunt. Nam perturbationis euidentia natu-

ram ea quæ molestant, etiam ante tempus propulsare compellit. Proinde primariam decernendi uirtutem non habent, sed per accidens ali- quod sic eueniunt. Quoniam enim natura non conuenienti semper tem- pore de morbis decernit, sed concitata plerumque aliàs alijs de causis, à quibus accessio in morbis acutis maxime continua redditur, in im- pa-ribus acutorum iudicia fieri ratio est.

Exiguum naturæ impetum. Hoc est, si uel modicè natura ad ex- petendum aliena se accinxerit. Ex primo Galeni libro ad Glauconem de curatione doloris capitis hæc trāscripta sunt, ubi ita habetur: ἢ μὲν γὰρ ἐβόρην ἡμέρα, καὶ κατὰ τὰς βραχέας παρὰ σκῶας τῆς φύ- σεις ἐξορμα πρὸς τὴν ὄψιν κενώσεως κρίσιν. Hoc est: Nam septimus dies etiam ex paruis naturæ apparatibus ad crīsim quæ per euacuatio- nem confit, erumpit. Itaq; ad quartumdecimum usq; diem ualentissi- ma. Græce erat ἀγανισκώτατα, hoc est, maximo cum certamine, & ἀγανισ- impetu naturæ. Ex libro secundo de diebus decretorijs. κώτατα.

Prorsus elanguescunt. Superius dixit de diebus post uigessimam succedentibus: quod scilicet uehementiam in iudicando remittant. ita hic eos qui post quadragesimum sunt, prorsus elanguescere in naturæ motibus. Græce est τελείως εἰσὶν ἔκλυτοι quod est, omnino sunt reso- luti. Male autem in codice Græco impresso est ἔκλυτοι pro ἔκλυτοι. Lectio co- dicis Græ- ci castiga- tur. Nec hoc aduerterunt Orosius & Gemusæus.

IN VIII. CAPVT.

Concoctionis signa. Galenus libr. 1. cap. 3. de Crīsis eadē pla- ne habet. Dicit autem signa decretoria nonnunquam male eueni- re, propterea quod apparentibus scilicet decretorijs citra concoctionē, natura ob perturbationis uiolentiam, quæ aliàs ab alijs causis accidit, ad expellendum coacta, crīsis uel bona, uel mala fiat.

Neque igitur per initia. Ex eodem Galeni libro capite octauo sumptum est: sequitur autem in Paulo Græco: οὐτε οὐδ' ἐν ταῖς ἀρ- χαῖς, οὐτε ἐν ταῖς ἀναβάσειν αὐτὰ φαίνεσθαι χρὴ, ἀλλ' ἐν τῷ τῆς παρακμῆς χρόνῳ. Hoc est: Neque igitur per initia, neque in au- gmento ipsa apparere, sed declinationis tempore conuenit. Galenus autem habet: οὐτε γὰρ ἐν ἀναβάσει, οὐτε ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ἀλλ' ἐν ταῖς ἀκμῶς αὐτὰ ἐπιφαίνεσθαι χρὴ. Quod est: Neq; enim in aug- mento, neque principio, sed in uigore ipsa apparere oportet. Cui lectio- ni ego assentior. Nam testimonio Galeni libro tertio de Crīsis, ca- pite quinto: Exquisita concoctio status tempore confit. Ergo si mor- bus ante statum indicatus fuerit, malo est. Mutandum itaq; in Pau- Lectio co- dicis Græ- ci uisitata.

COMMENTARIUS

λο ἐν τῷ τῆς παρακμῆς ἐν τῷ τ' ἀκμῆς. Hoc non intellexisti Oro-
sci, nec tu Gemusæ aduertisti.

Si accessiones vrgeant. Galenus libro tertio de Crisibus, capite
quarto inquit, in hu. c modum: εἰ μὲν γὰρ ἐπείγοιντο, καὶ προλαμ-
βαίονεν ἅει τῆς σωκῆθους ὥρας &c. Hoc est: Si enim urgeant, præ-
uertantq; horam consuetam. Paulus habet: εἰ μὲν ἐπιτείνοντο, hoc
est, si intrudantur, quod postea explicatur per hanc clausulam: Et ue-
hementiores multo fiant. Quare cum Galeno etiam legendum censco,
ἐπείγοντο, non ἐπιτείνοντο, quanquam non adeo r. firt, uirum ma-
lis. Galenus certe paulo post eodem uerbo eadem in re utitur: πρὸς-
δουλον inquit: ὡς ὡδὶ τὴν κρείσιν ἐπείγεται &c.

Item ijs qui ob rigores. Nempe ijs qui febribus laborant inter-
mittentibus. Parum proprie dixit rigores, nam hi proprie de frigori-
bus uehementibus, aut durtie ex frigore contracta, aut etiam sine fri-
gore dicitur. Ut apud authores idoneos est inuenire. Græca autem di-
Rigor. εἰς ἕξιν &c, totius corporis concussione significat. Celsus eam uoca-
bulo horrois qui Græcis φρίκη dicitur, interpretatus est. Plinius tamē
libro septimo capite quinquagesimo scribit: Certis pestifer calor re-
meat horis, aut rigor. Capiamus itaq; hoc loco rigorem, pro uehementi
horrore, ut Galenus est autor.

IN X. CAPVT.

ANte quam libet iudicationem, ægrotus grauiter excrucia-
tur. Caput hoc ex primo Galeni ad Glauconem libro, sumptum
est. Excruciatu autem grauiter, quia natura in totū contra morbum
insurgit, ad expellendum ea quæ præter naturam sunt. Græce est δύ-
σφοξα προνοεῖται. Hoc est ad uerbum: Difficilis tolerantia præce-
dit. Nam δύσφοξα uerbum, signat ægre morbum ferre, inquietum
esse, exagitari & affligi.

Atque his obuientibus. Galenus libro citato: εἰ γὰρ ὡδὶ τοῦ
τοῖς ἀπασιν. Hoc est: Si enim præter hæc omnia. Sublimius attol-
lantur. Galenus libro tertio de prænotione ex pulsibus sumpta, inquit
pulsus sublimem omnem excretionis indicem esse.

Ad hæc si dies decretorius indiceat. Hoc est si prædicatur ab alio
cōtēplatorio, ut septimus à quarto, quartusdecimus ab undecimo, &c.

Exilientem. Subaudi è lecto. Galenus in commentario quem in-
scripsit πρὸς τὸν προνοώσκειν, in hunc modum habet: Cum natura
incumberet in ea quæ grauabant, expellenda, æger erexit se tanquam
uellet è lecto exilire: Rogatus cur id uellet facere, respondit se uidere

serpentem rubrum ex tegula emergentem, ac uereri ne in uia ille aberrans, super ipsum caderet, eoq; fugere in locum quo decumbebat.

Si qua partium ipsius palpitet. $\epsilon\iota\ \tau\iota\ \pi\alpha\lambda\lambda\omicron\iota\tau\omicron$ Grecus codex habet, ut etiam Galeni primus ad Glauconem. Signat autem $\pi\alpha\lambda\cdot\pi\alpha\lambda\lambda\omicron\cdot\lambda\omicron\mu\omicron\iota$, idem quod moueor, concutior, palpito. Vid. libellum Galeni de $\mu\omicron\iota$. palpitatione, quam alij tremorem interpretantur. Libro primo de crisi- bus pro $\pi\alpha\lambda\lambda\omicron\iota\tau\omicron$ habetur, $\sigma\acute{\epsilon}\iota\tau\omicron\iota$, quod est, monetur, additurq; $\kappa\omicron\iota\ \tau\omicron\omicron\mu\acute{\omega}\delta\ \delta\upsilon\varsigma\ \gamma\acute{\iota}\nu\epsilon\tau\omicron\iota$, id est, & tremulum fit, ut labrum.

Venæ in temporibus. Quod signat sanguinem ad superiora eru- pisse, & calidissimum, cum alioquin proprium sit arteriarum pulsare.

IN XI. CAPVT.

SI euacuatio. Ex Galeno de Crisibus tertio, cap. 3. fere omnia tran- scripta sunt. Meminerint autem lectores, aliquando $\iota\mu\epsilon\lambda\lambda\iota\sigma\iota\sigma\iota\varsigma$ Græca crisi scilicet uti, quod medicorum familie sit & usitata, & fa- miliaris. Aliquando interpretor iudicium, uel indicationem: quod ut Crisis.
Iudicium.
Iudicatio.

IN XII. CAPVT.

PULSUS. Hoc caput ex uarijs Galeni libris de pulsibus transcriptum est. Primum itaq; Paulus definitionem ponit, qua dicit cor & ar- terias attolli, & deprimi. Attolluntur autē, longis fibrillis in se coeun- Pulsus
partes. tibus: alijs omnibus relaxatis. Submittuntur, hoc est deprimuntur, partes. astringuntur, longis relaxatis, latis in se coeuntibus. Græce est $\delta\ \mu\epsilon\lambda\iota\ \sigma\phi\upsilon\gamma\mu\omicron\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \kappa\omicron\iota\varsigma\ \epsilon\sigma\iota\upsilon\ \kappa\alpha\theta\acute{\iota}\sigma\tau\omicron\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \acute{\alpha}\rho\tau\eta\gamma\iota\omega\iota\ \kappa\alpha\tau\alpha\ \delta\iota\alpha\sigma\omicron\lambda\iota\omega\ \kappa\alpha\iota\ \sigma\upsilon\sigma\omicron\lambda\iota\omega\ \gamma\acute{\iota}\gamma\iota\omicron\mu\iota\ \kappa\iota$. Hoc est: Pulsus sane motus est cordis, & arteria- rum qui fit secundum diastolen & systolen.

Fuliginosa. Que ex functione obita collecta sunt. Nam hæc teste Galeno, nō aliter calorē natium, quā flammam ignis extinguunt.

Primo puluum genus. Hoc ad uerbum ex Galeni libello ad can- didatos medicine sumptū est. Habetur enim: Ex ijs que propria motus sunt, celeritas existit & tarditas: alius ugens motus, alius resolutus.

Quoniam enim. Hunc syllogismum ex primo de differentijs pul- suum mutuatus est. Verba ita sonant: Quia uero & arteria tria in- terualla sortita est, sicut aliud quoduis corpus, longum, latum, & pro- fundum, necesse est omnino in singulis distantijs quantitatem diasta- les, & systoles metiri. Verti autem interuallum, $\delta\iota\alpha\sigma\alpha\sigma\iota\upsilon$, quod neo- $\delta\iota\alpha\sigma\alpha\cdot$
 $\sigma\iota\varsigma$.
Interual-
lum.

Humoris infusi. Galenus libro de dignoscendis pulsibus quarta

COMMENTARIUS

etiam ex infusione humoris differentiam pulsus constituit. Nam alias plus, alias minus in ea continetur, nunc crassior, nunc tenuior, nunc aquosa, nunc aerea humiditas.

Pulsus
plenior.

Pleniorem. Verba sunt Archigenis apud Galenum lib. quarto de dignoscendis pulsibus, admodum obscura, ut lectores facile indicabunt. Ceterum plenus pulsus habet tria genera, ut summam dicam: Primum, quod ipsum corpus arterie, quo statu sit declarat: alterum quod qualitate substantie quam continet: tertium nativi spiritus facultate indicat.

Corrigit
exemplar.

Quoniam uero caloris. Hic locus aduerbum ex libro primo de differentiis pulsum desumptus est. Verba ita sonant: ὅτι κατὰ τὸν τῆς ἀρτηρίας τόπον, ἐνεργέστερον γνωρίζομεν τῆς τοῦ πυρετοῦ θερμότητος οἷα τις ἐστίν, ἢ ἐκ τῶν ἄλλοι μύριον ἅπτοιο, πειθαμένον ἐδοξεν εἶναι τισὶ καὶ τοιοῦτο γένος σφυγμῶν σωαρισματικοῖς ἄλλοις. Ex qua lectione uidetur addendum in Paulo τινὲς, ut sit ἡγεῖσθαι τινὲς καὶ τοῦτο &c. quod preterierunt. Aristarchi.

Nam cum arteria. Galenus primo de differentiis pulsum in hunc modum habet: τῆς ἀρτηρίας σώματι οὐ σπασμῶδον καὶ μακροῦ καὶ ὑποφθοῦ, κινουμένης τε ὅλη παρὰ τὸς διπλῶς κινήσιν ἐξ ἐναντίων σωθετομωρίων: καὶ εἰς ἐαυτὴν σωαρίζεται πανταχόθεν ἢ διασέλλεται πανταχόσε καὶ ταύτας τῆς διπλῆς κινήσεως ὀνομαζομένης σφυγμοῦ, διπλῶς ἀναγκάων αὐτῇ συμπιπτεν ἡρεμίας ἐφ' ἑκάτερον &c. Hoc est, ut Græcæ lingue ignari intelligant. Cum arteria corpus sit cauum longum, & teres, moveaturque perpetuo duplici motu, ex contrariis compositio particulis (uel enim in se undiquaque subsidet, uel in omnem partem attollitur, qui motus duplex appellatur pulsus) necesse est, ut duplex ei quies in utroque coincidat. Deinde pergit, atque has duas quietes exercitata manus cognoscit, & ratio demonstrat. Pauli lectio uidetur corrigenda. Habet enim codex impressus τῆς κατὰ ἀρτηρίας διπλῶς κινουμένης κινήσιν ἐξ ἐναντίων συγκεκλιμένων κινήσεων.

Corrigi
tur codex
græcus.

Quod est: Cum enim arteria duplici moveatur motu, contrariis compositio motibus, pro ἐξ ἐναντίων συγκεκλιμένων μορίων. Sic itaque tu corrigito. Orosius & Basiliensis corrector hoc sponte sua scilicet omiserunt.

Differentiæ rhythmici. Ex primo de differentiis pulsum Galeni transcripta sunt. Quare qui omnia planius fusiussque explicata desiderabit, ad eos se commentarios conferat.

Ac cum secundum magnitudinem inæqualitas, id quod maturius, aut tardius assumpserit. Hoc est, ut apertius interpreter: quæ-

quam sic habeant, ac cum inequalitas ex magnitudine sumpta, in-
equalitatem quæ celeritatis, aut tarditatis ratione constat, assumpse-
rit. Sed malui esse obscurior, quàm non fidelis Aristarchis nostris uideri.

Ac si id quod in situ est. Eadem locutio. Idē intelligo, ac si dicas: Si
eam differentiā inequalitatis sumpserit, quæ ex situ arteriæ capitur.

Porro opportunum erit. Sequentia Pauli dicta, ex Galeni li-
bris de causis pulsuum, & de præuotione miro artificio, compendioq;
sunt descripta.

Magnus igitur pulsus. Galenus primo πρὸς προγνώσεως σφυγ-
μῶν, in hanc sententiā ait de magno pulsus ἡ τοι γὰρ ὅτε τὸν ἰσχνό-
τητα τοῦ σώματος, ἢ ὅτε τὸν θερμότητα τῆς κρᾶσεως, ἢ ὅτε
τὸν ἐπίκτητον κίνησιν. Hoc est: Vel enim sit ob corporis (intellige ar-
terie) gracilitatem, aut temperamenti calorem, aut motum acquisitū.

Causæ ipsius naturales. Paulo post Galenus habet: ἅλλ' αἱ
μὲν ἐπίκτητοι κινήσεις, αὐτῶν καὶ βίβανται, παρὰ μὲν οὖσι δ' ἐτι
ὅτε τὸν ἰσχνότητα, καὶ τὸν κρᾶσιν, quod est: Verum motus ascitici
statim subsidunt. qui autem ex gracilitate, & temperamento proue-
niunt, adhuc perseverant.

Vt etiam manu admota. Galenus ὡς ἐνεσί σοι τῶν σφυγμῶν
ἁφάμενῳ, καὶ πειτὰ βραχὺ διαλείποντι, καὶ πάλιν ἁφάμενῳ
σαφέστατά διαγνῶναι τὸν μεταβολῶν. Hoc est: Vt liceat tibi pul-
sus tangenti, & deinde paululum intermittenti, rursusq; iterum atting-
enti, mutationem manifestissimam dignoscere &c. Habetur autem
in codice græco Pauli bis πάντως, tu igitur postremum exprūge, quod
neglexerunt nostri mastiges.

Textus
græcus
castigat.

Qui sane ob balineas. Hæc fere et sequentia lib. 1. iam citato in-
uenies. Nisi quod Galenus uerbis nonnihil immutatis eadem dicat.

Ex humorum putredine magnus, ad magnitudinem, adhuc
submisionem magis citatam. Galenus libro secundo προγνώσεως
σφυγμῶν hanc sententiā interpretatur in eū modum: διηλώσει τοι-
γαρ ἐν τῷ μὲν τάχῳ τῆς συστολῆς ἀξιόλογον τι πλεῖστον αἰδωλῶ
δὲ πρὸς πλάματων ἀδρόζουσαί τε αἶμα καὶ ἐκκρίνεσθαι. Et statim:
παμπολὺ μὲν γὰρ ἀδρόζεται κατὰ τὰς σήφεις τῶν χυμῶν &c.

Hoc est: Indicabit igitur, celeritas quidem systoles, eximiam quan-
dam fuliginosorum excrementorum copiam colligi simul, & excerni
&c. Permultum enim ex humorum putredinibus colligitur. Iam li-
bro primo de causis ita habet: Cum refrigerantem causam attrahit
corpus arteriarum distenditur: cum fuliginosum excernit, comprimi-

Causæ pul-
sū et eo-
rū differē-
tiæ.

COMMENTARIUS

219. Superat autem alias diastole, cum scilicet maior refrigerij usus est. Systole, cum plura recrementa expelli desiderant.

Verum ad magnum pulsum Galenus primo de causis: Conveniunt igitur tria causarum genera sibi mutuo opitulari, ut pulsus magnus aut celer fiat: nempe usum generationis ipsorum urgentem, virtutem robustam, arteriarum tunicas molles, aut non omnino duras.

Celeritas accedit Eodem libro: Copiosiore calore in corpore collecto, necesse est animal maiorem desiderare respirationem: pulsusque maiores. Quia autem ratione maiores, hac etiam velociore & frequentiores. Ut enim sitientes non solum multum, sed etiam cito, & frequenter potionem assument, ita qui refrigerantem substantiam requirunt, multam simul hanc & celeriter & frequenter attrahunt. Quare proprij sunt copie caloris pulsus magni, celeres, & frequentes non tamen necessary sequentes, utrum si nullum ex predictis impederit.

Non amplius id quod in Primo de causis Galenus. Fortassis videbuntur pugnare ea que apparent tum inter se, tum una cum causis propositis. Convenit enim, ut in caliditate, primum sane magnitudo, mox celeritas, deinde frequentia erat, ita etiam in frigiditate primum sane oriri parvitatem: mox tarditatem: tertium raritatem. Que igitur solutio? Quoniam virtute robusta, & si usus paulo minor fuerit, primam sane actionem neque exiguam, neque tardam necesse est fieri, secundam vero post longius tempus, si usus urget, ratio est absolui. Sicut enim cum urgebat stimulabatque, & impellebat virtutem ad actionem, ita cum non urget, diutius conquiescere permittit.

Sin autem tarditas parvitatemque accreuerint, è contrario raritas in crebritudinem. Quod fit cum non totum arterie spacium absolvit pulsus, sed medium dumtaxat, unde sepius repetere cogitur: alioqui in magno usu cum frequens est, totum spacium peragit, crebro id repetens. Si vero maior frigiditas oborta, sit, eoque usus abunde solutus fuerit, una quidem cum eo motus etiam celeritas ita solvetur. Minor autem erit & diastole si plurimum fuerit aucta frigiditas, rarissimos quidem, non tamen & tardissimos, & minimos pulsus fieri necesse est: sed tardiores semper, & minores sufficit. Quippe virtute robusta absolute tardi, aut parvi nunquam fient, etiam si usus admodum fuerit solutus.

Itaque latitudo. Latos omnino pulsus post criticas excretionem fieri docet Galenus libro secundo de pulsum causis. Paulo post: Frequenter lati sunt ob humiditatem, & presertim cum ipsa corpora arteriarum irrigua fuerint, ut in hydrope, aliquando ob pondus, quod extrinsecus

Dubij solutio.

arterijs accidit. Id autem pondus plerunque cutis ipsius rugositas est.

Quemadmodum sublimitas. Sublimis in ira & ante crises, sci-
licet et cum natura ijs quæ molestant, expellendis incumbit.

Longus. Cum quo reliquarum duarum distantiarum quantitas
existimatur, ob tenuitatem corporis aut peculiarem magnitudinem ta-
lis efficitur. Nam aliquando motus quatuor digitis occurrit arcus
sane & gracilis adeo ut chordam tenuem representet. Siue enim uel
gracilis cuiusdam chordæ, siue ut pili occurfus appareat, ex hoc ipso
magna quedam tunica arteriarum duricies apparet.

Non enim extrema. Idem Galenus habet primo *πρόξι προγνώ-
σεως σφυγμῶν*, hisce uerbis: *ἀσφυγία κατὰ μὲν τὴν ἀλγίστην
οὐδέποτε ἐν ζῶντι σῶματι γίνεται*. Hoc est: Pulsus defectio reue-
ra quidem nunquam in corpore uiuo accidit.

Corpore emaciato. Hanc sententiam & superiorem in libello de
pulsibus quem ad candidatos inscripsit.

Vires dissoluuntur. Vide libellum iam citatum, & prognosticū.

Durum pulsum. Galenus lib. 3. de differentiis pulsuum in calce: &
1. de dignotione: Durus inquit, et uehemens esse possunt, sed nō uehe-
mentissimus, & durissimus. Vide etiam primum de præsignis pulsū.

Reliqua pituitæ uicia. Alia quæ arteriarum tunicas humiditate
multa, & præcipue pituitosa irrigant. Primo de causis ad calcem.

Rhythmus. Vide secundum Galeni librum de præsignis, & ter-
tium de causis pulsuum.

Deficientes. Alij uocant intermittentes. Fit quando facultas gra-
uatur humorum copia, & impeditur, quo minus motum conuenienti
tempore auspicietur: uel ob crassitudinem, uel copiam humorum ora
arteriarum cordi uicinarum obstruentem.

Pulsus de-
ficiens un-
de,

Coincidentes. Fiunt hi teste Galeno ob frequentiam inæqualem:
quod cor sepe functionem minus ac usus exigit, obierit. Hoc autem ip-
sum rursus fit, uel grauato corde humorum copia, uel instrumentis ob-
structis, uel coactis: quæ & deficientium causa erat. Differunt au-
tem inter se, quod coincidentes uirtutem testentur repugnantem, &
contendentem cum ijs quæ molestant. Deficientes, detrectantem id su-
bere. Coincidentes sepe crism intulerunt. Deficientes illis periculosio-
res. Vtriq; accidunt in febribus ardentibus.

Coincidēs
pulsus.

Inclinantes. Cum uirtus imbecillis erit, corpora autem arterias
ambientia, emaciata & colliquata. Multæ sunt causæ, Inflammatio
ues, scirrhi, abscessus, phymata cruda, omnis tumor præter natu.

Inclinans

COMMENTARIUS

ram, duricies squalida, frigiditas nimia. Galenus primo de causis.

Caprizans. Caprizans. Fit cum uirtus quantum ad se pertinet, naturale robur seruat, sed à motu impeditur, uel propter copiam immodicam uel obstructionem, uel instrumentorum compressionem. Vide secundum de causis pulsuum.

Dicrotus. Dicrotus. Hic & caprizans bis ferunt, sed dicrotus duritiā instrumentorum habet, & intemperiem.

Vndosus & vermiculans. Hi duo quantitate sola differunt, una species existens. Sunt autem in diuersis particulis, sed uno in pulsu, causa est, imbecillitas uirtutis, aut copia humorum, aut mollicies instrumentorum extrema: cum robur uitale arteriam nequit attollere.

IN XIII. CAPVT.

Aluus. **A**luus optima. Hoc caput partim ex prognosticorum secundo, partim ex primo de Crisibus libro Galeni sumptum est. Dixi autem aluus pro deiectione, secutus Celsum, qui libro secundo eandem fere sententiam habet. At uenter ei qui à periculo tutus est, reddit modo mollia, figurata, eodem fere tempore, quo secunda ualitudine assueuit, modo conuenientia his quæ assumuntur. Ceterum qui causas omnium uolet intelligere, commentarium supra citatum lectitet.

Leuiter ruffa. Sic interpretatus sum ὁ πύρεξ ὅν quasi dicas subruffa: hoc est, quam bilis ex iocinore leuiter tinxerit.

Conuenienter spissa. Græce est ἀμὰ τῇ προσεκόνσῃ συστάσει, quod est cum conuenienti spissitudine. Apud Galenum de Crisibus non est, quod satis in uerbo σπυγνός, hoc est, coherens, intelligatur.

σπυγνός.

Non nimis foetida. Hippocraticum esse dixit Galenus, quod Celsus aliquando interpretatus est, mali odoris, aliquando si magna foetidas odoris accessit.

Non exuccata. Hoc est: Ex qua humiditas chyli aquositasque non sit per uenas mesaraicas iecori distributa. Ut fere idem, sit quod aluus liquida aquosaque. Cum enim distributio parum absolute peragitur in uentre, excrementa liquida, tenuia & aquosa permanent, si Galeno et rationi credimus. Græca dictio est ἀχύνωτον, quam Leoniceus uir

ἀχύνωτον.
Leoniceus.

alioqui in Italia habitus maximus in re medica, uertit, humoris expers, quod quam sit ad rem, eruditi indicent. Est autem ἀχύνωτον, id quod Galenus libro octauo de compositione medicamentorum secundum locos, ἀν' ἐχύνωτον dixit, in hac nimirum sententia ὅταν μὲν οὐ βέλκεν ἐκ τῆς κοιλίας τε καὶ τῶν ἐντέρων τὴν τροφὴν ἀτονήσῃ τὸ ἥπαρ γὰρ καὶ ἀν' ἐχύνωτα ἐκκρίνεται ὅλη τῆς ἐσθίας. Hoc est: Cū igitur

ur iecur alimentum ex uentriculo & intestinis prædibilitate nequiu-
uerit attrahere, liquida, & non exuccata per sedem excernuntur &c.
Ex hisce uerbis liquet non debere accipi pro ἀχύλων, aut ἀχυλο-
ποιεῖν, sicut nonnulli interpretantur. Nam deiectio liquida, & te-
nuis esse potest, etiam si uenter pro munere suo sit functus. Necesse au-
tem est & circumpositas partes à uicio immunes esse, et distributionē
probe in iecur fieri, ut alimentum concoctum esse, ex alio iudicemus.
Ceterum ἀχυμωτον uidetur contrarium fere esse uerbo σωεσκηός.
Nam hoc tam est substantia moderatum, ut undiq; cohereat: simulq;
existat molle. Illud contrà tam liquidum ut undiquaq; diffusetur.

At mere ruffa. Iam ad tertium deiectionum genus descendit, quod
nonnihil ex recrementis à toto corpore in uentrem confluentibus: non
ex ciborum confectione iudicare potest.

Viridis æruginosæ. Aeruginosa in uentre gignitur & porracea:
aliæ bilis differentie in uenis procreantur teste Galeno in commenta-
rio de atra bile.

Animantis particularum consumptionem Græce est σωτήριον
ἐκ τῶν τοῦ ζώου μορίων, quasi dicas colliquationem animan-
tis particularum indicat: Intellige autem solidarum: quæ absolute σωτήριον
particule dicuntur.

IN XIII. CAP. VI.

VRina igitur. Ex libro primo de Crisibus omnia mutuatus est Pau-
lus. Ceterum ubi de exacte aquosa agit, Galenus fusiùs pleniusq;
persequitur. Habet autem Paulus: τὸ δὲ δὺχάτως ἀπεπτον, ὃ περ
ἐστὶ τὸ ὑδρατῶδες ἀκριβές, οἷον ἀπεγνωμλὴς πεφύως σύμπτωμα
τοῦ φλεβώδους γένους ὑπάρχον. Hoc ut interpretatus sum. Gale-
nus autem τὸ τοίνυν δὺχάτως ἀπεπτον ἑκτὸς ἀπαντα ταῦτ' ἐ-
στίν. εἴη δ' αὖ ὑδρατῶδες ἀκριβές τὸ τοιοῦτον, οὐτ' ἢ δὴ πεπτό-
μνον, ὡς τὸ βολερόν οὔτε μέλλον, ὡς τὸ μετ' ὀλίγον ἀναθολούμε-
νον, ἀλλ' οἷον ἀπεγνωσμλὴς τῆς πέφως σύμπτωμα, τὸ τοιοῦτο
τοῦ φλεβώδους γένους ὑπάρχει παρ' αὐτοῦ, οἷον ἀκριβὴς ἀπεφύ-
γαςρός. Quod ē: Itaq; extreme crudi præter has uniuersas existit. Ta-
lis autē erit exacte aquosa, ut q̄ nec modo coquatur ut turbida, nec co-
quēda est, ut quæ paulo post turbatur, uerū ut desperatæ cōcoctionis acci-
dēs. Talis uenosi generis affectus existit, qualis exacte uēris cruditas.

Urina cru-
da.

His vicina est Recenset ordine crudarum differentias, quas etiam
Galenus breuiter hunc in modum commemorat: χείριστον μὲν ἢ εἰς
ἑρὰ διαζέεσθαι, μοχθηρόν δ' ἰκανῶς καὶ τὸ λεπτὸν οὕτως καὶ λευκόν.

COMMENTARIUS

οἷον περὶ τὸ ὑδαρ. τοῦτ' ἔγγυς ἐστὶν ἕτερον οὐ ρον ἐν πολλοῖς
τῶν νόσων φαίνεται μὲν ὡς οἶνον δοκεῖν ἰκανῶς λευκοῦ καὶ λεπτοῦ
μεμιγμένῳ ἔχειν ἰδέσθαι. Quod est: Deterrima quidem in urinas pro-
fluxio. Iam uerò praua admodum est tenuis adeo & alba, qualis &
Aduerte. aqua existit. Huic autem uicina est alia urina, quæ in multis morbis
apparet: & uini albi admodum & tenuis mixtam habere speciem ui-
deatur & c. Paulus fere eadem habet, nisi quod οἶνον hoc est, uini, nul-
lam mentionem faciat. Tu igitur apud te considera, num Galeni scri-
pturam malis, an intelligere ἔγγυς ἰκανῶς τοῦ λεπτοῦ καὶ λευκοῦ,
quod est: Alteram urinam esse admodum propinquam tenui & albæ
urinae, quæ aquam representare dicebatur. Orosius locum hunc nimia
sua diligentia intactum præterijt.

Castigan-
tur græ-
ca. Tantum vero crassicie ipsam ab aquosa. In græco codice est
τοῦ ὑδατος, hoc est, ab aqua: ubi legendum sit ὑδατος, id est, ab
aquosa, nec hoc aduenterunt Aristarchi. IN XV. CAPVT.

Sputa. Sputum subflauum, subrusum. Ex eodem Galeni loco, & Orisba
sij sexto libro collecta ista uidentur. Hippocrates in prognosticon
secundo prius omnia est complexus.

Etenim præter sanguinem. Hæc periodus libro secundo progno-
sticon à Galeno sic scripta est: πλὴν γὰρ τοῦ αἵματος, ὅστις ἀν' ἀ-
κρατος ἢ μοχθηρὰν ἐνδείκνυται διάθεσιν, ἐπὶ θερμότητι φλογώδῃ
τὴν γενέσιν ἔχων, ὁ μὲν ξανθὸς, ἐξοπτωμένης αὐτῆς τ' ὁρῶν ὡδους
ὑγρότητι, ἢς ἀθιμηνυμένης ὡχρὸς ἐφαίνεται, ἢ δὲ ἰώδης ἐξ ὑπερ-
οπτήσεως ταύτης. ὁ δὲ μέλας, ἢ τοι τ' αὐτῆς ὑπερ-οπτηθείσης,
ἢ περ δὴ κακίση τε καὶ διαβρωτικώτατη γίνεται μέλαινα χολὴ ἢ
τοῦ παχέος αἵματος ὁμοίως ξηρανθέντος, ἢ λόγῳ νεκρώσεώς τε
καὶ φύξεως. Hoc est: Nam præter sanguinem quicunque syncerus humor
fuerit, prauā indicat affectionē, ex flammea caliditate trahēs originē.
Flauus sanè, serosa ipsa humiditate retorrída, qua admixta, pallidus
apparebat. Erythrosus autē, hæc nimis adusta. Niger, uel eadē supra mo-
dū adusta, quæ efficit atrabilis et pessima, et maxime erodēs, uel crasso sa-
guine similiter resiccato, uel ratione tū mortificationis, tū perfrictionis.

Cruenta igitur. Galenus loco iam citato in istum modum habet: τὰ
μὲν γὰρ αἵματ' ὡδὴ καὶ φλεγματ' ὡδὴ μέτρια, τὰ δὲ τ' ξανθῆς καὶ με-
λαίνης χολῆς, καλεπὰ διαβρωτικὰ μὲν γὰρ ἐστὶν ἀμφω τῶν σω-
μάτων, καὶ τοῦτ' αὐτοῖς κοινόν. Hoc est: Etenim cruenta et pituitosa mo-
derata: Flauæ autē, aut nigra bilis sputa difficilia. Quippe ambo cor-
pora erodūt, atque hoc ipsis est cōmune. Paulus non habet φλεγματ' ὡδὴ.

Nam si prompte excreentur. Hoc est ex Hippocrate: *ἐὰν δὲ δι-
πτεῖως ἀπύοιτο.* Galenus interpretatur dictionem διπτεῖως,
quod nos uertimus prompte, hoc patet. Το. τὸ δὲ διπτεῖως ἀπύοιτο τοῦ ῥα
δίως τε καὶ ἐτοιμῶς οἱ ἑλλανες λέγουσι. Rursus: διπτεῖως καὶ ἀνα-
γωγὴ πλέλου, τούτῃσιν ἐτοιμῇ τε καὶ ῥαδίᾳ γίγνεται, μήτ' ὁ δυνῆς
ἐχυρὰς οὐσῃς κατὰ τὸν Δωρακα.

Valde crassum. Græcus codex habet ὑπέρπαχυν quod est suberaf-
sum pro ὑπέρπαχυν, hoc est supra modum crassum, ex pituita nimium
assata nimirum. Præterijt Gemusæus.

At si expuatur quidē Codex græcus deprauatus est, habet enim
εἰ δὲ μὴ πτύοιτο μέλαν, ἀλλὰ, pro εἰ δὲ μὴ πτύοιτο μὲν, ἀλλὰ etc.

IN XVI. CAPVT.

Diaris febres. Hoc principiū sumptum est ex primo Galeni libro
ad Glauconem circa principium. Dicuntur autem ἐφήμεραι græ-
cis, quasi dicas ad diem durantes: ἀμφήμεραι autem, circa singulos
dies infestantes, quotidiane uno uerbo latinis appellantur.

Opportuni sunt ista cum sequentibus ex octauo Methodi The-
rapeutices huc translata sunt. Paulus ἐφ' ὧν αἱ ἀπὸ ῥέοιαι τοῦ σώματος
τῶ εἰσιν οὐκ ἀτμῶδες, ἀλλὰ δριμύτι καὶ οἶον καπνῶδες ἔχουσιν
etc. Galenus autē habet: ἐν οἷς ἐστὶ τὸ διαπνεόμενον οὐκ ἀτμῶδες,
οἶον περὶ ἐν τοῖς δριμύσι, ἀλλὰ δριμύτι καὶ οἶον καπνῶ-
δες παρὰ πλείον ἢ λιγύτι etc.

Lauare quidē nō subinde. Paulus græce habet λούειν μὲν μὴ πολ-
λάκις, hoc est uertit. Galenus autē οὐτε τρίβειν, οὐτε λουεῖν δέ
ὠνται πολλῶν, quod est: Neq; frictionibus, neq; balneis multis indiget.

Vehementer refrigerata. Græcus codex deprauatus est. Habet
enim ψυχρὸν τὰ δὲ αὐτὰ σφοδρῶς καταχεῖν etc. Vbi sit legen-
dum ψυχόντα δὲ αὐτὰ σφοδρῶς, ut nos etiam uertimus.

Viſtus dulcibus. Hoc est bonis. Nam bonus in corpore succus aut
sanguis, dulcis est, & dicitur: malus autem, amarus, acidus, aliq̃
ue qualitatem extraneam habere ostenditur. Perperam igitur nos cor-
ripuit Orosius, quod dulcis succi γλυκὺν χυμὸν uertit: cum idem sit
dulcis & bonus improbi sanguinis significatur. Male habet græcus co-
dex γλυκὺν εὐμὸν. Vide Galeni octauum circa principium.

Aliquos horum nutrire. Codex græcus est deprauatus habet, τοῦ
των τινὰ σφέειν, pro τούτων τινὰς τρέφειν. vide octauum Galeni
de morbis curandis. corrigenda sunt omnia exemplaria impressa.

Sed uicari quod. Plinius in Galeno hæc sententia habetur in

Castiga-
tur codex
græcus.
Emendan-
tur græ-
ca.

Diaris.

Conferun-
tur loci.

Græca ui-
ciata.

Codex
græcus ui-
ciatus.

COMMENTARIUS

Græca
emendan-
tur.

hūc μοῦν· ἄλλὰ τοῦ δ' ἑλκους ἐφ' ᾧ περ αὐτὸς ὁ βουβὼν αὐτοῖς ἦν γε-
γοιμῶν· οὗ, αὐτοῦ τε τοῦ βουβὼν· προνοήσῃ οἱ λοιοῦνται κα-
τὰ τὴν παρὰ κλῶν τοῦ γενομένου παροξυσμῶν. Hoc est: Sed ulcери
ob quod Bubo ipsis fuerit excitatus, ipsiq; buboni prospicientes in ac-
cessione declinatione lauant.

Cæterū à uino. Hæc clausula ad uerbum ex 1. ad Glauconē sumpta
est. Vbi etiā dictio πρὶν accipitur pro μεχρὶς οὗ, hoc est donec: aut sic
diccēdū: Cæterū priusquā inflammationes fuerint solutæ, arcēdi à uino
sunt ægroti. Atq; hoc pacto seruabit dictio communem significatum.

IN XVII. CAPVT.

Græca cor-
rigenda.

Putridæ febres. Hoc caput ex primo Galeni de febribus libro to-
tum transcriptum est: sed uarijs ex locis. Textus autem in græco
Pauli codice deprauatus est. Habet enim τῶν ὡδὶ σήφει πυρετῶν
διὰ γνωστὶς, τῶ μὴ δὲ τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων προηγήσασθαι,
καὶ τὸ μὴ ἀπὸ εἰγους δὲ ἀρξασθαι τὸν πυρετὸν. Hoc est: Febrīū ex
putredine cōtra. Tantiū dignotio est, quod nulla causa primitiua præcesse-
rit, et quod nō à rigore febris inceperit &c. Quæ sententia plane falsa
est. Nā propriū plane febrīū putridarū est à rigore inchoare. Oroscius
et castigator Basiliensis, clarissimi & medici, & philosophi, ut ipsi au-
dire uolunt, hæc opinor tanquā parua neglexerunt. Tu autem qui quis
ueritatem amas in hunc modum corrigit: τῶν ὡδὶ σήφει πυρετῶν
διὰ γνωστὶς τὸ μὴ δὲ προκαταρκτικῶν αἰτίων προηγήσασθαι, τὸ δὲ
ἀπὸ εἰγους ἀρξασθαι τὸν πυρετὸν, οὗτ' ἐγκάστως &c.

Nota.

Corrige
græca.

Hoc enim singulariter. In codice græco superfluum est τὸ, post
μέγιστον adde δὲ particulam. quia noua incipit oratio.

Similiter ad ipsas. Græce est ἰδίον ἐστὶ μάλιστ' αὐτῶν τοιοῦτων πυ-
ρετῶν. Galen. habet: ἰδίον δὲ ἐστὶ ἐν τοῖς μάλιστ'. Si uoles, ita legito.

IN XVIII. CAPVT.

Si vires sint validæ. Ex Galeni undecimo Methodi sumpta sunt ad
uerbum. In nono libro circa principium, ait in eundem fere modum:
Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre uenæ sectio-
nem inbebis, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum
ut excrementa descendant, uidebitur.

Putrida per urinas. Et hæc ex undecimo, sed paulo ante, mutuatus
est Paulus. Oportet enim id quod putruit, omni ratione uacuare, quod
reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exa-
ctam symmetriam reducere &c.

Si vero febris magnitudo. Galenus addit ad planiorem intel-

lectum, ut in continuis. Hæ enim magis hominem affligunt, quàm intermittentes.

Vires inualidæ. Græcus codex Pauli habet καὶ τῶν δυνάμεων ἰσχυρῶν. Hoc est: Et vires ualidæ, cum sit legendum καὶ τῶν δυνάμεων ἰσχυρῶν. Hoc est: Et vires non ualidæ. Præterijt hoc Gemusæus. Textus græcus ulciatus.

IN XIX. CAPVT.

Tertiana febris cum sit. Ex secundo libro de crisi bus, capite tertio hoc transcriptum est iisdem plane uerbis. Caterum Galenus post illa, in hanc quoq; sententiam habet: τὸν οὖν ἀκριβῆ τριτοῦ οὐκ ἐνδέχεται μὴ οὐ μετὰ εἴγους σφοδροῦ γινέσθαι. Quam orationem Leoniceus uertit. Tertianam itaque febrem, fieri contingit sine rigore uehementi &c. Cum sit dicendum: Exactam itaque tertianam non licet nisi cum rigore uehementi fieri. Leoniceus error.

IN XX. CAPVT.

Exquisitam tertianam. Ex primo ad Glauconem hæc Paulus transcripsit. Nonnihil autem à Galeno uariet, breuitate sermonis intelligo, quæ tamen sensum nonnihil obscurum reddit. Verba ad Glauconem ita habent: προτρέπιν οὐα χερὶ τὸν μὲν εἰς τὴν γαστέρα συρρέοντα κενούει δι' ἐμέτων. τὸν δὲ κάτω ὑπὸντα ὡς πάντως διὰ τῆς κάτω ἐκκρίσεως. Quod est: Humorem itaque in uentriculum confluentē, per euomitiones euacuare oportet: inferius autē descendente similiter per internā excretionē. Paulus autē in istum modū: καὶ τὸ μὲν εἰς γαστέρα συρρέον, κενούει δι' ἐμέτων τε καὶ κάτω. Hoc est: Et quod sane in uentrem confluit, euacuare per uomitum, & inferna &c. In Galeni uerbis γαστήρ pro uentriculo: apud Paulum pro toto uentre positum esse existimandum, si concordēs alioqui intelligas. Conferuntur loci.

Vinis autem admodum vetustis Lectio in codice impresso plane mutila & deprauata est. Habet enim ἀπέχειν δὲ μέλιτος, καὶ νάπυος καὶ τρεῖς, καὶ τῶν φύσει θερμῶν ταῦτα μὲν ὑπὸ παλαιῶν. Ex Galeno et Oribasio legendū. ἀπέχειν δὲ μέλιτος τε καὶ νάπυος, καὶ τρεῖς, καὶ τῶν εἰσμένων πάντων, καὶ οἶνον δὲ τῶν φύσει θερμῶν, καὶ παλαιῶν ἰκανῶς. &c. Atq; sic nos reddidimus latina: In priore enim lectione nulla uel acrium, uel uini facta est mentio. Orosius & castigator Basiliensis non aduertierunt.

IN XXI. CAPVT.

I Auare in tertianis spurij. Hæc quoq; ex eodem loco sunt hæc translata. Difficilis autem tibi in græco exemplari desideratur. Lege igitur: ἀλλὰ τινὲς τοῦ τμητικότερον. Quod ceu paruum Aristar-

COMMENTARIUS

chi nostri contempserunt.

IN XXII. CAPVT.

Quartana. Ex primo etiam ad Glauconem & sexto Oribasij hæc sumpta sunt. De rigore autem quartanæ febris, Galenus cum alibi, tum in libello de tremore & palpitatione inquit: τὸ δὲ τῶν τεταρταίων οἱ περιεχέοντες ἀχρεὶ καὶ τῶν ὁσίων φασὶ δῖναι, ὅταν ἡ σφοδρὴν. Hoc est: Rigorem quartanarum qui experti sunt, etiam ad ossa usque penetrare affirmant, cum uehemens fuerit.

Nec bilis vomitus. Sed pituitæ intelligas, comitatur etiam lienis inflammatio, tumor, interim fastidium, intensa interim cupiditas.

Pulsus exiguus ac rarus. In hac febre inæqualitas pulsuum in uno ictu manifestissima deprehenditur. Multo enim uelocius principium motus finemque inuenies quam medium.

IN XXIII. CAPVT.

Quartana. Ad uerbum omnia ex Galeni libro iam sæpius nominato, compendiose transcripsit. Quanquam id antea fecerit Oribasius libro sexto.

Castigatur codex græcus. Qui refrigerant corpus siccantque. In græco codice erat ὑγρύνωνται, hoc est, humectantur, pro ξηραίνονται quod est, siccantur. Miror tam apertum uicium iudices nostros adeo oculatos non deprehendisse.

Restitutus codex græcus. Tum per dies aliquot. Male est in exemplari græco δι' ἡμερῶν τριῶν. Quod est: Per dies tres, pro δι' ἡμερῶν τινῶν. Id est: Per dies aliquot. Basiliensis corrector hoc quoque neglexit.

Quod succum Cyrenaicum. Galenus hoc medicamentum maxime etiam commendat libello de Tremore, seu ad rigorem, quartanosque circuitus, utilissimum.

IN XXIII. CAPVT.

Quotidianæ. Ex quinto capite secundi libri de crisi excerpta sunt. At Galenus libello de Typis, latius accidentia enumerat in hunc modum: ἀμφιμερῶν δὲ παρέπεται ὑγρότης ἑξῆς, καὶ φλέγμα τῶνδε ἔμετοι, καὶ δ' αἷμα οὐκ ἐπιτεταμένον, καὶ βαρυσμός τοῦ σώματος ὅλου καὶ ὑπὸ καρώδης, καὶ καταφρενὸς καὶ σφυγμὸς μέγας, καὶ ὄρεξις, καὶ χῆλον τὸ πρόσωπον ὑποπέλιον, καὶ χῆλον, καὶ πεπονῶδες, καὶ πόλλιν ἐμφαῖνον τινὶ τῆς καχεξίας, καὶ τρεπλὴν &c. Hoc est, ut ignari linguarum intelligant: Quotidianam uero comitatur habitudinis humiditas, uomitus pituitosi, sitis non intensa, grauitas totius corporis, somnus soporosus, ueternosusque, pulsus magnus, rarus, laxus, facies subliuida laxa, peronum mo-

do tumida, quæ magnâ materie prauitatem, et mutationē representet.

Aquosiora. Galenus addit lib. iam citato: ἢ φλεγματικώτερα, est, pituitosiora. quæ ipsam febris causam ostendunt.

IN XXV. CAPVT.

Quotidianam curantes. Ex primo ad Glauconem libr. Galeni Paulus hæc descripsit.

Oxymelite. Simplici intelligendum, ut quod omnes incatus artos aperiat, ne crassus alibi humor, uel glutinosus adhærescat. Conuenit autem cum ætatibus, tum naturis uniuersis.

Primis diebus. Græce est κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας. Male autem in Galeno ad Glauconem μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας habetur, Galeni locus castigatus. quod etiam castigator Basiliensis non mutauit.

Ventriculi. Sic uerit γαστρός, quæ diēlio nunc pro uentriculo, nunc pro toto uentre accipitur. Galenus libello de typis febrium ait: σωίσαται δὲ μάλιθα ὑδισομάχῳ κακοπραγούτι. Quod est: Constituitur autē potissimum ob stomachum male affectū. Propterea Paulus recte dixit uentriculi, & oris ipsius rationem esse habendam, quanquam accidat interim, ut in hac febre etiam lien scyrrhum contrahat. γαστήρ.

Idq; tam diu, quàm. Græce est: κατὰ πολὺ ἕως οὗ πάνθ᾽. Hoc paulo iecus sonat, quàm reddiderim. Galenus non habet: Eoq; multi, à quodam alio quàm Paulo fuisse adiectum putant. Nota.

IN XXVI. CAPVT.

Si vitrea pituita. Ex Oribasij sexto sumptum est. Vitrea autem pituita à Galeno libro secundo, de febrium differentiis explicatur, in hunc modum: ὑαλώδης δὲ μοι δοκεῖ προσαγορεῖν ὃν προαγορεύει τὸν χυμὸν τοῦτον, οἱ νεώτεροι δὲ ὧν ἐστὶ καὶ φίλιππος ὁ μόνον ἀπλῶς. Item in commentario de Tremore in hanc sententiam: οὐ μόνον δ' ὑδὶ τῆς ξανθῆς ἢ μελαίνης χολῆς εἶναι, ἀλλὰ καὶ ὑδὶ τῷ ψυχρῷ φλέγματι φίλῃ γίνεσθαι. καλεῖ δὲ ὑαλώδης τὸν χυμὸν τοῦτον ὃν προαγορεύει, &c. Hoc est: Non solum autem ob flauam, aut nigram bilem rigor, sed etiam ob frigidam ualde pituitam fieri solet, uocat autem humorem hunc Praxagoras, uitreum. Subiungit autem: Verum hic rigor non adeo uehemens est: quanquam pluribus nonnunquam diebus subsequētib; perseneret.

IN XXVII. CAPVT.

Continentes. Ex sexto capite libri secundi de Crisibus excerpta sunt. Interpretatus autem sum hic febres continentes, quas Græci συνεχεῖς appellant: continuas autem, quas σιωχόνες. In Latini σιωχός.

COMMENTARIUS

na quoq; lingua duas uoces usurpamus. Cæterum Galenus intelligit cōtinentes, quarum materia in uasis subsistit: ubi enim ea per totum corpus delata fuerit, intermittentes appellatæ fiunt.

ὀξύτης. Acumine. Græce est ὀξύτης. Nam ut ὀξύς acutus morbus dicitur, ita deriuatiuum ipsius ὀξύτης, acumen, celeritas, aut præcipitantia, aut quocunq; modo libet appellare.

IN XXVIII. CAPVT.

Restitui-
tur co-
dex.

Continuarum. Vide nonum Methodi, & sextum Oribasij. Per continuas autem hic intelligo πυρεθών, qui ex sanguine potissimum constituntur. Male in Græco codice legitur τὸν πυρεθών pro πυρεθών. Neglexit hoc Gemusæus. Nam πυρεθών uocabulum generale de omnibus febribus ex quocunq; humore cōtinue affligentibus, πυρεθών autem de febre ex sanguine uel putrido, uel effruescente usurpatur. Barbari hanc foeminino genere synocham nominarunt.

Emendan-
tur Græ-
ca.

In uigesimo nono capite codex Græcus habet παχέα pro τραχέα. Non enim crassa lingua, sed aspera, uel scabra dicendum est, hoc in loco, quod castigato Basiliensis in codice suo alioqui emendato non aduertit. Cæterum caput hoc & inferius ex sexto Oribasij descriptum est. Præcipit autem ardenti febre laborantes non sola aqua, sed mulsa aquosa nutriendos esse. Cuius rationem Galenus in commentario Hippocratis de morbis acutis: Aqua, scribens, natura frigida, tam de penetrat, & quam plurimo tempore in præcordijs subsistens, in acutis morbis corrumpitur: mel bilefcit, ob id mulsa aquosa dari debet: ut aqua nulla in superiore uentre facta mora à melie mixto ad distributionem trahatur. Non autem aqua cruda, sed cocta esse debet.

διαιτῶν.

Sustinere. Ita sum interpretatus διατῶν, hoc est, nutrire, alere. Celsus ait, cremore ptisanæ sustentandi sunt. Atq; hoc loco proprie dicendum est, Sustinere. Quia tantum cibi hic porrigitur, quantum uiribus sustinendis sufficit.

IN XXXII. CAPVT.

Aduerte.

Dvplex hecticarum. Galenus libro primo de febrium differentiis, Oribasius sexto eadem plane habent. Leonicens & Laurentianus parum recte in translatione Latina se gerunt. Quid autem sibi uelit Orosius interpretando ἡ μὲν οὐ σὺν σὺν, uel etiam si humiditatis aliquid continuum permaneat, eruditi iudicent. Cum melius dixisset, uel etiam madore adhuc copioso, aut multo permanente. Nam σὺν non tantum πυρεθὼς significat, si Hesichio credimus, sed etiam πολύς. Præterea sensus hunc significatum requirebat. Cæterum

Hætica dicitur, quod stabilis sit, ac solutu contumax, uel quod totum corporis habitum occupet.

IN XXXIII. CAPVT.

Hætica febre. Vide Galenum libro decimo Methodi medendi: ubi paulo manifestius curationem hæticarum persequitur.

Moderato. Græcus codex habet aduerbium μεμετρημενως, quasi μεμετρη-
dicas mensuraliter. Nam Gal. 10. magnam curam habendam esse di-
cit mensura, frigide febricitantibus exhibenda.

IN XXXIIII. CAPVT.

Quandoquidem tertiana. Hæc Galenus in secundo fere de febriū
differentijs, Oribasius in sexto tradidit. Ceterum nomencla-
tura rationem in libello de Typis interpretatur. Est autem semitertia-
na triplex: Parua, media, & magna. Parua uiginti quatuor horas ab-
soluit. Media triginta sex. Magna quadraginta octo, atque continue
proxima est. Porro ætati mediæ accidit, & tempore potius autumnii,
cum etiam ualde periculosa est, non solum Stomachum, sed etiam ner-
uosam partem, & ut summatim dicam, media attingens.

IN XXXV. CAPVT.

Publicæ grassantes. Vide Oribasij sextum, Hippocratem in com-
mentario τῶν ἐπιδημιῶν, & de natura hominis. Ceterum mor-
bos publice grassantes uoco, quos Paulus πανδημούς & κοινούς sua
lingua appellat. Opportunum autem hic est explicare, quos nam Græci
ἐπιδήμους, ἐνδήμους, ἀποράδας, πανδημούς, nominant. Galenus ita
quæ commentario primo in primum ἐπιδημιῶν in hunc modum scrip-
tum reliquit: μεμνῆσθαι χρὴ τούτων εἰς τὰ μέλλοντα λέγεσθαι γι-
νώσκειν, ὡς ἐνία μὲν τῶν νοσημάτων κοινῇ πολλοὺς καταλαμ-
βαίνει, ἃ δὲ λέγεται κοινά. Hoc est: Meminisse conuenit horū ad ea
quæ post dicentur, sciendumq; nonnullos sane morbos communiter
multos corripere: qui sane uocantur communes. Statim subdit: τῶν
δὲ κοινῶν τὰ μὲν ἐνδήμια εἰσι, τὰ δὲ ἐπιδημῖα καὶ ἐπιδημῖα.
τούτων δὲ τὰ χαλεπώτατα λοιμώδη καλεῖται. Id est: Ex commu-
nibus alij uernaculi sunt, alij aliunde in populum ingruunt. Horū peri-
culosissimi, pestilenciales appellantur. Item ἐνία δ' ἕκασον ἰδίᾳ τὰ
ἀποράδικα προσαγορεύει μάλιστα. Nonnulli singulos priuatim inuaden-
tes dispersi, ac erratici nuncupantur. Paulo supra: δὴλον οὖν ὡς ἐκ
τοῦ γένους τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων ὅσα κακοκτενέστατα γίνονται
λοιμώδη καλεῖται. τὸ δὲ τῶν ἐπιδημιῶν ἐκ τοῦ τῶν πανδημῶν τε
καὶ παγκοίνων γένους εἶναι ὅ τῶν ἀποράδεσι νόσοις ἀντιδιακρίνεται.

COMMENTARIUS

Hoc est : Itaq; constat ex popularium morborum genere eos esse, qui malignissimi generantur, & pestilenciales dicuntur. Populares autem illorum genere comprehendendi, qui undiquaq; , & communiter in omnes grassantur. Quod genus morbis priuatum, & inter se dissimilibus opponitur. Habes fere omnium appellationes explicatas: quo autem dilucidi or fiat interpretatio pauca ex primo Hippocratis de uictus ratione in morbis acutis subiiciam. Verba sunt Galeni in commentario primo: *δυνολὶ δὲ ὅλγα τοῦ λόγου τοῦτον, τὰ μὲν τινὰ πολλὰ γίνεσθαι νοσήματα καὶ ἕνα χεῖρον, ὅπερ ὅταν μὲν ὁ λέθρεια γένηται, λοιμὸν ὀνομάζουσιν, ὅταν δὲ ἐπιεικέστερα, ἑτέρα τινὶ προσηγορίᾳ δηλοῦσιν, ἐπιδήματα καλοῦντες, ὥς ἐστιν αὐτὸ μὲν ἐπιδήματι νόσημα τὸ κατὰ χρόνον τινὰ πλεονάσαν ἐν τινὶ χωρίῳ, τὸν δὲ λοιμὸν ἐπιδήματι ὁ λέθρεια. ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλο γένος νοσημάτων κοινὸν πολλοῖς ὁπερ ἐστὶ τὸ κατὰ χώραν ἐπιγινώσκον, τὰ ἐνδήματα καλοῦνται. τούτοις δὲ αὐτίκην πᾶσιν αἱ ἀποράδες νόσοι, διαφερόντως ἐνοχλῶσαι τὰς νοσοῦντας οὐ κατὰ τὸν κοινὸν τῷ πονοῦντι μὲν αἱ.* Hoc est: Indicat autē in hac oratione, multos sane quosdā morbos uno tēpore fieri, quos, cū perniciosi fuerint, pestilentia nominant: cū mitiores, alia quadā appellatione significant populares aut uulgares nuncupantes. Vt popularis quidē morbus sit, qui certo tēpore in regione quadā dominatur. Pestilentiam uero morbum populare perniciosum. Iam uero aliud quoque morborū genus est, multis commune, quod ex loci natura superuenit, uernaculum appellatur. His autē omnibus opponitur, priuati morbi, diuersa ratione egrotos infestantes, nō communi modo cōsistui &c. Haecenus Galenus noster: cuius sententiam ita interpretor. Morbi qui undiquaq; populatim, nullo nō tempore anni grassantur, nulliq; nec sexui, nec aetati, nec corporis statui parcunt, πανδημούς, & παγκοινούς appellant Græci, ex aere infecto trahunt originē. Qui autē certo tēpore in regione quadam publicē dominantur, ἐπιδήμιοι, quasi dicas populares, aut uulgares nuncupant, similiter ex aere, aquae uiciate potu, stagnorum, paludumq; graui halitu procreantur. Qui autē in perpetuo in regione quadam in crudeſcunt, ἐνδήμιοι Græci, patrios nostri & uernaculos nominant, simili fere ex causa oriuntur. Porro fit interdum, ut morbus regioni peculiaris, & generalis uno tempore simul inuadant, pro aeris, aliarumq; circumſtantiarum ratione. At morbi priuati cuiq; inter se dissimiles, ἀποράδας uocauit Hippocrates, ex uictus ratione trahunt originem.

Cibi communes

Cibiq; igitur communes. Non solum aer teste Galeno commu-

nes morbos efficit. Siquidem qui in Aeno dum fames grassaretur, leguminibus uescebantur, crurum impotentes euaserunt. Item qui Eruo genuum dolore cruciabantur. Nouimus autem nonnullos, qui etiam triticum semiputridum fame coacti ederunt, in communem incidisse morbum ex causa communi. Et alibi exercitum totum praua usum aqua similiter in omnibus militibus noxam sensisse.

Afflictiones corporis. Cum Hippocrates dicit alios morbos ex uitu procreari, intelligit etiā uitae studia. Nempe exercitia, otium, uigilias, tristitiam, iram, perfrictionem, insolationem, balnea quoque non suo tempore usurpata, morbos excitare saltem ratione secundaria.

Hæc quidem non. Græcus habet: ταῦτα μὴ οὐκ, quod sonat: Castigandus Græcus. Hæc quidem igitur. Verum mea sententia legendum uidetur ταῦτα μὴ οὐκ, negatur, id quod tum autoritate Oribasij, tum ipsa ratione probare possum. In primis enim Oribasius sexto libro hanc lectionem confirmat: deinde in eodem capite statim Paulus dicit: Si quidem in alias causas nec omnes simul incidimus, neque eis toto die immoramur: aer autem quoniam omnibus circumfusus est, & inspiratu attrahitur, ut animalium quoque corpora afficiat, est necesse. Non dico quod Galenus primo commentario in Hippocrates Epidemia, unde ista partim sunt excerpta, in hunc modum habeat: τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐδεσμάτων ἢ πομάτων ἀσθένειαι εἰσι. Hoc est: Qui autem ex cibo aut potu sunt, rari sunt &c. Gemusæus noster uituperandi studio, damnat hanc meam lectionem, nullam adferens uel autoritatem uel rationem. Quis amabo ignorat populares morbos continenter quidem ex aere procreari, aliunde autem rari? Sed inquit Gemusæus, ex euaporatione lacuum frequentius accidere: cui in hoc respondeo, nullum uel stagnum, uel paludem morbum communem generare, nisi τῷ βλάπτει τὸν ἄερα, ut ait Galenus. Aer autem ipse uel calidior, uel frigidior, humidior ne sæpe nobis circumdatur. Quare etiam is morbos potius, quàm Sole paludum uaporationes, efficit. Quæ ut dixi, nunquam corpora humana afficiunt, nisi prius aerem ipsum corruerint. At rursus obijciat Gemusæus Galeni sententiam commentario secundo in libellum de natura humana, uerba hæc sunt: πολλάκις μὴ καὶ ἀνθυμιάσεις τινὲς ἐξ ἐλαῶν ἢ λιμνῶν, ἢ τελεμάτων, ἢ γῆς τοιαύτης αἰτίας γίνονται τῶν τοιούτων νοσημάτων. Hic dico Galenum uelle indicare non solum ex aere intemperato huiusmodi morbos procreari, quod Hippocrates uidetur innuere, sed etiam ex aere, euaporationibus paludum infecto. Non

Castigandus Græcus.

Gemusæus natura medicus.

COMMENTARIUS

tamen negat ex aere frequentius contrahi. Ad hæc omnia, ex oratione Pauli opinionem meam possum astruere. Nam conferens ille aerem cū alijs omnibus supra nominatis causis, raro nos omnes simul in eas incidere pronunciat: non autem fieri posse, ut aeris usum effugiamus. Adde quod aeris tantum remedia enumeret, ubi intemperies aliqua subesse videtur, reliquarum causarum, non item. Vide ergo candide lector, quid faciat procliuis hominum quorundam ad maledicendum natura.

Præterea lignorum. Galenus hoc etiam confirmat libro de Theriaca ad Pisonem in eam sententiam: *διόπερ ἐπαινῶ καὶ τῶν θαυμασιωτάτων ἱπποκράτῳ ὅτι τὸν λοιμὸν ἐκείνον τὸν ἐκ τῆς αἰθιοπίας εἰς τοὺς ἑλλήνας φθάσαντα οὐκ ἄλλως ἐδεῖ ἀπὸ σεν, ἀλλ' ἢ τρεῖς τὸν αἶρα καὶ ἄλλοιῶσας, ἵνα μὴ κέ τοι τοιοῦτο ὦν αἶα πνέηται κελεύσας· οἱ αἶα τῷ πόλιν ὁλλῶ ἐξάπτεσθαι τὸ πῦρ, οὐχ ἅπλῳ τῆς αἰαί φεως τῷ ὕλῳ ἔχον, ἀλλὰ σφοδαίοντε καὶ τῶν αἰθῶν τὰ δυνάμειά, τοιαῦτα σωεβδύσειν εἶναι τὸ πῦρ τῷ τροφῷ, καὶ ἐπισπένδειν αὐτῷ τῶν μυρῶν λιπαρώτατα, καὶ ἡδῆσαν τῷ ὀσμῷ ἔχοντα ἵνα οὕτω καθαρὸν γενόμενον οἱ ἀνθρώποι αἶα πνέσωσιν εἰς τῷ ἀπαλλαγῇ τὸν αἶρα.* Quod olim sic Latine reddidimus: *Quamobrè etiā Hippocratē illū, multis admirā dū laudo, qui luem illā pestilentie ex Aethiopia Græcos inuadentē, nō aliter curauerit, quā aerē mutādo, alterādōq; ne talis amplius inspiraretur. Cū igitur ignem p totā Athenarū urbē incendi iussisset, nō simplicē lignorū materiā, uerū ferta, floresq; suauissimos, fomitē ipsius esse consuluit, unguentaq; pinguisima, & odorisera ipsis superfundi, ut aerem purum hoc modo redditum homines in mali subsidium inspirarent.*

IN XXXVI. CAPVT.

NAres destillant. Galenus in commentario Prorethetici Hippocratis scriptum reliquit: *ἀπὸ σῶν δ' οὐ σῶν τῶν ἀπὸ εἰνὸς σάξεων χαλεπῶν ὅταν παχέαι καὶ μέλαινα ἀπόσταξαι, ταύτας ὀλεβριεῖ τάτας δρεῖσεις.* Id est: Cum autem omnes è nare stillationes sint periculose, cum crasse, & nigre fuerint, has perniciosissimas reperiēs.

Venter colliquata. ἡ γὰρ τὰς σλωτήξεις habet græcus codex. Est autem σλωτήξεις colliquatio, consumptioq; nempe cum particulis quotidie aliquid decedit, nec alimentum recipiunt. Plinius libro uigesimo secundo, cap. uicesimo quinto hac uoce utitur, Tali, inquit, s, forbitionis genere emendantur syntexes, hinc syntectici eodem autore dicuntur. Licebit igitur interpretari hanc sententiam, uenter Tabida, & quæ ex ipsius substantia decesserunt, humore undiquaq; in ipsum con-

Nota.

τάξαι.

fluente, emittit. partim uomitu, partim inferius.

Aloes partes duæ. Hæc est descriptio pillularum communium: quæ in Nicolao illo præposito uiciosa & deprauata habetur. Nam is ponit aloes uncias duas, croci & myrrhæ utriusq; unciã unã, in peste addendum consuluit, bolum armenũ. Primum uetus scriptura croci nõ meminit, deinde thymiamatis ammoniaci, non boli armeni unciã præcipit. Id genus permulta monstra in officinis nostris pertinaciter regnant.

Theriacen ex viperis. Hoc etiam Galenus libro de Theriaca ad Pisonem confirmat in eum modum: τὸν αὐτὸν τρόπον νομίζω καὶ τὴν θηριακὴν, ὥσπερ τι καὶ αὐτὴν οὐσαν πῦρ καθ' ὅσον, τοῦ μὲν προπίνοντος αὐτῇ ἐν τῇ λοιμικῇ καταστάσει, μηδ' ὅλως ἐαυτῷ ἐλίσκεισθαι τῇ κακῇ. τοὺς δὲ ἡδὴ φθίσαντας παθεῖν ἐξαῖσθαι δυνάσθαι, ἀλλοιοῦσθαι, καὶ τρέπουσθαι τὴν τοῦ ἀναπνέοντος ἀέρος πονηρίαν &c. Hoc est: Simili modo Theriacen, cui ipsa quoque ignis quidã purgatorius existat, præsumentes in pestifero aeris statu, neutiquam malo corripi sinere nouimus. Correptis autẽ mederi posse, aeris inspirati maliciam in alterando mutandoq;. In Galeni codice græco qui Basileæ nuper impressus est perperam legitur ἀναπλάδεντῷ ἀέρι. Quasi dicas: Aeris reformati, positũ est p ἀναπλάδεντῷ. Quod est, inspirati. Nã qui correpti peste sunt, malũ aerem attraxerũt respiratu, non reformatũ aut refectionẽ, aut quomodocunq; dicere libeat.

Catapo-
tra.

Codex
græcus
uiciosus.

IN XXXVII. CAPVT.

Nonnulli febricitare. Galenus lib. 12. omnia hæc ad uerbũ habet. Variat aut nonnihil lectio græcorũ codicum. Galeni habet ἐν ὀγκῳ τε μέζονι τοῦ κατὰ φύσιν ὅλον τὸ σῶμα ἐστὶν ἡ χροιά τοῖς μὲν &c. Hoc est: Et totũ corpus uastiore mole quã pro nature modo cernitur, & color &c. Pauli τὸ σῶμα τ' γαστρός, quod est, os uentri culi uastiore mole cernitur. Mea sententiã cũ Galeno legendũ esse censeo.

Nota co-
dicum u-
rietatem.

Vt pote quos. Apud Paulum impressum est οἱ δὲ καὶ χωρὶς τῶν τῶν, pro εἶνε καὶ &c. Sic etiam Galeni exemplaria omnia habent. Nam ratio datur cur missionem sanguinis, aut purgationem non sustineant. Signat igitur hoc loco, si quidem, dictio εἶνε. Præterijt Orosius, castigator Basiliensis neglexit.

Corrige
græca.

Sin autem robore mediocri. Galenus, si autem pulsus mediocri robore sit, & magnitudine, paulum ad egrotantem refert, cuius tamẽ uires ex pulsu cognoscuntur.

Ergo si æstas. Galenus non habet, καὶ θερμὸς, quod ego interpretatus sum, calidi temperamenti. Non enim referri potest ad θερμὸς,

C O M M E N T A R I V S

ut Grammatista putat.

Balneum his aduersissimum Galenus addit, et aer ambiens uel nimium calidus, uel frigidus.

I N X X X V I I I . C A P V T .

Qui tenuium humorum. Ex eodem loco Galeni, & 6. libro Oris-
basy transcripsit. Dicit autem paulatim & continue alen-
dos huiusmodi humoribus laborantes: praeterea fructus, quos ὁ πῶρος
græci nominant, exhibendos. Supra uerti poma, quod nihil refert. Nam
fugaces seu horarios, seu tempestiuos, ὁρῶνους græci appellant. Hoc re-
Historia. medium olim Lutetiae in quodam adolescente continua febris laborante
sum expertus salutare. Nam quoties ille uel aluum deicere, uel urinam
reddere extra lectum uolebat, aut etiam quoties pedibus tantillum con-
sistere, aut in sella, quousq; ei lectulus sterneretur sedere, in sincopen so-
lebat incidere: ac uidentes hoc aliquot medici, de salute minus sperare
coeperunt. Ego uidens iuuenem natura biliosum, tenuiq; sanguine præ-
ditum, cogitavi illi quoquo modo uirium dissipationem impedire: ac sta-
tim quum è lecto in sedem esset collocatus, porrexi ei uiam recentem
nondum exacte maturam: nam initio Augusti accidit morbus: qua as-
sumpta, paulatim per dimidiam horam seruaui hominem extra lectum
citra animi defectionem, quod feliciter successisse animaduertens se-
quenti die idem facere decreui: exhibitaq; paulo maiore portione, ad
unam usque horam sine ullo incommodo ut prius seruaui. Factumq;
est tandem diebus infecutis, ut tuto iam extra lectum in cubiculo
obambulet, daretq; occasionem reliqua auxilia exhibendi. Hoc te
nolui celare lector.

I N X X X I X . C A P V T .

Reliquæ occasiones. Ex eodem Galeni loco sumpta hæc sunt ad-
uerbum. Enumerat autem Paulus syncopæ causas, dolorem uehe-
mentem, siue ex intemperie, siue humoribus, siue utrisque: uel etiam
ex continui diuortio ortum, uigilias nocte dieq; affligentes, nam so-
mno mediocri uires recreantur, immodica inanitio aut per uentrem,
aut uomitu, aut sudoribus, aut urina, aut sanguinis profluuio. Ac in
ijs qui aliena loquuntur, hoc est, qui mente non constant, qui delirant,
desipiuntq; Nam παρὰ πᾶν uerbum signat παρὰ φρονῶσαι, ἄλ-
λοφᾶσαι, cerebro scilicet affecto, adeo ut functiones suas peculiare,
σῶσαι. nequeat edere. In ijs motus quandoque corporis fiat, uires collabi ne-
cessè est. Ad quas conseruandas, & ad syncopen uitandam singulare
est præsidium, temperamenti custodia. Ante omnia uero trium princ-

piorum: mox reliquarum partium, quaecunq; illa in consortium affectus principia secum ex facili trahunt.

IN XL. CAPVT.

ITaque dolor. Hæc magna ex parte Galenus in secundo de locis affectis habet. Reliqua in duodecimo Methodi medendi.

Dolor stupidus. Græce est ἡ μὴ ναρκώδης ὁδὴν δὲ ψυχρὰν ναρκώ-
γινεται διὰ θεσιν. Quod interpretatus sum ad uerbum in Paulo. Galenus libro iā citato ait. καὶ τοίνυν τὸ ναρκώδες ἄλγος διὰ θεσιν ὁδὴν. ἔργάζεται ψυχρὰν τε, ἀμὰ καὶ ὁδὴν, quod est. Itaq; stupidus dolor affectionem frigidam simul et dolorificam parit. Aduerte lector, Paulus hic dolorem ut affectum, Galenus ut affectus causam interpretatur. Verum sequentia in oratione Galeni eos conciliant. Nam stupor, inquit, frigiditas quædam est non exigua, eoq; membris hac occupatis difficilem & motum, & sensum parit, atq; ita stupidus dolor, non indicat doloris speciem, uerum dolorem simul & uel affectionem frigidam, uel difficultatem sensus motusq; ab ea particula obortam. Ceterum non solum in neruis, sed alijs omnibus partibus accidit.

Pulsatilis autē dolor. Græce dicitur σφυγμώδης, et σφυγματώδης πόνος, quasi interpretaris, pulsorius, et pulsatilis labor, uel doloris signum πόνος inflammationis proprius, arteriarum quidem semper, primario affectu, σφυγμώδης aliorum uero corporum sensilium omnium, consortij lege. Ceterum uocem græcā πόνος Galenus sit exponit: ὁ γὰρ τοι πόνος αἰσθησις ἐστὶν αἰσθη-
ρὰ, καθάπερ ἡ ἡδονὴ προσλήψις αἰσθησις. Hoc est: Siquidē dolor, sensus est molestus, sicut uoluptas est sensus suauis, quod Cicero eleganter dixit. Omne id quo gaudemus, uoluptas est, quo offendimur, dolor.

Sin autem tanquam à palo. Colicorum dolor est, qui in imo uentris ea potissimum parte urget, qua urinary meatus ex renibus ad uescicā ex-
porriguntur. Atq; hinc non ita ex facili discerni à nephritide potest. Colicus dolor.

Punctorius autē. Galen habet. ἀρξόμεθ' οὖν ἀπὸ τοῦ πον-
γματώδους ὀνόμαζομεν σπασμὸν πόνου τοῦ ἐν μίαις μάλι-
στα, οἷον ῥίζης τοῦ πάδους κατὰ τὸν πόνου δοκοῦν ἐρηισμὸν μίαις
ἐκτενομίας δ' ἐπὶ πλεονὲν κύκλῳ ὑπὸ τοῦ τοῦ ὁδὴν. Hoc est, ut Corpus noster uertit: Igitur iterum incipiamus à punctorio uocato dolore, ac uidetur quidē ueluti ipsius affectus inter pungendum circa membranas potissimum uerū dolor circa locū punctū ad magnum spacium extenditur. Nos autē, pace illius dictum sit, in hunc modum uertendum putamus. Incipiemus itaq; rursus à punctorio dolore dicto, circa membranas potissimum constituto, cuius affectus ueluti radix in eo quod pun-

COMMENTARIUS

gi uidetur defixa est, dolor autem longius orbiculatim ad id extenditur &c. In pleuritide hunc dolorem esse nemo ignorat, acri humore membranam costas succingentem pungente.

Pertundens.

Pertūdēns, vehemētissimis. Hic dolor græcis dicitur διαίσσων, quod idem est, ac si dicas διαγμῶν, id est, cum impetu perrumpens. Corpus uertit turgidus dolor, qua ratione, ignoro. Certe in Cephalæa, caluaria ipsa perrumpi, pertundi ue dolentibus uidetur. Id autem tunc accidit, quando ueluti à radice incipiens, ad uicina transit, ut ait Galenus.

Viciarium exemplar.

Membrana quidem. In græco codice deest μὴ particula. Legendum enim ὁ μὴ ἄπο τῆ δέ γματι, ut respondeat sequenti, ὁ δέ, quod omnes nostri Aristarchi non aduerterunt. Nec impressum exemplar à Gemuseo castigatum habet. Cæterum membrana cuti subiecta que sit, audi. Continentur ea cute & corporibus subiectis per fibrarum tela modo subtilium traductus: quam uenæ cutem nutriendes & nerui sensum communicantes permeant.

Viciosus codex.

Diuellentes cruciatus. Impressa omnia exemplaria habent οἷον διασωμὴν pro διασωμὴν οὖς: quanquam Oroscius hoc & castigator Basiliensis non annotarint.

Profundi sunt. Hoc est in alto delitescentes, unde quibusdam ὁσὶ κοποὶ quasi osium dolores appellantur.

Si igitur sanguinis sit copia. Ex 12. Methodi medendi Galeni, & 6. Oribasii sequentia sunt transcripta.

Auxiliantes. Miror cur Gemuseus hūc locū deprauatū reliquerit in suo codice, cū plane ad sensum nihil faciat dictio προσλιπαροῦ-

Castigatur græci codicis lectio.

τῶν, lege igit προσβονβάντες ex Galēo, ut nos etiā antea uertimus.

κατω-

Irrorationibus. Hoc est, aspersioibus. Nā κατωονέειν est κατωονέειν, quod signat superfundere. Linacer uertit κατωονήσει κατωονήσει, quod signat superfundere. Linacer uertit κατωονήσει κατωονήσει, quod signat superfundere.

κατωονή-

κατωονήσει, humidis & siccis fomentis. Quanquam non parum diuersa nomina sint, uariasq; res significant. Nam κατωονήσις est aspersio

κατωονήσις.

irroratioq; ut Celsi more loquar, ex oleo potissimum ad rem propositā idoneo facta, ueluti cum multa pituita in ore uentriculi hæret, oleum

κατωονήσις.

κατωονήσις in quo absinthium ebullierit, id superfundimus κατωονήσις quæ & πυρίμα

κατωονήσις.

κατωονήσις, & πυρίμα, & δέγμαμα græcis dicitur, triplex est. Nēpe humida sicca, & mixta, si Hippocrati & Galeno credimus. Humidum

κατωονήσις.

κατωονήσις, fomentum, spongia mollis magna; ex aqua calida expressa, applicata;

ca; Huius generis est aqua calida, aut oleum in utriculos, aut uasa ærea, fictiliaq; aut in uesicam coniecta, parti; dolenti admotā. Siccum fomentū est, milium, sal, har. na in sacculos coniecta, aut solū lin-

thrum.

therum. Item lateres & titiones panniculis inuoluti, & sic circumdati. Pace cuiusdam docti uiri dixerim apud Celsum lib. 2. nō esse uiciū scripturæ in dictione, titionibus. Nā tertio eandem repetit, fomentisq; in-
quiens, protinus ualidioribus totū corpus circumdare cōuenit, maximeq;
inuolutis extinctis testis et titionibus. Mixtum fomentum est, hordenū,
eruumq; prius contusa, aceto & aqua macerata, uel etiam farina si-
mili modo preparata, & in sacculis apposita. Ceterum humida fomē-
ta conueniunt inflammationibus ex bilioso humore suscitatis. Sicca
ijs, quæ ex tenui & aquoso sanguine proueniunt. Mixta crassis, uisco-
sisq; humoribus incidendis, conficiendis, dissipandisq; expediunt.

Sin moles. Quidā parum uersati in medicina uertunt dictionem
ὄγκον in græco codice positā, tumore, nullo plane sensu, quāquā id quoq; ὄγκος.
hac uoce significetur. Voco autē hoc in loco molem, corpus, quod ab ex-
terno supercecidit: quod uel durum, uel magnum, uel graue, uel simul
ambo fuit. In fine capituli male legit̃ i codice impresso ξυροῦ pro ξυροῦ.

IN XL I. CAPVT.

QUum per ventrem. De hoc accidenti Oribasius libro 6. eadem
tradit. Ceterum syntexin, seu ut latine dicam, colliquationem
corporis facies illa cadauerosa comitatur. Quod in marcere quē μα-
ρασμον̃ græci nominant, uidere est aut etiam in hectica marasmode.

Ex fonte. Huius loci castigationē Oroscius exemplari suo debet,
& Oribasio. Nam omnia exemplaria quæ mihi uidere contigit, ha-
bent, ἀπὸ γῆς pro ἀπὸ πηγῆς, quanquam aqua ex terra intelligi pos-
sit, aqua ex fonte. Hoc præterijt etiam Gemuseus.

Castiga-
tur co-
dex græ-
cus.

IN XLII. CAPVT.

Nonnunquam palpebras aperire. Hoc Galenus confirmat lib.
1. de febribus: οὐ μὲν ἰνκνῶν, οὐδ' αὖ ἀνατείναν ἐπιπλέον οἰοί-
τεσσι τὰ βλέφαρα, παρὰ πλεονίαν τοῖς ὕδασι ζουσιν ἀεὶ διακρί-
μναι, καὶ μὲν τοῖς μύουσιν ὡς τὰ πολλὰ, καὶ δὲ περὶ ὑπνώοντες.
ἔστι δ' οὐχ ὅτι ὑπνὸς αὐτῶν τὸ πάθος, ἀλλ' ἐν γενόσσεως ἀδυνα-
μία. Hoc est: Nec uero palpebras diutius attollere possunt, similiter ni-
stantibus perpetuo affecti. Quinetiam plerumq; conuiuent oculis, ueluti
dormitantes. At affectus ipsorum, somnus non est, uerum uigilandi im-
potentia &c. Hæc quidem de hectica Galenus pronunciauit: nos au-
tem de omni febris, in qua uigilia urgeant.

Si conuiueant. Male in græco codice ἢ μὴ σῶν, quod est uel conui-
uere, legitur pro εἰ μὴ σῶν, quod etiam Oroscius annotauit: Basiliensis
autem corrector eglexit.

Restitue
exemplar.

COMMENTARIVS

2013-
751.

Diaco-
dyon.

In quibus autem caput. Contrario supradictis modo affectos recenset. Nam illi ob tuſſim ex defluxu capitis pulmones infeſtantes dormire non poſſunt, eoq; diacodyon ex ſapa aſſument, quod tenues humores incraveſcit. Hi autem quibus caput defluxionibus obnoxium non eſt, ſuffitu iuvabuntur. In ſequenti ſententia pro παρὰ γὰρ μῶς, legitur παρὰ γὰρ μῶς. Itē pro λι. quod ſig nat librā pone 7. quod notat drachmā.

Arnabo. Recentiores quidam modo carnabum, modo carnabadiū,
alij Zarnabum, & Zarnabadium Odoramentis expetitur. Vide Pau-
lum in septimo. Sunt qui Doronicum in officinis appellatum esse pro-
nuncient. Non salicis folia, id esse putes, ut quidam grammatista hæs-
tabundus exponit. IN XLIII. CAPVT.

ΚΑΤΑΦΟ
ΣΚ.

γαλακ-
τώδες.

Castigato
græcum
exēplar.

IN XLIIII. CAPVT.

Nonnullis etiam cum igneus sensus, Hoc est, cum comburi
videntur nimio calore febris, pulicaris herba, quam graeci psyllio
nominant, conducit.

Permulceri q̃. Grace ἐστὶ διαφθαλμνῶν, ἢ διαφθαλμνῶν, ἢ ἡμῶν

Celsus latine dixit, corpus eius leuiter ex oleo ueteri permulceatur, &c. hic autē manibus tantū permulceri debēt, somni cōciliādi gratia.

IN XLV. CAPVT.

EXabsinthio. Hoc est, ut Galenus ait, in quo absinthij coma sit feruē facta. Siue autem oleum, siue unguentum, dicas, nihil refert.

Quaquam Orosius olea in quæ etiam aromata coniecta sunt, unguenta dici nolit. contra ueterum sententiam. Olei uero

Nardino. In græco codice est νάρδου, quod signat nardo: eadē nimirū locutione qua usus est Celsus, & Scribonius Largus aliq; ueteres. Celsus lib. 3. ungi rosa debet, pro rosaceo. Ut in cōpositione 210. apud Largū. Idem rosa dilutū explet concana uulnera. pro rosaceo dilutum.

Sin autem inflammatorium quiddam. Codex græcus habet φλεγματώδης τὸ pro φλεγματώδης τι, quod omnes castigatores Pauli, ceu momenti exigui neglexerunt. Emēdato codicem græcum.

IN XLVI. CAPVT.

Rigori. Medici hodie dictione rigoris utuntur pro græca ῥίγησι: quaquam non ita latine Celsus Hippocratis sententiam aliquādo uertens pro ῥίγησι horrorem reddit. Verum nos φρίκῃ horrorem uocamus. Inopia itaq; linguae, ῥίγησι febrium, quasi ad uerbum, rigorem interpretamur.

Concertationē naturæ. In græco codice est: οὐδ' ἐκλήεν τὸν ἀγῶνα ἀγῶνα. Quod Paulus ἀγῶνα dixit, ego concertationem naturæ exposui. Nam in crisi natura certat cū morbo. Si eo sit superior, bona crisis est: si morbus uicerit, mala. Quamobrem si natura se accingit ad ea quæ offendunt, expellenda, ut in rigore accidit, moliendum nihil est. Dixi igitur concertationem naturæ dissolvere, uel certamen uel pugnam quā cum morbo habet. Naturæ quidem in græco non est, sed sententiæ clarioris gratia addidi.

IN XLVII. CAPVT.

Adiutareq; calfactu. Recenset hic Paulus, quibus modis sudor per crism crumpens, etiam adiuuari debeat, nempe fotu mediocri, quiete, calido clystere, adeoq; in quiete manere egros uult, ut sudorem non abstergant.

Recreare. Græce est ἀναψύχειν, quod uerbum duo significat, refrigerare, & recreare, seu reficere. Hesychius grammaticus dicit idem χεῖν. esse quod ἐπιρίζειν, euentilare, & ἀναψυχῶν interpretatur παρὰ θυμῶν, hoc est solatium. Congruit magis id hoc in loco, nempe uires sudorum copia lassas, oppressasq; recreare.

COMMENTARIUS

ποδὶ βό-
λουον.

Tenui velamine. ποδὶ βόλουον λεπτόν in græco codice est. Cel-
sus ait: Veste leui, madida, interpretatus sum ἐμβεβεγμένον ab
ἐμβρέχον quod est irrigo, madesacio.

Ambæ siquidem. Ad calcem & floces uini referuntur. In græca
neutrum genus est. ἄμφω ἀλάπομενα, ambo ad fouendum appli-
cata, genuino corporis tepore siccantur: siccata meatus per quos sudo-
res erumpunt, obstruuntur.

Qui per validam expressionem. Græce est κατ' ἐκθλίψιν, quæ
fit natura quasi necessitate quadam oppressa. In doloribus uehemen-
tissimis & anima sæpe deficit & sudores frigidi erumpunt. Hi dicun-
tur fieri per expressionem, ualidam addidi significantie gratia: Quidā
pro ἐκθλίψιν, legunt ἐλλίψιν, quod est animi defectum, quod non ma-
le etiam hic quadrare potest. Eruditi iudicent.

IN XLVIII. CAPVT.

ὑπογλω-
ττις.

Hypoglottia. Formulæ quedam medicamentorum sunt, quæ in
tussi, choracis arteriæq; uicis assumuntur. Hodie bechicas officii-
ne, & penidias appellant. Fiunt autem potissimum ex radice dulci,
tragacantho, terebinthina, & accaro, alijsq; ad rem propositam cōgruis.
Ceterum Galenus uocat ὑπογλωττίδας.

Lana sulphure imbuta. Græce est ἔριον τε θειομένον, ad uerbum
sonat: Lana sulphurata. Oroscius corripienti studio potius quàm ue-
ritatis, uertendum clamat sulphure suffita. Quomodo autē lane suf-
fiantur, nusquam me legisse fateor, homines suffini sulphure in tussi le-
go. Lanam autem ut pice, aut alio pingui, ita sulphure imbui. Imbutas
sic applicari. Nam suffitus parum in lana proficit.

Pingue. Græcus codex habet νοὺ ἢ λιπὼς pro ἢ λιπός, accipimus
pro pinguitudine, aut oleo, aut quacunque re pingui.

Permulceri. Hoc est, molliter contrectare, supra interpretatus
sum διαφλάφαίν permulcere, ex Celsi more.

IN XLIX. CAPVT.

Sternutamenta. Vide sextum Oribasij. quomodo autem fiant: Ga-
lenus tertio de symptomatum causis explicat. Hic autem Paulus re-
media persequitur sternutationis quæ in febribus molestæ esse solet.

Ilium intentio. Græci λαγῶνα & κενεῶνα eam partem esse uo-
lunt, quæ latinis dicitur, Iliæ. Quidam uero male ὑποχόνδρια uertunt
Iliæ, in bonis autoribus parum uersati. In codice impresso est ἐντασις
lege ἐντασις. Neglexerunt Aristarchi.

λάγων.
κενεών.
Corrige
græcum,
codicem.

Summarum partium. Hic Oroscius debet exemplari suo. Nam

omnia quæ mihi uidere contigit habent, τῶν ἀκρωῶν μυῶν, quod est, Castiga
 summorum, muscalorum pro τῶν ἀκρωῶν μερῶν. to codi-
 cem.

Mollis contrectatio. Quod ante dixi permulcere, hoc molliter cō
 trectare interpretor. Nā idem esse puto. Græca uox est διαφιλήφησις

Spongiæ ex mari uacue. Quidam in codice græco legunt pro
 κειοί, quod est uacue, κεινοί, hoc est, recutes. Vtrunque instituto con-
 uenit: quam tu malis lectionem sequere.

IN I. CAPVT.

Vel attemperatos. Cibi fastidiū aliās ex humore pituitoso, aliās
 ex bilioso nasci solet. Si pituita in stomacho redundat, uomitu
 educenda est, si bilis supernatat, deorsum euocanda. Vbi uero totum cor-
 pus purgare uoles aliter faciendum docet Hippocrates. Quod si in pri-
 mis uenis crudi humores, semicocti q; habeantur, dissecandi, concoquen-
 di q; quod Hippocrates πεπασμόν, quasi mutationem. Huius autem
 seculi medici, perperam digestionem appellant. Si in extremis uenis
 corporis habitu sint infixi, relaxandi ueniunt. At biliosi humores
 melancholici, qui ultra sanguinis terminum processerunt, caloris uiole-
 tia expelli prorsus debet: Si in stomacho nausea excitet per inferiora:
 si in toto corpore biliosi, quod æstate potissimū accidit, uomitu purgari
 debet: melancholicus aut infra semper. Porro cū iā educūtur, necesse est
 eos infrenare, coercereq; ne transitu partes afficiant. Item meliores hoc
 agendo in locum restituere. Quā rationē, seu potius, ut Galenus ait, ca-
 cochymie curationem græci ἐπίκρασιν nominant. Verba Galeni nono
 Methodi in hunc modū habet: χρεὶ γὰρ δηλονότι κατὰ τὰς τοιαύτας
 ἐναντίας τῶν ἐνδεξίαι κατὰ βραχὺ μὲν ἐκκενωῶ τὸ μοχθη-
 ρὸν, κατὰ βραχὺ δ' αὖτ' αὐτοῦ τὸ χρεῖζόν ἐντιβέναι. καλεῖται δ' ἐ-
 πίκρσις ὡδὲ τῶν ἰατρῶν ἡ τοιαύτη διερέπεια τῆς κακοχυμίας.
 Paulus igitur recte etiā dixit: ἢ τοι ἀπορρεῦσαντα ἐκκρίνειν, ἢ ἐπίκ-
 ράσαντα, βελτίους ἐργάσεται. Quod est: Vel abstergēdo excernūt,
 uel attēperādo, coercendo, mitigando furorē illorum, obtundendoq; melio-
 res in locum restituent. Hippocrates libro de ratione uiclus in morbis
 acutis materiā eorū quæ attēperare possunt, cōmemorat. Galenus autē
 eius interpret paulo apertius in hūc modū diffinit: de torminibus ora-
 tionē instituens: σκοπὸς δ' ἐστὶν αὐτοῖς, τὸ μὲν τοικαδ' αὖτ' αὐτοῖς κα-
 κοχυμίας, τὸ δ' ἐπίκρᾶσαι, τὸ δ' ἐπιξηραίνειν, τὸ δ' ἐμφύσαι. τὸ
 μὲν αὖ γὰρ κατὰ τὸ ὄνειον, καθαίρειν διατατα, καὶ ἐπιξηραίνωαι, τὸ δ' ἐ-
 τοῦ λίγνον σπέρμα ξηραίνετε καὶ φύχειν, τὰ δ' ἐκ τῶν πυρῶν ἄλφι-
 τα, τὸ ἐπίκρᾶσαι ἔχει. καλῶς δ' αὐτοῖς ἀναμέμικται καὶ τὰ κρεῖ-
 f iiii

πηπασ-
 μός.
 Nota.

COMMENTARIUS

θινά, ξεραίνοντα τε καὶ φύχοντα. οἱ δὲ Αἰγύπτιοι κύνες μοι πετρίως
 φύξαι δυνάμει. τὰ δὲ ὡς καὶ ἡ σεμίδαλις, καὶ ἡ χύνδρος παχύ-
 χυμος καὶ ἐνχυμος, καὶ δὴ καὶ περικισά. Hoc est: Eo ipsi spectant, ut vi-
 ciosum humorem partim purgent, partim attemperent, partim desic-
 cent, partim refrigerent. Lac itaque asininum purgare potest, & at-
 temperare. Lini vero semen siccare, & refrigerare. Triticæ polenta,
 attēperandi facultatē obtinet. Recte ipsis et ordeacea admixta est, quæ
 & siccatur, et refrigerat. Aegyptiæ autem fabæ, mediocriter refrigerare
 potest. Oua, similago, et chondrus crassi bonique succi, & attēperatoria
 existunt &c. Vides igitur, quomodo Galenus utatur dictionibus ἐπι-
 κράσαι & ἐπικρανῶσαι. Item ἐπικρασιὸν. & ἐπικρατικά. Gale-
 nus duodecimo methodi de uinis fulvis agēs scribit ἐπικρασιὸν δ' εἰ-
 σὶ καὶ θρεπτικοί, quod postea interpretatur τρεφόνσι δὲ μᾶλλον, καὶ
 κακοχυμίων ἐπαυροῦσθαι. Hoc est: Nutriunt magis, et prauitatem
 humoris corrigunt, emendantq;. Linacer superiorē sententiā nescio quo
 modo exponit, certe dictionis vim ignorasse uidetur. Nā quid sibi uult,
 præterea mistibilia sunt, et nutriētia? Dicere enim oportebat, attēpera-
 toria autē sunt (intellige malorū humorū, bonos in locū reponendo, &
 qui nondū longius terminos cōcoctionis excesserūt, reducēdo, acrimoniā
 ipsorū obtundendo.) Ne autē putes bilem absolutā, aut flauā, aut nigrā
 meliōrē reddi posse: imo nec salsam pituitā: eoq; nemo doctus medicus
 hos humores alterandos, cōcoquendosq;, uel ut barbari dicunt, digeren-
 dos dixerit. Sed purgandos potius, meatibus per quos transibunt, ada-
 pertis, medicamētis in id efficacibus. Ne autē acrimonia sua et rostone
 infestent, ut in torminibus docuit Hippocrates, cibi et potus ἐπικρασι-
 κοὶ assumuntur. quibus potes etiam syrupos quosdā mitigatorios annu-
 merare. Cæterū male in codicibus græcis ἀπορῥῶντα, quod est,
 proijciētes, pro ἀπορῥῶντα, quod signat abstergētes. Præterierunt
 id Oroscius, Gemusæus & alij. Potissima vero polenta. Codices
 græci omnes male congruam habent lēctionē hanc, περατέον ἀνα-
 κταῶσαι τὴν θρεῖν, μάλισα δὲ ἀλφίτων. pro μάλισα δὲ ἀλφίτων,
 aut μάλισα δὲ δ' ἀλφίτων. Nō tamē ab ijs multū. Hic quoq; de
 prauatus est codex græcus. Habet enim μὴ πόρῳ μὲν τοι τοῖς τῶν
 πυρετῶν χρείας, pro μὴ πόρῳ μὲν τοι τῆς τῶν πυρετῶν χρείας.

IN LI. CAPVT.

SI vero in grandē famen. Apud grecos una dictio grandem famē
 signat cōposita ex βοῦς et λιμός. Quicquid enim grande illi uolūt
 significare in una dictione, per ἱππός, & βοῦς, quod est apud nos, fē-

Aduerte.

Castigato
 exēplar
 græcum.
 Restitue
 exēplar.
 Emēdato
 græca.

IN PAVLVM AEGIN.

332

uerbum ex uerbo interpreteris, equus & bos, explicant, ut ἵππος ἐλί-
νον, βούλιμος &c. Ceterum eadem fere habes remedia bulimi apud
Gal. lib. 8. de compositione medicamentorum secundū locos. In sequenti
bus uerti ὁ ξύπτος pro seuitia furore, ad uerbum sonat acumine.

IN LII. CAPVT.

Quoniam igitur à pituita. Galenus de symptomatum causis li-
bro primo scriptum habet. Canina appetentia fit, cum uel ob
acidi humoris uicium uentriculus infestatur, uel ubi totum corpus im-
modice digestum dissipatumq; continua nutritione indiget &c. Cæ-
terum in Aphorismorum libri secundi commentario, cap. 20. curatio-
nem hanc ad uerbum persequitur.

Incidant, abstergeantq; Superius et hic male in codice Greco **Aduerte**
ἐῖπτουσι, pro εὔπτουσι habetur, unius literæ mutatione: quod ceu
nullius momenti castigatores Pauli neglexerunt. Quāquā ad sensus pu-
ritatem non parū faciat. Quippe diuersa sunt, proycere, et abstergere.

Pingua. Galenus addit, καὶ ὡς αὐτὸ εἴπητις, ἐλαίω δὲ τῶν ἐδεσμά-
των, hoc est, & ut ita dicam oleosa esculenta.

IN LIII. CAPVT.

Particularum per quas. Hæ sunt, Stomachus, os uentriculi, ipse
uentriculus. Galenus commentario quarto in opus de ratione ui-
etus in morbis acutis, partes commemorat, quæ aliquando sitim pro-
creare soleant. Idq; in hunc modū: πάντων μὲν πρῶτον καὶ μάλα
τὸ στόμα τὸ γαστέρις. ἐφεξῆς δὲ ἡ γαστήρ. καὶ μετὰ ταύτῃ τὸ στόμα-
χος. ἔτα πνύμων, ἔτα νῆσις.

Prauas autem potiones. Codex Græcus deprauatus est. Habet
enim μοχθηρῶν δὲ ἐπιθυμῶσι ποιότητων. Hoc est, prauas autem **Emendanda**
appetunt qualitates, pro πομιάτων, quod est, potiones. Orosius cum **codex,**
alijs Aristarchis negligenter hoc præterijt.

Cæterū siti pressos. Hæc apud Gal. lib. 1. de symptomatum causis in-
uenies. Habet autē ille paulo ampliora ἢ istū modū: ἀπὸ πύσης δὲ δίψας
κατακληθέντες, ἐξ ὧν περ καὶ ἀποταίνονται οἱ δα, τότε καταφα-
γόντα τὴν ἐχίδνα (καὶ δὲ ἄρα δίψας) καὶ τοὺς ἐκ τοῦ οἴνου πίνον-
τας ἐκ τοῦ στόματος θερστάς, ἐν αὐτοῖς τὸν τὴν θύριον ἐξαποτελεῖν
καὶ τὸν ἐξ οἴνου παλαιῶν μεθυθέντα, καὶ τὸν ἀποκατερεῖν ἀπο-
θελίσσαντα καὶ τοὺς ἐν τῷ πλοῖω ἐπιλιπόντες τοῦ ὑδατος ὧν ὁ
τὸ θαλάσσιον ἐτόλμησάν τι πλεονάμεν ἄμετροτερόν τι διψήσαντες
τῶν ἄλλων, καὶ τινες μὲν αὐτῶν ὑπάρχοντες τὴν γαστέρα καὶ στήθεα
τὴν σφοδρῶς ὁξύτερον ἢ κατὰ τῆς λαίπης ἀπέβαινον, &c.

f iiii

COMMENTARIUS

Vile igitur an ex hac lectione, Pauli codicem in quibusdam uelis ca-
stigare. Ego sane, aliorum iudicio, legerem διφεισι δ' ἀπαύστοις
καταλειφθέντες ἐξ ὧν περ καὶ ἀποθανόντας οἱ δ' αὖ τούτῃ φαγόν-
τας ἐχιδνας διφάδας, καὶ τοῦ οἴνου παλαιοῦ μεθυόντας, καὶ τοῦ
ἐν τῷ, &c.

Rosaceo cum impetu salientis modo. Græce est μετὰ κρουσί-
μου γινομένη, hoc est: Cum crunisimo facta: à uerbo κρουίζειν, quod
κρουίζειν in hac sententia: εἰ δ' ὕγρὸν εἴη τὸ προσφερόμενον, ἐξ
ὕψους αὐτοῦ βάλλοντες, καὶ οἷον κατακρουίζοντες, id est: Sin an-
tem id quod adfertur, liquidum fuerit, ex altiore loco deiciens & in
salientis modum fundentes. Ibidem usurpat dictionem κρουώσ. ἔτι δὲ
κρουώσ. μᾶλλον εἰ κρουώσ ὕδατος ψυχροῦ κατακρούει τοῦ ἀγγείου ὑ-
χει τὸ ὕγρὸν. Hoc est: Preterea magis humorem refrigerat, si desiliens
aqua frigida uas illidat, &c. Ceterum superfundimus aliquando li-
quores, ut in hoc symptomate, synicipiti sublata in altum manu, per
mediocrem lane hapsum.

Iam dilutum. Sic uocamus humorem in quo aliquid maduerit,
aut maceratum per horas aliquot sit. Recentiores medici infusionem
appellant, ut infusionem rheubarbari, agarici, cotoneorum Græci
ἀπόβρεγμα dicunt.

IN LIIII. CAPVT.

Melius autem facit myxion. Myxion uel myxa, uel myscion
fructus est pruno similis. Galenus sericon appellat. forte hodie
officinis dicitur sebesten.

Salem indicum. Hic sal nimirum est saccharum quod nos eandem
appellamus, natura non arte, proueniens, quanquam hodie Venetijs &
alibi artificio naturam imitentur. Auicenna interpretatus hunc locum
Pauli, saccharum tabarzet ponit.

IN LV. CAPVT.

Textus
græcus in-
ciatus.

Imbibito. Similia apud Galenum libro 7. medendi Methodi. Ea-
dem uero apud Oribasium sexto. Sed perperam hic in Codice im-
presso legitur ἀνὰ πέντε μολύον, quod est sursum misso, pro ἀνὰ πέν-
τε μολύον, quod ualet imbibito ab ἀνὰ πίνωμαι, inde ἀνὰ πέπωμαι.
Sic habet Galenus loco supra citato, ἐνίοτε inquit, δ' εἰς αὐτοὺς
τοὺς χιτῶνας, ὡς αὖ εἰποι τις, ἀνὰ πέντε μολύον ἢ ἐμπεπλασμένον.
Hoc est. Nonnunquam uero in ipsas tunicas imbibitus, ut ita dicam,
uel impræctus.

Porro vbi concoctrix facultas. Ex hac sententia opinio quorundam de remedijs spine applicandis in uentriculi affectionibus, satis refellitur, etsi euidentia ipsa quæ in confectionibus apparet, quid in hac re faciendum sit, aperte doceat.

Vel manna vino macerata. Non in dandi casu, legenda sententia est sed nominandi. Corrige igitur codicem græcum ita. $\kappa' \mu\alpha\lambda\iota\eta\epsilon\nu \omicron\iota\upsilon\kappa\omicron$ $\varphi\upsilon\gamma\alpha\delta\epsilon\iota\sigma\alpha$.

Agathium. Pastillus est, qui retinendi suppressendiq; potestatem habet. Vide septimum.

Typhe. Specie siliagini non dissimilis, simplici culmo, grano multo triplici, tunica uelato, atq; leuissimo, radice numerosa, largior eius in Asia prouentus regione, ut uult Galenus, quæ super Pergamum sita est. Hanc agricolæ, quod triti cum in oppida conuehi soleat, ad panificium usurpant. Huiusmodi igitur arista, hoc est, spica apice narium foramina pungere interim precipit Paulus, ut irritatus sanguis largius profluat.

**FINIS LIBRI SECVNDI
COMMENTA-
RIORVM.**

COMMENTARIO-

RVM IN PAVLVM AEGINE-

TAM LIBER TERTIVS.



TERTIVS hic liber de omnibus totius corporis affectibus particulatim agit: & singula unicuique particula convenientia remedia complectitur. Primum autem cuiusq; morbi curandi Methodum artificiosam exponit, quæ ex causarum notitia, partis temperamento ægriq; natura, & alijs indicationibus sumitur. Deinde sic ad ea ueniendum auxilia præcipit, quæ ipsis locis affectis induci debeant, Græci τοπικὰ nominant. Quod Galenus libro 14. Methodi pulcherrime docet. Cæterum hic liber Pauli partim ex Galeni opere de compositione medicamentorum secundum locos, partim ex octauo Oribasij transscriptus est; admixtis interim remedijs quæ Paulus ipse usu comprobavit.

IN I. CAPVT.

Quemadmodum stirpium. Ex primo capite Galeni de compositione medicamentorum secundum locos ad uerbum hæc sunt transcripta. In quartodecimo Methodi pene eadem habentur. ascribam autem uerba Galeni, maioris perspicuitatis gratia: ἰδὲ ἔχ-
θι δ' ὅτι τῶν διαπνεομένων χυμῶν ὅσον ἰλυῶδες ἐστὶν ἐξ ἀρχῆς
τε δὲ δέως, τὰς τριχὰς ἐγεννησε, καὶ τοῦ λόγου κατὰ τὴν φύσιν
ἀνέβη. τοῦτ' οὐκ ὅταν ἦτοιγ' ἀπολλύται παντάπασιν ἡ μο-
χληρὸν γεννηθῇ, φερέσθαι τὰς τριχὰς ἀναγκαῖον ἐστὶ. καὶ γὰρ οὐκ
ἢ τὰ φυτὰ κατὰ διτλὴν αἰτίαν ἀπολλύται, ποτὲ μὲν ἀπορουῶ-
τα τῇ τρεφούσῃ ὑγρότητι, ἐπὶ δ' ὅτε οὐκ οἰκεία χρώμινα. τε-
λέως μὲν ἀπολλυμένου τοῦ τρέφοντος χυμοῦ τὰς τριχὰς ἡ
φαλάκρωσις γίνεται, μοχληροῦ δ' ἀποτελεσθέντος, αὐτὸ φιά-
σεις καλοῦ μύλου, καὶ αἱ ἀλάπεκες. Hoc est, ut rudiores intelli-
gant: Ostensum uero est ex humoribus qui per latentes meatus

Pilorum
origo &
nutrimen-
tum.

perspirant, limosum quicquid est, id, & statim ab initio pilos producere, & reliquo sequenti tempore, ueluti materiam suggerendo augere. Hoc igitur, cum uel in totum perit, uel prauum generatum fuerit, pilos corrumpi necesse est. Quandoquidem etiam stirpes duplici ex causa pereunt, interim sanè humiditate quæ ipsas nutrit, destituta, interim non propria utentes. Vbi humor pilos nutrens prorsus interit, caluicium provenit. Cum autem uiciosus est redditus, & opiales, & alopeciae excitantur, &c. Celsus hæc duo postrema uicia Caluiciū. Ophiasis. Alepecia. Areas. communi uocabulo Areas appellat, quod nimirum loca pilis uacua eos in capite representent. Orosius reprehendit hic me quod Celsum imitatus dixerim de areis, hoc est alopecia & opiasis. Recte facit literator, interpretandi muneris imperitus.

Nonnullæ vero alienis. Græce est ἁλλοτριῶν ἔκτῳ, quod ad uerbum sonat, succis alienis à seipsis. Galenus paulo clarius dixit: ὑγρῶν ἁλλοτριῶν τῶν φύσεως, quod est: Humoribus alienis à sua ipsorum natura. Atq; ita nos reddidimus, potius indicantes esse, dictionem sententiæ addere, quàm rem obscurare. Quemadmodum igitur quedam alimenta sunt homini, quedam sturno propria, ita herba quoq; idoneum, familiaremq; naturæ suæ humorem quo alantur, attrahunt, alienum respiciunt.

Inter se. Deprauatus codex est Græcus, tum Venetjs, tum in Germania impressus. Habet enim διαφέροντα τῶν ἁλλῶν, pro διαφέροντα τῶν ἀλλήλων. Rursus hic Galenus apertius dixit: ὀνόματα δὲ ὅντων διαφέροντα παρὰ τὸ χῆμα. Hoc est: Nomina autem secundum figuram diuersa habentes. Castigatur codex græcus.

Quoniam in Ophiasis. Codex Græcus hic mutilus est. Quid enim sibi uult ὅτι παρὰ πλῆσιον ὁ φειτὶ βεβλαμμένῳ φαίνεται μῦθον, nisi addatur in quo affectu. Addendum igitur necessario ex Græcus mutilus instauratur. Galeno non nihil est, legendumq; in Paulo ὅτι κατὰ τὰς ὀφίσεις παρὰ πλῆσιον, &c. Orosius & Gemusæus non animaduertunt, tam bonis alioquin ut ipsi gloriantur, exemplaribus usi. Orosius.

Deinde loco uiciato. Hoc ubiq; obseruandum præcipit Galenus, ut semper totius corporis uacuatio præcedat, nisi admodum exiguus sit affectus. Dixi loco uiciato auxilia inducemus, pro τοῖς τοπικοῖς ἀποδερὰ πύσσας μὲν βονθήμασι, quod est, localibus persanabimus remedijs.

Si igitur color ad nigrius. Hoc est, si nigrior, albidior ne conspiciatur. Nam quod Paulus εἰ μὲν οὖν ἂν τὸ μελαίντερον ἢ λευκότερον

COMMENTARIUS

τερον ἢ χροῖα παρὰ πρᾶξιν dixit, Galenus in methodo in hunc m-
dum εἰ μὴ γὰρ λευκότερα τοῦ κατὰ φύσιν, ἢ εἰ μελαντέρα. Quo-
est, si albidior quàm pro natura habitu sit, & si nigrior.

Hiera dia-
colocyn-
thidos.

Antidoto Hiera. Intellige, hiera diacolocynthidos, cuius descripti-
nem habes lib. septimo Pauli, Archigeni a scriptam. Scribonius autem
Largus eandem pene ad uerbum habet. Officina uocant Hieram com-
positam Galeni: uerum in multis adulteratam. Que uero ex aloë &
alijs sex rebus, nempe cinamomo xylobalsamo, asaro, spica nardi, cr-
co, & chiamastiche, constat, simplex dicitur. Et hæc in officinis, u-
parum ab illa Galeni discrepat. Primum sane præter medicamenta quæ
ab illo numerantur, duo insuper adiecta habet, puta xilaloen, & cas-
siam, unum supposititium carpobalsamum, loco xylobalsami. Deind
pondera etiam diuersa continet. Nam omnium partes æquales habet
Galenus autem hiera, aloes centum, aut cum præstantiorem fieri cupit
aloes drach. nonaginta. aut etiam octuaginta recipit, reliquorum ue-
ro sex: ubi de capite sollicitudo est, croci tantum quinq;.

Catapotia ex aloë. Hæc recipiunt cucurbitæ syluestres, quæ colo-
cynthida uocant, partem unam aloes, et scammonij singulorum partes
duas. Galenus hic absinthij succi partem unam admiscere solebat: an-
tea quoq; mastichen chiam, & bdellium, rediguntur in granula Ciceri
similia. His fere respondent Pilulæ nostræ Cochleæ à Rasi descriptæ.

Metho-
dus cura-
tionis.

Dein ad præsidia. Cum iam purum ex purgatione corpus fuerit,
humor qui in cute continetur medicamentis digerentibus discuti debet:
diligentia adhibita, ne adeo calida, acridq; admoneatur, ut cutis exul-
ceretur. Ad hæc ne nimium siccent, prouidendum est. nam talibus non
tantum uiciatus, sed etiam utilis qui confluit, absumitur. Græce erat
ὡδὶ τῷ τοπιῶν χερεῖν ὡδὶ μέλειον quod ad uerbum sonat, ad lo-
calem ueniendum curationem, sed Latinus est ut reddidi.

Primæ a peritis. Locutio est Varronica pro asperissimo. Græce
erat τὸ τῆς χύτης.

Additum
est hic ut
curiosis
fiat satis.

Aliud experientia prob. Hoc medicamentum in Codice Ioannis
Iasaris manu scripto, non habetur: nec compositio plane coheret, ac
peregrina plane uidetur.

Orosius.

Vnciæ octo. habebat in Græco & pro 50 sicut alia pleraq; absurda.
Miror Orosium in tanta ueterum exemplariorum copia hoc non monuisse lecto-
rem, cum tamē in sequenti medicamento adnotet legendum μὲν ὅς pro κωδός.

Viciata le-
ctio Græ-
ca.

Euphorbiæ, thapsiæ, baccarum lauri. Male in Codice Græco ha-
betur δαφνίου quod est laurum pro δαφνιδίου. ut Galenus habet.

Nam postea mentio laurini fit. Præterea Galenus in eodem medicamen-
to à Paulo ratione ponderum dissentit. Legit enim Euphorbii, thapsiæ,
& baccarii lauri, singulorum drachmæ duæ, sulphuris uiui, hierati sin-
gulorum drachmæ: ceræ drachmæ sex, &c. Neglexerunt Aristarchi.

Nasturcij. Impressus Codex tum Venctijs, tum Basileæ habet *καρδαμύμου*. Sed Galenus & ipse sensus requirit *καρδαμύμου* quod
impetigines & lepras discutit, eadem ui præditum qua sinapi. Nec hoc
à castigatōribus animaduersum.

Orosius
& corre-
ctor Basi-
leæ.

Orosius.
& Gemu-
sæus.
Orosius,
& Gemu-
sæus.

Recinini aut veteris. Paulo ante etiã deest, particula disjunctiua
in codice Græco. habet enim *κικίνου πικαλίου ἐλαίου*: cum legendum
sit ex Galeno *κικίνου πικαλίου ἐλαίου*. Nam si ricinium deest, etiã
commune uetus oleum eadem præstare potest. Omiserunt correctores.

Leporum ventriculi quinque. Ex Critone hæc sunt, citante Ga-
leno. Verum scriptura illius à Paulo uariat. Galeni codex habet
κοιλίας ex hoc est uentriculos sex. Paulus tantum habet *πέντε*.
Vide utrum malis sequi.

Gal. à Pau-
lo uariat.

His adijciantur. Græci Codices omnes deprauati sunt hoc in loco.
Nam habent. *πρὸς τοῦ τοῖς λάμβανε τὸ τρίτον, μυσίνης, ἀκραι-
μόνων, ἀκκακίας καρπού, &c.* Quid quæso hinc colligi possit? Legen-
dum igitur cum Galeno censeo in eum modum: *πρὸς τοῦ τοῖς λάμ-
βανε μωτῶν, μυσίνης ἀκραιμόνων, ἀκκακίας καρπού, &c.* Pondere
nonnihil apud Galenum uariant.

Castiga-
tur co-
dex Græ-
cus.

Quolibet oleo aromatis imbuto. Sic interpretatus sum ὃ δέ-
λεις ἢ δύσματι. Celsus dixisset, quolibet unguento. Nam Græca uox
ἢ δύσμα nihil aliud signat quàm unguentum ex oleis succisue præpa-
ratum, cui ex aromatis iniectis, odor suauior, & gratia accesserit.
Non autem sum ignarus *ἢ δύσμα* apud alios quo sitam aliter accipi, ut
apud Plinium libro tertio decimo, capite primo, ubi habet in hunc mo-
dum: Ratio faciendi duplex, succus & corpus. Ille olei fere generibus
constat, hoc odorum, hæc stygmata uocant, illa hedysmata, &c. In
qua oratione planè à Galeno, cæterisq; Græcis dissentit. Nam olea ip-
sa quæ in unguentis sumuntur, hedysmata uidetur appellare: stymma-
ta uero aromata. At Galeno & Dioscoridi stygmata alia medicamen-
ta aromatica, nempe quæ spissitudinem unguento concilient, appellan-
tur, unde etiam spissamenta possis nuncupare alia uero hedysmata,
nimirum quæ gratiam odoris et suauitatem eis imprimant. Vide Dio-
scoridem in unguento cinamomino, & Nardino alijsq; cum paucis. Ga-
lenus uoces Hippocraticas interpretans, hedysmata, inquit, pro ipsis

ἢ δύσμα.

*σύμμα-
τα*.

COMMENTARIUS

aromatis apud Hippocratem accipi.

Orosius. Anemonæ flos tritus. Orosius hic in græco codice legendum cense-
set, ἀνέμωνος τὸ ἐντὸς μέλαν τρίψας μετ' ἐλαίου μυρσίνου, hoc est
Anemonæ interior pars nigra, cum oleo myrteo trita, ut habetur apud
Archigenem, citante Galeno libro primo de compositione medicamen-
torum secundum locos. Vide quid reprehendendi libido faciat. hunc
locum adfert, de medicamentis nigrescentibus, ab Archigene com-
prehensum, cum paulo superius singulare caput extet de fluidis capillis,
de remedijs illos conservantibus, unde Paulus hanc orationem ad ver-
bum planè transcripsit. Habet enim Galenus ex sententia Heraclidis:
ἀνέμωνος τὸ αὐτὸ τρίψας μετ' ἐλαίου, κατὰ χεῖρ. Iam flos ipse
non aduersatur aliqua ex parte pilis promouendis.

Stercus caprillum. Apud Græcos proprie dicitur stercus caprillū
σφύρατ, teste Galeno libro decimo de simplici medicina, ubi habet
συνεχέσθαι μὲν οὐδ' ἡρώμετα τοῖς τῶν αἰγῶν κόπροις, (σφύρα-
τοι δ' ἰδίως ὀνομάζονται.) Quod est: Frequentissime igitur caprarū ster-
coribus utimur, sphyrathi autem proprie nominantur. Orosius nouus
Orosius. interpret, aliorū autem, si dūs placet, corrector. filum caprillū exponit.

IN II. CAPVT.

Lixiuio-
rum gene-
ra.
E Cinere lixiui. Paulus libro septimo lixiuium, quod græci κοῖα
appellant, cineris lotionem esse dicit: enumeratq; eius differentias.
Aliud enim ex cinere fici, caprifici sarmentorum, & tithymallorum
πρωτό-
σακτ. confit, quod uim abstergentiam maxime, siccantemq; & exedentem
σάκτ. propemodum obtinet. Si calx admisceatur urentem, πρωτόσακτ.
σαπῶνα dicitur, quasi primarium lixiuium. Interim ex sola fit calce. Iam
εἰρη. quoddam ex sapone preparatur, unde σαπῶνα εἰρη κοῖα nuncupatur.
κοῖα. At nomen κοῖας plura signat, nempe calcem ipsam, & lixiuium, ci-
κοῖα σά-
neremq;. Solet autem alijs adiungi, quæ ipsum, quæ de re intelligi debeat,
κτι. interpretentur, ut pote κοῖα σάκτι, pro lixiuo liquido, κοῖα ἄσβε-
κοῖα ἄσ-
στ, pro calce uina accipitur, cum ἄσβεστ per se calcem non extin-
βεστ. Etiam signet, ut τίττω ἄσβεστ. Porro cum κοῖα ἄσβεστ ponit-
tur, hoc est duo substantiua, alterum in nominatiuo, alterum in geni-
tiuo, lixiuium calcis intelligendum uenit. Cæterum apud latinos scripto-
res lixiuij uox alijs atq; alijs dictionibus iuncta, diuersa etiam signifi-
cat. Primum apud Varronem, Columelliam, Plinium frequenter habe-
Lixiuuium
e cinere. tur Cineris lixiuia, cineris lixiuium, pro simplici lixiuiio. Deinde apud
Largum, unde Galenus aliquot medicamenta transcripsit, compositio-
ne. 228. Hæc tercre oportet ex cinere lixiuia. In sequenti rursus:

Cum cinere lixiui diutius terere. Paulo post in altera: Teruntur ex cinere lixiua qua utuntur culinary, sicut apud Paulum Aeginetam κοία πιλοποιτικὴ pro lixiua quo pileary utuntur. Legendum est κοία π in codice graeco per simplex i non per y, ut quidam faciunt, putantes ἀ πλοποιτικὴ πύλον quod est lutum, πλοποιετικὴ κοία appellari, ut sit lixi- κη. uium quo figuli utuntur; cum tamen nullum eius ut mihi uidetur usum habeant. Quare locus in sexto Methodi deprauatus Linacrum inter Linacer. pretem decepit; alio sq; non paucos eum citantes. Verba graeca sic habent μηδὲν ἐν τῷ παρὰ χειρὶ μα φάρμακον ἔχων, ἢ τῆσα κοίαν σακ- τῶ, ἔτρεκὼς ἐκ γειτόνων τοῦ κάμνοντος πλοποιόν. In qua ora- πλοποι εione πλοποιόν legendum est. Galenus aliquando κοίαν πλοποιτικὴ os. κῶ, Aliquando ὁ δὲ πλοποιτικὸν pro eadem re exponit; ut lib. sex ὁ δὲ πλοποι de compositione medicamentorum secundum genera in hunc modum, πλοποιτικὴ ἄλλῃ ἢ διὰ τοῦ ἀφροίτρου, ἢ ἐχρήσατο λάγρον κυρὸν λίτραν κόν. α τερμινθῶνς λίτραν α μανῆς λίτραν α ἀφροίτρου λίτραν α ἐλαίου ἑξήλω α ὕτ πλοποιικὸν ἑξήλω α μίσρον α μού Γο β. σωτῆρα κατὰ τὸ πον. Largus composuit. 216. temporis iniuria non nihil mutilus est. Verba ipsius haec sunt. Cerae pondo libra, resinae terebintinae pondo libra, nitri rubri pondo libra. Haec teruntur ex cinere lixiua, postea cum olei cyathis sex, liquesunt ad ignem; quibus adijcitur thuris pollinis scilicet libra. Vides hic ὁ δὲ πλοποιόν nihil aliud esse quam cinerem lixiuum, aut lixiuum, aut quomodocunque uoles appellare. Atque ita ego etiam antea sum interpretatus. Paulo post Galenus eodem in libro τὰ ξηρὰ διαλύεται πλοποιικῇ hoc est arida dissoluntur lixiua, ubi simpliciter πλοποιικῇ dixit pro κοία πλοποιικῇ. Apud Plinium cineris uox simplex interim pro lixiuo usurpatur; nempe ex Dioscoride uertit dictiōem κοίαν. Ruellius uir Ruellius. alioqui antiquae eruditionis etiam in postrema editione libro 6. Dioscoridis κοίαν πλοποιτικῶν uertit cum luto suo lixiuum, quam accommodare iudicent alij, certe lutum nemo potui dabit, sed lixiuum, lacte in uentre coagulato. At Orosius noster non tantum sen su inaccommodato, quod de me dicit, sed longe omnium absurdistime uertit, calcem qua in tectorijs, dealbandisq; parietibus testes utuntur. Vide optime lector quam sit quibusdam maleferiatis hominibus innatum, alios reprehendere in ijs etiam quae ipsi non intelligent. Iam pondus uiciatum in Codice graeco non aduertit Aristarchus. Nam pro, ζ δ, quod est drachmae quatuor, reponendum Græcus codex de prauatns. Ε δ hoc est sextary quatuor. Idem itaque est κοία πλοποιτικὴ Orosii.

COMMENTARIUS

κονία πιλοποιήμην, ὅδωρ πιλοποιητικόν, ὅδωρ πιλοποικόν & σακ-
τὴ τῶν πιλωταρίων.

IN III. CAPVT.

πυτυρία
σιν.

Porrigo. Sic interpretatus est Celsus πυτυρίασιν. Plinius etiam
furfures secundum græcæ dictionis ætymologiam appellat : quem-
admodum interpres Auicennæ. Vide Galenum libro primo de compo-
sitione medicamentorum secundum locos.

Resoluitur Græce est: ἐξὶν ἀπότῃς, quasi dicas, ἐξὶν particula-
rum eliquatio, uel particule eliquantur. Celsus resoluitur, quem imi-
tatus sum. Nā quedā ueluti squamule surgunt eaq; acute, resoluitur.

Melante-
ria.

Creta sutoria. Sic interpretatur Largus μελαντηρίαν, compositione
218. Aluminis inque rotundi, meläterius quæ creta sutoria dicitur,
qua ligule calceorū denigrantur. Diuersum est ab atramento sutorio sicut

Orosius.

Dioscoridē cōsulas, quanquā Orosius exponat atramentū sutorium.

Viciatus.
codex
græcus.
ἰχωρ
quid.

Creusæ singulorū drachmæ. In græco codice habebatur Γο.β.
quod est Vnciæ duodecim. ego autem legendum censeo Ζ.β hoc est
drachmæ duodecim. Itaq; etiam habet Alexander, & magis conuenit.

Ex quibus sanies. Græce est: ἀφ' ὧν ἰχωρὲς ἀποτῇκοντα. Inter-
pretes latini mirum in modum cruciantur, dum græcam uocem ἰχωρ
explicare student. alij namq; imitantes Plinium, ubiq; saniem interpre-
tantur, alij serofos humores & acres, tenuesq; quidā sanguinis cruorē.
quidam ut Celsus ipsum sanguinem. Aristoteles ἰχωρ δὲ, inquit, ἐξὶν
ἀπεπτον ὡμα, hoc est Ichor autem est sanguis crudus Ex hac tāta
uarietate, certi aliquid adferre conabimur, quod in authoribus exponē-
dis tuto sequi possis. Itaq; ἰχωρὲς aquosæ serosæq; et superflue sangui-
nis humiditates existunt nunc acres & calidæ, nunc pituitosæ & fri-
gidæ. Galenus lib. 6. de sanitate tuenda ita scriptum reliquit. ὅταν μὲν
γὰρ ἢ μὲν ὅλου τοῦ σώματος κρᾶσις ἢ χολώδεσς, τὰ δὲ κατὰ
κοιλίαν ἀτονάτερα, συρίζονται δὲ τὰ ὀξυτέρω δύσομάχον. μὴ
γενομένην δὲ τοῦτου, καταρρέουσιν ἰχωρὲς εἰς αὐτὴν, οὗς ἀθεοίξει
τὸ σῶμα περίηους. Paulo post, ἐὰν δὲ μὴ μόνοι ἢ κεφαλὴ δερμούς
ἰχωρὲς ἐπιπέμπει τοῖς κατὰ γαστέρα χωρίοις. Rursus de frigidis. in
hunc modum, ὅταν ἢ τοιγεῖς δερμὶν γαστέρα καταρρέουσιν ἐκ τῆς

Calidæ.
Frigidæ.

Interpre-
tatio
ἰχωρ
apud Ga-
lenum

κεφαλῆς οἱ ψυχροὶ καὶ φλεγματώδεις ἰχωρὲς &c. Hippocrates libro
quarto de ratione uictus in morbis acutis δὲ θυμὸς καὶ χολώδεις ἰχω-
ρὲς dixit, quod Galenus interpretatur in eum modum, ὅτι δὲ ἰχωρὲς
ὀνομάζονται λεπταὶ ὑγρότητες, ἐνδὸν καὶ ἔξω. Galen. autem libro se-
cundo de elementis: ὡς οὐκ εἰ τῶν γαλακτικῶν μὲν ἐξὶν ὀξείας. το δὲ
τυρὸς

τυρός, οὐ τῷ ἐν τῷ αἵματι τὸ μὲν οἶον ἰχῶς αἵματι· αἰσάλογον
 ὁρῶ γὰρ λακτιῶ, τὸ δὲ οἶον ἔλυσ τις καὶ τρυῖε &c. Quādiu igitur in
 corpore adhuc sunt ἰχῶρες aquosæ serosæq; humiditates sanguinis, uel
 aquosi humores sanguinis latine dici poterunt. Nam ipse Galenus eos-
 dem nunc pituitosos, nunc biliosos χύμους, quod est, humores nomi-
 nat. Vbi uerò extra corpus aut uiuum, aut mortuum eruperint, sanies
 appellari debent. Vt apud Galenum tenue in ulceribus excrementum
 ἰχῶρ, nobis sanies non incommode exponitur. Item in capitis uicijs
 quæ ἰχῶρας nūcupantur, ἰχῶρες sanies recte dicuntur. Plinius in assati
 iecoris saniem appellauit; humorem, qui abs iocinore, uel pulmone, uel
 alia parte dum affatur, emanat. Caterum Paulus hoc in loco apposite
 dixit ἀποτίκτονται, hoc est, eliquantur, sicut in corporibus mortuis per
 solis æstum fieri solet. Atq; hæc sanies crassa uiscosaq; existit.

Sanies.

Medicamentum ex charta, xerion. Huius descriptio est in septi-
 mo. Vocatur autē xerion quod aridum sit, et in puluere accommodatur.

Ad Achoras, recrementum. In impresso codice habetur πρὸς
 ἰχῶραι τας, hoc est, ad eos qui saniem habent, ego autem puto legen-
 dum πρὸς ἀχῶραι τας, hoc est: Ad eos qui Achoras experiuntur. Nā
 titulus idem habet, nempe ad Achoras, non ad ἰχῶρας. Quāquam
 Orosius ἰχῶραι τας legendum censet.

IN IIII. CAPVT.

Capitis dolor. Hæc ex libro secundo Galeni de compositione me-
 dicamentorum secundum locos transcripta sunt. Paulus autem
 σύμπτωμα dolorem esse refert, ubi Galenus διαίθεσι ponit. Ille hunc
 superuacuire intemperiei, hic affectum ipsum esse pronunciat. Rursus
 apud Galenum plures causæ commemorantur, una sane, simplex intem-
 peries citra humores, altera, horum qualitas, tertia ipsorum copia, itē
 obstructions humorum, uaporumq;. Alia adhuc, quarundam capitis
 partium imbecillitas, interim externa quedam causa, quam græci προ-
 κταρατικῶν nominant: ego sæpe primariam interpretatus sum.

Orosius.

Nisi caliditati aut. Decet particula in codice græco impresso. Tu
 igitur lege μετὰ θερμῆς ἢ ψύξεως, quod est, cum caliditate, aut frigi-
 ditate. Decet enim ἢ.

Causæ do-
lorum ca-
pitis.Addendū
græco.

Prodest fronti & temporibus. Recte hoc dicit, nā per initia spina-
 lis medulla dolorē nō experitur, cōq; posteriora capitis ungi nō debent.

Pastilli ad cap. Alexander medicus hunc pastillum describit. Sed
 pondera nonnihil in quibusdam medicamentis uariant. Commendat
 enim ad diuturnos dolores, omnibus alijs remedijs nihil proficientibus.

COMMENTARIUS

Vbi Paulus, ex somniferis aliquid, dicit, Alexander opij momentum inijciendum precipit.

At si frigus. Ad verbum ex Alexandro hac ut superiora mutuatus est Paulus. Facies nō cōcidit, hoc est, nō macrior est reddita, ut ex calore sed colorē decorēq; amisit, pallida effecta. Sic ὀχρῶν, quod est sine colore, ex Celso interpretatus sum. Sanguis enim ob frigiditatem partes externas relinquens, intro refugit, unde pallor necessario superuenit.

Præsertim si recrementa. Hoc est si ex crassis glutinosissq; humoribus dolores sint excitati. Græca sunt ἡνὶ παχύτερα γλισχρὰ τῶν πτάματ' ἐν. Quæ verba satis obscura in hūc modū intelligi debēt, si humores crassi viscosiq; i capite tenacius hæretes, dolorē excitant.

Si biliosus humor. Hæc & sequentia ex Galeni scūdo de cōpositione medicamentorū secundū locos, nullo verbo mutato, habentur. Cæterum ambo præcipiunt, tum Galenus, tum Paulus primū balneum temperatū, inunctionem, cibum potumq; refrigerantem. Deinde offerunt medicamēta bilem educentia; quod sane Alexander medicus suo seculo clarissimus in hunc fere modum exponit. Conuenit igitur, ut superflua medicamentis bili ducendæ idoneis educantur. Verum ut hoc secundum rationem fieri possit, corpus antea præparari humectariq; debet, cibis temperatis, balneis & unctionibus. His enim probe contemptus, resolutus & quasi imbecillior effectus humor, facilius expurgabitur.

Abinthii dileto. Hoc est, ut officinæ uocant, infusione: tunc nimirum cū pauca bilis Stomachi tunicas imbuet, irrigaritq;.

Vel aloë. Scammonia nunquam exhiberi debet, nisi maxima bilis copia dolorem excitarit, nec alia uiolenta medicamina. Picra autē prædest, ubi crassi aliqui succi bili sint permixti.

Si caput consortij lege Græce est συμπαῖσχει, hoc est compati-
tur. Celus lege consortij, aliq per consensum patitur, exponunt συμπα-
θεα. δεια namq; est, cū pars aliqua corporis, alterius malo uel cōfinij. uel cō-
quid. nexus, uel cōmunicatiōis gratia cōdolescit. Huic cōtraria ἰδιοπαθεα,
Legē con uel, πρωτοπαθεα cū p se, & suo uicio tantū afficitur: quē affectum
fortij. primarium nominare licet, et ἰδιοπαθεα, primario affectu laborare.
Cōsensus. Emoliamur. Verbum græcum est ἐμολῶσαι quod de pertinaci-
ἐμολῶσαι ter herētibus proprie dicitur, ut de viscosis, crassisq; humoribus partem
aliquā tenaciter obsidentibus: item de induratis affectibus. μοχλεῖσαι
idē est quod κονῖσαι, libro septimo ait: ἡ πρὸς τὸ μοχλεῖσαι διαδ-
σιν δυνάμεως, de medicamentis efficacioribus sermonē habens.
Propterea mihi uisum est, emoliri uerbū non incommode hic usurpare.

VTerque hic affectus. Ad uerbum è Galeni secundo de compo-
sitione transcripta sunt, nisi quod pro hac dictione, permanens, Pau-
lus παραμεινέ, Galenus χεῖν ή δύσλυνέ, hoc est, diutur- παραμει-
nus, & soluti contumax, habeat. Celsus acutum & pestiferum mor νειμέ.
bum appellat κεφαλαίον.

Hiera quam exacueris. Scammonio, aut ueratro adiecto hiera
uehementior redditur. Atq; id per ὁ ξυώατας intelligitur. Nā ὁ ξυώειν
idem est quod acutum reddere, intendere, uehementiorem efficere.

Vnguenti irini. Ad uerbum habetur hoc in Alexandro. Apud Ga-
lenum uariatur nonnihil hoc modo. Vnguēti Irini expressionis, castorei,
singulorum pars una, baccarum lauri pars una, uiticis seminis pars
una, rosarum siccarum, pars una, rutæ summitatum partes quatuor.
Aceto resoluta excipiuntur cerato &c.

Dum intabescerent. Sic reddidi ἕως τὰ κερῶσιως, Celsum imi-
tatus Oroscius improprie usq; ad eliquationem dici iubet.

Oroscius.

Partem affectam irrorabit. Lege in græco κατῆόνει pro κατε-
νει, quod est, κατέβρεχε κατὼ τῷ τῷ superfundebat, aspergebat, non
inspergebat ut uult Oroscius.

καταμο-
νειν.

Oroscius.

Dropax. Huius descriptionem habes in septimo Pauli ad finem,
ubi etiā sinapi smus exponitur. Hæc sunt medicamēta noxios humores
in summā cutē euocantia, μετὰ συγκριτικὰ græci nominant. Sic etiā μετασυγ-
Celsus uerbū hoc uidetur interpretari, ubi summā cutē, inquiens, rela-
κari, euocariq; corruptū humorem, & habitū corporis mutari expedit.

κριτικὰ.

Malagmate, quia liquidū est parygron. Galenus lib. 7. de cōpo.
medicamētōrū secundū genera, iter malactica ponit, quod recipit adipe
suillū curatū, ceram, et argenti spumā. Eoq; merito interpretatus sum
dictionē, contra opinionem Oroscij. Male est in impressis παυνέρο.

Sani. Lege in codice græco ὡς μετὰ λουτροῦ ὑγιᾶς γίνεσθαι παυ-
τελῶς τῆς κάμωντας, ut habet Galenus libro secundo iam sæpius
citato, ad calcem.

Corrigen-
dus co-
dex græ-
cus.

Apophlegmatismus. Nunc uertō medicamentū, quod pituitam per
os educat, nunc quod salinā moueat. Ut hoc in loco, Celsum imitatus in
capite de Cephalæa, cap. 4. Cæterum in græco codice habetur Γο. 1β..
quod est, unciæ 14. ego puto Γ. 1β. legendum sicut interpretatus sum.

Nota.

AT quæ mentis alienatio. Quia multæ in hoc caput no-
cua incidunt, idem propemodum significantes, non abs re fue-

COMMENTARIUS

rit, eas curiosus in utraque lingua distinguere. Mentis igitur alienatio
 παρακόφου. uerti pro græca dictione παρακοπή. Nam in febris uehementis sta-
 tu, ut ait Galenus, accidit egros παρακόφου, παραχθῶναι, παρα-
 παραχ- ληῆσαι, & παραφρονῆσαι, quæ latini exponunt, mente alienari men-
 δῶναι. te non constare, aliena loqui, delirare & desipere. Si autem hoc con-
 παρα- tinuè accidat, phrenitis dicitur. At si in statu dementia superueniat in
 φρονῆσαι declinatione autem cesset, delirium, non phrenitis est appellanda. Cel-
 Phrenitis. sus eandem ponit distinctionem libro tertio cap. 18. Phrenitis, inquit
 Demetia. tum demum est, cum continua dementia esse incipit.
 Delirium.
 Læmæ.

Orosius. Vel læmis, hoc est. Orosius male exponit λιμῶντας, id est lip-
 pientes. Non enim Læmæ lippitudinem signant, alioqui omnes quibus
 Læmæ in oculis innatant, ut hectica uel potius marasmo confecti, lip-
 pitudine laborarent. supra dixit Plinium dictionem græcam usurpare.
 Celsus pituitam interpretatur.

Coma. Coma. Galenus commentario in primum τῶν προῤῥητικῶν re-
 fert, Coma & Cataphoram apud Hippocratem idem esse. Sed Coma
 duplex inuenitur pro humoris ratione. Nam cum per se est, ex pituito-
 so generatum humore, grauis sopor, & quasi inexpugnabilis dormien-
 di necessitas. Quod si biliosus humor mixtus præpolleat, uigilans coma
 dicitur. Quo qui detinentur, nequeunt uigilantium munia subire, sed
 tum palpebras claudere cupiunt, tum dormire sperant.

προσφόρος. Commodū incident. Hoc est, opportunitate et occasione sumpta se
 Panis lo- ingerent. Hoc enim apud grecos προσφόρος ἐν τυγχάνειν significat.
 tus. Panis quoque aqua lotus. Galenus panis eluendi rationem inuen-
 tam esse scribit, ut obstructionem in cibo impedirent. Nam hic panis
 lotus quàm minimum habet crassicie, glutinisq; ut pote ex terrestri ac
 graui, aereus, levisq; factus.

Duracina. Peponis duracini. Sunt qui non duracini legendum censeant, sed
 Rhodaci- rhodacini, quanquā Palladius, Paulus, aliq; recentiores greci ut Con-
 na. stantinus ῥωδάκινα legant, quos Palladius ubiq; imitatus, duracina
 conuertit, quicquid sit siue rhodacina, hoc est, à Rhodo nominata, siue
 duracina à duritie, persica proferas, non multum interest. Plinius etiam
 cerasa, & uuas duracinas nuncupat. Tu utrum malis sequere.

ὥμῃ λυσίς. Hordeacea farina. Græce est ὥμῃ λυσις quasi dicas, cruda solu-
 tio, uel cruda farina ordeacea, ad differentiam polentæ quæ torretur.
 Verum latini interpretes crudam omittunt, lectori id intelligendum re-
 linquentes. Aliquando etiam de aliorum farina ὥμῃ λυσις dicitur, uerū
 tunc apponitur frugis nomen, ut πυρίνη ὥμῃ λυσις. ἢ λινασπέριμον. Se

pe ex superabundanti κριθίνω ὡμὴ λύσις nominatur.

IN VII. CAPVT.

Multus angor. Caput hoc ex octauo Oribasij transcriptum est. Græce habetur πολλὴ ὄσκη, quod interpretantur plerique, sicut etiam ὄσκη. Oroscius, fastidium, cum uerè hoc loco sit dicendum multus angor. Oroscium Nam adeo torquentur, ut nesciant quid ipsis sit agendum. nunc lecto se erigunt, nunc rursus decumbunt, uitæ quasi pertæsi. Morbus hic intra septimum sepe iugulat.

Tumore molli Sic reddidi οἱ δὴμα, qui tumor, prementibus digitis cedit, eoq; dixi, molli. Tu si libet dicas, cum œdemate.

Emisicij. Hoc est, qui foras propelluntur, dolore nimio exprimente. Græce est προπετὴ γίνονται.

Porro vitior. Post totius corporis uacuationem deriuationemq; per propinquiores particulas ad topica uenit remedia. Primum aspergines ex hydreleo, aut uino & oleo, ut in alijs partibus inflammatis cōueniunt; deinde cataplasmata ex pane, aut farina hydreleo subacta, quæ ad maturationem perducunt. Id enim uerbū πεποιμένον significat.

IN IX. CAPVT.

Lethargus. Oribasius lib. 8. omnia ad uerbum habet. Galenus commentario in primum prorrheticon, in hunc modum scriptum reliquit: φρενίτις μὲν γὰρ ἢ ἀκριβὴς, ἢ ὀμικτὴ ἐτέρῳ νοσήματι γίνεται χολῆς ξομθὶς κατὰ λαβούσης τὸν τόπον ἐν ᾧ τὸ ψυχρὸς ἡγεμονοῦται. ἀλλ' ἄρα γὰρ δὲ τὸν αὐτὸν τόπον ὑγρὰ αὐτὸς καὶ διαβεβέξεται φλέγματι. Consentiumt hæc cum Paulo, nisi quod ipse pituitam frigidiorē habeat.

Caros. Vide Galenū secūdo cōmentario Prorrheticorum, ubi refert tres quasi species Cari, nēpe morboſi, quo de hic agitur, mediū ut ex uino cōtracti, et boni, qui post longas uigilias solet accidere. Ceterū arteriæ Carotides à caro nomē habēt, quāquā si intercipiātur, nō statim mutū animal, aut soporofum euadat sed omnes arteriæ quæ supra uulneratas partes habētur, pulsum amittunt. Interpretari licet, soporē ueternofum.

Febrium accelsionibus. Emenda codicem græcum, ac pro παρόξυσμο lege παροξύσμοις, quod Oroscius & castigatōr Basiliensis studio, opinor neglexerunt.

Membranæ custode. Sic interpretatur Celsus libro octauo, capite tertio; Quomodo os excindatur. Hæc autem sunt ipsius uerba: Factis foraminibus eodem modo media sæpe, sed multo circumspectius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eandem membranam uiolet, do

Cari species.

Oroscium

COMMENTARIUS

Μembrana custos **μὲν γοφῶ**
οὐλαξ. nec fiat aditus, per quem membrana custos immittatur. **λακα** greci uocant &c. Nunc quid sit membrana custos, audi. Lamina, inquit, enea est, firma, paulū resima, ab exteriori parte leuis quæ demissa est, ut exterior pars eius, cerebro propior sit. subinde ei subijci-tur quod scalprio discutiendum est, ac si excipit eius angulum, ultra transire non patitur, eoq; & audacius, & tutius scalprium maleolo subinde medicus firit, donec excisum undiq; os eadem lamina leuetur, tol-liq; sine ulla cerebri noxa potest &c.

Nota. Quæ cito transeunt. Hoc est, quæ cito per totum corporis habitum rapiuntur, quale est quod etiam Diacalaminthes inscribitur. Habes utriusq; compositionem apud Galenum libro quarto de sanitate tuenda. Græce est τινὸς τῶν δ' ἐν πύρεον. Non intelligit hic Paulus, quæ per alium cito transeunt.

Iis autem qui in uetustatem. Id est, quibus morbus in uetustatem incidit, quiq; tremuli sunt. Nam postea ob diuturnitatem morbi exter-narumq; partium imbecillitatem, tremor accidit.

Βομβύλια Angusti oris vasculis. Sic interpretatus sum **βομβύλια**. Nam Hesychius ait: βομβυλίδος ποτηρίου γένος κατὰ μίαν ῥὴν πόντον ἑα-ξάντας, ὅθεν ὄλετ' ὁ ἥχος οὐ τὼ κεκλιῶται. Cuenient igitur ut eius-modi poculis dulcis aliqua potio ita affectis instilletur.

IN X. CAPVT.

Interim rubore tineta est. Græce erat ἐρυθρὸν αὐτοῖς ἐπαυθεῖ. Hoc est, rubor eis efflorescit, uiuidus est. Auicenna hoc caput ut alia pleraq; in suum librum quasi transcripsit, mutato ordine tantum, uo-catq; affectum Subet asabari.

Qui vero malo victi sunt. οἱ δὲ κραιπνότεροι. Celsus uertit malo uicti. Opponuntur ijs qui mediocriter habet; qui morbo possūt resistere.

In ijs autem periculum maius est. Reddidi sic græca hæc χάλειποι δὲ μάλλον εἰσὶν, quod est, difficiles autem magis sunt curatu scē licet, quibus uigilie sunt continuæ.

IN XI. CAPVT.

Causam habent communem Subintellige, mentis noxa, et me-morie iactura. Fatuitatis causam Galenus commentario in libel-lū Hippocratis de natura hominis ita memorie prodidit: τὸ μὲν ὅξυ καὶ σωετὸν ἐν τῇ ψυχῇ ὄλετ' τὸν χολώδ' ἡ χυμὸν ἔσαι. τὸ δὲ ἰσθαῖον καὶ βέβαιον ὄλετ' τὸν μελαγχολικόν. τὸ δ' ἀπλοῦ καὶ ἡλιθιώτε-ρον ὄλετ' τὸ αἶμα, τοῦ δὲ φλέγματ' ἡ φύσις εἰς μὲν ἡδονοποιῶν ὀχ-ρεῖται. Quæ uerba olim sic reddideram: Acumen ingenij & prudentia

ex bilioso humore nascetur. Constantia uero & firmitas ex melan-
cholico: simplicitas stoliditasq; ex sanguine: pituita uero natura ad mo-
res fingendos inutilis &c. Ceterum communem causam refert Paulus
& mentis noxe, & memorie iactura. Male habebatur in greco co-
dice $\nu\gamma$ $\nu\alpha\upsilon$ pro $\nu\omega\iota\lambda\omega$, ut annotauit Orosius quoque. Sed hoc sane de-
bet exemplari suo. Quod autem $\tau\lambda\omega$ $\sigma\upsilon\gamma\acute{\alpha}\sigma\alpha\iota$ uerteris, illic confi-
stentem, cum dicendum esset, constituentem, efficientem eruditioni
sue & ingenio debet. Nam si consistentem, hoc in loco Paulus dicere
uoluisset, non opus erat articulo $\tau\alpha\lambda\omega$, qui ueluti autorem & opificem
demonstrat. Sic etiam Galenus intelligit lib. 3. de locis affectis, unde hae
partium descripta sunt.

Vitiatus
codex
græcus.
Orosius

Vel utique in humiditate inspersa. De ea nimirum dicit humi-
ditate, quæ per totum corpus cerebri dispersa est. Galenus tertio locorū
affectuum habet sententiam eandem, sed paulo apertius.

IN XII. CAPVT.

Vertiginum affectus. Vide Galenum libro tertio de locis affectis. δίνω
Alibi autem refert causam inordinatam flatuosi spiritus motionē,
qui uel in cerebro generatur, uel ab inferioribus sursum fertur.

Rotas, vortices ve Græce est $\delta\iota\omega\tau\eta\varsigma$ $\chi\omega\upsilon\varsigma$ ἢ $\delta\iota\omega\tau\eta\varsigma$, Galenus $\tau\eta\varsigma$
 $\chi\omega\upsilon\varsigma$ ἢ $\delta\iota\omega\tau\eta\varsigma$ ἐν ποταμοῖς, hoc est, rotas uel vortices in fluminibus. Nā
 $\delta\iota\omega\tau\eta\varsigma$ $\sigma\upsilon\gamma\epsilon\phi\eta$ ἢ $\delta\iota\alpha\tau\alpha\iota$. At $\delta\iota\omega\tau\eta\varsigma$, ait Gal. $\delta\iota\omega\tau\eta\varsigma$ $\lambda\epsilon\iota\tau\alpha\iota$, ὅταν ἡ κεφα-
 $\lambda\eta$ $\pi\acute{\alpha}\rho\delta\iota$ $\phi\acute{\epsilon}\rho\epsilon\tau\alpha\iota$, $\pi\alpha\upsilon\tau\acute{\alpha}$ $\lambda\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ ὅταν δὲ σκοτῶδης ἡ ὄψις ἀμὰ $\tau\omega$
 $\delta\epsilon$ $\phi\acute{\alpha}\iota\eta\tau\alpha\iota$ σκοτῆδ' $\eta\delta$ $\kappa\alpha\lambda\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ &c. Apud latinos uertigo alterū δίνω
nominari potest, alterū si ad uerbū interpretaris. Tembricosa uertigo.

Medicamentis, quæ odore mouent. Hoc est, quæ naribus odorā-
da adhibentur, atq; ita cerebrum commouent, græce dicuntur $\delta\sigma\phi\epsilon\omega$ -
 $\tau\acute{\alpha}$. Celsus, quæ odore mouent, conuertit δσφραω-
τά.

IN XIII. CAPVT.

Morbus conitialis. Vide Galenum libro tertio de locis affectis,
& Oribasium in octauo, unde Paulus hæc ad uerbū transcripsit.
Græci uocant ἐπιληψία, quæ dictio comprehensionem, retentionem,
obturationemq; significat. Nam spiritus animales hoc in morbo deti-
nentur, adeo ut in membra corporis distribui nequeant.

Vel certe alijs quoq; . Græce est $\gamma\omega\omega$ $\kappa\alpha\iota$ ἐξ ἀνὰ δόσεις ἐτέ-
 $\rho\omega\upsilon$ $\mu\epsilon\gamma\iota\sigma\tau\alpha$, ad uerbū sonat: Vel etiam ex aliarū partium distributio-
ne, quod est, uel etiam alijs particulis cerebro communicantibus. ῥάσις.

Volens artis & consilij expers. $\sigma\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$ ἀπρόσπειρος in greco co-
dice habetur, quod est: Status qui citra uoluntatē & propositū fit, uel $\epsilon\iota\sigma\iota\varsigma$.

COMMENTARIUS

luti angustia, aut tristitia. Aristoteles distinguit προάγεισιν ἀκούσιον. Illa enim fit cum ratione et intelligentia, ἀκούσιον contra. Possis itaq; dicere, inuitus corporis & animi status. Galenus libro supra nominato ait: Dormientes spirant, quamuis nulla alia accedat

παράκο- actio, quæ uoluntate et consilio regatur. Item μηκέτι παρακολουθεῖν
λαθεῖν ē- ēαυτῷ, quod est: Non amplius constare mente & intelligentia: ad
κντῷ. uerbum uero sonat, seipsum assequi.

Eorum quæ perceperant. In greco due tantum dictiones habentur, τῶν προσέχων λήθη. Suidas προσέχειν interpretatur προσοχῶ hoc est, meditationē, perceptionemq;. Sunt qui malint τῶν προσέχων λήθη exponi, propinquorum obliuionem, uel necessariorum.

Menstruis purgationibus. Græce est simpliciter κατὰ τὰς καθάρσεις. mox addit ἡ τὰς κύήσεις, hoc est cū in utero habere cœperint Celsus apte dixit, In pueris, ueneris, in puellis menstruum initium tollit. Paulus hoc pubertatis uocabulo comprehendit. Vide Aphorismum septimum libri quinti, eiusq; commentarium Galeni.

Si infans adhuc fuerit. Galenus exiguum quidem, sed elegantem puero comitali commentarium dicauit: in quo morbi huius omnem curandi methodum & rationem est complexus. Reliquarum ætatum meminit etiam libro tertio de locis affectis.

Viciosus
græcus co-
dex.
Sinapif-
mus.

Mane passū auferetur. Codex græcus habet κεράσαντα, παρά-
σαντα. quod Orosius annotauit. Gemusæus ut exiguum nimis præterijt.

Sinapismus. Nempe ut noxi humores ex alto corpore in extima euocentur. habes autem sinapis oblinendi rationem libro septimo Pauli abunde & eleganter expositum.

Iam etiam acrium ciborum esus. Græce est δεινμιφαγίου. Celsus de eodem morbo uerba faciēs, acria, inquit, assumat. Marcellus Dioscoridis interpres, male conuertit uomitionem acrium ciborum esus concitatam.

Vidi autem quandoq; puellum. Galenus hoc commemorat libro sexto de simplici medicina, ubi de herba Glycyfide disputat. uidi in-
quiens puerum totis octo mensibus, morbo liberum & cū forte fortuna radix à collo cecidisset, rursus confictatum &c.

Inuasuro quidem symptomate. Addidi ad euidentiore intel-
lectum, communicare morbum aliàs obscura nimis esset sententia, ἐπεὶ
δὲ αὐτὸν αὐτὸν ὡς τὸν μὲν ἰδὲν, id est ubi senserint particulam, intelligendū
affici, uel à particula morbum excitari. Hæc dixi ne Aristarchi nostri
aliquid me præter sensum Pauli assuisse clamitent.

Cum autem remitti. Græce est ἐν δὲ αὐτῷ σερὶν ἀποθεραπύειν. ἀποθεραπύειν
In remissionibus autem apothera pia uti. Est autem ἀποθεραπύειν πύειν.
corroborare & firmare corpus. nec non uindicare à lassitudine. Sequi-
tur autem omnium exercitationem magnam, ne corpora in lassitudine
incidant. Hic autem post accessionem corpus ante agitatum recreare
nonnihil oportet, uel particulam, unde morbus excitatus est. firmare
caustico medicamento, quod calorem in eo excitet, ne amplius in eam
humor frigidus, aut supernuacuis confluat, & inde ad cerebrū feratur.

Inconniuens è sublimi conspectus. Sic exposui ἐν τῷ ἀτενίζειν ἀτενίζειν
ἐξ ὑψους quod ad uerbum sonat inconniuenter conspiciere ex alto. Cel-
sus uertit clarè è Græcis, loci præcipitis conspectus.

IN XIII. CAPVT.

MElancholica. Galenus de hac multa libro tertio de locis affe-
ctis. Oribasius eadem libro octauo habet. Ceterum uno omnes
cōsensu dicunt insaniā, mentē ipsam occupare, nunc cerebro ipso pecu-
liari uicio laborante, nunc totius corporis affectionē simul experiente.

Per se ægrotante. Ita interpretatus sum Græcam dictionē, πρω-
τοπαθούτῳ quasi primario affecto exponas. Idem uero est, per se
apud idoneos scriptores, quod nimirum, nullo alterius consensu.

Homines auerfantur. Misanthropia est eiusmodi animi affectio,
qua quis in solitudine uiuere cupiat, uitet hominum consortia, ut Ho-
merus de Bellerephonte scriptum reliquit.

Qui miser in campis merens errabat Aleis,

Ipse suum cor edens, hominum uestigia uitans,

ut Cicero uertit. Dicimus etiam μισανθρωπείν, & apud Hippocra-
tem ἀπανθρωπύειν, hominum consuetudinem auersari. μισαν-
θρωπείν.

Inane violenter tractent. Ita exposui διαχειρίσθαι Celsum ἀπανθε-
secutus in capite de phrenitide, ubi habet: Alij consurgunt, & uiolenter πύειν
quedam manu faciunt. Non sum ignarus διαχειρίσθαι ab Hesychio διαχει-
exponi φονεύειν, quod est occidere, uerum hoc non semper contingit. σείδειν.
Tractant quidem uiolenter eos, tum feriendo, tum mordendo, tum alia
faciendo. Neque hic debebat Oroscius nimium esse grammaticus. Oroscius.

Qui igitur ex primario. Hæc ex libro tertio de locis affectis ad
finem transcripta sunt. Reddidi πρωτοπαθούτῳ primarium affectū,
qui nō ex alterius partis dolentis consensu oritur. Ceterū omnia reme-
dia melancholice Galenus loco suprā citato enumerat præter hoc, unā
cum decenti animi delectatione, quæ Græcis dicitur θυμολία.

Aut gestandi grabato intra lecticam insanientibus pecu-

COMMENTARIUS

γύραθον liarem. Celsus etiam inquit, maxime suspensi lecti motus. γύρε, αἰσθη-
 teste Suida, κλητὴ ἐν ἡ τοὺς παρ' ἐτοῦς καὶ δ' αἰμονιῶδ' εἰς τρεῖς οὐ σι.

IN XV. CAPVT.

Incubo.

E Phialten. Hunc aff' etum appellauit Incubonem secutus Scribonius
 compositione centesima, ubi inquit: Facit hæc compositio ad suspi-
 rium, & ad uocis abscissionem, & subitas præfocationes ex qualibet
 causa ortas, & ad eos qui sæpius existimantur ab Incubone deludi.

Nocturna
 delubria.

Plinius nocturna delubria nominat.

IN XVI. CAPVT.

Qui lycanthropia detinentur. Hic morbus apud Latinos nomen
 nullum habet: si ad uerbum interpreteris, Lycanthropi sonat lu-
 pini homines, hoc est, qui lupos imitantur. Auicenna integrum caput
 de Cutubui hinc transcripsit.

Oculi ad uidendum imbecilles. Græce est, ὁφθαλμοὶ ἀδ' ὁφθαλμοῦ,
 ὁφθαλμοῦ quod sonat, uident imbecille. Nam ὁφθαλμοῦ idem quod ὁφθαλμοῦ. Ani-
 cenna: Oculi ipsorum sunt debiles & submersi.

IN XVII. CAPVT.

Nota.

A Mores. Barbari uocant, amor ereos, quasi dicas, amor amoris.
 Nam ἔρεος Græcis amor appellatur. Auicenna ὕψι nuncupat, ex
 Paulo multa transcripsit. Habet autem diuersum de oculis, & sunt,
 inquit, omnia mēbra arefacta, præter oculos. Paulus refert: Et cum
 relique corporis partes non collabantur soli hi amantibus concidunt.

ἀλσία.

Pulvis proprie nullus Vide Galenum in libello περὶ προγινώ-
 σκεν, ubi se mulieris amor in ex pulsu deprehendisse testatur.

Balnei abstinentia. Orosius legi pro ἀλσίου, hoc est balneo
 rum abstinentiis, ἀλσίου, hoc est, uinculis ut exponit: quasi aman-
 tes in uincula sint coniungendi. At sequens sententia Pauli facit, ut ἀλ-
 σίου legendum censeam. Nam prudentiores inquit, ad balnea, compo-
 sitionemque eos ducendos præceperunt. Tu autem candide lector, utram
 malis scripturam sequere. Nam haud ita multum refert.

IN XVIII. CAPVT.

ἡμιπλά-
 για.

Quando commune quidem. Ex tertio Galeni libro de locis affe-
 ctis, et deinde ex octauo Oribasij hæc collecta sunt Galenus
 autem non meminit dictionis hemiplagias, quæ idem signat quod pa-
 ralysis. Ad uerbum si interpreteris, sonat simplexia, hoc est in dimi-
 dia parte percussio. Nam uerbum πλάγιο. unde apoplexia, & hemi-
 plagia deriuantur, serio percussio apud nos significat: unde non omni-
 no male tali percussos affectu, attonitos Celsus nominat, quorum

scilicet, & mens, & corpus stupet.

Commune neruorum principium. Cerebrum omnium neruorum tam sensilium, quam mouentium fons & origo existit. Medulla uero secundo neruorum mouentium principium dicitur. Nam & ipsa a cerebro propagatur. At in hoc afflictu primum anteriores uentriculi, deinde medius, postremo & qui in cerebello habentur, obturantur ad o, ut ne pauxillum quidem spiritus animalis ad medullam spinalem neruos deriuentur. Vnde sensus, motusq; intercidat, aboleaturq; necesse est. Quomodo fiat apoplexia.

Ita ut pariter principis animæ. Tres sunt secundum Platonis, Aristotelis, & Galeni sententiam in humano corpore animæ species. Una θυμοειδής, altera επιθυμητική, tertia ήγεμονούσα, uel in neutro genere τὸ θυμοειδές, τὸ επιθυμητικόν, τὸ ήγεμονούσῳ, ἢ λογικόν ἢ λογικό μίλον. Prima in corde sedem ac domicilium habet. Secunda in iocinore. Tertia que aliarum dux & princeps est, in cerebro. Merito igitur ea impeditur, uentriculis omnibus obstructis, præsertim medio, ubi ratiocinatio consistere dicitur.

Sin autem in altera. Hoc est si alterius partis cerebri tantum, si nus, aut uentriculi, aut quomodocunq; appellare uelis, impediti, obstructi q; fuerint.

Voce intermortua. Græce est αἰανθοί, quod ad uerbum sonat, sine uoce, ut apud Hippocratem αἰανθούς. At Galenus interpretatur, ἐλάγως, quod est sine sermone. Num αἰανθὴ etiam λόγος dicitur. Intelligitur igitur uoce intermortua, pro sermonem edere non ualentes, quippe omnes nerui, tum sermonis, tum aliarum actionum duces, spiritu animali sunt destituti.

Toruli eleuantur. Hoc est, ipsæ uenæ attolluntur, quod capitis repletionem testatur. Græce est τῶν σφαγιῶδων ἐπαρµα.

Ipsi inhærescunt. Haud scio cur Orosius ἐγκέφαλον molesta uerterit. ἐγκέφαλον enim ex ἐν ἐγκέφαλον uenit. Nec puerita soli ori molesta est. Imo non adeo molesta est ijs quibus sensus omnino perijt. Rectius igitur que inherant, aut eo decumbunt ex capite, auferantur. Orosius

Cibus mollis, distribui facilis. In codice Græco habetur παρὰ ληψί μεδὰ τῶν ἀπαλῶν καὶ ἐν δίοικητον, καὶ χυλώδην τροφὴν, quod est: Assumemus tenerum, & distribui facile, & succulentum nutrimentum. Celsus libro tertio de morbo comitiali inquit: Neque sorbitiones autem his, alijq; molles, & faciles cibi, &c. At per χυλώδην quod nos reddidimus succulentum, intelligit cibum ex cremore, uel pisanæ, uel chondri, uel alterius frumenti. Nam χύλος cremorem χυλώδης τροφή

COMMENTARIUS

significat, qui in sorbitionibus dari solet.

Vnctioni uero accommodata. λιπάσματα τε σύγχριστα τοιαῦτα. In Græco exemplari est, quod Celsus expressisse uidetur: Vnctione uero, inquit, aptissimum est uetus oleum. Ad uerbum sonat Græce, pinguedines quæ illini queant, huiusmodi sunt.

ἐνταριχέ
νεοδα.

In quo scilla intabescit. Græce est ἐνταριχέ νεοδα uerbū, quod signat proprie agros abstinentia immoderata exiccare. Ita scilla in Sole eliquescit, consumiturq;. Celsus etiam dicit: In quo scilla intabescit.

Vitiatus
codex
Græcus.

Attendentes. Male in codicibus Græcis legitur προέχοντες, pro

Oroscius.

προέχοντες, hoc est aduertentes. Deinde in eadem sententia: ὅλγ᾽ τὸ μὴ σωαοδαίνεσθαι εἰ μὴ ὑπὸρ καυθῶσιν pro ὅλγ᾽ τὸ μὴ σωαοδαίνεσθαι μὴ ὑπὸρ καυθῶσιν. Quo in loco dum Oroscius alios reprehendit, nec locum Græcum emendat, & male ueritit ὑπὸρ καυθῶσιν, ne uehementer urantur: cum Paulus uelit uehementer quidem, sed non nimium, non supra modum, nec magis quàm conuenit.

φοινυμοί.

Cutis ruborem. Sic interpretor τοὺς φοινυμούς, Celsus habet: Prodest etiam torpentis membri summam cutem exasperasse, uel urticis caesam, uel imposito sinapi, sic ut ubi rubere cœperit corpus, hæc remoueantur.

Oroscius.

Feculæ. Græce est φέκλης quæ fex combusta dicitur. Gal. lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos ad Achoras inquit, τρυγὸς οἶνου κεκαυμένης, ὡς ἑωμάοι φέκλῳ καλοῦσιν. Latina itaq; dictio est fecula, quam Græci imitantes φέκλῳ nominant. Largus etiam utitur pro fece uini combusta. Hoc ignorabat Oroscius, dum alios reprehenderet.

Canina cō
uulsio.

Canum more conuellantur. Verbum è uerbo reddidi. Largus autem interpretatur quid sit spasmus caninus, his uerbis: Facit ad κωϊκὸν σπασμὸν, cum in utramlibet partem deprauata est facies. Celsus libro quarto habet: Circa faciem uero morbus inuascitur, quem Græci κωϊκὸν σπασμὸν nominant. Is cum acuta febris est, os cum motu quodam peruertitur, ideoq; nihil aliud est, quàm distentio oris.

ξίνεγχύ-
της.

Per narium clysterem Græce est ὅλγ᾽ ξίνεγχύτου, hoc est ad uerbum per narium infundibulum, per quod medicamenta in nares infunduntur. Quemadmodum ὠτεγχύτης, clyster auricularius, et μητεγχύτης uterinus. Celsus libro quarto, capite secundo. fere eadem.

καθέτηρ.

Per rectos siphones. Sic uidetur Galenus significare, qui καθε-
τήρς libr. 5. Methodi ὅλγ᾽ τῆς τῆς, quasi recto foramine preditos

Oroscius.

canales interpretatur. Oroscius rem medicam ex Celio maluit discere.

Lentisci. Male in utroq; exemplari habetur σχίνον, quod est iunci Codex
odorati pro σχίνον nam astringentia in hoc morbo requiruntur. Græcus
Vitulinumq; & oleum. In Græco codice deest particula καὶ. depraua-
Nam habetur tantum, σέαρον ὕειον, καὶ χλωϊον καὶ μολόχινον ἔλαιον. tus.
Cū sit legendū: καὶ ἔλαιον in fine. Nā molochinū oleum nullū dicitur. Corrige
Cum communi curatione. Hoc est præter communem resolu- Græca.

torum curationem, quæ medicamentis extrinsecus adhibitis, alijsq; ab-
soluitur, etiam hæc quæ sequuntur, facies.

Nostri ætate. Quod Paulus suo tempore accidisse in morbo co-
lico commemorat, nos quoque nostra ætate frequenter uidemus. Nempe
ex magno, diuturnoq; colico cruciatu artuum resolutionem, præsertim
brachiorum, quanquam & crurum imbecillitas summa adfuerit.
Iam ex febre quæ humoribus ad intestina confluentibus, ibiq; dolo-
rem uehementem excitantibus finita fuerit, secuta est artuum resolu-
tio, quod nuper in Canonico quodam, sed non iuxta regulam uiuen-
te, sum expertus.

IN XX. CAPVT.

CVM particulæ corporis in anteriora. Hoc Celsus paucis com-
prehendit: Cum mentum inquit, pectori anneclitur, emprostho-
tonos, cum scapulis opisthotonos: cum rectam & immobilem cerui-
cem intendit, Tetanus dicitur.

Optimum itaque præsidium. Hippocr. lib. 4. Aphorism. I. sectione
57. Qui conuulsione, aut distentione neruorum tenentur, febre super-
ueniente liberantur.

Nonnunquam & risus ipsis Sardonius oboritur. Dioscorides
lib. 6. sardona ranunculi genus esse testatur, quæ uescentibus mentem
adimat, & quadam neruorum distentione, dehiscere in rictus ora co-
gat, ita ut imaginem ridentium præbeant. Risus Sar-
donius.

Cucurbitulas admouere cum lancinatu. Græce est μετὰ ὀμυ-
χῶν, quod sonat cum uibicibus excitatis. Sic intelligo hoc loco lanci-
natum scalpelli.

Abstergere, ne imprudentes. Dum Oroscius alios reprehendere Oroscius,
instituit, ipse corrigendus uenit, qui tam impure, & nullo sensu peni-
tus uertit, ne perfrigerati occultentur. Videtur autem lexicarius adhuc
esse interpres μη λαΐδωσιν ψύξαντες, quod ad uerbum sonat, ne la-
teant refrigerantes, hoc est, ne imprudentes, nescij, ac non aduertentes,
refrigerent particulas.

Hydromeli spilsius. Sic exposui ὕδρὸς μελι λιπαρόν, hoc est ad

COMMENTARIUS

uerbum, hydromel pingue. At nulla pinguetudo in eo habetur. Sit itaq; λιπαρόν ad pinguetudinis crassiciem incoctum. Nam ad dimidias co- qui precipit.

Oroscius. Et laserpicij radice. N. scio cur hic Oroscius succum laserpicij in- telligi uelit, cum apud Galenum Dioscoridemq; ipsum, ubi liquoris men- tionem facit, ὁπὸς ponitur Adeoq; in opisthotonicis. At radicem tum in puluerem redactam tum decoctam saepe & in his, & in alijs affe- **Male gra-** ctibus dari legimus. ut plane non sit, quod Oroscius in hoc loco uersio- **ca.** nem nostram reprehendat. Quin potius in exemplari graeco legendū putat ἐμπλαδέντα pro ἐμπλαδέντα & ἀφέψμα αὐτῆς pro ἀφέ ψματι. ut sit decoctum ipsius radice. Quid enim est silphij radice co- chlearia duo, aquae mulsae cyathis tribus inspersa, uel decocto ipsius da- ri? Quorsum referri debet, decocto? ad mulsam ne? quae iam cocta est, quantum opus est. Itaq; ad radicem magis competit. Ea enim uel pul- ueris modo inspersa, uel decocta exhiberi potest.

Græca ui- Myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopiq; decocto. Hic rursus co- **riata.** dix graecus deprauatus est, habet enim ἡ σμύρνης & α. μελικράτω ὕσσώπου τε ἀφέψμα Cum nimirum legendum sit ἡ σμύρνης & α. **Oroscius.** σὺ μελικράτω, ὕσσώπου τε ἀφέψματι, quod Oroscius & Basiliē sis castigatores non aduerterunt.

Nardi Distum est pro nardini, ut apud Celsum & Scribonium aliquando Rose pro rosaceo, nardi pro nardino usurpantur.

IN XXI. CAPUT.

Tremoris origo. Vide libellum Galeni de Tremore, quem nos ali- quando latinitate donauimus, ubi habet: τρέμου μὲν οὐ γίνε- ται τὸ ὀχούσης καὶ κινούσης τὸ σῶμα διαάμεως ἀρρώστια. οὐ γὰρ ἐξ αὐτῶν εἴηπου τὰ μόρια τῶν ζώων οὕτως οἷα βαρεὰ καὶ κατώ- φερεῖται πεφυκότα, τὰς εἰς ἀπαντὰ τόπον ἔχει κινήσεις. ἀλλ' ἢ ὅτε τῶν ὑδρῶν τοῖς μυσὶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπιεμπομένη διαύαι- μιν οἷον ὀχυμάτι καὶ πτέρωμα τὴν κινήσεως αὐτοῖς ἐστίν, ἢ ὅταν μὲν ἀπολέσῃ τελέως ἀπὸ λυσιδὲ τὰ παρὰ λευμλίαν, κατὰφέρεται δὲ πίπτει κατὰ δίκην ὁρεῖθ' πτεγοῖ ῥυήσαντο. ὁ δὲν οὐδ' ἐμὶα κινήσεις ἀπολείπεται τοῖς οὕτω παροῦσιν. Hoc est ut linguarū ru- des intelligant: Tremor itaq; fit imbecillitate, facultatis, quae corpus uehit, mouetq;. Quippe animalium particulae, tam graues cum sint, & deorsum ferri natae, non ex seipsis nimirum motiones, in omnem locū habent. Verū facultas quae à principio per neruos musculis transmitti- tur cū uehiculum quoddā, & ala mot. onis ipsis existit, quam cū pror

Tremor.

us perdiderint, perdunt autem resoluta, deorsum firuntur, caduntq; auis nemnis distituta modo, unde nullus motus ita affectis relinquitur.

In oleum descendant. Hoc est in solum oleo repletum, quo olim uti solebant, resoluti contracti arthritici tremuli. Graece est ἐμβλα-
σέον εἰς ἔλαιον. Celsus descendant in solum, ait.

IN XXII. CAPVT.

Quam ex affectione corporis. Hoc in omnium particularum morbis obseruandum docet. Galenus, ut corporis primum affectione, quam vulgus dispositam appellat, graeci διαθεσις, intueamur. Nam hac neglecta, quicquid particulis admoecamus, sinistrè accidit. Ceterum hoc te admonitum uolo candide lector, ubi in uersione mea dictionem inuenis, affectionem, pro διαθεσις positam esse, intelligas. Nam dispositio hoc in significatu apud idoneos autores non usurpatur.

Affectio.
διαθεσις

Perturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore naturæ alieno. Postrema clausula, naturæ alieno, male in codice graeco habetur, πρὸς τὸ κατὰ φύσιν. Vbi legendū παρὰ τὸ κατὰ φύσιν.

Graeca de
prauata.

Membrana adnata. Intelligo membranam coniunctam siue coniunctiuam, ut barbari appellant. Graeci τὴν ἐπιπεφυκίτην, eo quod alijs quæ oculum ipsum constitunt, tunicis extrinsecus adnascatur, ligamentum & ipsa existens totū, oculo ad ossa circumiacentia, ex pericranio ducens originem.

Mēbrana
adnata.

De fluxu nis impetu.

Angiologiam, arteriotomiā, hypospatiū, & periscyphismum. Omnes has rationes. Paulus libro sexto complexus est. Prima est uinarum in fronte ad tempora praesectionio quod in hemisphaeris etiam fieri solet. Altera est arteriarū retro aures per transversum sectio. Tertia est ab instrumento chirurgico appellationē sortita, quasi dicas spatæ submissio intra partes quæ a subiectis liberabuntur. Quarta ratio est, quæ diuisionē in fronte à tempore ad tempus transversum molitur, cura tamē adhibita ne temporalium musculorum motus uiolitur.

Angiolo-
gia Arterio-
tomiā.
Hypospa-
tiū.
Periscy-
phismus.

Recte huic specularium. Hic legit Orosius σφικλάριον, ut significet σφέκλω, hoc est, ficulam, cupiditate magis reprehendendi, quam ratione adductus. Diligens homo non legerat apud Galenum hoc remedium citari pro lapide speculario: nec etiam apud Paulum qui lib. 7 hunc in modum habet: σφικλάριον, οἱ δὲ δὲ μὲν φ σφικλάριον. ὁ τῆς, αὐτὸ σφικλῶν ἐν ταῖς δύρεσι χρεώται, εἰς καὶ διαφαλεῖς προσαγορεύεται γυναικὶ ὑπάρχοντι τῷ σφικλῶν, εἰς αὐτὸν ἔχει

Orosius.
specula-
rium.

COMMENTARIUS

παρὰ πλῆσιν τῶν κεκαυμένων οὐδὲν αἰσθάνεται. Si uero fex cō-
busta quæ ardens est, natura oculis ut ille putat, adhiberi deberet, cer-
te clotam esse oporteret.

Xerophthalmia. Celsus lib. 6. interpretatur aridam lippitudinem.

Ξεροφθαλμία. Est enim, inquit genus aridæ lippitudinis, ξεροφθαλμίων ἑσθάνεται, quæ ardens est, natura oculis ut ille putat, adhiberi deberet, certe clotam esse oporteret.

Ertropiō. Ertropion. Hoc uicium est inferioris palpebræ, quod parum sur-
sum attollitur, sed pendet & hiat, neq; potest cum superiori committi.
Id interdum accidit ex mala curatione, interdum ex senectute.

Aegilops. Aegilops. Est ueluti parua fistula maioris anguli, per quam pituita
assidue distillat. Numquam etiā exeso osse usq; ad nares penetrat.

Lixiuio quod ex cinere & calce. Græce habetur absolute πρῶ-
τος ἄκτω quasi dicas, primario lixiuio. Paulus lib. 7. habet: εἰ δὲ προ-
σλαβοίη τι τῶν οὐκ ἔσθλ' ἢ τῶν καυστικῶν ἐργάζεται τὴν κοιλίαν ἢ
τὴν κεφαλὴν πρὸς τὰς οὐκ ἐσθλὰς μετέωρον.

Oroscius. Quæ uerba Oroscius non uide-
tur intellexisse, dum interpretatur cinerem lixiuum, qui primus distilla-
uerit, secutus Hermolaum. Recte igitur quis interpretetur lixiuum,
quod per cinerem & calcem distillauerit.

Cum manus opera. Hoc remedium in exemplaribus uulgatis non
est, sed in Lascaris codice manuscripto additum inueni. Si itaque pla-
cet ascribere, aut expungere, per me certe licebit.

Chalazion. Celsus sic appellari dicit, quod mobilia, & digito huc,
illuc impellantur curationem manu præstandam docet libro sexto.

Encanthis. Encanthis naturalis. Varijs de causis hoc uicium gigni solet. In-
terim ex ungue parum exciso, uel ob tuberculum, quod palpebras parū
diduci patitur. Quod si ungue caruncula nimium abscindatur putrescit
foramen per quod postea humor descendit, ac uicium superiori contra-
rium nascitur, quod græci ἐν ὀφθαλμῷ nominant.

ἑσθλὰς. Terra samia. Duplex ea terra apud Dioscoridē habetur, una simplici-
ter terra samia dicit, altera γῆ ἄστρης, hoc est, terra aster, quasi dicas,
terra stellata. Celsus itaq; ubi posterioris mentionē facit: Terræ, inquit,

Oroscius. samie, quæ ἄστρης dicitur. Nō ita Oroscius uolebat, terræ asteris, obscu-
re nimium. Ceterum ante hoc medicamentū in græco exemplari est ὁ ἄσ-
τῆρος περὶ περὶ, pro ὁ ἄστῆρος, quod etiam Oroscius annotauit.

De oculis purulentis. Due sunt apud Græcos dictiones, quæ fere
ὅπτιος in omnibus sibi respondent, nempe ὅπτιος, & ὅπτιος. Prima si-
gnificat pus subesse membranæ corneæ. Largus & Celsus uocant o-
culos

los purulentos : altera dicitur, teste Galeno, quosi $\pi\omega\delta'$ & $\omega\pi\alpha\varsigma$, hoc est, sub oculis. Ac ueteres latini hoc uicium appellant, suggillata, genere ecchymomatum comprehensa. Parum prudenter Oroscius, dum in aliorum erratis castigandis occupatur, ipse in grauissimum incidit, qui $\nu\pi\acute{o}\pi\nu\omega\nu$, quod est, purulentum, conuerterit suggillatum.

Floris aris Hoc medicamentum in impressis non habetur, sed in manuscripto codice Iani Lascares scriptum inuenitur.

Arida me
dicamēta.

Contritis ad leuorem aridis. Hoc est, aridis in tenuissimum pulverem reductis. Græce est $\lambda\epsilon\acute{\alpha}\nu\alpha\varsigma$ τὰ $\epsilon\nu\rho\acute{\alpha}$, hoc est, leuigans arida. Celsus autem de Aridis mentionem facit libro quinto, capite uigesimo secundo in hunc modum : Quedam misturæ medicamentorum sunt, quibus aridis, neq; coactis utimur. sic ut inspergamus aut cum aliquo liquido mista illinamus. Alia medicamenta sunt his opposita, nempe, quæ liquari possunt. Hæc græcis τικτὰ nominantur. Vbi itaq; Galenus aliq; habent τὰ τικτὰ τήκονται, τὰ $\epsilon\nu\rho\acute{\alpha}$ δὲ $\lambda\epsilon\acute{\alpha}\nu\epsilon\iota\nu$ δὲ $\lambda\epsilon\iota\omega\tau\epsilon\iota\beta\epsilon\iota\nu$. Latini scriptores exponunt, quæ liquari possunt, ad ignem eliquentur, arida conterantur : Celsus inquit libro quinto, arida ex eo conteruntur. Rursus arida medicamenta contrita humore non pingui coquantur. Item arida ex aceto teruntur. Largus simili utitur locutione, & uerbum $\lambda\epsilon\acute{\alpha}\nu\epsilon\iota\nu$ δὲ $\lambda\epsilon\iota\omega\gamma\alpha\tau\epsilon\iota$ oportet, interpretatur. Quæ cum ita sint, immerito Oroscius nos reprehendit, negans latine, & fideliter dictum, aridis contritis, cui magis placet, pulcris dilutis. Et si apud nullum idoneum scriptorem huiusmodi locutio inueniatur.

$\epsilon\nu\rho\acute{\alpha}$.

Liquida.

τικτὰ.

Oroscius.

Sublinimus medicamentis. Hic quæso candide lector animum aduertat cauillationi Oroscij. Damnat me quod uerterim ex græco τῶν πρὸς τὰς παλαιὰς διαδέσεις, medicamentis quæ ad ueteres affectiones inscribuntur, ipse enim mauult dici collyrijs. Quasi uero collyria nō sint medicamēta. Certe ego à præceptoribus meis olim didici, substantiā collyriorū, esse et dici medicamēta : ipsum uero nomē collyrij, formā medicamēti indicare. Celsus li. 6. ita inquit : A secundo die graui quoq; lipitudini per medicamēta recte succurritur. Itē in collyrio trygodes. Quo grauior quoque inflammatio est, eo magis leniri medicamētum debet.

Oroscius.

IN XXIII. CAPVT.

AN ob exteriorem causam acciderit. Ex octauo Oribasij hæc mutuatus est. Exterior autem causa, est uentus frigidior, aut lauacrum aque frigide, similiaq;. Hæc itaq; solent interrogari, an egrotus in ambiente frigido obambulauerit, uel lauacionem frigidam expertus, uel alio modo fuerit affectus. Græcus codex habet τοῦ

COMMENTARIUS

αὐτὸ κρι- κάμνοντ' αὐτὸ κρισιως, ubi αὐτὸ κρισις idem ualet quod ἑξέτασις.
σις Nonnulli autem lexicarij interpretes contemperamentum uertunt.

Cucurbita ex aqua calida. Idem Galenus commemorat ex Apol-
lonio lib. 3. de compositione medicamentorum secundum locos in hunc
modū: πυρίως δὲ χρεῖσθαι τοῖς ὅλκ' τῶν ποσγῶν οἷς θερμὸν ὕδωρ
ἀποβεβρεμμένων τούτων ἰκανῶς τε ἐκτεδιμμμένων, καὶ τοῖς ὅλκ'
Fomenta. τ' σικυῖας. Hoc est: Fomentis autem utendum est, quae per spon-
gias fiunt, in calidam aquam intinctas, easq; abunde expressas. Item illis
quae per cucurbitam adhibentur. &c. Ego itaq; προπυρίων μὲν in Pau-
lo, uerti fotu prius facto. Quamquā possis dicere, cucurbita prius aqua
calida concalsacta.

Per specillum lana. Graece est ὅλκ' μιλώτιδ', quasi dicas specil-
lum auricularium, ut Celsus etiam exponit. Nam eodem capite me-
minit specilli lana inuoluti, specilli auricularij, & clysteris auri-
culary, strigilisq;.

Fomentū
Per arun-
dinem. Veletiam arundine. Apollonius etiam fomentum recitat, uapo-
re per arundinem perforatum elato. Erit autem alterum arundinis ex-
tremum, concauitati auriculae accommodatum, alterum in ollam cuius
operculum foramen habeat, incumbet. Decoquitur in olla absinthium,
cuius uapor auditorio meatui insinuatur. At hic nullum fotum arun-
dine adhibere praecipit. Verum exugilumorem, si quis, forte in aurem
receptus sit.

Græca
mutila. Sin autem pauca. Græcus codex mutilus est, nec Oroscius, nec Ba-
Oroscius. siliensis castigatior aduertit. Deest enim αὐτῷ, ad integram sententiam
Corrector. explendam, quæ sic legi debet: αὐτὸ μὲν εἰν πολὺ ὅλκ' τοῦ τόματ', ἢ
Baliliē. sis καὶ τ' καλαμίδ' αὐτὸ ἐκ μυζαίαν δ' αὐτὸ δὲ ὀλίγον &c.

Cardamomi & nitri. Galenus libro iam citato legit καρδάμου
ἰκανὸν, καὶ ὑπερὺν βραχὺ σῦκου σαρκίχωρὶς κεχραμίδ' αὐτὰ λαβὼν
ποίησον κολλύριον &c. Quod est: Nasturcij quod jatis, & nitri pau-
lulum fici carne sine granis exceptum, in penicillum redigito &c. Ve-
rum cardamomi & cardami quod est nasturcij, eadem fere potestas
est, nisi quod nasturcium sit ualentius.

Nota. Idq; in aurem demittendum. In græco codice hæc clausula qui-
dem non est, uerum à me addita, ad sententiam absoluendam. Alexan-
der etiam in hunc modum ex Galeno profert. Hoc te celare nolui.

Hyssopum medicamentum. Hyssopum & herba & medicamen-
tum appellatur. Verum ubi herba notatur, simplici uocabulo hyssopum
dicitur, ubi medicamentum additur ipsa medicamenti dictio. Quan-

quam in eo nulla sit hyssopi herbae mentio, sed lanarum potius succida-
rum. Nonnulli autem adiciunt hyssopum herbam.

Bulborum, polente. Admonuit Orosius græcum codicem esse ui-
ciosum, qui habet: βολβῶν ἀφρών pro βολβῶν ἀλφίτων &c. Græca ul-
tiata.

IN XXIIII. CAPVT.

Linamento ex ellychniis contorto. Varia sunt apud græcos μο-
τῶν, hoc est, linamentorum genera. Aliud uocant στρεπτόν, quasi
dicas tortile, aliud ξυστόν, hoc est, rasile, aliud τιλτόν, quod est concer-
ptum filatim, aliud ἐλλυχνιώτῶν ex ellychniis præparatum, aliud περι-
πικωτόν à prudendi humani similitudine nuncupatur; aliud quod cu-
nei formam referat, aut quia cunei modo foramina obturet, aut con-
iuncta separet, σφλωίσκῳ dicitur. Ut Paulus sexto uocat σφλωί-
σκους στρεπτοὺς ἐκ ῥάκους, hoc est, cuneolos intortos ex panniculo. σκωτόν.
Adhuc aliud est λημισκός græcis dictum, implicitum in longitudinē σφήν-
linamentum, si Celso credimus, quod alibi uocat linamentum inuo-
lutum & oblongum. Sicut στρεπτόν linamentum implicitum, seu in-
tortum simpliciter appellari possit. IN XXV. CAPVT. σκός.

Ptisane fresæ. Hoc est confractæ. Græce est ἱρεως ἢ πτισαίνης ἐρεγμός.
ἐρεγμού. Ut ἐρεγμός significet omne id quod fressum est, uel ipsam
confractiōnem, omnium scilicet, leguminum, nomine tamen ipsorum
apposito, ut κριθῆς ἐρεγμός. Cum uero simpliciter ἐρεγμός ponitur, de
faba fresca dicitur. Quæ si molam experta sit: ἄλδρον κυάμινον & κυάμινον.
ἐρέγμινον ἄλδρον appellatur. Ferculum autem ex faba, cicere, & re-
liquis leguminibus fressis paratum, ἔτυθ, ex fressorum autem farina
pulmentarium, λέκυθ Galeno cum alibi, tum in libello de bonis
malisq; succis generandis nuncupatur. Quoties autem in Paulo alijsq;
græcis inuenitur κυάμινον ἔτυθ, pro faba fresca elixata ad ferculum
intelligito. κυάμινον λέκυθ, pro fabæ fresæ farina elixata ponitur. Sic
πτισαίνης λέκυθ, & ῥῆ βινθ λέκυθ, aliorumq; leguminum di-
citur. Vbi uero hæc uox λέκυθ sola citra alterius adiectionem poni-
tur, Luteum oui significat apud medicos. Orosius male ἐρεγμός pro
lomento tantum usurpauit.

Ad Ephelidem & lenticulas Ephelis asperitas quedam et duri-
cies mali coloris est in facie lenticula et in alia parte nonnunquam nasci
solet. Celsus ineptias putat curare uaros, lenticulas, & ephelidas.

Suggillata. Græci uocant ὑπώπια ut antea annotaui. Sunt
autem ex genere ecchymomaton, quæ & Hippocrates & alij pleri-
que medici appellant cutis affectum, quo uenis in ea tenuibus contu-

Linamen-
torum ge-
nera.

στρεπτόν.
ξυστόν.
ἐλλυχνιώ-
τόν.

σφλωί-
σκους.
σκήν-
σκός.

ἀλδρον.
κυάμινον.
ἐρέγμινον.
λέκυθ.

ἐρεγμός.
Ephelis.
Lenticula.

Orosius.
ἐρεγμός.
Ephelis.
Lenticula.

Suggilla-
ta.

COMMENTARIUS

sis sanguis inde effunditur, qui ita excretus non uno in loco, nec subito concrefcit. Temporis fpatio liuefcit, nigrefcitq; cutis.

Cum melle admoueto. Galenus habet in eodem medicamento, ὄξυς αἰσάλας βῶν ἐπιτίθει μέλιτ' ὁ λίγον αἰσάλας Hoc eft aceto excepta, mellisq; momento fubacta.

IN XXVI. CAPVT.

Dentium dolorem. Ex quinto Galeni de compofitione medicamentorum fecundum locos ad uerbum hoc caput eft transcriptū, nifi quod ubi Paulus ad inflammationem habet, Galenus & Oribafius ad dolorem dentium medicamenta fubfcribunt.

Parulis.

Ad parulidas. Parulis græca dictio eft, ἀπαρὲς quod eft iuxta, & εὐλα hoc fignat gingiuam. Celfus libro fexto, capite tertio decimo: Solent etiam interdum iuxta dentes in gingiuis tubercula quedā oriri dolentia παρολίδιας græci uocant.

παρίδια.
μια.
αὐτίδια.
ες.

Tonfillæ. Glandule quedam funt in ore utrinq; fingule penitus fite, fpongis fimiles. que humiditates ex capite recipiant ad fauces humectandas παρίδια græci nominant, que fi poft inflammationem induruerint, αὐτίδιας appellantur.

κίονις.

Vua. Græce eft κίονις, quod ad uerbum fonat columella. Eft autem hæc carnofa quedam particula, in fuma oris parte fufpenfa uocis plerumque, recipit ea madorem à cerebro quo superiores palati partes humectat. Si plus iufto humiditatis recipiat, interim laxatur, ac faftigiata defcendit, interim inflammationem experitur, et ne potus, nec cibus deuorari poffit impedit. Vetres græci γαργαρεῶνα & κίονα recentiores κίονις appellant. σαφυλή uero quafi dicas uuam, partem ipfam appellari non uult, fed affectum. Celfus aliq; latini fcriptores etiam partem, uuam nominant.

γαργαρεῶνα.
σαφυλή.

Vbi equaliter craffa fuerit. Paulus præter Galeni more κίονα appellandam particulam cenfet, ubi in æqualem crafficiem intumuerit. Nam interim tenuis, acuta, albaq; cernitur. Interim ima craffa, fuma tenuis, & liuida eft.

IN XXVII. CAPVT.

Angina. Apud recentiores medicos uaria funt angine nomina nunc per literam κ. nunc per σ. inchoantia. At Galenus commentario tertio in prognoftica Hippocratis parum intereffe dicit, modo de re ipfa conftet, κωάγχω, an σωάγχω proferas. Ibidem etiam tres angine fpecies enumerat ex Hippocratis fententia: Peffimè inquiens, agunt, qui uehementer quidem dolent nullum autem in cer-

nice & faucibus symptoma experiuntur. His succedunt, qui quidem *Species*
non difficulter spirant, uerum dolent grauitur, collum ipsis intumescit, *anginae*
fauces apparent rubicundiores. Postremi neq; dolent, neq; egre spirant,
ita ut suprema gutturis pars *λάρυγξ* græci nominant incolumis qui
dem ipsis permaneat, sed fluxio magna parte biliosior aut in fauces,
aut in collum, aut in utraque descenderit &c. Rursus libro quarto de
locis affectis quatuor species recenset. Paulus item noster quatuor enu-
merat, pro musculorum uel interiorum, uel externorum inflammato-
rum ratione. Ego sane musculos primum intelligendos puto, qui in ore
circa linguam ex omni parte habentur: qui superiores palatum uersus
eam mouent: qui inferiores deorsum. Laterales in latera adigunt.
plurimi ex ossibus græcam literam *υ* referente prodeunt. Deinde duode-
cim proprios, summe arterie parti quam *λάρυγξ* uocant, octo au-
tem communes, qui scilicet laryngem corporibus uicinis colligant: nec
non eos qui cernicem constituunt. Iam musculis qui œsophago subiiciun-
tur, inflammatis, angina quedam oriri solet.

Faucium pharinga græci vocant. Magna harum uocum ambi-
guitas apud authores inuenitur. Vnde fit, ut plerique græcorum libro-
rum interpretes mirum in modum torquantur & subinde etiam aber-
rent. Itaque *φάρυγξ* duo significat, nempe fauces, & asperam ar-
teriam. Fauces dico regionem intra os, ubi tum gula, tum aspera ar-
teria extrema concurrunt. Grammatici genere distinctionem faciunt
hoc pacto: *φάρυγξ* *εὐληκῶς* σημαίνει τὴν κυρίως *φάρυγγα* ἢ δὲ
ἐστὶν ἡ ἀκανία ἢ μετὰ τὴν τῆς γλώττης εἴζον, ὅτε δὲ ἀρσενικῶς
σημαίνει πολλάκις τὸν *λάρυγγα*. Que uerba sonant ita Pharynx
fœminino genere prolata, proprie dictam pharyngem, hoc est fauces
significat. Hæc autem est oris ampla capacitas post lingue radicem
sitâ. Masculino autem genere dictus pharynx, laryngem, quod est, arte-
rie asperæ summum, uel ipsam arteriam signat. Hippocrates libro pro-
gnosticon per dictionem *φάρυγξ* in fœminino genere fauces etiam
intelligit, cum ait: *φάρυγξ* δὲ ἔλκουμένη σὺν πυρετῷ θανάτον Paulus
post, αὐτὴ δὲ κυανὰ καὶ θανάτου μὲν εἰσι, καὶ τάχιστα αὐτοῦ σιν,
ὁ κόσμος μὴτ' ἐν φάρυγγι μηδὲν ἔχον ποιεῖουσιν, hoc est: Angina gra-
uissima sunt, & cito interimunt, quæ neq; in faucibus, neq; in collo
quippiam manifestum edunt &c. Hanc sententiam Galenus expo-
nens inquit: ὅτι *φάρυγξ* τὴν προκειμένην χωρὶς τοῦ στόματος τε καὶ
λάρυγγος ὀνομάζει, ἥλθον ἐστὶ. Hoc est: Quod pharyngem nominat
regionem, gulae & asperæ arterie summo prepositam, nemo ignorat.

COMMENTARIUS

Κυρσὺς φάρυγγα δὲ τὴν ἐν τῷ δ' ἀνοῖξαι τὸ σῶμα καὶ πλῖσαι τὴν
γλῶσσαν κατὰ φωνομλίω δ' ἐρυχωρίαν ἐν ἡ τὰ δύο σῶματα
ἐστὶν τὸ τε τοῦ σῶμαχος, καὶ τοῦ λάρυγγος. At pro larynge, & aspe-
ra arteria posita, non solum in masculino genere, ut Suidas putat, sed
etiā in feminino inuenias: præcipue apud Galenū, ut secundo de placi-
tis Hippocratis & Galeni: τὸ μὲν γὰρ τῇ τῆς αἵματός ἀρτηρίας ἦν περ
δὴ καὶ φάρυγγα προσκαγορῶμεν. Ibidem, αὐτὸ δὲ τοῦ τοῖς ἀπασίν
ἐξῆς ποσὶ εἰς ὅσον τοῦ τῷ φωνῆς ἰδίων ὄργανοι τὴν φάρυγγα,
καὶ τοὺς κινουῦντας αὐτὸν μῦς. Hic p larynge accipit: de qua ita scri-
bit, octavo de usu particularū, καὶ τὸ γε πρῶτον τε καὶ κυριώτατον ὄρ-
γανον τῇ φωνῆς ὡς λάρυγγος ὀνομα, τὸ αὐτὸ πέρας ἐστὶ τῇ τῆς αἵματός ἀρ-
τηρίας ὡς δὴ καὶ φάρυγγα καλοῦσιν ὁμωνύμως τῇ πρὸ τοῦ λάρυγ-
γος. γ. & hoc est: Ac primum, principalissimumq; uocis instrumentum, quod
larynga nominant, superior pars asperæ arteriæ existit, quam sanct etiā
pharynga uocant, eodem nimirum uocabulo quo pharynx (id est, fau-
ces) ante arteriæ asperæ caput, nuncupatur. Atque hic in feminino ge-
nere ut superius in masculino positum est nomen pharyngis, contra
grammaticorum opinionem. Pollux audiendus non est, qui τὸν φάρυγ-
γα masculino genere prolatum, pro gula extremo accipiat.

Nota.

Pueris raro talis. Pueris interim uertebrae colli loco suo excidunt
propter ligamentorum quæ eas connectunt imbecillitatem, Vnde angina
periculosissima oritur, quæ nullis cedit remedijs, quare ei admonen-
da manus non est. Intelligenda autem sunt hæc,

Pueris raro talis. Raro quidem, sed tamen interdum angina
hæc accidit, idq; in pueris magis quàm adultis, ob causam superius
dictam. Hippocrates huius meminit libro secundo τῷ ἐπὶ δ' ἐπι-
μῶν in istum fere modum: ὡς δὲ τῶν καυαρχικῶν παθήματα
τοιαῦτα, τοῦ τῆς αἵματός διασπῶντος εἶσω ἐξέρεπον. τοῖς μὲν ἐπι-
πλέον, τοῖς δὲ ἐπ' ἐλάττω.

Porro ex strangulatis. Hippocrates lib. 2. aphorismorum hanc
profert sententiam τῶν ἀπαγχνομλίων καὶ καταλυομλίων μήπω
δὲ τεθνῶτων οὐκ ἀναφέρουσιν οἱς αὐτὸ ἀφ' ὧς ἡ πῶν τὸ σῶμα, hoc
est, Quibus strangulatis, solutisq; nondum uero mortuis spuma circa
os extiterit, non restituntur.

Aduerce.

Discussis autem colli. In græco codice est διαλυομλίων δὲ τῶν
πῶν τὸν τῆς αἵματός ἐρυθιμάτων, quod antea uertebam, Simulatq; ue-
ro colli impedimenta dissoluntur, intelligens nimirum uincula quibus
strangulantur.

GRauedo. Celsus libro quarto dictiones graecas eleganter exponit
 κούζαο grauedinem nominans, κατὰ σάγρους, uel ut Paulus ha- κούζαο
 bet, κατὰ σάγρους destillationes.

Aquilonis diebus. Graece est ἐν βορέοις κατὰ σήμασι quod est
 aquilonis aeris statibus seu cōstitutionibus. Ego Celsum secutus sum.

Tussis. Tussis uarijs de causis excitatur, nunc ob intemperie, nunc **Tussis.**
 ob humores, uel tenues, uel crassos ex alto descendentes. Interim ob io
 cinoris inflammationem; interim ob pulmonis affectum.

Anaphoticos. Interpretatus sum eos qui aegre reijciunt, scilicet qui **Anapho-**
 crassa glutinosaq; ex pectore reijciunt, hi enim difficulter propter cras- **tici.**
 siciem educunt. Sunt qui ad sanguinem reijcientes referant, mea opi-
 nione, incommode.

IN XXIX. CAPVT.

Qui febris expertes. Galenus libro septimo de cōpositione medi-
 camētorū secundū locos copiosius haec, Aetius itē et Oribasius
 ante Paulum pene eadem tradiderunt: non autem eo compendio quo
 Paulus, usi sunt. Ceterum ἀδμα suspirium uerti: quod latine etiam **ἀδμα**
 dici possit anhelatio.

Acetum scilliticum. Valentia hic commemorat medicamenta, pur-
 gationemq; fortissimam, ea nimirum ratione, quod multas numero
 partes pertransire oportet, antequam ad pulmonem perueniant, nempe
 os, gulam, stomachum, uentriculum, tenuia intestina, uenas mesera-
 cas, uenas in sima parte iocinoris, item eas, quae in gilba habentur, hinc
 uenam canam, postremo pulmonem.

IN XXX. CAPVT.

Tunica oculi ceratoides. Ex octauo Oribasij haec sunt trāscripta.

Dixi autem in pinguedinem languescit, pro modice aut leuiter
 pingues sunt. graece est ὑπολίπαροι φαίνονται, hoc est subpingues
 apparent. Locutio est Pliniana in pinguedinem languescit.

Suffragantibus qui huc req. Graece est ἐπιτρέποντων μὲν τῶν **Explicata**
 αὐτῶν τοῦ τοῦ ἀριμῶν, hoc est ad uerbum, permittentibus quidem ad hoc **sententia.**
 numeris. Quae sententia obscura quibusdam uideri possit. Hoc autem
 sibi uult, omnibus quae huc requiruntur, indicationibus consentientibus:
 nempe uribus, morbi natura, etate, & alijs id genus reliquis.

Hydromalo. Hoc est potione dulci ex malis Cotoneis, melle & **Hydroro**
 aqua confecta. **fatum Ac**

Hydrosolato. Huius etiam misluram Paulus libro septimo **tij iunio.**

COMMENTARIUS

exponit, ex rosis, aqua & melle. Recentiores autem græci, ut actuarius paulo delatiorē compositionē hydrosatū appellant. ea recipit aquæ libras decem, Zuccari libras quinq; hæc feruescunt unā, donec spissitudo fiat: postea additur succi rosarum libra. Febribus conuenire dicunt.

Iridem insparfam. In Græco codice est ἱριδὸς ἐμπειπασμένης. male nimirum, pro ἱριδὸς ἐμπειπασμένης quod Oroscius & Basilien-
sis castigator mutare noluerunt.

Oroscius.
Castiga-
tur co-
dex.

Epithema. Hæc dictio quidem in Græco non est, sed intelligenda uenit. Nam Aetius eam apponit. Cæterum per resnam, intellige terebinthinam, Per medullam, ceruinam. Nam ista sunt excellentie uocabula, Per oesypum quod in Græco est, ὀσώπω, intellige medicamentum liquidum in septimo descriptum. Aetius legit οἰσὺ ποῦ ὕγροῦ, hoc est oesypi liquidi. Cæterum iridem siccam mandi detritam, ac in puluerem redactam.

IN XXXI. CAPVT.

CRuentum sputum. Tribus potissimum de causis sanguis per os educitur. Vel enim exesa parte aliqua uenosi generis, uel rupta, uel ore alicuius uenæ patefacto. Primā διὰ βρωσίν, secundam ἐκ ξίν, tertiam ἀναστομαστίν Græci appellant, authore Celso libr. 4. At sanguis uel confertim uel paulatim erumpit. Vase quidem eroso sensim educitur, nisi magna adeo sit iactura, ut etiam pars aliqua pulmonis, uel eius Cartilaginis reijciatur. aut si casus ex alto, uel cōpressio uel aliud id genus superuenerit. Rupto autem cumulatim prorumpit, ut in aperto quoq; ore fieri solet. Paulus à Galeno dissentire uidetur. cum ait, εἰ δὲ κατὰ διὰ βρωσίν οὐκ ἄδρός, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ τοῦ αἵματος ἀναγωγὴ γίνεται. Nam ille quarto de locis affectis libr. inquit, αἰ δ' ἐξ αἰσβρώσεως ἄδρός αἱ κενώσεις αἵματος ἐπίτε προηγουμένης γίνονται βραχεῖας πτύσεσι καὶ τοῖς εἰς τὸν πνεύμονα δυνάμεσι ἐδύμασι. Hoc est: At cumulate sanguinis euacuationes ex erosione post pauca fiunt sputa, & acres in pulmonē fluxiones &c. Quomodo igitur hæc cū Pauli uerbis cōsentient? Aetius lib. 8. in istum modum litem dirimit: Quibus ex erosione uenarū pulmonis, eductio sanguinis contingit, his p̄ interualla modica sigillatim expuitur. Mox subycit. Fieri etiā potest ut ex erosione sanguis coaceruatim erumpat. Cū enim præcedenti tēpore paulatim quis expuerit sanguinē, nec diebus insecutis uel casus, uel alia quedā causa uiolēta superuenerit, sanguinis tamē eruptio multa prodierit, magnā subesse erosionē oportet. &c. Itaq; primis diebus paulatim ex erosione sanguis reijcitur. Si aciores fluxus ī pulmonē de

διὰ βρω-
σίν.
ἐκ ξίν.
ἀναστομα-
στίς.

Stillarint, quæ magnam erosionē pepererint, confertim prorūpit. Nō possum satis hoc in capite Oroscium demirari, qui pro dictione Græca **Oroscius.** πλὴν ἴσ' multitudinem uerterit, tantus medicus, ut ipse uideri uult.

Quercus mēbrana. In Græco est δρυὸς τὸ ἰνώδες, καὶ τὸ τοῦ τῷ κελύφει τ' βαλαίου. In septimo tantum, ὕμλιν ὠδες legitur. Dioscorides habet τὸ μετὰ τὸν τοῦ φλοιὸν καὶ τοῦ πρέμνου ὕμλιν ὑαδες. Prima est interior & subiecta corticis tilia quæ ligno membranacea coheret, altera tunica putamini glandis subiecta. ἰνώδες itaq; sit **Membranae quercus.** ὕμλιν ὠδες. Vtraq; astringendi uim obtinet.

Phagiautem & ilicis membranæ præstantiores sunt. Gal. lib. 6 de simplici medicina eadem fere habet. σφόδ' ῥότερον δ' ἔτι στυφαί φηγὸς καὶ πρίνθ'. Intellige τὸ ὕμλιν ὠδες.

Cochleare vnum. Exemplum Græcum Basilicēse habet κοχλιά - **Lectio ē** ρια. ἰα hoc est cochlearia undecim. quæ mensura magna est nimis, **obserua** eoq; legendum κοχλιάριον. α.

Fructibus. In Græco erat ὁ πῶρον. aliàs uerti poma, quod scilicet **ὁ πῶρον.** lignosi nihil habeant. uerum hic recenset etiam malum punicum extrinsecus durum. ob quam causam, fructibus dixi, quia latius patet, fructus quàm pomum. Et differentia superius exposita nonnunquam confunditur.

IN XXXII. CAPVT.

Puris illuuiēs. Sic interpretatus sum ἐμπύημα: quasi dicas puris **ἐμπύημα.** in parte aliqua collectio. ἐμπυοι Purulenti Plinio uocantur. alij exponunt, pectore suppurati. **μα.**

IN XXXIII. CAPVT.

Pleuritis. Celsus interpretatur laterum dolorem libro secundo, & quarto. Huic, inquit, accedit febris & tussis. In Græco uerbum est σωειδ' εἶναι, quod signat simul accedit, assistit, ac quasi diuina est **ἰνγυλίον.** Usque ad ingulum & præcordia. Alij dicunt usq; ad clauiculam & hypochondria. Ego Celsum imitor, qui clauiculam seu κλαυδ' ἰνγυλίον exponit, & ὑποχόνδ' ρια, præcordia. Distinguit autem postea, **πρεκordia.** quando ad ingulum dolor, quando autem ad præcordia pertingit.

Pulsusq; durum & ferræ modo inequalē. Hec pulsus species secundo libro exposita est. Galenus eā aperte interpretatur libro quarto de pulsuum causis in hunc modū: ὁλίγως οὐ σκληρότερος ἢ πασι τοῖς ἀπὸ φλεγμονῆς πυρέψουσιν ὁ σφυγμὸς γίνεται καὶ προσέτι γε ὀξὺς τὴν δυσκρασίαν τὴν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις αὐτῶν κατὰ μίαν προσβολὴν, καὶ δὴλον ὡς ἀμφοῖν σπειλῶντων τὸ εἶναι μέ-

COMMENTARIUS

Pulsus fer-
ranus.

νον ὑπότινων ἡ δ' οὐ δύται τῷ σφυγμῷ, τὸ δ' οὐν ἐμπρίον τῷ ἀφῶ.
οὕτω γὰρ αἰ ἀρκη φαντασιούσθαι τὸν ἀπτό μῆλον ὀργάνου σκλη-
ροῦ τῷ προσβόλῳ αἰώμαλον ἔχοντας. Hoc est: Bona itaq; ratio
ne omnibus qui ob inflammationē febricitant pulsus oboritur durior.
Præterea ob intemperiem arterias obsidentem inæqualis in uno ictu, et
nimirum ambobus coeuntibus pulsus erit species à quibusdam dicta,
veluti ferra tangentis manum secans. Ita enim necesse est imaginari
eum qui tanget durum instrumentum quod occursum habet inæqualē.

Quæ nihil emolitur. Hoc est, quæ nihil exspuitur. Sic Celsus lo-
quitur libro quarto.

Atque si tumor purulentus. Hoc est ex inflammatione muscu-
lorum externorum collectus, nisi dissipetur, in exteriorem partem scal-
pello incidi debet. Græce est ἀδὶ τὰ ἐκτὸς ἀδὶ τῆς κεφαλῆς καὶ παραγί-
νεται, quod ad uerbū sonat, ad exteriora incidi commodo est. Nā πα-
ραγίνεσθαι signat βλάπτειν, ἐπικουρεῖν, παρῆναι. Hoc Orosius in Al-
bano quem ferè in singulis uerbis reprehendit, non adnotat.

Illa nanque nisi vel extra, vel intus. Hoc est, nisi per os, uel per
aliū fuerit expurgata. Foras enim per cutem purgari non potest.

Pleuriti-
cis unde
mittendus
sanguis.

Remedium est sanguis dimissus. Non dicit quæ ex parte mitti
debeat. Hippocrates sane lib. 4. de uictus ratione in morbis acutis ma-
nifesto docet his uerbis: ἢ μὲν ὁ δὴ αὐτὸς περὶ τῆς κεφαλῆς καὶ
τῶν ὤμων καὶ τῶν βραχίων τε μὲν καὶ τῶν ἐν τῷ βραχίονι φλέβας
τῶν ἐν τῷ ὤμῳ καὶ τῶν ἐν τῷ βραχίονι καὶ τῶν ἐν τῷ στήθει. Hoc est: Siquidē
dolor sursum ad iugulū, aut circa māmam, aut brachiū pertingat, inter
nam brachiū uenam secare oportet, illa nimirū parte, qua dolor fuerit.
Galenus exponens hæc ait: Cubiti internā incidere conuenit illius par-
tis, qua dolor fuerit. Oribasius capite de sanguinis missione habet: Pleu-
riticis autē ex ipsa parte quæ dolet auferendus est sanguis. Hæc obiter
posui candide lector, ut isti Arabū sectatores uideant, ueteres illos ex
eadem parte per initia semper, non ex aduersa sanguinem detraxisse.

Cibus soli-
dior.
ἁδ' ὅτε
ρον.

Solidiore utetur cibo. Græce est καὶ τῇ αἰσθητικῇ. Nam λεπτό-
τερον, hoc est tenuior, seu qui extenuet, ut est, mulsa sorbitio ex ptisa-
na chōdro, alijsq; opponitur ἁδ' ὅτερον, qui recte dicitur solidior, qui uī
delicet magis nutrit. Gal. interpretat ἡ παρὰ ξουσα τῆς φν, quod est
ad augēs alimētū, quod Celsus dicit ualētis materie. Ut enim tenuis ci-
bus corpori parū adiicit, aut nihil sed uires tantū cōseruat pro tantillo
tēpore: sic solidior plus corpus alit. Nō est quod Orosius alios reprehē-
dat, ueritētes ἁδ' ὅτερον solidius. Nō nego aliquando plenius posse dici.

Noui inquit. Lib. 5. de locis affectis hanc historiam commemorat
 Galenus, unde etiam hec sunt transcripta. Est autem palpitatio quam
 Græci vocant πάλμον, qui est teste Galeno πῶς τὸ πάλμον καὶ πάλ- πάλμος
 μόν, καὶ πάλμον, καὶ εἶγος: διὰ τὰς καὶ σωήκας παρὰ φύσιν, palpi-
 ac omni parti accidit palpitatio, etiam immobili. Causam eodem libello
 Galenus ostendit his uerbis πῶς παχὺ καὶ ἄτμωδες οὐκ ἔχον
 διέξοδον, hoc est spiritum crassum, & uapores qui non habeat exi-
 tum. Cordis autem palpitationem humor aliquādo generat, in ambien-
 te cor tunica quam pericardion Anatomi ci uocant, collectus.

IN XXXVII. CAPVT.

Aloe trita inspargitur. Græcus Codex perperam habet ἐπιπλάσσειται pro ἐπιπλάσσειται nec hoc aduertentibus Aristarchis, sicut etiā paulo post ἐμπλάσσης pro ἐμπάσσης habet.

Orosius.
Deprauatus co-
dex.

Orosius.
Deprava-
tus co-
dex.

COMMENTARIUS

De cibi fastidio.

Si cibus quodammodo præter voluntatem. In Græco Codice est, εἰ βιαζέμεντες τὴν τροφὴν αὐτὴν τυχούμεν. Huic respondet Gal. hoc ad Glauconē primo: οἱ δὲ δυνάμεις τὸν σῶμα χον φάλας ἰσχύουσιν ὥστε ἀποσφρέφειν σιτία, καὶ εἰ βιασάμενοι λάβειν, ἢ μὴ κατέχειν, ἢ μὴ πέπειν καλῶς, hoc est, quidam uero statim os uentriculi habent affectum, ut cibos auersentur, & si coacti assumpserint, aut non retineant, aut male concoquant.

Melca.

Quam Romani Melcam. Constantinus Cæsar Melcæ præparationem lib. 18. de agricultura tradit. Est autem lac in feruentes ollas, quæ iam acetum incalescendo absorpsit, reconditum acidumq; reconditum, ut species eius quod oxygala dicitur, uideri queat.

Cōditum.

Conditio. Constantinus Cæsar lib. 8. conditi præparationem in hunc modum tradit: πεπέρως πεπλυμένον, καὶ ἐφυγμένον, τριβόμενον ὑδρι μελῶς γραμματὰ β. μέλιτ' ἀπικὸν ξεσ. α. ἰνὸν παλεὺ καὶ λθικὸν ξεσας η.

Maloplacunion. Hoc est placentula ex malis Cotoneis. Paulus lib. 7. latius exponit.

Castiga-
tur co-
dex.

Sorbtionibus ex oleo. In Græco codice ἐκτὸς male legitur pro ἐκ τοῦ ἐλαίου. Gemusæus uitiosum reliquit exemplar.

Aloe, masuchæ. Masucha compositio, non simplex remedium existit. habes eius descriptionem libro septimo Pauli expressam.

IN XXXVIII. CAPVT.

Cum tormine intestinorum. Græca dictio est σπέρφον, quæ Largo tormina intestinorum significat. quanquam & dolorem stomachi haud absurde interim interpreteris licet.

Exigua caliditate. In Græco est, ὀποδεσμός τε καὶ χλιαρὰς, quasi dicas caliditate tepida. Aetius mediocri dixit.

IN XXXIX. CAPVT.

Cholera est immodica. Cholera commune stomachi et intestinum uitium uideri potest. Nam simul et deiectio, & uomitus est, præterq; hæc inflatio, intestina torquentur. Bilis supra, infraq; erumpit.

Hydromalum. Hoc est aqua ex malis Cotoneis preparata. scriptura eius habes li. 7. Pau. sumitur autem et per se potui, & cum micis panis.

Horarios seu fugaces. Alias exposui qui sint horarj quos Plin. uocat temporarios & tēpestiuos. Sūt autē hi qui diu asseruari nequeant.

Suum petunculi. Hoc est suum pedes. Celsus alibi Trunculos ui-

IN PAVLVM AEGIN.

detur nominare suum pedes inter ea quæ boni sunt succi.

IN XL. CAPVT.

Interia. Celsus ad uerbum interpretatur hanc uocem, leuitatem Leuitas
intestinorum nominans. In hac cibus non continetur, & quicquid intestino-
assumptum est imperfectum protinus redditur. rum.

Cerata ex myrteo. In græco legitur κερωται ὁ ξ. μυρσίνου pro
κερωται ὁ ξ. μυρσίνου quod est, Cerata ex oleo myrteo. Sic etiam
Aetius habet.

IN XLI. CAPVT.

Implacabilis desidēdi. græcè erat ἀπαραιτήτῃ προθυμία πρὸς
ἐκκρίσιν. Celsus ponit frequens desidēdi cupiditas: ἀπαραιτήτῃ
signat inuitabilis. Melius sonat hic implacabilis, frequens & assidua
est. Quidā τανυσμόν scribendum putant à uerbo τείνω, quod est tēdo.

IN XLII. CAPVT.

Atini tormina. Celsus lib. 4. ita inquit. Proxima his inter intesti-
norū mala tormina esse consueverunt, δυσεντερίαι Græcis uocantur.

Vide Galeni librum sextum de locis affectis, Oribasij librum nonum.

Tenesmi mutatione. Græce est ἐκ μεταπτώσεως τανυσμοῦ, qua
si dicas ad uerbum ex decidentia tenesmi, cum uidelicet Tenesmus in
dysenteriam degenerat, transit, mutatur.

Deinde leniter subcruenta In Græco malè habetur εἴτα πρὸς Corrigi-
γόνον αἵματός εἰς pro εἴτα πρὸς ὀλίγον αἵματός εἰς. Celsus etiam tur co-
quodam loco interpretatur, Leniter subcruenta. Oroscius et Gemusæus dex.
non annotarunt. Oroscius.

Cochlearum integro tostarum. Græce est κοχλιῶν ὅλων quod
sonat cochlearum totarum, quod nostri dicunt, cum toto.

IN XLIII. CAPVT.

Colon. Hoc intestinum apud Latinos scriptores uaria sortitur no-
mina, nunc intestinum crassum, nunc plentius, nunc laxius appel-
latur, Paulus dicit, cum pars sit intestini crassi hoc est, recti. Nam Nota,
rectum octo fere digitos longum, statim colon uocatur, quod tenuibus
est crassius. A sinistro rene ad dextrum super uentriculi fundum fer-
tur, donec sepenumero & lienem, & iecur attingat. Quid dicet ali-
quis, quod Paulus contra Galeni sententiam à dextra ilium regione
procedere colon pronunciat. Huic respondeo, Si à tenuibus intestinis
numeremus, per dextra ilia prius superuectum colon ad sinistra pro-
dit. Sin à recto incipiamus, à sinistra parte incipit, in dexterio-rem
obliquum conuertitur.

Ex cruciantur præsertim sensu. Græce est ἡ δ' οὐκ ἔστιν ἵνα γινέται, μα

COMMENTARIUS

**Dolor co-
li qualis.**

λίσσα δὲ κατὰ θέσιν τοῦ κώλου τρυπανόδης σωαιδίης γινόμε-
νης. quod ad uerum sonat. Color oritur, maxime uero iuxta situm Coli,
cerebrali (ut sic dicam) sensu excitato. Galenus hanc doloris speciem
lib. 2. de locis aff. Etis exponit his uerbis. οἱ δ' αὖ δὲ καὶ ἐμαυτῷ. ποτὲ
συμβάσαν δ' αὖ λω σφοδρῶτά τινι, ὡς τρυπαίῳ δ' οὐκ ἔν διατε-
ραῖ δ' αὖ κατὰ τὸ βάθος τ' κοιλίας Rursus in eodem capite, τὰ μὲν
δ' ἡ τοιαῦτα τῶν ἀλγημάτων ὑπὸ τρυπαίου φαίνεται γινόμενα
Brassica caule probe polito. Græce erat κρεμβῆς κανλῶ κα-
λῶς ἐξεσμένῳ. Orosius intelligit per ἐξεσμένῳ, coctio, quod ἐξεσμένῳ
potius significasset. Præterea Dioscorides leuiter seruē factam, si edatur,
alio idoneam: percoctam uero, alium sistere.

Iubebis ut lauent, incalescantq; laconico. Ad humorem pituito-
Laconicū. sum concoquendum consulit naturales balneas, & Laconicum. Est au-
tem Laconicum etiam hodie adhuc in usu, testudo illa thermarum, quæ
igne concalfacta uaporem siccū excitat; qui deinde sudorem mouet in
corporibus. Columella meminit his uerbis, quotidianam cruditatē laco-
nicis excoquimus, & exusto sudore sitim querimus. Græca sunt πυ-
ραῖ δ' αὖ ἐν διαπύροις τοίχοις, quasi dicas desudare intra ignitos pa-
rietes. Nō opus erat ponere ignitos parietes, cum Laconici uox hoc com-
prehendat. sed ut sciolis quibusdam fiat satis, apposui.

Cucurbitæ quàm maxime cum flamma. Sic interpretatus sum
σικύα ὡς μέγισται διαπύροι, quasi dicas cucurbitæ quàm maximè
ignite. Celsus cum flamma dicit, quem imitatus sum.

Tanquā in crisi, causa. Paulo pluribus uerbis reddidi hanc senten-
tiā: ὡς περ ἐν κρίσει μετασάσης τ' αὐτίας, hoc est ad uerbū, tanquā
Crisi causa mutata. Is autem sensus est, Colicus hic morbus tandē ex
intestinis materia tāquā per crisi expulsa in alias partes finitus est.

IN XLIIII. CAPVT.

Ileos.

Ileos. Morbus hic nomenclaturā ab ipsa parte affecta, ut superius,
colicus, accepit. Nam tenue intestinum, uti ieiunum etiam, dicitur.

Voluulus Incipit, si ab imo incipias, à ceco, & desinit in ieiunum, in uarios im-
plicatum orbes. Quidam recentiores morbum uocant Voluulum.

Colica affectione. Hoc Paulus superius dixit ubi habet: Inter coli-
cas affectiones hæc est grauissima, quæ in ileū transitionem minatur.

IN XLV. CAPVT.

Colicis in dexteriore potius ilium. Quia per dextra ilia su-
peruētum, uentriculi fundo incumbit lienem & iccur attingens:
deinde ad sinistra prodit, si de superiore ipsius initio, ceco intestino,

dici intelligas. Nam infra sinistram magis partem occupat.

Eiusdem lateris ac ē Hoc signat græce κατ'ὅθεν & κατ'ἵξιν si Ga κατ'ὅθεν
leno credimus. Hippocrates prior his dictionibus usus est. κατ'ἵξιν.

Hoc inspergi potest In codice græco perperam scriptum est κατ'ἄ
πλασον, pro κατὰ πᾶσον. Nam de pulvere, non emplastro mentio est. Orosius.
Aristarchi libenter omiserunt.

Phylliq; momento ex mero & melle. Hoc est, phylli modico
cum mulso. Nam ἀκράτῳ μέλι nihil aliud est quam οἶνὸ μέλι Contra-
rium est μελίκρατον, quod uidelicet ex aqua & melle confit. In græco
erat δὲ κράτομέλιτ' pro ἀκράτομέλιτ'. Acrato-
meit.

Iniectione recti siphonis. Lib. 7. hanc rationem indendi canalis
recti in uescicam habes expositam Vocant καθετηρισμόν ab instru-
mento καθετήρ. Solent autē quassationes corporis simul adhiberi,
ut calculus facilius excidat.

Ex vino & oleo rosaceo, vel ex aqua & oleo. Græce est ἐξ οἴνου
ῥοσάδινου ἢ ὕδ' ῥοσάδινου. Quia de uino rosaceo, et aqua rosacea intelli-
gunt: male nimirum: quia ῥοσάδινον per se oleum rosaceum significat.
Hermolaus barbarus in corollario suo, pace illius dixerim, oxyrhodi- Hermo
num interpretatur, acetum rosaceum, pro aceto & oleo rosaceo, ut Ga-
lenus, & alij græci accipiunt. laus.

Archigenes in epistola. Idem refert Actius sermone undecimo.

Ad finē deest particula: in græco habetur enim σικύου σπέρμα κικα-
θαριζέμενον ἀριθμῶ. λ. cū legendū sit, σικύου ἡμερῶν σπέρματ' κικα-
θαριζέμενον κόκκους ἀριθμῶ. λ. Paulo post, amyli cochlearia duo Perperā
character ῥ. qui hemmā signat, ac legēdū est Κοκλ. ut sit cochleare.

Iterum: σικύου σπέρματ' ἢ pro σικύου σπέρματ' κόκκους εἰ.

Depraua-
tū exem-
plar græ-
cum.

Nonnihil ex vena laxant. Hoc est ut latius exponit Actius, ex
vena caua propter amplitudinem osculorum remittunt Interim per cir-
cuitus hoc mali repetit. Per initia ægri nihil mali sentiunt, eoq; nihil tē-
tandum. Sin autem perseueret, occurrendum, aliās grauissima sympto-
mata solent prouenire.

Aut lixiuium. Simplici uerbo dixit Paulus ἢ σακτῶν, quod antea
quoq; annotauit.

Diabetes. Multa nomina hic affectus habet, uide Galenum de lo- Diabetes.
cis affectis libro sexto. Venit à uerbo διαβημι, quod signat, pertrāseo.

Potus enim quā primū assumptus est. statim transit.

Rosato. Forte legendum in græco pro ῥοσάδινου ὕδ' ῥοσάδινου. Nā
apud Paulum in septimo nulla est mentio rosati, sed hydrorosati, ubi Notā.

COMMENTARIUS

etiam Rodomelon exponit.

Ex anatome constant.

Musculus qui ceruicem. Musculus hic transuersis constat fibris, uariâq; habet officia. Primum quidem uiscâ claudit, licet sine illo claudipossit. Deinde post emissionem urinae contractus undiquaq; id quod in meatu est, propellit. Præterea quicquid eo exprimente in urinariū meatum inculit, id ne diutius immoretur ibi efficit, sicut cum urina mordax est.

Resolutionem repræsentat. Græcè est παρὰ λύσεως ἔμφασιν ἔργαζέτω, quasi dicas, resolutionis emphasim efficit. ἔμφασις autem est representatio rei cuiusdam, aut adumbratio.

In succum quidem conuersa. Hoc est in chylum medici dicunt, & ut latinam dictionem per græcam interpreter. Habet autem Paulus χυλοποιεῖν τὰ, quod est in succum seu chylum redacta beneficio uentriculi. Simile uerbum Galen. lib. 8. de compositione medicamentorum secundū locos habet, ut antea quoq; annotaui: nempe ἐκχύμωτα quasi dicas exuccata sed hoc plus signat, chilum scilicet à iecinore attractū ita ut liquidior pars sit distributa, siccior ueluti recrementū relicta. Dicimus itaq; Chilum ἐκχύμωτον cum & uentriculus probè concoxerit, et iecur attraxerit. ubi uero ille quidem concoxerit, iecur autem attrahendi uim habeat infirmam, αὐτὸ ἐκχύμωτα & liquida excernuntur.

Bilis insigniter colorata. Hoc est bilis colore suo abinde exaturata per alium descendens uel deiectio meræ bilis. Nam Gale. apud Hippocratem interpretatur κατὰ κορεῖα, τὰ ἀκράτοχολῶ διαχωρήματα.

κατὰ κορεῖς.

Quando iecoris substantia. Græcè est ἡ δὲ καὶ τὸ οὐσίαν αὐτῆς σωτηρικὴν τοῦ ἥπατος, quod ad uerbū sonat, Iā uerò etiā iocinoris substantiā cū ea colliguescente: Cū ea, intellige bile. Nā ubi humor firmè consumptus est, corpus ipsum contabescit cuiuscumq; partis.

Flammeus ardor. Sic fere ubiq; sum interpretatus dictionē φλόγωσι.

φλόγωσις.

Inflammationem uerò φλεγμονὴν, secutus Celsus.

Chamæpyteos radices. Pondus apud Galenum & Alexandrum medicum uariat. Nam Chamæpyteos drachmæ octo ponuntur. Verum Actius cum Paulo consentit.

Troximum.

Adhæc intybum, troximum, & sonchus. Troximum hoc est, sciris per se esui aptum significat. Scireos autē genera tam hepatis affeclibus conueniunt, ut etiam cruda comedi possint.

Exemplar græcū uisiosum,

In quibus calor intenditur. In codice græco habetur τὰ τοῖς δερμῶσι pro τὰ τὸ δερμῶσι. Basilienfis Corrector hoc non castigauit.

Corruda Græcè est μυάκωντα, quæ latinis Corruda dicitur, hoc est asparagus syluestris.

Illud

Illud autem in summa præcipiendum. Hoc Galenus lib. 8. de compositione medicamentorum secundum locos commemorat. iecur & stomachum semper astringentia cum relaxantibus requirere. Aliàs sæpe stomachicis syncope iocimorosis interitus suscitatur.

Copton. Sic dicitur medicamentum quod tunditur. Est autem malagma libro septimo ad duriciem stomachi, & iocineris inscriptum.

IN XLVII. CAPVT.

Cottabismi. Cottabismus olim ludus apud Græcos erat, quo uinū ex alto fundebant strepitum facientes. Hic autē possit accipi pro superfusione in partem aliquam, aut pro ruboris excitatione quo sanguis in exteriora eliciatur, hæc dum meliora occurrunt, boni consule.

IN XLVIII. CAPVT.

VT corpus albedo, & pituitæ colore. Græce est, ὡς λευκὸν καὶ φλεγματῶδες τὸ σῶμα φαίνεται ad uerbum sonant hæc, ut album & pituitosum corpus appareat. Dicit autem de externo colore apparente. Eoque albedo & pituitoso colore uertendum erat, quanquam parum refert dicere, album & pituitosum apparet, mortui instar. Ex nono Oribasij sumpta sunt.

Coqui autem possit etiam in aqua. Perperam in codice græco legitur ὕδασι pro ὕδατι. Cæterū πινωμένοις de futuro intelligendū est. Ad hæc in arena contexti desudent. Sic interpretatus sum φάμισμόν. Solent autem hydropici in arena à sole excelsa sepeliri capite excepto, ut humiditas meatibus apertis extrahatur.

Quia si cum febris aqua subter cutem. Si duo uno tempore uicia infestent, uehementiori insistendum, altero non neglecto, quod Paulus per uerbum τὸ κατεπείγον signat.

Corpus emaciant, collquantque, releganda. Quidam nasutus propter malè impressum codicem latinum hic me corrigendum censuit, quod liber habuerit eligenda. Quasi uero nescierim quid sit τὸ πῶς αἰσθεῖται. Gemuseo Lutetie indicauit legendum releganda pro eligenda.

Ad perforationem veniendum. Græce uocatur hæc chirurgia administratio παρακέντης, hoc est pertusio & punctio. Nam eos qui a scate laborant, ad peritoneum usq; imo in uentre diuidunt, sicut lib. 6. de hydropicis comprehensum est.

IN XLIX. CAPVT.

Cvm lien melancholicum. Galenus li. 9. de compositione medicamentorum secundum locos. Oribasius lib. 9. & Aetius 10 sermone de liene in eandem ferè sententiam tradiderunt.

Cottabismus.

Codex græcus uiciosus. φάμισμός quid.

τὸ κατεπείγον quod urget.

τὸ πῶς αἰσθεῖται. Calumniā παρακέντης.

COMMENTARIUS

Centaurij. Male habet codex græcus ταυρίου pro κενταυρίου. nec tamen hoc castigauit Basiliensis.

Ceræ libra, terebinthine, Græcus codex habet κηρίων τερεβινθίνης, pro κήρου λίτρα. α. τερεβινθίνης λίτρα. α. Oroscius cū Basiliensi hoc neglexit. Cinis ex officina fabrii. Cinis hic est quem ferrū dū in officinis fabrilibus ignitur, ac malleo tunditur, abijcit. Verba græca hæc sunt, καὶ ἡ τέφρα τῶν χαλκείων, ubi Oroscius interpreti tū censor, pro χαλκείων legendum putat κοιχλείων. At Gale. li. 9 iam citato, primū aquā in qua ferrum ignitū sepius extinctū sit, potui lenosis præbet. Paulo post Cataplasma ex cinere fabrilis officinæ obducitū exhibet, hoc pacto ἵκνις, καὶ ἡ τέφρα ἐκ τῶν χαλκείων μετ' ὀξους.

τέφρα
χαλκείων.
Oroscij
error.

Acetabulum cum oxymelito. Lectio codicis græci deprauata est: habet enim ἐν βᾶφον πάντα ἢ ὀξυμέλιτ', ἀν' ἀγγαλλίδ'. pro ὀξυ βᾶφον μετὰ ὀξυμέλιτ', ἢ ἀν' ἀγγαλλίδ'.

IN L. CAPVT.

Si enim febricitante ægro. Græca sonant. εἰ μὴ γὰρ αὐτὸ πυρεκτικῇ νόσῳ ἀθρόως γερονὼς ὁ ἵκτερ' ἀποπαύσι τὸν πυρετὸν, hoc est ad uerbum. Si enim post febrilem morbum subito ortus arquetus febrim finierit. Vide nonum Oribasij, & decimum Aetij.

Si absq; febris alba deijciantur. Alba quia bilis in meatibus obstructa ad intestina non potuit descendere, quæ excrementa tingeret.

Seminis autem atriplicis scrupuli octo cum Chrysattico, aut alio passo. In græco exēplari habetur. μετὰ χερσατίκου ἢ ἄλλου γλυκέως Aetius meminit passi Chrysattici. Alexader item sepius citat. dicitur esse coloris aurei. Scribit Dioscorides atriplicis semē cum mulsa. Ictericis conuenire.

Excrementa alba.
χερσατίκου γλυκύ.

IN LI. CAPVT.

Ξέμφαλον. Ausam umbelici prominentis. Hoc uitium uno uocabulo Paulus uocat libr. 7. ξέμφαλον, quod uidelicet aut rupto in ea parte peritoneo, prolapsōq; aut omento, aut intestino, interim ocioso humore umbilicum subeunte: interim carne subnata, aliās sanguine obue-ne aut arteriæ rupturam concreto aliās spiritu indidem collecto, generatur. Celsus etiam caput facit de umbelico prominente.

Ξεγμός. Fabæ fresæ corticum. In græco est ξεγμού λεπύρων. Significat autē ξεγμός fabam fresam seu fractam. Dicitur autem etiam de aliis leguminibus confractis, nomine ipsorum apposito. Quamquā hic possit simpliciter de faba dici κατὰ χερσιν ὥς, ut sit fabæ corticum. tu utrum malis sequere.

A Sellorum domesticorum qui tacti cōduplicant se in orbē.

Sic interpretatus sum ex Largo ὀνίσκων κοτοικιδίων τῶν σφαί-
 ρημένων. Ipse autem addit in pile rotundissimā similem. Ceterum uā-
 ria habent nomina. πολὺ ποδ' es enim græcis κουβαρίδες Dioscoridi,
 κύαμοι Galeno appellantur. Nascuntur sub aquarijs uasis ut ait Ar-
 chigenas: imo etiam omnibus locis humidioribus.

Calcis viuę partibus duabus. In græco est ὄσβεσος κονίως. Nā κονία.
 ὄσβεσος κονία In extinctam calcem significat. Si autē κονία ὄσφέ κονία ὄσ-
 σον ponatur, pro Lixiuio calcis accipendum est.

ὄσβεσος

Nā κονία.

κονία ὄσφέ κονία ὄσ-

σέσου.

A Qua frigida perfulso. Græce est προκατακλίσας ὕδατι ψυ-
 χρώ. ante hoc προκατρίψας habetur, uidetur legendum προκα-
 νατρίψας ut scilicet prius intro reprimatur. Nam quid confert prius
 intestinū conficere, quod προκατρίβειν signat. noluit tamen immu-
 tare, quod non haberem quem sequeretur.

Nota.

Medicamento tam spisso. Sic uerti ἀμολώτω χερῶ. Signat au-
 tem ἀμολώτων non inquinans a uerbo μολώω Coquuntur medica-
 menta nunc, ut liquida permaneant, nunc ut dura sint. Liquida immit-
 tentis digitos inquinant: dura ac spissa nō item. Est itaq; ἀμολώτω Erratum
 spissitudo qua digiti, aut manus non inquinantur, quāquam Oroscius Oroscij.
 uerterit, post quam ex coctura recrementa iam separata fuerint.

Amolyn-
tem.

Erratum

Oroscij.

Tenuissimæ parti. Sic fere ubiq; πωπάλω sum interpretatus: Error
 aliquando pollinem, quod Oroscius reprehendit, mihi uero placet, Oroscij.
 cum alios etiam doctissimos ita uertisse uideam.

Aphthæ ulcere pressos. ἀφθῶντας in græco habetur. quid sit ἀφθῶν-
 τες. alibi exposuimus.

τες.

Priapismus, Galenus ad uerbum lib. 10. hæc habet. Vbi male in co-
 dice græco ἐνεμάτων legitur pro ἐμμοτων, quod miror correctorem
 Basiliensem non aduertisse.

Nymphæam igitur. Vulgo nenupharim appellant insigni refrige-
 ratoria ui præditam. Duplex est eius species: de qua alias.

DE particulis inefficacibus. Hoc loco particulas intelligo eas
 corporis partes, quę generationi dicatę sunt. Barbari caput sa-
 ciunt de frigidis & maleficiatis.

Particu-
lar.

COMMENTARIUS

Priuatim stellio concrematus. Hoc ex Oribasio sumptum est. Aetius sermone undecimo mentionem facit: aliorumq; complurium.

Satyriace. Hoc est medicamentum, quod penem erigat, à satyris dictum, qui naturalibus arreclis depinguntur.

IN LIX. CAPVT.

SIn etiam altè descēderint. In græco est εἰ δὲ καὶ ἔλαθ' αὐτοῖς τι σωεῖν hoc est: Sin autem profunditas etiam quādā ipsis adfuerit.

Resina.

Iuuat resina fricta. Hoc est sicca & retorrída. Duplex resina species est, sicca & liquida. Sicca preparatur, ut Dioscorides memoriæ prodidit. Liquida utribus conditur, quanquam idem autor ex ijsdem arboribus alias esse siccās, alias haberi liquidās autumat. Sicca græcis φρυκτὴ nominatur, liquida ἢ ἐκ τῶν ἐρεσμέων ὑγρὰ, hoc est si ad uerbum exponas, retorrída, & ex utribus seu dolys liquida.

φρυκτὴ.

Puluis inspergi ur parti vino prius. Hoc est, ista in puluerē redacta. Textus græcus deinde sequens deprauatus est, habet enim προαπονήπτων ἀπίω, pro προαπονήπτων δίνω, ut ego conuertit. Nec Orosius nec Basiliensis castigatō animaduertit. Triginta numero. Viciosus est codex græcus, ut qui habeat < α hoc est drachmam unam pro λ. quod signat triginta, facili nimirum lapsu. Galenus & Oribasius unde Paulus sumpsit, lectionem hanc confirmant.

Hemor-
rhoidum
differen-
tiæ.

Oris venarum quæ quod. Ita simplicē dictionem græcā αἱ μὲν ῥοῖ δ' ἐς sum interpretatus. Sunt autem uenule quædam recti intestini, ore hiantes, eo quod statō tempore sanguinem crassum feculentumq; excernunt, hæmorrhoides appellatæ: cum autē apertæ nō sint nihilq; excernunt, sed tumide apparent, sanguine in eis suppresso, τυφλὰ græcis.

τυφλὰ.

Cæcæ quasi foramē nullū habentes, latinis uocātur. Differunt autē situ et origine, si Galeno in Anatomicis fidem accōmodamus, aliæ siquidem in recto intestino, aliæ in ano, aliæ in circulari musculo aluum constringente qui σφιγκτὴς appellatur, consistunt. Atq; hoc est quod Paulus dicit, quædam superius delitescunt, non apparentes, ob loci longinquitatē.

Situs hæ-
morrhoi.

Quantum ad originem attinet, aliæ uidentur ex ramis uenæ portæ, quæ omento, lieni, uentriculo communes sunt, propagari: aliæ ex caua uenæ diuaticatu in crura factō, ubi grandis arteria cauam uenam conscendit. Hæ itaq; uel ex portā, uel ex caua ortæ nūc iusto largius profluunt, nunc supprimuntur, quando remedia adhibere conuenit. Sin autem mediocriter fluant, corpus multis morbis liberant.

ἀπόσι-
τος.

Infeliciter contabelcere. Sic reddidi πονήρως ἀποσίτους γίνεσθαι. Abusus est Paulus uerbo ἀποσίτους pro ἀσίτους, hoc est, ἀτρε-

φους γίνεσθαι, quod signat, cibum non sentire, contabescere.

Quare cum plures sint hæmorrhoides. Ex Hippocrate sumptio est, apho. li. 6. ubi habet, αἷμα μορφοίδης ἰκιδέντι χρόνιος, ὡς μὴ μία διαφυλαχθῇ κίνδυνος ὑδρωπαῖς ὑδρὶ γένεσθαι ἢ φθίσειν. Miror cur Aetius à Galeni sententia, aliorumq; fere omnium grecorū discesserit, nullam esse relinquendam censens. Quædam vero superius Hoc est, quædam in recto intestino habentur: quæ superiorem locum occupant, quam quæ in ano, & circulari musculo apparent.

Cæcæ autem Hoc est cum apertæ uenæ, dolorem mouent, copia humoris melancholici grauata.

Cretæ sutoriæ, aluminis rotundi singulorum. In græco codice deest αἰά, & στρογγύλης per se signat alumen rotundum, sicut χιτῆσις. Aliqui tamen pro μελαντηρίᾳ, legunt στυπτηρίᾳ.

Recrementi plumbi rus syriaci singulorum drachmæ. In uulgatis codicibus græcis habetur uncia octo. Verum Galenus & Orbasius habent drachmas octo, quod non annotauit Orosius.

IN LX. CAPVT.

Circa statum menstruale tempus. Græci uocant certum, præfinitumq; tempus προτεσμία, uel προδεσμία τακτικῶς, & προμεμία. ut Budæus etiam annotauit.

Detrahetur autem sanguinis. Hodie sumus timidiore quam ut libram integram una uice detrahamus, tātum abest, ut libras duas & dimidiam auferamus.

Est autem pessus. Descriptio pessarij. In græco codice autem superfluum est ἡτοι, uel in hunc modum legi debet: πεισσοῦς δὲ ἐστὶν ἔριον διεξασμένον ἡτοι καὶ σφουρωθέν. Aliqui legendum putant ἡτοι καὶ, hoc est, uel aliquid.

Amus, sion. Malè in exemplari græco impresso σίνων habetur, pro σίον aut σίσον. utraq; uim semina prouocandi menses obtinent. Paulo post κερκίδες pro κεδρίδες substitutum est.

IN LXII. CAPVT.

Ob legitimum partum. Hoc est, absolutum, perfectumq;. Nam postea dicit, uel ob abortum, illegitimum scilicet partum profluvia accidere. Verum quæ ex naturali partu fiunt, sua sponte plurimum cessant. Erat in græco ὡς τελείως ἀποτέξουσιν, quod Orosius noster uertendum censuit. In fine partus, quàm erudite, uel mediocriter literatus indicare poterit.

Vel combustæ ipsius cinis. Lege in codice græco pro κενουμένου,

ἀπό τε
τέλει
εἰς τὰ
Οροσίου.

COMMENTARIUS

κεομένου αὐτοῦ ἢ ποδία, quod castigatores omiserunt. Paulo ποδία κηκίδ' α βράβυ habetur, τὴν αὖ κηκίδ' α βράβυ. Quod etiam annotavit Oroscius ex suo exemplari.

IN LXIII. CAPVT.

VNctio ex melle. Sic Galenus libello de prenoscendo præcipit in uxore Boethi, Romanorum consulis. Ita fere sonant uerba ipsius: ἐνός τὸν σκοπὸν τῆς διαίτης ποιήσας, διὰ τε πόματ' ἐλαχίστου καὶ τριφύως ὅλου τοῦ σώματ', ἐτίτε χρίσεως οὐτω σκευαζομένης, οὐδ' ἔτι πίπῃσι καὶ ῥητίσιν, ἀλλὰ δ' ἔτι μέλιτ' ὁμοῦ μετὰ πλείον' ὕδατος ἐψηθῇ, hoc est ut rudiores intelligant: Consideraui scopum intentionemq; uictus instituere ex potione paucissima, ex totius corporis frictione, & præterea unctione ita preparata, non ex pice, & resina, sed ex melle solo diutius incocto.

Corrigi-
tur co-
dex Oro-
scius.

Quercus liber. In graeco codice habetur δένος τὰ ὑποὶ τῷ φλοιῷ τοῦ πρέμνου τὸ ὑμνῶδες. Galenus ita legit, δένος τὸ ἐν τῷ φλοιῷ τοῦ πρέμνου τὸ ὑμνῶδες. Dioscorides, τὸ μεταξὺ τοῦ φλοιοῦ καὶ τοῦ πρέμνου ὑμνῶδες. In Paulo igitur legendū censco: δένος τὸ ὑποὶ τῷ φλοιῷ τοῦ πρέμνου ὑμνῶδες. Quod Oroscius neglexit, et castigator Basilicensis. IN LXIII. CAPVT.

DE inflammatione uteri In ipso titulo graecum exemplar deprauatum est. Habet enim παρεκλυσίως pro παρεκκλίσεως, quod etiam Aristarchi omiserunt.

Tēdo me-
dius inter
neruium
et ligamē-
tum.

Dolor capitis, tendinis. Hic nimirū intelligit tendinem in utraq; capitis parte situm, corpus tenue, ac fibrosum, quod excrecentiam uernicularem ad particulas natibus cerebri, utrinq; adiacentes, illigat, ne errabunda uagetur, uel neruos in sincipite intelligunt.

πίλημα.
Error
Oroscij.

Per hapsū. Sic reddidi πίλημα cōtra Oroscij opinionem. At Cel- sus libro septimo ita inquit: Τὸν multo is oleo perungendus, inducendusq; hapsus lane mollis, tepido oleo repletus &c. Quid sibi uelit uelamen Oroscij, nemo facile intellexerit. Ex lexico suo ita exponendū censui.

IN LXV. CAPVT.

Oroscius.

Praeterea vero inordinatae. Oroscius graecum codicē deprauatū dicit, legendumq; putat πυρετοὶ δὲ ἀτακτοὶ μετὰ φρίκης ἐν ταῖς ἐπισημασίαις γίνονται, hoc est: Febres autem inordinatae cum horrore in accessionibus fiunt &c. At ἐπισημασίαι, per se febrium accessiones significant: nisi forte inflammationū accessiones, aut in pure generando intentiones naturae intelligere uelimus. Tunc enim, ut ait Hippocrates, dolores ac febres accidunt magis quàm in iam confecto. Vtram in

ἐπισημα-
σία.

malis, sequere lectionem. Certe omnia antiqua exemplaria quae mihi uidere contigit, impressi codicis uerba habent.

Aut candidū oleū. In græco est λευκασμένον ἔλαιον, hoc est, dealbatum oleum. Quomodo oleū fiat candidū, ex Dioscoride cōdisces.

IN LXVII. CAPVT.

Turpem humorum colluuiem. Græce est εἰς ἐχθρὰς, hoc est, εἰς ἐχθρὰς turpem aspectu, qualis in Elephanticorum facie alijsq; partibus uideri solet. Vfus est eo uocabulo lib. quarto in hac senectia. Habet enim εἰς ἐχθρὰς ἐξερὼν δὲ πῶς μόνον τὸ πρόσωπον. Hoc est: Faciem autem solum aspectu quodammodo tetram horridam & deformem.

Amurca. Hoc sedimentum in æneo uase ad mellis spissitudinem decoqui solet. Interim torreri in duriciem, seu puluerem. Ac postea etiā alijs liquidis commisceri.

IN LXVIII. CAPVT.

Helleborismus. Paulus lib. 7. aliquot rationes tradit ueratrū exhibendi. Tu inde colligito.

Metasyncriticum. Superius exposui, quid sibi uelit μετασυγκριτικόν, quod alijs male re corporaticum interpretantur, nisi forte intelligas noxium humorem euocando restauraticum.

IN LXIX. CAPVT.

Sanguinis uero eruptionem. Cum mola scilicet in utero affligit, ita curabimus, ut sanguinis profluium, quod in immoderata purgatione ex abortu potissimum accidit. Item sicut muliebrem fluxum, de quo supra quoque est comprehensum. Basilicensis corrector dictionem unam exprunxit superfluum esse ratus. Nam legit. τὰς δὲ αἰμορῆς ἁγίας ὥστε καὶ τὸν ῥοῶν. Ego ex ipso sensu & exemplari ueteri legendum censeo: τὰς δὲ αἰμορῆς ἁγίας, ὥστε τὰς αἰμορῆς ἁγίας καὶ τὸν ῥοῶν. Primum αἰμορῆς ἁγίας refertur ad id quod Paulus ante in eodem capite dixit: τισὶ δὲ καὶ αἷμα φέρεται, hoc est quibusdam uero etiam sanguis effertur. Secundum αἰμορῆς ἁγίας ad caput de immoderata purgatione ubi habet: σιωχῶς δὲ καὶ ἀντὶ ἀμβλασσειν ἰσχυρῶς αἰμορῆς γούσιν.

IN LXXII. CAPVT.

Quæ interaneum id. In græco codice est οἱ κατέχουσιν τὸ σπλάγχνον, quod est, quæ continent uiscus. Appellat uterū, uiscus Ego dixi interaneū, nā cor tecur, cerebrū, pulmo, liē pprie uiscera appellantur.

Quidam uero & totam uulnam. Paulus negat totam uulnam posse procidere. At nostris temporibus in una & altera totā pro-

COMMENTARIUS

cidere extra sinum uidimus, ex cornibus tantum & quibusdam adhuc
ligamentis suspensam cuius rei etiā hodie testimoniū adferre possumus.
ὑπατμισμός. Vaporibus & suffimentis vaporum. Verba græca ita habent.
ὑπατμισμός. ὑπατμισμοῖς, καὶ θυμιάμασι, quasi dicas subuaporationibus & suf-
fimentis.

IN LXXV. CAPVT.

IN vuluæ ostio. Rime, aut fissa uocantur latinis, quæ apud grecos
ῥαγάδες. ῥαγάδες, & si non nulli ῥολίδας ita nominent. Celsus libro sexto
rhagadia appellat.

Subliuida & feculenta. Codex græcus impressus aliq̃ nonnulli
scripti manu habet: ὑποπέλιον καὶ τραγγάδην, pro ὑποπέλιον
καὶ τραγγάδην, ita etiā legēdū putat Oros. Gemusæus autē nō aduertit.

Volsella præhensas. Græce sonat μιδίω διακρητῆσαντας. Est
μύδιον. autē μύδιον, ferramentum quo aliquid prehendimus, quod Celsus Vol-
Volsella. sellam nominat: Neq; quicquam, inquiens, commodius est quā uolsel-
la prehendere, sub eaq; quod uolumus excidere. Græcus quidam autor
anonymus ait: αἰτ τὰς δὲ κεχλασμένας σφυλὰς ἀμέτρως ἐκτέμ-
νομεν μιδίω λαβόμενοι, hoc est: Vuas autem immodice relaxatas
uolsella præhensas excindimus.

IN LXXVII. CAPVT.

σφαίρωμα. A Gibbanatium regione. Græce legitur ὁ δὲ πόσις αὐτοῖς ἀπὸ
τῶν κατὰ σφαίρωμα καὶ τὸν βουβῶνα τόπον. Ad uerbum so-
nat: Dolor autem ipsis ex locis iuxta spheroma, & bubonem &c.
Quæ iam pars sit σφαίρωμα, audi. Autor quidam græcus anonymus
ita scriptum reliquit: λήγει δὲ ἡ σφύς εἰς τὸ ἱερὸν ὁ σφῶν παρ' ἐκά-
τερα δὲ τοῦτον τὰ ἰχία ἐστὶ, ἐφ' οἷς οἱ γλοῦτοι ὄντι. τὸ ὅσα εἶναι
ὑποκείμενα μέγιστα ἐνδεῦπερ ὦν αὐτοῖς σώματα σαρκώδη,
ὧν τὰ κυρτώματα ἐκ τοῦ πύθι φερέεσθαι, σφαίρωματα προσα-
γορεύεται. Hoc est ad uerbum: Desinunt autem lumbi in os sacrum.
Vtraq; huius parte coxæ sunt super quas nates eo quod ossa subiecta
sint maxima. Hinc carnosæ corpora ipsis substrata sunt, quorū gibba,
inde quod rotunda sint, σφαίρωματα, quasi orbiculata appellantur.

In quibusdam & vomitus à radiculis. Ita ferè semper Celsus
interpretatur, ἐμετ' ἀπὸ ῥαφανίδων intelligit autem raphanum.
Vide septimum librum, ubi de uomendi modis præcipit.

Lixiuio. Sic græcis κομία, aut κομία σκλήτη uertimus. Male Oro-
Orosius. scius hic κομίαν πρωτοσάκτιω lixiuium uertit cinerē, qui primus de-
stillauerit, cum πρωτοσάκτη sit lixiuium quod cinere & calce adie-

Et a sit, apud Paulum in septimo.

IN LXXVIII. CAPVT.

Non sola particularum. Vide Galenum libro decimo de compositione medicamentorum secundum locos. Oribasij nonum, & duo decimum Aetij.

Et cum ablunt. Deest in græco codice particula καὶ, ut sit καὶ χαλκῆς. Vult itaque Paulus, ut lauentur & cum defluxiones adsunt, & cum non adsunt. Orosius & Basiliensis corrector omiserunt.

Statim igitur cū quis morbum primum experiri cœperit, sanguinis missio erit tentanda Nam quas iam fluxio frequenter infestari: ij plus. Pauli sententia est, ut quamprimum quis fluxione cœperit infestari, mittendū sanguinē curet. Vbi autē iam sepe eadē fuerit conflictatus, præcipue in frigidioribus natura, & imbecilibus. Nescio quid Orosio in mentem uenerit, legenti ὥς εἴγε φθίσαντες ἢ δὴ πολλάκις ἐδματιοδύωαι βλάπτονται &c. Cū & ratio, & uera sententia in hunc modū habeat. ὥς οἴγε φθίσαντες ἢ δὴ πολλάκις ἐδματιοδύωαι βλάπτονται &c. Nō sum ignarus Actiū ferē cū superiori sententia cōuenire, ubi habet: Quare necessaria maxime est sanguinis ac reliquorum humorum in fluxionibus sanguineis, detractio, præcipue in ijs qui sanguine redundant, ac reliquis humorū recrementis. In his enim antequā dolores oboriantur, uenam secare oportet, bis in anno &c. At Paulus de ijs mentionē facit, qui iam ex sanguineo temperamento, ad pituitosum inclinant temporis processu, naturaq; frigidiores, ac imbecilli sunt, quæ duo sanguinis missionem recusant.

Orosius.

Anxietatem, & cibi fastidium. ἄσῳ δ' εἰς καὶ ἀνορέκτους, hoc est, anxios & inappetentes. ἄσῳ quid sit, antea sumi interpretatus. Aliqui nauseabundos hic exponunt.

Nec miraculum est si materies. Hoc est humor pituitosus per se frigidus, ubi accensus, inflammatusq; fuerit temporis spacio, ut uiridia ligna, æstuat, incandescitq;, & si bilem habuerit admistam, tanto facilius accenditur. Eoq; dicit, ut bilis admistionem omittam.

Bulbi per se: vel cum polentæ polline ad ruborem usq; suffricti. Orosius legit ἔως συμμῖξεως, hoc est, ad commistionem usque, idq; ex suo antiquo exemplari cui plus credit, quam rationi et ueritati. Non enim ad commistionem usque sunt infricandi bulbi, sed ἔως ἄμυξεως, quod est ad ruborem usque in cute excitatum, unde tumor relictus discutatur.

Orosius.

COMMENTARIUS
IN LXXIX. CAPVT.

OLei lentiscini. Deest in codice impresso τὸ ἄνταρκis, quod Oroscius præ nimia diligentia præterijt.

Minij. Sic uerti μίλτον, Celsum imitatus qui μίλτον σωοπικλὺ reddit minium Synopicum. Manardus reprehendit Barbarum, quod μίλτον exposuerit minium, & non potius rubricam.

Calcis viuidę Hoc est, calcis non extinctę, Verba duo gręca idem significant. ἄσβεστος, & ζώση. Sed primum calcem uiuam per se possum signat, cum dictione ζώση, calcem tantum.

Oroscius. Emmoton. Hoc est, medicamentum, quod linamentis filatim conceptis excipitur. Nam μοτοὶ linamenta gręcis appellantur, quibus ora uulnery obturari solent.

IN LXXX. CAPVT.

Claui. Celsus inquit: Clauus autem nonnunquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur: præcipue tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, doloremq; etiam, si non alias tamen ingredienti mouet.

Syringiacus puluis. Hoc est, puluis qui fistularum callis exteren- dis conuenit: Dixit gręce Paulus συγγιακὸν ξηρὸν quasi syringia- cum aridum.

IN LXXXI. CAPVT.

IN gręco codice habetur συμμάτων, quasi dicas spissamentorū. Oroscius σύμματος legendum ex ueteri exemplari putat. Mihi autem uidetur θέριον, quod est, lupinorum, ut superius etiam habetur. Nam de coctione met allorū, præsertim stymmeos in hac re nihil apud bonos autores habetur.

Ne manus inquent. Hoc est, tam spissa duraq; fiant, ut digitos iniectos non inquent, ea enim est emplastrorum crassities. Gręci eam ἀμόλωτον appellant, ut superius annotaui. Hic disjuncto uerbo dixit Paulus, μὴ μόλωέτω. Atque hæc contra opinionem Oroscij, qui in hoc ipso uerbo reprehendendum me censuit.

FINIS COMMENTARII
LIBRI TERTII.

COMMENTARIO

RVM IN PAVLVM AEGINE

TAM LIBER QVARTVS.



IN I. CAPVT.



LEPHANTIA. Morbus hic Græca tan- Elephan-
tum habet nomina, uocaturq; ἑλεφάντι- tia.

φάντισις, ἑλεφαντίσις. A quibusdam λεον-
τίσις, aut σατυρίσις primam ab elephā-
to, aliam à leone, et satyris nomenclaturam
accepit. Est autem is nimirum, qui uulgo dici-
tur lepra. Græcorum enim lepra cutis tantum
asperitudo est. Iam barbari elephantiasim

uocant pedum tumorem quendam, qui febribus superuenire solet, ne te
fallat interim nominum diuersitas.

Extrema decidunt. Hoc est digiti pedum manuumq; auricularum
jūmma, pili, nasus, sed hæc posterius. Istam speciem efficit atra bilis
ex flaua supra modum naturæ adusta, quæ ideo perniciosa esse uidetur
Galeno, quod uehementer erodat, & terram fermentet.

Neque tamen eminentiæ tuberosæ. Sic reddidi μήτε μὲν ὄχ- ὄχβοί-
θους. Sunt enim ὄχθοι tumores uerrucosi, tuberosiq; in elephanticeis ap-
parentes. Vnde ὄχθωδ' ἢ ἑλκεῖς ulcera dicuntur prætumidis labris.

Sola capitis adustione. Vide lib. 6. ubi habes expositū, quomodo
ferramento quinque excitant crustas in elephanticeis. Est autem cap. 2.

Nunc saltu, nunc magis alteribus. Miror hic Oroscium nihil Oroscius.
uel ex antiquo suo exemplari, uel ingenioso cerebro attulisse: cum &
codex Græcus impressus sit uiciosus, & multi hoc in loco impeerint.
Primum enim habetur in Græco, τὰ μὲν ἀφ' αὐτοῦ μὲν, τὰ δὲ
πλεον ἄλλῃ ῥοι cum legendum sit τὰ μὲν ἀφ' αὐτοῦ μὲν, τὰ δὲ
πλεον ἄλλῃ ῥοι. quod etiam antea in meis annotationibus monue-
ram. Quia igitur Paulus ualide exerceri uult elephanticos, præci-
pit illis saltum, alteres & folliis usum. Sunt autem alteres massæ Halteres.

COMMENTARIUS

quedam graues, uel ex lapidibus, uel metallis, quales hodie in librandis rebus adhibentur. Galenus libr. 2. de sanitate tuenda inquit πολὺ δὲ δὴ μάλλον εἴ τι βόηται ταῖς χερσὶν ἄκρους ποδὶ λαβὼν ἑκάτερον κατὰ μόνον οἱ ἀπὲρ οἱ κατὰ παλαιστρὰν εἰσὶν ἄλτηρες, ἄτρεμας ἔχει προτείνας, ἢ ἀνατείνας αὐτάς, hoc est: Multo autem magis fiet si quodam pondere summis manibus prehensio utraq; seorsum (qualia sunt quæ in palestra alteres dicuntur) protensis aut sursum elatis ipsis in eodem consistat habitu. Idē eodem in libro exercitij modū prescribit in hunc modū ἐνιοὶ μὲν κατὰ δέντες ἄλτηρας ἐν τῷ πρόθεν διεσώ- τας ἄλλήλων ὠρύουσι, εἴτα ἐν μέσῳ ἵσαντες αὐτῶν αἰρούμενοι προκύπτοντες τῇ μὲν δεξιᾷ χερὶ, τὸν ἐν τοῖς ἀριστεροῖν, τῇ δὲ ἀρι- στερᾷ τὸν ἐν τοῖς δεξιῷ καὶ ἀντιστρίβοντες ἑκάτερον εἰς τὴν οἰκείαν κατὰ τίθενται χώρῳ. Ex his satis liquet, quid alteres apud Martialem, & alios ueteres scriptores fuerint. At litera una addita ἄλτηρες, di- cti, non sunt massæ quædam, sed adminicula, quibus in saltu inniti- mur: quales sunt cuspides, hastæ, arundines. Galenus horum quoq; men- tionem facit libro iam citato, in hanc sententiam: καὶ μὲν δὴ καὶ οὗτοι τῶν χειρῶν ἐνεστὶν ὁ δὲ γυμνάσιον ὁ μὲν ὁποῖον γυμνάσιον ὁ δὲ χωρὶς τοῦ κατέχειν ἄλτηρας &c. Hæc exercitia supernis partibus ualent, lumbis & obliquis spinæ regionibus. Basiliensis castigatō reliquit lo- cum deprauatum.

Insuper melissæ herbæ. Quæ herba ita uocetur nondum apud ido- neos authores comperi nec castigatores locum corrigunt. Actius eā uo- cat Milesiā herbam Sermone tertio decimo.

Conferunt etiam si bibantur. Quia meatus uiscerum ui quadā peculiari adaperiunt, & alium etiam mouent comprimendo ea quæ intestinis inhaerent.

ἀφιδρω-
τήρια.

Eandem habet efficaciam. Interpretatus sum ἀφιδρωτήρια, quæ desudationes mouent. Sudor autem Celso authore duobus modis elicitur aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est & harenæ calidæ, & Laconici, & Clibanii, & quarundam naturalium sudationes, ubi ē terra profusus calidus uapor, edificio includitur, sicut super Baias in Murtetis habemus.

IN II. CAPVT.

UTerq; affectus. Non de lepra uulgari hic agit, sed de extraneo cutis affectu, ut antea monui. Vide Orobasij librum septimum.

ἀπότμ-
ξις.

In qua corpus consumitur. Græce est μετὰ ἀποτμήσεως σώμα- τος. Est autem ἀπότμησις quæ semper aliquid à corpore abscedit, eliqua

turque. Sic in externis, lib. 2. de internis usurpatur. Nam psora et lepra melancholici cutis tantum affectus sunt. Nam si in uenis & carne pro ueniant, canceri uocabulum sortiuntur.

Stercoris argenti. Vno uerbo græce dictū ἑλκυσματῶν. quanquā ἑλκυσ-
etiam σκωρία ἄφρονος & ἑγκύμα apud Dioscoridem appelletur. μα.

Lotariorum rubrorum. Græce est λωτάριον ἑρυθρὸν. Hermolaus barbarus Lotarium rubens quasi diminutivum loti interpretatur, nisi quis non de siluestri potius dictum accipiat. alij de Aegyptica intelligunt. Citatur apud Paulum lib. 7. Pa-
stillus dia Lotarion ad pudendorum, sedisq; uicia. Præterijt Oroscius. Oroscius.

IN III. CAPVT.

PLeriq; hoc solo impetigines. Has Galenus lib. 5. de compositio-
ne medicamentorum secundum locos nominat μλιτάγρας, uoce
nimirum ex latina & græca dictione composita, quod contra rationē
grammaticæ fieri uidetur. Plinius etiam libro sextodecimo huius memi-
ni, aitq; sub Claudij Tiberij Cæsaris principatu potissimum hanc men-
ti impetiginem inualuisse quidam hanc morbum quem hodie Gallicū,
aut Hispanicum uocant, esse opinantur.

IN V. CAPVT.

Leuce, cutis. Leuce uiriliginis species est albida, & altius descen-
dens: in eaq; albi pili sunt, & lanugini, similes. Due uero alie re-
stant, alphas & melas appellatæ Celso, Paulo autem albus albus &
niger. In prima color albus est, ferè subasper, & nō continuus: ut quæ
dam quasi guttæ dispersæ esse uideantur. Interdum etiam latius, & cū
quibusdam intermissionibus serpit. Altera colore ab hac differt, quia
niger est, et umbræ similis. Leuce quem occupauit, non facile dimittit.

Acu per summa leucen pungito. Celsus libro quinto eadem ferè
habet: Verum autem, inquit, horum aliquod sanabile sit, an non sit, Experimentum,
experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet aut acu pungi, si
sanguis exit, quod ferè fit in duobus prioribus, remedio locus est: si hu-
mor albidus, sanari non potest.

IN VII. CAPVT.

STigmata curabis. Stigmata in uetere medicina dicta sunt, non Stigmata,
puncta, sed maculis punctorum quantitate et forma decolorata ho-
minis cutis. Porro latinus etiam in usu est ea dictio. Plinius enim &
Largus aliquoties usurpant.

Quod matulæ adhærescit Hoc est, quod in urina subsidat, hoc
namque matulæ solet adhærescere Dioscorides oculorum cicatrices ex-

COMMENTARIUS

purgare commemorat.

IN VIII. CAPVT.

Exanthe-
mata

EXanthemata Pusulae sunt exiguae Celso, quales ex urtica, uel su-
dore fiunt. Interim pituitae eruptiones, ita Plinio appellantur, de
quibus hic agitur. Graeci etiam ἐξανθήσεις, quasi dicas efflorescen-
tias nominant à uerbo ἐξανθίσθαι.

Cuticula.

In superiore pellicula Graece est ἐπιδερμίδα, quam Latine pos-
sis interpretari cuticulam. Nam summa pars, & ueluti ipsa cutis ef-
florescentia existit.

IN IX. CAPVT.

Splenio illitas. Hoc est, panniculo lienis modo oblongo. Plinius, su-
perimponi oportet splenium è melie decocto.

Sallorum elus. Malè in codice Graeco est προσφορὰ, tu fac προ-
σφορὰ, eiusmodi minutias neglexerunt Aristarchi interpretum.

IN X. CAPVT.

ὕπόρρευσ-
σις.

ἐκ βράσ-
ματα.

ποδύ-
ματα

VT humoris colluuiēs habeat emissarium. Graece est κατὰ
ὕπόρρευσιν, quasi dicas, ex confluxu. Quidam Graecus autor ha-
bet κατὰ ὑπόχυσιν in eodem significatu.

Calidis eruptionibus. Sic uerti ἐκ βράσματα feruentibus papu-
lis, ποδύματα. Gliscentibus seu manantibus capitis ulceribus,
ἀχῶρες. Atq; hac autoritate ueterum.

IN IX. CAPVT.

τρυκαυ-
τά.

Ambusta. Latini τρυκαυτά ambusta, uel combusta, uel exusta,
citra ignis uocabulum additum exponunt. Propriè uero signat
usta igne, eoq; Paulus primum τρυκαυτά dixit. Combustionem uero
ex aqua calente, κατακαύματα ἀφ' ὕδατος. Quamquam & alia
materie saepe adurant.

Codex
castigatur

Oui albumen. Malè in codice nostro legitur ὠὸν ὄλον, pro ὠὸν ὀδὸν
κουῶ. Ita etiā Auicenna habet, et Dioscorides. Annotauit id Oroscius.

Ordei farina. Simpliciter in Graeco codice est κριθαῖς, quod est or-
deis. At significantius ex Auicenna et Serapione ordeis farina positiū est.

Illitumq; lintheolo. Malè Graece habetur ἐμπάσσων pro ἐμ-
πλάσσων. Id quod neglexit Oroscius, & Basilienis castigat.

IN XII. CAPVT.

Ouum integrum. Graeca sonant ὠὸν ὀλόκληρον χωρὶς τῶν ὀρεῖ-
των, hoc est: Ouum integrum sine cruīs. Quid sibi uelit, cruīs, non
uideo, cum nulla sit ante mentio cruorum facta. Puto igitur legendū,
χωρὶς τῶν ἐρέγγων, hoc est, sine putaminibus. Quamuis etiam eruūm

cesis conveniat. Hunc locum præterijt Oroscius.

Oroscius.

IN XVII. CAPVT.

MAli punici corticibus vino incoctis, rhu & polenta. Galenus eadem ferè libro secundo ad Glauconem habet. Vnde lectio nem Pauli corrigendam puto, ut legatur εὑτε καὶ ἀλφίτων, pro κερουτε καὶ ἀλφίτων. Nam cera hic nihil proficit, sed sumac, ut barbarorum more loquar, astringendi vi præditum. Oroscius hunc locum sua sponte præterijt, & Basiliensis castigator omisit.

Castiga-
tur co-
dex.

Oroscius.

IN XVIII. CAPVT.

CAtaplasmate ex ficis siccatis. Vide librum Galeni iam citatū. Voco autem ficus siccatas ἰσχάδες: quas etiam Caricas nominare licet. Galenus autem habet: Non autem oportet ipsas caricas as- sumere, sed aquam, in qua illa decocta intabuerint.

ἰσχάδες.

Si voles magis intendere. Hoc est, si uehementius uoles siccare. Nam Galenus pro ἐπιτείνει habet σφοδρότερον ξηραίνει.

Galenus autem memoriæ. Libro quartodecimo methodi medendi meminit, unde etiam Paulus hæc quasi mutuatus est. Eadem ferè tradit etiam libr. 2. ad Glauconem, & commentario de Tumoribus præter naturam, ubi ad uerbum ista habentur.

Qui humorum ex loco in locum decubitu. Græca lectio nō. nihil est uiciata, habet enim τοῖς ἀπὸ σκήματ' ἡ μάλιστα χρονίσασιν ἀποσκήμασιν, pro τοῖς ἐξ ἀποσκήματ' ἡ μάλιστα χρονίσασιν ἀποσκήμασιν. Nam una dictio est ἀπὸ σκῆμμα. Quam Galenus in hunc modū exponit: ὁνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ἵταν χυμοὶ τινες ἐνοχλοῦντες ἐτέρῳ μορίῳ, καταλιπόντες ἐκεῖνο ἐς ἕτερον μετασῶσιν. Atq; hic alter modus est generationis abscessuum. Sit itaq; ἐξ ἀποσκήματ' quod τὸ πῶς ἀποσκήματ', ut ait Galenus. Differunt igitur inter se ἀπόσκημα, & ἀπόσκημμα, ut apud idoneos autores licet condiscere. Non aduerterunt nostri aristarchi.

Locus ca-
stigatur.

ἀπόσ-
κημμα.
Oroscius.

Porro abscessuum generationem. Græcus codex uitiatus non. nihil est, ubi habet τὸ τῶν ἀποσκημάτων γενέσεως, pro, τὸ τῶν ἀποσκημάτων γενέσεως, dictio δὲ omissa sententiam poterat confundere. Oroscius et castigator Basiliensis quantumuis oculati nō annotarunt. Oroscius.

Codex
depraua-
tus.

IN XIX. CAPVT.

CUm inflammatio neque. Inuenies penè eadem in secundo ad Glauconem libro. Verti autem νεκροῦται membrum emoritur. νεκροῦται quod alij barbarè exponunt, mortificatur.

COMMENTARIUS
IN XX. CAPVT.

Cvm bilis flaua nulli mixta humori. Hoc est, cum sincera bilis, nullum alium humorem uel pituitam, uel bilem atrā, uel sanguinē coniunctum habens. Oribasius libro quarto derimo similia habet.

Codex
uiciatus.

Porri succi cyathi dimidiū. Viciatus est codex græcus impressus. Nā pro xxv ζ legēdū est xxv . $\eta\mu\iota\sigma\epsilon\iota$. quod ualeat Cyathi dimidiū: Paulo post, myrteici uncie sex, in græco erat $\Gamma\theta.1$. S. pro. S. hoc est sedecim. pro sex positū. Statim in eadē linea, Vino diluta, græcus codex habet $\theta\iota\nu\omega$ $\eta\mu\iota\sigma\epsilon\iota$, pro $\theta\iota\nu\omega$ $\delta\iota\epsilon\iota\varsigma$. Nō multo post, recremēti plūbi uncia una. S. græce erat $\sigma\kappa\omega\rho\iota\alpha\varsigma$ $\mu\omicron\lambda\iota\beta\delta\omicron\nu$ $\delta\epsilon\upsilon\beta\epsilon\phi\omicron\nu$ ζ . S. pro $\sigma\kappa\omega\rho\iota\alpha\varsigma$ $\mu\omicron\lambda\iota\beta\delta\omicron\nu$ $\Gamma\theta.1$. S. quæ loca nec Orosius, nec Basiliensis corrector aduertit.

Orosius.
Basiliens.

Circa tedam. Hoc est circa lignum ad tedam aptatum, cui lana cum alia quadam pinguedine circumuoluitur, ad flammam alendam. cuiusmodi hodie etiam lucernarum loco utuntur.

Thuris, aluminis scilsi. Hic quoque diligentiam Basiliensis Correctoris desidero, qui lectionem græcam & confusam & mutilam reliquit. Nam habet $\lambda\iota\beta\alpha\lambda\omicron\nu$ $\chi\iota\sigma\tau\eta\varsigma$ ζ . α . quod ad uerbum sonat, thuris scissilis drachma nullo sensu. cum legendum sit $\lambda\iota\beta\alpha\lambda\omicron\nu$ $\sigma\chi\iota\sigma\tau\eta\varsigma$, $\alpha\lambda\alpha$. ζ . α . quod signat thuris, aluminis scissilis, singulorum drachma. distinctione post thuris addita, deinde post $\sigma\chi\iota\sigma\tau\eta\varsigma$ $\alpha\lambda\alpha$.

IN XXI. ET XXII. CAPVT.

Erisypelas. Multi inter latinos scriptores interpretantur erisypelas sacrum ignem. Celsus autem hunc ab illo separat, eoq; malui græca uti dictione quā expositione esse obscurus. Vide Galenū secūdo ad Glauconem: Aetium libro quartodecimo, & Oribasij septimum.

Abscessorij tumores. Hoc est qui abscessum representant. sic uerbi $\alpha\pi\omicron\sigma\tau\eta\mu\alpha\tau\omega$ $\delta\epsilon\iota\varsigma$ $\delta\gamma\kappa\omicron\iota$ quasi dicas apostematici tumores.

Phyma & Phygetlon. Tubercula sunt tumida. Celsus græcis nominibus quoq; appellat Bubo à loco nempe inguine, cui solet magna ex parte accidere appellationem accepit: quanquam etiam alas, & cervice interim infestet. IN XXIII. CAPVT.

ORibasius. Libro septimo huius tuberculi mentionem. Pauli autem lectio nonnihil est uiciata habet enim. $\epsilon\pi\iota\kappa\epsilon\delta\omega$ $\delta\epsilon$ $\alpha\upsilon\tau\eta\varsigma$ $\alpha\lambda\phi$ $\kappa\alpha\tau\omega$ pro $\alpha\lambda\omega\tau\alpha\tau\omega$. Paulo post, $\tau\omicron$ $\kappa\alpha\tau\omega$ pro $\kappa\alpha\tau\omega$ $\kappa\alpha\tau\omega$ ut sit una dictio. Id quod Aristarchi nostri omiserunt.

IN XXV. CAPVT.

Codex
impressus.

Carbunculus. Sic uerti græcam dictionem $\alpha\lambda\delta\epsilon\alpha\kappa\epsilon\varsigma$. id est ad uerbum, Carbones. Celsus autem, quem libenter in dictionibus latinis

sinis imitor, Carbunculum nominat.

Quod vlcus est crustaceum. Habetur i græco ἡ περ ἐστὶν ὕλα
ῥωδ' ἢ ἄλλῃ quod est, siquidem sunt crustacea ulcera. Ego autem legen-
dum puto pro ἡ περ, οἱ περ ut referatur ad ἄνδρες. Sua sponte præ-
terierunt hoc Oroscius, & Gemuseus.

Depascatur q̄. Sic exposui μετὰ νομῆς quod est cum depastione.
Sensus est, ita carni subiectæ affixa est, ut eam quoq; depascatur. Vo-
lui itaq; uersionis meæ rationem reddere, ne quis seuerior censor nos à
uerbis ipsis discessisse clamet.

Circumscribuntur. Ad uerbum exposui τὸ διγερὰ φονταί. Signat περιγερὰ
autem hoc loco circumscribi, tolli, aboleri. Nam qui carbunculi carnē φεοῖται.
obsidentur, facile tolluntur. qui partes solidas, pertinacius hærent.

Vel & ipsum similiter dilutum. In Græco codice pro ἡ tu facῖ,
quod etsi exiguum sensum tamen poterat confundere. Neglexerunt Cē-
sores interpretum.

IN XXVI. CAPVT.

Cancer in qualibet. Hoc caput quasi ad uerbū habet Aetius libro
quartodecimo. Oribasius septimo. Galenus secūdo ad Glauconem.
Habet autem lectionem deprauatam in exemplari græco, οἷον ἐστὶ τὸ
ἐπίδυμον πλῆθος. Γ.δ. S. quæ sonant ad uerbum, quale est epit hy-
mum pondere unciarum quatuor. At nemo non medicinae peritus intel. Oroscius.
ligit nunquam epithymum dari tanto pondere. Legendum itaq; uenit in
hunc modum, οἷον ἐστὶ τὸ ἐπίδυμον πλῆθος. Γ.δ. S. id est quale est
epithymum pondere drachmarum quatuor & S. Nam Dioscorides, Codex
alijsque eiusmodi ferè pondus admittunt. Miror Oroscium tam grauē emenda-
interpretum Censorem & Gemuseum, alioqui in medicinis exhiben- tur.
dis peritum hæc non aduertisse. Gemu-
sæus.

IN XXVII. CAPVT.

OEdema lexus quidam. Omnia ex Galeno ad Glauconem, septi-
mo Oribasij, quartodecimo Aetij transcripta sunt. dixi autem m-
dolens tumor, hoc est doloris expers tumor. Vide etiam Galenum libro
quartodecimo Methodi.

Affectus qui hominem premit. Lectio Galeni libro iam citato
corrupta est: habet enim τοῦ κατέχοντος πλῆθος, quod Linacer ex Galen. co-
ponit multitudinis quæ hominem premit, cum legendum sit τοῦ κατέ- dex emē-
χοντος πάθος. hoc est affectus, qui hominem premit. datur.

Tenerrimum ellychnion. Ellychnion est quod ex papyro, spar-
ea, canabe, aut Stupa tortum in lucernis uritur. dixi tenerrimum, hoc Ellychniō

COMMENTARIUS

est molliſſimum græci. ἀπατότατον.

IN XXX. CAPVT.

πικπύ - **P**Er subſultum. Græce ſubſultus dicitur, διαπύδης. Galenus li-
δης. bro quinto Methodi quomodo fiat, exponit in hunc modum, Diapede-
ſis ex tunica quidem ipſa rarefacta, ſanguine uero tenuato: interim
etiam ex gracilium uasorum adaperſum naſcitur &c. quando autem
hoc fit, ſanguis ueluti ſubſiliendo ex uas ſis prodiſt.

IN XXXI. CAPVT.

ἐγγυα. **R**Vptio. Vnitatis ſolutio pro particularū natura, nomenclaturam
ſortitur. In offe, græcis κέτογμα quasi fractura dicitur, in carno
ſis muſculorum partibus ex diſtentione perueniens, ἐγγυα hoc eſt rup-
tura, de qua hic fit mentio. Cum autem fila menta ſimiliter tenſa rum-
puntur, uulſum. In carne uulnus.

IN XXXII. CAPVT.

EXactus quidem ſcirrhus. vide ſecundum ad Glauconem, &
quartumdecimum Methodi: Vnde hæc omnia fere ſunt translata.
quanquam Oribasius antea & Aetius ea quoq; tranſcripſerint.

Oroſcius.
Nota le-
ctionem.

A balneo autem in totum. Oroſcius ſimpliciter uertit à Laua-
cris uerò continuis abſtineant, quod mihi non placet. Nam uidetur
Paulus præcipere ut in totum à lauacris abſtineant ſcirrho laboran-
tes, aut ſi id nō fiat, ſaltē à frequētibus. alioqui dictio συχνοῦ ex ſuper-
ſuo fuiſſet adiecta. Ego itaq; lego ἢ γοῶ duabus dictiombus, nō ἢ γοῶ
ut habetur in exemplaribus. Aetius abſtinendū præcipit à balneis medi-
camētōſis quæ atramentum ſutorium, alumen, aut ſulphur reſpiciant.

IN XXXIII. CAPVT.

Codex
emenda-
tur,

NAſturcij. Male in codice græco καρδαμῶμον pro καρδαμόν ha-
betur, item σκληράς pro σκληρίας. In fine ἀμωνιακοῦ θυμιάμα-
τος. β. Vbi Gemuſæus ex codice Ruelli ζ. ζ. legit. à quo hic non
diſſentio.

IN XXXVII. CAPVT.

Oroſcius.



QUercus folia applicata vlceribus. Vide Oribasij librum ſepti-
mum. ex quo Oroſcius græcam lectionem caſtigandam pu-
tat, legendumq; ἄχνω ἄλδρον pro ἄραχνω ut ſit polien farine, nō
aranei telum, quanquam hoc etiam recentibus uulneribus conglutinan-
dis conducat. Sed malo cum Oribasio legi ἄχνω.

ἀχνω.

Anagallis. Rurſus ex Oribasio ponendum anagallis, pro ἀνὰ πα-
λιν ποιεῖ. Expunge periodum. Exemplaria Ruellij, & Laſcaris ueterem
lectionem retinent.

Corrigi-
tur lectio

MYrrha. Galenus tertio methodi fufius hæc exponit. Aetius pro myrrha uidetur, legere myrtus, non omnino male. nam ulceribus conglutinandis, fi Dioscoridi credimus, efficax est. præterea astringit, & fíccat citra rofionem quod propofito conducit. facilis erat lapsus $\sigma\mu\gamma\gamma\alpha$ ex $\sigma\mu\gamma\gamma\acute{\iota}\nu\alpha$, aut $\mu\upsilon\epsilon\tau\alpha$. Nota.

Ostrearum. Actius habet, ostreorum crematorū, item in fine habetur singulorum unctæ octo nimirum pro drachmæ octo. Nā antiquum lascari exemplar non Γo quod est uncia sed  habet. Orosius & Gemuseus noluerūt hoc annotare. Rursus ī sequēti emplastro, cadmiæ drachmæ sex. In græco male habetur Γo pro  mox sequitur, eris cōbusti, singulorū drachma, ubi Codex græcus Γo. hoc est uncia habet. Depravata lectio.

IN XLVIII. CAPVT.

SI inferius spectet. Galenus secundo ad Glauconem hæc fere ad
uerbum habet. unde etiam textus codicis Pauli impressi corrigendus est, legendumque: κατὰ γὰρ τὸ πῶς δὲ ὄντ' αὐτοῦ ubi habet ἀναρ-
τῶν δὲ ὄντ' αὐτοῦ, contrario nimirum sensu. Galenus autem di-
xit κατὰ τὸν τὸν δὲ ὄντ' αὐτοῦ. Idem namque est κατὰ γὰρ τὸ πῶς,
κατὰ τὰντες. Omisit Orosius & Basiliensis corrector.

Etenim in cubito. Sic interpretatus sum ἐν πῆχει, que vox grecis significat eam brachij partem, que ad manum tendit interius ulnā quidam recentiores nominant ἄγκυον flexura ipsa recte dicitur. Veteres sanguinem ex cubito detrahi precipientes, hanc intellerunt.

De finibus diruptus. In græco codice est $\pi\omicron\rho\tau\iota$ ρακωδ'ων κόλ- $\epsilon\alpha\kappa\omega\delta'ης$
 $\pi\omega\upsilon$. Signat autem ρακωδ'ης idem quod $\epsilon\omega\gamma\alpha\lambda\epsilon\theta$, καὶ δι' $\epsilon\epsilon\omega\gamma\omega\varsigma$,
hoc est fractus & ruptus. Venit autem à $\epsilon\alpha\kappa\theta$, quæ vox significat
pannum & uestem laceratam. Sicut $\epsilon\alpha\kappa\omega\upsilon$ apud Aristophanem ue-
stem uilem, detritam, & pertusam. Hic itaq; $\epsilon\alpha\kappa\omega\delta'ης$ abscisui ac- $\epsilon\alpha\kappa\theta$.
commodatur, in quo cutis pus congestum integens, erosa extenuari de-
teriq; instar pellium detritarum contingit,

Ut neque admodum sit durum. Mirum est quàm Oroscius hic Oroscius.
memor sui non sit. Antea me reprehenderat, quod dictionem græcam
ὀμόλωτον uerterim, manus non inquinans. Hoc autem loco nō uidet
à Paulo emplastrum liquidum intelligi, cum dicit μήτε σκλίσαι, μήτε
ὀμόλωτον. Galenus ad Glauconem eadem habet.

IN LIII. CAPVT.

AT scopus crustam generantium. Hoc est, eo consilium in crustam generantibus dirigitur, ut calefaciant simul & astrin-

COMMENTARIUS

gant. Calx autem calefacit tantum eoq; non ita commode adhibetur.
Hec sunt ex Rufo petita.

IN LIIII. CAPVT.

Neruis vulneratis. Paulus hæc fere ex Galeni tertio secundum genera mutuatus est, mutato tantum docendi ordine. Actius libro quartodecimo, Oribasius septimo habet eadē. Ceterum uocat in ner-
ὑδροτρεῖς uis uulneratos, ὑδροτρεῶτους in tendonibus, τειοντοτρεῶτους. Cura-
τις tio autem communis est.

Specillo subunctorio. Sic reddidi ὑπαλείπειν. nimirum à uer-
 bo ὑπαλείφω quod subungo significat, derivato.

Maiores conuulsionis metus. Male ἱ codice græco habetur, ὁ μὲν
 κίνδυνος τοῦ σκεπεῖσθαι pro ὁ μὲν κίνδυνος τοῦ παθεῖσθαι.
 Orosius & Gemusæus non aduertunt.

IN LV. CAPVT.

ἀγκύλα **A**ncylas. Celsus & Scribonius eius discipulus, Contractionem,
 ligationemq; articulorum interpretantur græcorum dictiones
 ἀγκύλας, & ἀγκυλώσεις.

IN LVI. CAPVT.

ὑδρα **N**am colligātes nerui. Hoc loco intelligit per σωδεῖται ὑδ-
σωδεῖται ρα, ipsa ligamenta. quæ ossa colligant: uocat autem neruos quod
κῆ. eos imitentur. Nam alibi tres species enumerant, alios qui sensum mo-
 tumq; præbent, alios qui motui tantum seruiunt, ut tendines, alios qui
 osseam compagem ligant, uincuntque.

IN LVII. CAPVT.

Corrigi-
tur co-
dex im-
pressus. **T**res sunt vniuersæ. Actius libro nono eundem fere docendi ordi-
 nem seruat. Celsus duorum generum meminit, Latorum quos etiā
 peiores dicit, & teretum, Græci addunt etiam ascarides. Habetur in
 Græco codice ἄσκαρες pro ἄσκαροι, hoc est extremorum perfrictione
 potius quàm articulorum, antea notaueram.

ζωμήρι-
σις. Cochleari. Sic exposui ζωμήριον. quod Grammatici Græci dicunt
 instrumentum esse, quo spuma ab ollis tollitur. Quia igitur nullum
 commodius uasculum ad hanc rem inueni, cochleari interpretatus sum.

IN LVIII. CAPVT.

Recentio-
rum opi-
nio. **C**arnem salsam. Recentiores medici carnem suillam pinguem,
 salsamq; uolunt subijci. Actius pinguedine adempta subdi præci-
 pit. Tu uide quos imitari malis, utrobique bona est ratio.

FINIS LIBRI QVARTI COMMENTARIO RVM.

COMMENTARIO.

RVM IN PAVLVM AEGINE

TAM LIBER QVINTVS.



IN I. CAPVT.



E virulentis bestijs. Hoc libro in multis Dioscoridem Paulus imitatur quanquā Galenus etiam librum de Antidotis conscripserit post eum Oribasius, Actiusq.

IN II. CAPVT.

Homo adhibendus est qui vulnus exugat. Celsus libro quinto idem præcipit. Si cucurbitula inquiens non est, quod tamen nix incidere potest, tum quod libet simile vas, quod idem possit: Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui vulnus exugat. Græce ἐκμολυσμός κεχρησθαι. hoc est exustione uti.

Galenus memoriæ prodit. De uisera multis in locis meminit, tum in commentario simplicium medicamentorum, tum ubi antidota, confectionemq; Theriacæ comprehendit.

Aut paliurum. Codex græcus deprauatus particulam ἢ desiderat. Codex castigatur. Legiq; debet, ἢ παλιούρον, quod etiam Oribasius libro octauo habet. Castigator Basil. præterit Castigator Basiliensis.

Desudationes. Græce erat ὑδρωτική hoc est, quæ sudores mouent, ut laconicum, aliq; id genus modi, ut scilicet uenenum ab internis foras inuocent.

IN III. CAPVT.

HYdrophobiam. Celsus hoc morbi genus miserrimum, aquæ timorem appellat. Largus aquæ hoc est, liquoris metum interpretatur ὑδροφοβία.

Sudore & anxietate. Veri ἀπορία anxietatem. Est autem proprie ἀπορία consilij, aut propositi inopia, incertitudo, ex qua quis ne. ἀπορία. scit, quid potissimum acturus sit. Ruellius uertit ἀπορία languorem.

k iii

COMMENTARIUS

Carnis præscisio. Græce erat τὸ μὲν περισάφειζεν. quasi dicas περίσας περίσας. circa carnem sectio, uel circumscriptio. nam interim carnem amputare scalpello conuenit.

IN IIII. CAPVT.

Celsus. **L**Ata manu morsum ferito. Hac locutione Celsus etiam utitur. Si manus, inquit, uulneri imponitur, superq; id duobus digitis uerberatur.

πεπυρωμένα δ' ἢ γ πεπυρωμένα τῶν δ' ἡγμάτων, hoc est ad morsus quos inflammatio iam feruida inuasit.

IN V. CAPVT.

Lac ficulneum. **E**T lac ficulneum. Hoc est, liquor ficulneus sic lac papaueris, lac lascris aliorumq; consimilium pro liquore aut lachryma.

IN VI. CAPVT.

SEd leniter rubidus. Græce habetur ἁλλὰ μετρίως μὲν ὕπερθε, quod est, sed mediocriter quidem subrubens. Dioscorides & pressus habet pro ὕπερθε, ὕπερθε, hoc est humidus. atq; ita uertit Ruellius. Marcellus autem ὕπερθε, quanquam supra Paulus dixerat. ἐνερθεῖς. uide utra placeat lectio.

Et viridium cupressi foliorum. Mutulus est codex græcus. Nam desideratur dictio φύλλων legendumq; uenit χλωρῶν κυπαρίσσου φύλλων ἢ σφυρίων. Id Oroscius non aduertit nec Gemusæus.

IN VIII. CAPVT.

Particula. **P**articula intenditur. Hic intelligo particulam penem ipsum. Sic etiam apud græcos τὸ μορίον accipitur. Dioscorides ὀρθοτρίχων huius loco habet, quod est pilorum crectionem.

IN IX. CAPVT.

Confer auctores. **A**Tolliturq; Pauli Codex Græcus habet ἐπαίρεται, hoc est attolitur, Dioscorides unde hæc transcripsit, τὸ ὑσώπεται hoc est cōputrescit, legit. Itē Paul. δ' ὑσινθῶν ponit ῥ' ὑσινθῶν, hoc est δ' ὑσινθῶν.

IN XII. CAPVT.

νομή. **A**lbū vlcus apparet. hoc est ulcus depascens, quod νομή græcis appellatur.

υότις. **F**rigidi madoris hoc est corpus frigido sudore perfunditur, mador initium sudoris est. υότις græce dicitur.

IN XIII. CAPVT.

DE amphibena. Hoc animal biceps est, autore Galeno, & utraque parte ingreditur, unde nomen illi est inditum.

DRyinus. uide Galenum de Theriaca dictus est à δρῦς, quod in Dryinus quercuum radicibus uiuat.

Torsiones. Græca dictio est στρόφοι qui proprie tormina sunt circa umbilicum, omneq; id spacium quod in anteriore parte ab ore στο- στρόφοι. machi ad umbilici partes descendit hominem torquens.

Qui hæ morrhoi ictum. Hemorrhus & hemorrhhois suis ipsorum nominibus simili hominibus perniciem adferunt. quippe per- Hæ mor- cusi ab eis, sanguine per os, nares, totoq; corpore effuso intereunt. rhus.

Redduntur corpora. Græcus codex habet ἄρεωματα. hoc est raritatis. Dioscorides quem Paulus sequitur, σωματα eoq; sic uertendum duxi. quod Oroscius & castigator Basiliensis præterierint.

Et si cicatrix toto corpore. Sic quoq; legit Actius. quanquam Marcellus Virgilius aliter legendum in Dioscoride sentiat.

Quem euomentes. Pauli codex impressus ἐξαιματωῦντες pro ἐξαιτωῦντες habet. Dioscoridē secutus sum unde Paulus hæc transcrip- sit: licet sententia nō multum uariet. Oroscius nō dignatus est annotare. Oroscius.

Aduersus feram præsidia. Græca sonant πρὸς τὸ ἐνρίον. Oro- scius dum nimis exacte loqui studet, in alijs corrigendis, maxime fal- litur. Paulo superius damnauit quendam quod ἐνρίον bestiam uertif- set, semper eam dictionem pro uipera accipi affirmans. Cuius hic con- trarium uides. Oroscius.

Natricis morfu vulnus factum. Natrix primum in terra uiuit, & Chersydios appellatur. deinde in aqua, unde hydros dicitur. Si- Natrix. milis est pusilla aspide, præterquam quod ceruicem latam non habeat Hydros. ut aspides.

Nasturciū. Dioscorides legit καρχαριδιον hoc est cardamomum non καρχαριδιον quod est nasturcium, sequere utrā malis lectionē. Dioscori- des & Paulus ua- riant.

Reginam Cleopatram. Vide Galeni commentarium de Theri- ca, ubi historiam ampliter comprehendit, speciesq; aspidum enume- rat. Oroscius putat in fine capitis aliqua ex Dioscoride apponenda. at ego breuitatis causa omissa existimo. Oroscius.

DRachmis duabus. In Aldino exemplari erat Cyatho uno. Ba- siliensis corrector fecit cyathis duobus. Actius integram le-

COMMENTARIUS

Flionem ita habet. Drachmis duabus ex cyathis uno aceti: Sequenti die drachmis quatuor ex cyathis duobus. Tertia die drachmis octo ex tribus ciathis. hoc praterit Oroscius. Lege igitur in greco < . β μετ' ὅξους βν. α. τῇ δὲ ἐξῆς < δ. μητ' ὅξους βν. β. τῇ δὲ τῇ τῇ < . η. μετ' ὅξους βν. γ. IN XXVIII. CAPVT

Historia
Mithrida
eis.

REx Mithridates. Galenus ea commemorat libro de Theriaca ad Pisonem. Vnde Paulus transscripsit.

IN XXXII. CAPVT.

Ficus aridae, item. Transposita & peruersa uidetur lectio in Pauli codice impresso. Nam Dioscorides unde omnia haec sumpsit, aliter habet. Fac itaque in hunc modum συκὰ ξυρὰ λαμβάνοντες καὶ τὸ ἄφεψμα δὲ αὐτῶν σιῶ οἶνω παρακμάζοντες δὲ τοῦ κατ' ὀξύτητα κωδίνου ὠφελουῦται θηβαικὰς βαλαίνους ἐδίοιτες ἢ λελεασμένους σιῶ οἶνόμελιτι ἢ γάλακτι πίνοντες, ἢ καὶ ἁπλῶν ἁπλῶν τὸ γένος ἐδίοιτες καὶ γάλα γυναικῶν πίνοντες. Ita quoq; nos reddimus. Pauli scriptura ad uerbum habet ut sequitur συκὰ ξυρὰ λαμβάνοντες, καὶ τὸ ἄφεψμα αὐτῶν σιῶ οἶνω ἢ γάλακτι πίνοντες, ἢ οἶνόμελιτι, καὶ ἁπλῶν παλὴ γένος ἐδίοιτες, καὶ γάλα γυναικῶν λαμβάνοντες. παρακμάζοντες δὲ τοῦ κατὰ τὴν ὀξύτητα κινδύνου ὠφελουῦται θηβαικὰς βαλαίνους ἐδίοιτες λελεασμένους σιῶ οἶνω. hoc est inuuantur, si ficus aridas sumant, earumq; decoctum cum uino aut lacte bibant, aut mulso, ac pirorum omne genus comedant, & lac muliebre assumant, ubi periculum lenius fit & declinat, confert, si glādes thebaicas detritas cum uino edant.

Nota.

IN XXXIII. CAPVT.

MENS impeditur. Greca habent λαλιᾶς ἐμπόδιμός, hoc est loquelae impedimentum. At Dioscorides unde haec sumpta sunt δῆλ' οἶος ἐμπόδιμός id est mentis seu intellectus impedimentum habet. Ita quoq; Actius libro tertio decimo scribit. Quibus authoribus mutandam lectionem putauit, saluo aliorum iudicio.

Et resolutione vrget. Hic quoq; uicium exemplaris graeci est. habet enim καὶ ἐκλύσεις pro ἐκλύσεις, nec hoc annotauit Oroscius.

IN XXXV. CAPVT.

Lectio
græca
emendatur

PISCIBUS virosis. Corrige lectionem graecam muta q; ex, ὁμοίαι ἰχθυὶ βρομώδεις. In ὁμοίαι ἰχθυὶ βρομώδεις. Paulo post, ὁ δὲ σι δὲ δυσώδ' αἰματι μεμιγμένα. Mutila est lectio, quæ sic ἵσταuari debet. ὁ δὲ σι δὲ δυσώδ' αἰματι μεμιγμένα, καὶ ἐμετοῦ σι χολώδ' ἐνίοτε δὲ αἰματι μεμιγμένα. ut nos uertimus. Oroscius & Castigator Basiliensis

hec duo loca deprauata reliquerunt. Non multo post πδκιδάου ma Castiga.
le habetur, pro κωδάμινου. Basiliens.

IN XLII. CAPVT.

Cum oleo & passo. Variat lectio Dioscoridis à Paulo impresso Instaura-
habet σὺν ἑλαίῳ καὶ γλυκεῖ, hoc est cum oleo & passo, ubi Pau- tur Pauli
lus σὺν οἴνῳ καὶ γλυκεῖ quod est cum uino & passo. Actius tantum lectio ex
ex uino dulci habet. sequere quemcunque uoles. Dioscori-
de.

IN XLVI. CAPVT.

Præsertim in exurgendo. Hoc est cum è lectulo lenare se conan-
tur, ut ait Largus. Græca sonant, ἐν τῷ ἐξανίστασθαι.

Opobalsami drachma cū uino. Dioscorides habet cū melle aut
lacte. In primo libro etiā cū lacte opobalsamū ualere cōtra aconitum Nota.
tradit. uide an malis cum Dioscoride legere. Ego exēplar sum secutus.

IN LXVIII. CAPVT.

Totum corpus prurire facit. Græce est κνησμός καὶ ὁ λοντόσῳ
μα: Dioscorides etiā in hunc modū habet. Largus autē cuius men-
tionem Galenus subinde facit, pro corpus, habet os in hūc modū. Ephē Largus.
merum potū protinus quidē os prurire facit, uelut scilla tactum postea
etiam adurit, quasi pipere manducato. Hæc te, lector, latere nolui.

IN LIII. CAPVT.

Pharicum dictum. Multi scriptores dubitant, simplex ne sit an
compositum. Largus ex compluribus componi affirmat.

Nardum syluestrem. In codice Pauli Græco de erat ἀργεία. Tu
ex Dioscoride restituito. Basiliensis Castigator omisit.

IN LIIII. CAPVT.

Vt uinum dulce cum rosaceo. Deprauatus est Codex græcus Castiga-
impressus. habet enim γλυκὺ οἶνον pro γλυκὺ οἶνον. Omisit tur tex-
Gemuseus. tus Græ-
cus.

IN LV. CAPVT.

Atramentum sutorium. Hic quoq; uiciatus est codex græcus. ha-
bet enim χαλκοῦ αἷον hoc est flos æris pro χαλκοῦ αἷον, ut sit
atramentum sutorium. Ex Dioscoride castigatum: Basiliensis castiga-
tor hoc etiam non aduertit. Largus habet æris flos, sed male opinor.

IN LVI. CAPVT.

Dentes tincti. Græcus codex impressus habet ὁδόντες βιβρω Impresū
μυλῖοι hoc est dentes erosi. Dioscorides ὁδόντες βιβρωμυλῖοι exēplar
quod est Dentes tincti. At Actius legit gingivæ corrosæ. Secutus sum græcum
Dioscoridem. Præterijt Gemuseus. corrigē.

COMMENTARIVS
IN LVII. CAPVT.

Marcel-
lus.

LAc potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum. Sic interpretatus sum γάλα ἐμπιτυαδὲν ἄδροϊν. Nam si prius coagulatum est quam fuerit assumptum, nō opus habet, ut rursus co-geletur. Longe dissentio à Marcello cui ἐμπιτυαδὲν ueriedum censet, cui coagulum sit admixtum. cum Paulus coagulum superbibi cum aceto precipiat. Sed ἐμπιτυαδὲν intelligo intus, hoc est in corpore congelatum. Ibi enim aliquando coit in grumos, & densatur, ut respiratio- nem impediat. Vbi igitur lac assumptum repente ac cumulatim, in corpore coierit, remedia ad ferenda sunt.

κοία πι-
λοποικη.

ὑδωρ πι-
λοποικτι

κόν.
Castiga-
tur co-
dex Græ-
cus.

E cinere lixiua. Turpiter hic Ruellius Marcellus, aliq; interpre-tes lapsi sunt, qui κοίαν πιλοποικλῶ uerterint, nunc lutum ex cola- tum, nunc lixiui genus aliquod. Nihil enim aliud est quam è cinere li- xiuium, quo & pilotarij, & alij artifices utuntur. Sicut apud Galeni ὑδωρ πιλοποικτικόν, quod Largus in eodem medicamento dixerat, è cinere lixiuium, ut aliàs annotauimus.

IN LXII. CAPVT.

HOrmini femine. Male habetur in codice Græco θερμίνου ἄγ- ρίου pro θερμίνου ἄγρίου. neglexit Gemusæus.

FINIS LIBRI QVINTI
COMMENTARIORVM.

COMMENTARIO³⁶⁶

RVM IN PAVLVM AEGINE

TAM LIBER SEXTVS.



VM humor oculis. Liber hic sextus curatio-
nem tradit, quæ ferramentis et manu admini-
stratur. Certe difficilis existit, tum quod ne-
mo hæc eo ordine tractarit, tum quod ij unde
transcripsit, non extant. Curabo tamen pro
mea fide, ut nihil quod lectorem remorari pos-
sit, indiscussum relinquatur.

Sextus li-
ber om-
nium dif-
ficilissimus.

Ferramentis nuclei modo rotundis.

καυσήρας πυγλωσείδης. Græce dicuntur πυγλωῆς, extrema specillo-
rum siue acuta, siue caua, siue rotunda. Hoc autem loco, rotunda ut ustio
commodius administraretur, aliqui nuclearia uocant instrumenta. Cel-
sus tenuibus, retusisq; ferramentis ait libr. 7. de oculorum humoribus
reprimendis sermonem faciens.

Tenuia, re-
tusq; fer-
ramenta.
Ustio ca-
pitis.

At in elephantiasi. Paulus hoc lib. 4. iam docuerat, nempe mul-
tos qui ne in totum insanabiles fierent, ex capitis uestione seruatos.

IN III. CAPVT.

HYdrocephalon. Celsus lib. 4. Inuenitur genus quod longum Hydroce-
pote est esse, ubi humor cutem inflat eaq; intumescit, & prementi phalon.
digito cedit ὑδρὸκέφαλον Græci appellant.

In ociosam inutilemq; mutato substantiam. Oroscius omnia
grammaticorum Lexica introspectit ut me in dictione Græca ὀροscίω, Oroscius.
tanquam male eam interpretatum reprehenderet, ac tandem Budæum οἰscίω's.
nostrum in commentarijs in Græcam linguam consulens, ὀροscίω in-
uenit significare, contrarium ei quod elaboratum, confectum, conco-
ctumq; est, eoq; exponendum hic censuit ὀροscίω, crudam, non atten-
dens, quo modo in re medica crudum dicatur. Nam sanguis nunquam
dicitur, post absolutam sanguificationis terminum crudus fieri, sed
mordax, acris, crudum uero aut semicoctum succum, sanguinem mu-
crosum.

C O M M E N T A R I V S

tari, aut sanguinem minus elaboratum, ac crudum adhuc in perfectum degenerari. Gal. enim lib. de sanitate tuenda quarto concoctionem ponit crudorum, uel etiam semicoctorum humorum, educationem acrius. At sanguis non consistit citra concoctionis terminum. Et si adhuc in uenis etiam illis capitis semicoctus ac crudus existeret, tamen non diceretur extra uasa elapsus, in crudam mutari substantiam, sed putridam potius ac peregrinam. Qui enim extra instrumenta sua elapsus est, non potest non corrumpi. Crudus autem fieri, non item. Quare Orosius hunc laborem castigandi, non alio quam calumnie studio sumpsisse uidetur, ipse maxime corripiendus.

**κεκυρω-
μένον** Puluino sublimi. εἰς ὕψος κεκυρωμένον, hoc est, in sublime eleuatus, quemadmodum puluini in superficie tument, gibbero extante.

Orosius. Et quia paucis particulis subiectus. Orosius coniungit hic sequentia cum prioribus. Græca sic habet εἰς ὀλίγον σωματὶ κατωπείπων κατὰ τὴν ἐπέρεσιν τῶν δακτύλων. At clausula hæc posterior κατὰ τὴν ἐπέρεσιν segreganda est à priori, connectendaque sequentibus, in hunc modum, κατὰ τὴν ἐπέρεσιν τῶν δακτύλων ἑαδίας ὑπὲρ κων.

Lineis incidere. Duabus utemur lineis. Hoc est duas diuisiones moliemur. Celsus ubique loquitur eodem modo, ut lib. 7. Reperti in Græcia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent. Item Reperti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent. Græce est εἰς σι κεχρημέθα διαγέσες.

I N V. C A P V T.

A Ut etiam acutus. Fluxiones in oculos nunc longæ, nunc breues eueniunt, pro humorum in illos decumbentium ratione particula et in Græco codice male proposita est, nec Orosio, nec Gemusæo aduertente.

Aut etiam ceruix deligata sit. Ut scilicet magis conspiciantur. Nam Celsus lib. 7. de eadem re tractans, frequens curatio est, uenas in temporibus adurere: quæ fere quidem in eiusmodi malo tument, sed tamen ut inflectantur magisque se ostendant, ceruix ante modice deliganda est.

Membranam detrahemus. Codex Græcus uiciatus est, ut qui ὅφ' ἐν habeat pro ὅμ' ἐν omisit Orosius, alijque castigatores. In fine capitis ἀφουλωτικὸς uertit crustam inducentibus, cum dicendum esset, cicatricem inducentibus.

I N V I. C A P V T.

**Hypospa-
tismus
quasi spa-
tæ trans-
missis.**

HYpospatismo. Anonymus quidam Græcus inquit, hypospatismus ita, tribus sit super frontem diuisionibus post latiore specillo quod spatoullam uocant, per corpora quæ interiaccnt, transmissio.

Exilem spatam. Hoc est gladioli modo latam Græco vocat Paulus
 ἡ ὥστε ἀσπίδα. Paulo post ἀσπίδα, quasi dicas spatulam. Hac ὑπὸ πᾶσι
 autem dictione usus sum non quidem latina, sed medicis cognita. Δόκη.

Panniculumq; implicitum. Græci πτύγμα & πτυγμάτων φτύγμα.
 appellant. Galenus in commentarijs de Chirurgia.

IN VII. CAPVT.

Periscyphismus Citatus supra Græcus author, memoria prodit,
 periscyphismus est. cū transuersis lineis coronæ modo frons secatur.

Penicillis. Sic reddidi σφλῖσσοις, quæ linamenta dicuntur. cunei σφλῖ-
 modo intorta. Vnde quidam reddunt cuneolos ex linamentis. σκθ.

IN VIII. CAPVT.

DE futura. Titulus capitis habet πρὸς ἀναρῆα φῆς quæ dictio ἀναρῆα-
 deriuata est à ῥῆα et ἀνα. Sicut inferius caput facit de κατὰ ρῆ.

ῥῆα hoc est de futura inferioris palpebræ à κατὰ & ῥῆα φῆ. κατὰ ρῆ.

Græci appellant δισιχίαισιν. Celsus eleganter libr. 7. hanc dictio ῥῆα φῆ.
 nem interpretatur, Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo sub
 crescit. Quo authore ego quoq; uerti, cum naturali pilorum ordini, alij
 præter naturam pili succrescunt; nihil tamen ex Pauli sententia com-
 mutauit. Græce sonant in huius modum ἡ καλουμένη δισιχίαισι, ἐστὶ
 μὲν ἑκφυσον παρὰ φύσιν τριχῶν, εἰς τὸν κατὰ φύσιν σύχον τοῦ
 βλεφαροῦ προσηγομένη τριχῶν.

Interim in phalangosi. Phalangosis est cū pilorum subnascentiū φαλάκ-
 duplex, triplex uel acies uel in superiore, uel in inferiore palpebra prodeit. γωσις.

Cuspide specilli Græce est πυρρῶι σμήλῃ. At intelligendum ne πυρρῶι.
 nit apud Græcos πυρρῶα nunc pro cuspide accipi, nunc pro extremo σμήλῃ.
 quidem capi, sed cauo, unde aliquid infundi potest. Itē rotundo, nucleoq;
 specilli. Hic igitur specilli cuspide palpebra in rugas, plicasq; aut sinu
 coacta quod κοιλώσαστες significat, inuertitur. Dixi autem in ru-
 gas coacta, pro inuoluta circa cuspide.

Vt croceno diarhodon. Sic appellatur collyrion apud Paulum 7. κροκνωδὸν
 lib. quod ex rosis inscribitur, adiecto croco in Græco codice κροκνωδὸν ἡ δὲ ῥῆ α-
 betur pro κροκνωδῶ. Neglexit Orosius. δῶ.

Et veluti lacte infu. Græce est ὡς γάλακτι ἐγχύτω. Orosius. νο-
 luit instillato dici, quasi uero non etiā infundi dicantur in oculum medi-
 camenta. Celsus. Quicquid inspergitur, auerso specillo infundi debet.

IN IX. CAPVT.

VRina pueri impubis. Orosius diligens aliorum iudex: ἀφ᾽ οὗ Vrina im-
 γον uult à me exponi, uenerem non experti. At ego Plinium secu- puberis.

C O M M E N T A R I V S

tus dixi impubis. Ante pubertatem enim uenerem exercere nequeunt pueri. Hermolaus alijque docti uiri eo quo ego modo sunt interpretati.

Orosius. Simili calumnia in sequente capite utitur, reprehendens ἰκανὸν uerit amplam notandam magnam, sufficientem, dicendum autem putans, idoneam contra Grammaticorum suorum quibus adheret pertinaci-

Orosius, castigat. ter, opinionem. Item in Aldino exemplari habebatur, οὐδ' εἰ καὶ, ubi ipse οὐ relatiue legendum censet, at ego ex Ruellij exemplari & sensu sine oī in hunc modum corrigendum codicem dico δ' εἰ καὶ αὐτῷ τῷ οὐ λῶ &c. In undecimo capite pro δισυχίαν, facio δισυχίαν.

I N X I I . C A P V T .

DE ectropio. Inferioris palpebræ uitium est, quod parum sursum attollitur, sed pendet & hiat neque potest cū superiore committi, ut ait Celsus.

Ectropiū. Ectropium oboritur. Vide librum septimum Actij. Inuertuntur palpebræ nonnunquam exulceratione præcedente & carne ipsarum adauclæ; nonnunquam ex duriore cicatrice.

Celsus. Auerfum specillum. Ita exposui autoribus Celso & Scribonio, ut etiam antea annotaueram. At Græci τὸν κυὰ δισκὸν τ' μήλῃς uidentur sepe confundere. Nunc pro cauo, & ad fundendum apto specilli extremo, nunc pro acuto & in cuspidem abeunte, accipitur, ut hoc in loco. Celsus etiam libro quinto. Quicquid, inquit, inspergitur, auerso specillo infundi debet. Item libro septimo, nam quod paruulum est, super inguē in aluum uel digito, uel auerso specillo repellendum est. Iterum uulnus digitis, uel auerso specillo diducendum est, ut torquentibus exitus detur; & effusis tum diutius pura urina descendat. Scribonius compositione 227. Ac quarto die auriscalpio auerso, quam partē κυὰ δισκὸν græci uocant sensim tētare, omouere ab alienatum oportet, quo celerius excidant hæmorroides,

I N X I I I . C A P V T .

A Nabrochisium græce dictum. Nulla est apud latinos dictio, quæ anabrochisium significat. Deriuatur à βρόχον, & αὐδ', quasi illaqueationem dicas. pili autem ansulis ex filo factis comprehēsi euellantur, ut non sit quod Orosius damnet, pilorum euulsionem à me dictam, quæ per filum administratur. Auriscalpio. Græce est. μήλωτις. μήλωτις, quod deductum est à μήλη hoc est specillum, & οὐς, ὠτις, μήλωτις auris. proprie enim auribus destinatum est. Dicitur etiam μήλωτις.

Specillum quod utroque extremo in cuspidem. mal. in codice Græco habetur δισκὸν εἶναι pro δισκὸν εἶναι. Quod in strumētum

est duplici cuspide præditum. Nam $\pi\upsilon\epsilon\lambda\omega\alpha$ extremum, ac summam
cuspitem, seu nucleum, seu capitulum exponunt. Oroscius reliquit codi-
cem deprauatum, sicut etiam Basiliensis Castigator.

IN XIII. CAPVT.

PAlpebre cuti præter naturam. Codex deprauatus græcus τοῦ
 $\beta\lambda\epsilon\phi\acute{\alpha}\rho\omicron\upsilon$ δ' ἑρματικὰ φύσιν habet, pro παρὰ φύσιν. Notauit
Oroscius.

Collectionem quandam. Ita exposui, $\sigma\omega\alpha\gamma\omega\gamma\iota\omega$ τινὰ τῶν
 $\delta\alpha\kappa\tau\acute{\iota}\delta\omicron\upsilon$, hoc est cōgregantes aliquo modo hydatidē intra digitos.

IN XVIII. CAPVT.

PTerigion. Celsus libro septimo ita scriptum reliquit. Unguis uero
quod $\pi\tau\epsilon\rho\acute{\iota}\gamma\iota\omicron\nu$ græce uocant, est membranula nersosa oriens ab $\pi\tau\epsilon\rho\acute{\iota}\gamma\iota\omicron\nu$
angulo, quæ nonnunquam ad pupillam quoque peruenit, eiq; officit &c.
Hunc ego imitatus, dixi unguem oculorum.

Hamulo modice inflexo. Græce est $\acute{\alpha}\gamma\kappa\iota\varsigma\epsilon\omega\mu\iota\kappa\rho\alpha\kappa\mu\pi\acute{\epsilon}$.
Celsus eleganter dixit hamulum paulum mucrone intus recuruato, ali-
bi, hamulos intus recuruato.

IN XIX. CAPVT.

STaphyloma est. Celsus nomē staphylomatis probe exponit libro
septimo. In ipso autem, inquiens, oculo, nonnunquam summa attol-
litur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, &
similis figura, acino fit, unde id staphyloma græci uocant. Itaque
 $\kappa\acute{\upsilon}\rho\tau\omega\sigma\iota\varsigma$ recte exponitur eleuatio. Nam alius quidam græcus dixit
 $\mu\epsilon\tau\epsilon\omega\rho\iota\sigma\mu\acute{o}\varsigma$.

Staphy-
loma $\kappa\acute{\upsilon}\rho\tau\omega\sigma\iota\varsigma$
 $\mu\epsilon\tau\epsilon\omega\rho\iota\sigma\mu\acute{o}\varsigma$

IN XX. CAPVT.

DE purulentis Galeni verba. Græce purulenti ὁπόπνοι dicen-
tur, cum scilicet totum oculi orbem, aut eius dimidium pus occu-
pat. Historiam apud Galenum habes in Methodi medicatorie libro
quartodecimo.

ὁπόπνοι

Nisi quis admodum diligenter. In Codice impresso græce habe-
tur, εἰ μὴ πᾶν τις ἄκρως. Deprauate nimirum pro εἰ μὴ πᾶν τις
ἀκρῆβως. Oroscius & Gemuseus ceu exiguum præterierunt.

Oroscius.

IN XXI. CAPVT.

SVffusio. Latini interpretantur $\epsilon\pi\omicron\chi\acute{\upsilon}\mu\alpha\tau\alpha$, suffusionem. Bar-
bari Cataractam. Alibi Celsus enim ὁπόχυσιν nominat.

ὁπόχυσιν

Lanamq; oui luteo cum rosaceo. Hunc locum Græce ita habe-
mus $\epsilon\tau\epsilon\iota\omicron\nu$ $\lambda\omicron\delta\kappa\omega$ ὡς $\sigma\omega$ $\epsilon\theta\delta\acute{\iota}\nu\omega$ $\delta\acute{\alpha}\nu\delta\epsilon\nu$, quæ Oroscius male, & im-
prudenter uertit, Imponemus oui luteum rosaceo exceptū deligatumq;.

Oroscius.

COMMENTARIUS
IN XXII. CAPVT.

ET si ad malas, subluuies. Hoc est si ad genas humoris impetus deciderit. Paul. dixit, καὶ εἰ πρὸς μὲν λόν ἕτοι πίπτει ἢ ὑποφορεῖ

Ab vitione lenticula melle adiecto. In Aldino exemplari habe

Phacome batur omphacomeli, cuius descriptionem habes septimo Pauli inter
li. potiones dulces. At hic nihil proficit. Sed phacomeli, legendum, quod est
τῆλόμε- lenticula melle addito, ut superius τῆλό μελι fenu græcum melle adie-
λι. cto, item malicorio ex σιδιωτῶ reddidimus, ἀ σιδίᾳ deriuatum.
σιδιωτόν

IN XXIII. CAPVT.

Hic affectus à prima. Celsus septimo penè eadem habet. Solct in-
quiens tamen tumere, uel à prima natali die protinus, uel postea
ἀτρεῖνοι. facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in
ea nullum sit, coq; audiendi usu careat. &c. Græci uocant πύρου ἀτρεῖ-
τους. In titulo male per iota ἀτρεῖτους impressum est.

Postea accidit. Hoc est, post natalem diem accidit hoc uitium, si
precesserit exulceratio.

IN XXIII. CAPVT.

Auriculario specillo. Sic exposui μῆλωτίδᾳ, quod aliquando etiā
pro simplici specillo accipitur, ut in sequentibus interpretor.

Celsus. Violenta capitis concussione, aure super circulum. Celsus li-
bro sexto ex Hippocrate inquit, Tabula quoq; collocatur media inha-
rens capitibus utrinq; pendentibus, superq; eā homo deligatur in latus
uersus, cuius auris eo modo laborat: Sic ut extra tabulam emineat.
Tunc malleo caput tabulae quod à pedibus est feritur: atq; ita concussa
aure, id quod inest, excidit.

καλαμῖς. Iam vero Calamo, græce est ὄζυς καλαμίδᾳ. Sic enim aqua po-
test elici, exugendo.

IN XXV. CAPVT.

Polypus. De hoc lib. 3. comprehensum est, uocat autem hic molli-
res, dictione græce φαφαρωτέρου. quasi dicas teneriores fragi-
lioresq;.

Spatula. Celsus etiam hac dictione utitur lib. 7. de Polypo. Ergo,
inquiens, hunc ferramento acuto in modum spatulae facto, resolueret ab
osse oportet.

κναδισ- Manubriolo ipsius. Græce est τῷ κναδισκῷ αὐτῷ, quod superius
κός. exposui auersam specilli partem. Celsus autem uidetur manubriolum
capere pro aduersa specilli parte, ut lib. 7. de Chalaxio. Dein scalpelli
manubriolo diducenda ab integris partibus sunt &c. quanquam etiam
dicat

dicat eodē libro, Adverso scalpelio subsecare magna cū moderatione.

Duplici cuspide præditi. Male rursus in codice græco διαπυγι-
 αου impressum est, pro διαπυγίνου, nec hoc emendauit Orosius aut Orosius.

IN XXVII. CAPVT.

ANtheron puluerem. Libro septimo Pauli compositionem Anthe Puluis An-
 ri habes comprehensam. Dicitur autem ανθινον quod rosarū flo-
 res inter alia recipiat. theros.

IN XXX. CAPVT.

Tonsillæ. Latinos in hoc uitio peculiariter significando uerborum Pari-
 inopia laborare testatur. Siquidem per tonsillas & partem corpo- rhmia.
 ris, & morbum exponere cogimur. Græci autem distinctim partem αντι-
 παριδμια, affectum αντιδιδας appellant. δες.

Deuorationi spirationique negotium. Græce est δυσχεσιαν
 τε παρεχοντα τη τε καταποσει, καὶ τῷ πινύματι, quod est ad uer-
 bum, difficilem usum deuorationi, & spiritui exhibentes.

Quantum licet. Hoc est quoad possumus, ἐφ' ὅσον διαμέτρα.
 Auicenna lib. 3. Trahuntur ad exteriora quantum est possibile.

IN XXXI. CAPVT.

GVrgulio. Eadem fere Galenus libro sexto de compositione medi-
 camentorum secundum locos habet, Carnosa) inquit) ut nos
 uertimus) quedam particula in summa oris parte suspensa apparet, si
 quis toto ore plurimum aperto linguam deprimat, hec inquam carun-
 cula duobus nominibus à ueteribus græcis nominatur Gargareon, & Gargareō
 Cion. His postèrius medici prope om- Cion.
 nes non ita sed cronida quod est columellam ipsam nominant. Nam Gurgulio.
 eorum qui staphylen, hoc est uuam uocitant, satius est non meminisse. la. Columel-
 Non enim particulam, sed unum aliquē ipsius affectum, Staphylen hoc
 est uuam appellamus &c.

Tenues autem oblongæ. Celsus partem ipsam contra græcorum Vua.
 opinionem, uuam appellat lib. 7. uua inquit, si cum inflammatione
 descendit &c. Paulo post quasi uerba Pauli recenset in hunc modum.
 Si uerò inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra mo-
 dum à pituita deducta est, & est tenuis, acuta alba, præcidi debet.
 Itemq; si ima, lucida, & crassa, summa tenuis est.

IN XXXIII. CAPVT.

QVomodo aspera arteria. Caput est τοῦ λευγοτομίας. Su-
 perius annotaui quid ὁ λευγὴ apud græcos medicos sit, quid

COMMENTARIUS

Larynx. ὁ φάρυγξ ἢ φάρυγξ. Hic dico τὸν λάρυγγα ὃ φάρυγγα pro aspe-
Pharynx. ra arteria usurpari & inter se confundi, sicut etiam βρόγχον. Gale. eo-
dem modo utitur lib. 2. de placitis Hippocratis & Platonis magis au-
tem ὁ λάρυγξ pro summa parte arterie, ὁ φάρυγξ pro tota ipsa ponit-
tur, Verba Galeni sūt. τὸ μὲν γὰρ τῇ τραχείας ἀρτηρίας ὡς περ δὴ
ἢ φάρυγγα προσαγορεύομεν & c. Paulo superius. πληθον μὲν γὰρ
κατὰ τῶν κατὰ τὴν λάρυγγα χάνδρον, οἷον ὑπὸ πλῆκτρων τι-
τῶν ἢ ἐκ φύσκεις αὐτὴ φανὴ γίνεται. & c. Idem in loco ἢ φάρυγξ,
nisi uicini sit codicis, pro ὁ φάρυγξ usurpatur, in hanc sententiam. οἱ δ'
οὐδὲ ἄλλοι ἔχουσι λέγειν, ἢ δὲ ὅτι πλείστον ἐστὶν ἢ καρδία τῇ φάρ-
υγγι & ὅλως τοῦτο ἐξ ἐκείνης ἀρχιδοῦται τὴν φωνὴν, & c.

IN XXXIII. CAPUT.

ANo proximos. Codices nostri depravati erant, δακτύλου ha-
bentes, pro δακτυλίου ubi non parum debet Orosius exemplari
suo. paulo post fac δὲ τρεῖς ex δὲ τρεῖς.

**λημισ-
κός.** Implicitum aliquod in longitudinem. Sic interpretatur λυμι-
σκόν. Celsus lib. 7. cap. 28. Intus inquit, & implicitum in longitudine
linamentum (λημισκόν greci vocant) in aceto tinctum demittere. In co-
dice graeco est ὅλως συρτόν distinctum, quasi duae dictiones sint, impres-
sum, quod legendum est διάσυνε τὸν, quod pertrahi possit & implicari.

Orosius. Fomentum & medicamentum. In exemplari graeco habetur τὴν ἄν
τὴν ἐμβροχίῳ μοτοφυλάκιον φάρμακον, pro quo legendum censeo
τὴν ἄν τὴν ἐμβροχίῳ, ἢ μοτοφυλάκιον φάρμακον. Nā antea uino
& oleo, aut aqua & oleo aspergi uolebat, inde medicamentum in lintheo-
lis illitum accommodari. Capitur autē eodē fere sensu, quo ἐμμοτον.
**μοτοφυ-
λάκιον.** primum non annotavit Orosius, nec Gemusaeus.

IN XXXV. CAPUT.

**τράχι-
ς.** **I**N Ceruice. superstitiosi quidā doctores, pro in ceruice, censent dicē-
dū, in collo, quod ἐν τραχήλῳ graece dicitur. At Celsus fere ubiq; cer-
uicem pro collo, ut libro quinto de strumis agens in hunc modum nascū-
tur maxime in ceruice, sed etiā in alis, & inguinibus, & in lateribus.

**Caroti-
des.** Arteriae quas Carotidas appellant. Haec arteriae in dextra, sini-
straq; circa guttur sursum procedentes ultra aures feruntur, quae nomē
Musculi. inde sortite sunt, quod tense, aut alterationē quandam expertae Caron
καρδι- inducūt, quae admodum musculi καρδιαδὲς apud Hippocratem de articulis.
δὲς. Nerui recurrentes. Hi sunt nerui sextae coniugationis cerebri, qui

Nerui re- iuxta carotidas arterias deorsum feruntur, communi utrinq; uelamen-
curiētes. to, & in Anatome plenius condijces.

Arteria aperta. Galenus libello de tumoribus preter naturam hunc in modum habet ἀρτηρίας διασπασμοειδούς, τὸ πάθος αὐτοῦ δρισμα καλεῖται. γίγνεται δὲ καὶ τῷ θέρει αὐτῆς, ἐπεὶ δ' αὐτοῖς οὐ λυγρὸν μὲν ἀφίκεται τὸ προσκείμενον αὐτῇ διερεκα δὲ μένει τ' ἀρτηρίας ἑλκῶ, μήτε συμφυεῖς, μήτε σιωνυλαίσεις, μήτε σαρκεῖ φραχθείσης. διαγιγνώσκεται δὲ τὰ τοιαῦτα παθήματα τῷ σφιγμῶ τῶν ἐργασαζομένων ἀρτηριῶν, ἀλλὰ καὶ ὑλισβομένων ἀφανίζεται πᾶς ὁ γὰρ παλινδρομούσης εἰς τὰς ἀρτηρίας τ' ἐργαζομένης αὐτὸν οὐσίης. Ex qua sententia, addendum in Paulo superius est ἑλκῶ, legendum γὰρ μένει δὲ τ' ἀρτηρίας ἑλκῶ, non μένει δὲ τὸ τῆς ἀρτηρίας, &c. Hæc non annotauit Oroscius, uel Gemusæus.

Tumor omnis euanesceat. Codex græcus habet πῶς ὁ ὄγκος, pro πᾶς ὄγκος. nec hoc aduerterunt Aristarchi nostri.

Grandis in ceruice & rotundus. Celsus libro septimo inquit, At in ceruice inter cutem, & asperam arteriam tumor incresecit, βρο βροχο- γχοκῆλις græci uocant &c. Qui hoc uitio laborant gutturosi apud ἡλλή. Latinos nominantur. Gutturosi.

Ganglion. Verti ganglion est nerui in modum concretio, quod græce est συστροφὴ νδρου. Nam indurantur nerui, contorquenturq; ac in nodosam affectionem coeunt. συστροφῆς δὲ signat inspissari, coi συστροφῆς, indurescere.

Copia vero ipsius. Vide Galeni commentarium de plenitudine: ubi copiam utramque fassissime exponit.

At in capitis morbis. Galenus libro de anatomicis tractationibus quarto in eandē fere sententiam habet. In ijs qui infra iugulū afficiuntur, siquidem sanguinem detrahē oportet, principem locum præsi- dy ratione uena possidet: quæ cubiti flexū accedit secundū quæ ad cubi- tum ipsum defertur. Tertium communis: quartum quæ ab humeraria ad flexum cubiti pergit. postremū humeraria ipsa. In illis autem quos supra iugulum morbus infestat, contra, humeraria primum: quæ inde ad cubiti flexum porrigitur secundum: tertium communis: quartū quæ ab interiori parte flexum adit: quintum, quæ cubitum ipsum.

Ordo ue-
narum in
mittendo
sanguine.

Ieuis itaque Cucurbitula. Dicitur leuis cucurbitula, quæ sine scarificatu, & flamma imponitur. uide Galenum in libello de

C O M M E N T A R I V S

Leuis cucurbitula hirudinibus, reuulsione, cucurbitula, scarificatu.

Genera cucurbitulae Alij cucurbitulis vfi sunt vitreis. Celsus duo genera cucurbitularum ponit aeneum, & corneum quanquam ex alijs quoque materia generibus fieri doceat. ac si cetera defecerunt caliculus quoque pultarius oris compressioris ei rei commode aptatur.

I N X L I I . C A P V T .

Hippocrates. Libro de Articulis de ala mentionem facit. non autem certe altius ferrum adigi praecipit, quod nervi, uena, & arteria subsint, quae calorem istum ex ferramento tolerare uequeunt.

I N X L I I I . C A P V T .

Conuenit igitur. Graecus codex plane peregrinam habet lectionem, quid enim sibi uult aristolochiae mentionem facere, uti feramento crustae excitandae sunt. Habet autem in hunc modum. *δεῖ οὖν τῇ μακρᾷ ἀριστολοχίας τῶν εἰζῶν ἐλέω δὲ δυσαντὰς ἐντίθεναι αὐτοῖς πεπυρακτωμέναις τὰς δὲ χαράρας* hoc est conuenit igitur longe aristolochiae radice oleo imbuta imponere ipsis crustas ignitas. Mihi autem legendum uidetur *δεῖ οὖν αὐτοῖς καυτηρίοις πεπυρακτωμένοις τὰς δὲ χαράρας ἐντίθεναι*, ut nos uertimus. Neglexerunt locum Oroscius & Basiliensis castigator.

I N X L V . C A P V T .

Galenus solam administrationem. Libro quartodecimo Methodi haec ad uerbum inuenies.

I N X L V I I . C A P V T .

Vomica in pectore.

Vomica laborat. Graece est *ἀφισάμνον* quasi dicas, abscedens. Celsus de uestione iecoris agens, dicit si uero iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quae in ceteris interioribus suppurationibus, quidam etiam contra id scapello aperiunt, ipsam uomicam adurunt.

I N L . C A P V T .

Ascites.

Quo veluti in utrem aqua colligitur. Hoc est, si ascites hydrops est. Nam *ἄρκυς* utrem signat. Auicenna administrationem ex Paulo sumpsit.

Imum abdomen adusque tenuem. Sic reddidi *ἐπιγάστριον*, quod ad uerbum sonat imum uentrem. Sed abdomen imum ex Celso sumpsit, nam exterior uentris pars est, abdomen forte *ἐπιγάστριον* legendum est, ut in sequentibus, *χαλκοῦ καλαμίσκου διάτε τῆ τοῦ ἐπιγαστρίου, καὶ τῆ τοῦ πύθωνος διαφύσεως καὶ οἷου*.

Quomodo peritonæi. Hoc caput ex sexto medendi Methodi libro sumptum est: uerum in codice græco, mirum quam mutilū & deprauatum. Oroscius autem, & Basiliensis castigatōr, non aduerterunt, in erratis interpretum occupati.

Quare etiam remedium. Lege in codice græco ὥστε καὶ ἡ ἰασις ἐν τῷ θερμῷ αἵματι.

Mox expressa calefacere. fac ἐκ θερμῷ αἵματι τοῦ τῷ τῷ ἐντερον.

Quæ græci Syringotoma. μεταῖν τὰ καλὸν μὲν αὐτὸν ὁρῶν συριγγότομα.

Figura autem laboranti. Adde in græco dictionem hoc παρὰ τοῦ ἐπὶ τῇ δέσσει δὲ χῆμα τῷ κάμνοντι.

Cumin superioribus deorsum. Deest in græco, πρὸς δὲ τοῖς αἵματι, κατὰ ῥέπον.

Quoad totum exacte persuatur. Deest aliquid. Legendum enim ἄχρηπερ αὐτὸν ὅλον ἀκριβῶς ῥάφει.

Inde per reliquum abdomen. Fac ex διαπείρειν τὸ ἐντερον ἐπιγαστρὶον hoc, διαπείρειν τὸ ἕτερον ἐπιγαστρὶον

Deinde ab hoc rursus. Hic multa desiderantur plane necessaria quæ superioribus adiciantur, ne quis compendij causa ab ipso Paulo prætermissa censeat. Sic igitur ex Galeno instaurari debent. εἴτ' αὖ δις ἀπὸ τοῦ τοῦ πάλιν ἀρεξάμενους συρῆσθαι πτενὸν αὐτῷ τῷ ἀντικειμένῳ παρὰ τοῦ αἵματος. κάπειτα διεκβάλλειν ὅλην τοῦ πλησίον δέρματ'· ἐκεῖθεν δ' αὖ πάλιν εἴσω διαίρειν, συρῆσθαι πτοντας αὐτὸ τῷ ἀντικειμένῳ παρὰ τοῦ αἵματος διεκβάλλοντάς τε ὅλην τοῦ πλησίον δέρματ'· εἴτα &c.

Pari modo si proxime oras. Legendum est οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν ἐγγυτάτω. Id autem fiet in eum modum. Fac εἴσω δὲ τοῦ τοῦ κατὰ τὸν δὲ τὸν τρόπον. Quid enim sibi uult εἴσω δὲ τοῦ τοῦ κατὰ κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον. Vbi hic tua diligentia Oroscie?

Sympto igitur Cathetiro. hoc instrumentum à demittendo dictū est. nam per id aliquis liquor in uescicam demittitur à κατὰ & ἵκημι καθέτης.

Est autem rectus syphe, ut ait Gal. IN LX. CAPVT.

Igaminibas lex processuum. Hoc est sex appendiculorum ἑξα-σκελεῖς enim ad uerbum sonat, sex crurum. à geometris petita dielio est, qui figuras quasdam ἑξασκελεῖς nominant.

Super lapidē qui excidendis subiicitur. Græce est κάπειτα

COMMENTARIUS

ἐπικόπος δι' ἐλαφρὺ καὶ τὸν λίθον κατ' ἐπικόπου αὐτοῦ τοῦ λίθου hoc est
 deinde diuidemus infra calculum super ipsum lapidem qui incidendis
Nota. subiicitur. At uitium exemplaris esse puto ponendumque pro τὸν λίθον,
 quod est calculum, τὸν καυλὸν hoc est colem uerū Aetius & alij uete-
ἐξασκε- res sectionem in cole nō infra ad futuram, uerū supra fieri precipiunt.
λῆς. sed καὶ τῷ. Sunt qui intelligant, super lapidem ipsum qui inciditur.

Tunica erythroides. Duæ sunt testiculorum tunice, dartos, &
 erythroides. Hic autem male habebatur in Greco ἐλαιοειδῆς pro
Dartos. ἐρυθροειδῆς. Paulo post inuenies ἐρυθρόν pro ἐρυθροειδῆ posuitum. Ge-
Erythe- muscus locum iam citatum reliquit uitiatum.
roidos.

IN LXII. CAPVT.

Humoris ociosi in particulis scrotum impli. In greco est ἄρ-
 γὺν ὑγρὸν συλλεγόμενον τοῦ τοῦ μέθ' τῶν τῶν ὄχεον δια-
 πλεκόντων σωματῶν, quod ad uerbum sonat. Orosius humor colle-
 ctus circa partē corporum scrotum implicantium. Mihi uisa est superior
Hernia. translatio manifestior. hoc te meminisse uolui. Ceterū commune rami-
 cum nomen est, Hernia ut ait Celsus; unde Herniosi appellantur.

IN LXIII. CAPVT.

Rhacosis. Ita appellant greci ῥάκος quod uile detritumq; lina-
 mentum, ut superius annotatum est. Cum itaq; laxior cutis scro-
 ti & ueluti lacera pendet, rhacosis uocant.

ἐπικόπος Quod incidēdis subiicitur. Grece est κατ' ἐπικόπου σκευή, ὅν,
 quasi dicas super asserem, super quem aliquid inciditur Superius de cal-
 culosis dixerat, κατ' ἐπικόπου τοῦ λίθου. Nonnulli calculum ipsum
 qui inciditur, exponunt, uerum in sequentibus dictio ἐπικόπος innotē
 scet magis.

IN LXVII. CAPVT.

πριαπισ- **P**essarium aliquo cicatricem inducente vnctū, πριαπισκός
σός. reddidi pessarium. nam illud nihil aliud est quam penicillum, pudens
 di uirilis figuram representans. Superius autem habetur, speculo quod
 greci διόπτρα appellant, à perspicendo. Nam hoc instrumento tri-
διόπτρα plici crure predito, naturalibus dilatatis, latentes in utero morbi con-
 spiciuntur modum uero aptandi instrumenti uocant διωπτισμόν.

IN LXXIII. CAPVT.

λωτός. **S**peculi tridente. Sic exposui τοῦ τῆς διόπτρας λώτου. Cū enim
 speculum tria habeat crura, aut columnulas, aut dentes, inuicem iun-
 ctos, seil qui diduci possint, non plane abhorrere uisum est à sensu, si
Lotos. tridentem speculi dicerem. Nam quid sibi λωτός apud grecos aliud ue-
 lit, nescire me fateor. Bernardus felicianus, qui mihi in Pauli sexto

uertendo successit, græcam dictionem reliquit, Loton inquitens speculi.

IN LXXIIII. CAPVT.

Contractum. Male in græco codice est σωκρμένων pro σωκρ-
μένω paulo post λελεπτυσμένων, pro λελεπτυσμένω, rursus,
postea indicem digitum unctum, λελεπισμένον habetur pro λελιπασ-
μένον. quæ omnia Orosius neglexit.

Hydrocephalō sit, hoc est aquam in capite. Hoc est ferè quod Hydroce-
Celsus dicit, solet etiam euenire ut infans humore distendatur, ex eoq; phalon,
profluat fædi odoris sanies.

IN LXXV. CAPVT.

MAnu siquidem sinistra calida, inunctaque. Græce est. τὴν
χωρὶς χεῖρα τὴν ἀριστεράν θερμὴν, καὶ λελεπισμένω. scilicet λελι-
πισμένω ἀ λιπαίνω. Et hoc reliquerunt aristarchi.

IN LXXVII. CAPVT.

SI oblique, specillo duplici cuspide, male in codice Græco habe-
tur. διαπυρίνω pro διπυρήνω.

Caulis modo porrecton. Græce est ἀποκαυλιθέν, hoc notat
caulium modo transuersim fractum.

IN LXXVIII. CAPVT.

ANi fistulæ latentes. Fistulæ ani aliæ tortuose, aliæ multiplices, Fistulæ.
aliæ transuersæ, aliæ simplices habentur.

Vel specillo per fistulam. Rursus male in græco διαπυρίνον pro
διπυρήνον habetur.

Instrumento quod ad sedem. Vocatur hoc διασολές διόπτριον διασολές
quasi dicas distendens speculum. uerum proprie dicitur διόπτριον de
utero. Potest autē accommodari etiā sedi, cū latentes in ea morbi sint. ον.

IN LXXXIII. CAPVT.

DE extremarum partium præcisione. Sic uocatur græcis ἀκρο-
τεριασμός. Celsus libro septimo de Gangrena inquit, Gangrena
inquitens, inter ungues, alasq; aut inguina nasci, & si quando medica-
menta uincuntur, membrum præcidi oportere alio loco mihi dictū est.

Ex causa exterius adueniente. Græce est ἐν προκαταρχτικῇ
αἰτίας, quasi dicas præincipiente aut primaria causa. ut προκρουμέ-
νως de intentiore causa dicitur.

IN LXXXV. CAPVT.

Pollicibus. In græco est τῶν χειρὸς μεγάλων δακτύλων, hoc est
ad uerbum in manus digitis magnis. Quia uero pollex quasi maxi-
mus omnium est, uerti pollicibus, Celsum imitatus.

COMMENTARIUS

IN LXXXVI. CAPVT.

VT sanie excreta, secta hæc. Codex græcus tantum habet, ἵνα ἐκκριθῇ, ubi addendum est ἰχωρ. legendumq; ἵνα ἐκκριθῇ. ἰχωρ. quod Orosc. & Basiliensis corrector non annotarunt.

At in rectum superne deorsum. Hic quoque mutila est lectio exēplaris græci. Habet enim εἰδὲ κατ' ὀρθὴν ποιήσας τομὴν ἐκ τῶν αὐτῶν εἰς τὸ καλοῦ μύλον ἵππῳ σάρκωμα γίνεται ἢ ὅ. c. ubi legēdum est, εἰδὲ κατ' ὀρθὴν ποιήσας τομὴν ἐκ τῶν αὐτῶν εἰς τὸ κατῶ, τὸ καλοῦ μύλον ἵππῳ σάρκωμα γίνεται, ἢ ὅ. c. Istud quoq; Aristarchi nostri neglexerunt.

IN LXXXVIII. CAPVT.

βέλθ, **T**elis extrahendis. Telum uocatur, quicquid manu iaci mittiue in aliquem potest. unde apud græcos βέλθ à βάλλω quod est iacio dictum est.

ἄτρεκτον. Hastilia. Sic exposui ἄτρεκτα Galenus in exegeſi Hippocratis inquit ἄτρεκτον οὐ μόνον τὸν εἰς ἱερουργὸν χεῖσιμον, ἀλλὰ καὶ τὸ ξύλον βέλους, hoc est atræcto non modo ad sacrificium utilem: sed etiam sagitta lignum significat. Alibi appellat τὸ ἐπίθεμα, nempe id quod imponitur. Ego ut obtemperarem Oroscio hostile dixi, quanquā interpretatio mea satis erat manifesta.

βελουλκόν. Belulcum. Celsus libro septimo hoc ferramentum ad Authorem Dioſcem refert. Est autē lamina uel ferrea, uel aenea etiam ab altero capite, duos utrinq; deorsum conuersos uncōs habet, ab altero duplicata lateribus, leuiterq; extrema in eam partem inclinata quæ perforata est.

χυλός. Succus ex ventriculo. Hoc est Chylus, quæ uox licet græca sit, medicis tamen non est incognita. Est autem proprie Chylus, succus ex alimento in uentriculo prima concoctione factus. nec proprie succus latine dicitur. quia uero aliam dictionem non habemus, ea utendum fuit.

μυωγγοφύλαξ. Lamina quæ membranam custodiat. uocatur græcis inde **μυωγγοφύλαξ.** Celsus ut alias annotaui libro octauo exponit in hunc modum. Lamina aenea est firma, paulum resima. ab exteriori parte leuis quæ demissa est, ut exterior pars eius cerebro proprior sit, subinde ei subiicitur, quod scalp̄o discutiendum est ὅ. c. Sequenti capite rursus ait, subiicienda lamina est, quam custodem eius membranæ esse **ἐπικόπος** proposui, & super eam quicquid spinosum est, & intus eminet, excidēdum est, forte non male ἐπικόπθ dici potest.

VSque ad laminam secundam. Græce erat ἀχρὶ τῆς διπλούς.
Recentiores, ἢ; barbari dicunt ad caluariæ tabulatram, alij
usque adduplicationem.

Mirum in modum Galeno commendatur. Vide librum sex-
tum Galeni Methodi medendi, ubi de fracturis caluariæ agit.

Choenicion. Celsus interpretatur modiolum quod ita describit li-
bro octauo. cap. ij. Modiolus ferramentum concavum, teres est imis χοινίκιον.
oris serratum per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cin- Modio-
ctus demittitur. lus.

TEnui & forbili cibo. Celsus lib. octauo in quo Hippocratem ma-
gna ex parte sequitur, habet. Deinde die tertio humidum cibum,
quod Paulus dixit λεπτός, ἢ ῥοφμα τῶδες τροφός.

Maxilla intra tres potissimum septimanas. Huic sententiæ
Celsus aſti pulatur ferè uero intra quartum decimum & unum & ui- Celsus.
gesimum dim sane secunt, maxilla, male, iugulum, pectus, latus, os sca- Fractura-
rularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus planta. tiæ.

Quod si fractura per transversum. Fracturarum differentie
quinque sunt: prima quæ fit schidacedo, altera caledon. Tertia raphani-
do, quarta sycyedo, postremo alphitedo. prima assulatim quasi per re-
ctitudinē, secunda per transversum, tertia in raphani modū per fissuras, quar-
ta cucumeris modo, quinta in minutissimas partes ut farina efficitur.

LAmina quæ à tuendis. Græce erat μωνυγοφύλακθ' ἢ ἐτέ-
ρου ἐκκοπέως. Adhibetur etiam lamina quæ in cerebri membranis
usurpamus, alijs quibusdā excidendis: ut coriū, uel assir, uel massa plū-
bea aneas. Puto autē legendū ἐπικόπου pro ἐκκοπέως. Nā superius
ἐκκοπέως facta iam erat mētio. Præterea subiungitur, dictioni μωνυ-
γοφύλακθ'. In sequenti capite Græce habetur προτυπούται pro προ-
συπούται. quæ omnia Oroscius et Corrector Basiliensis neglexerunt.

MAnubrij ligonis. in Græco codice male habetur οἶον συλίον, pro
οἶον σελεύς quod Oroscius & Gemusæus præterierunt Exponit
autem Galenus, rationem administrationis huius commentario secun-
do in librum Hippocratis de fracturis.

In medio membro. Græca sonant, ἐν μέσῳ τῷ κώλῳ. frequen-
tius uertunt τὰ κώλα artus. Celsus autem lib. 8. uidetur etiam in κώλα.

C O M M E N T A R I V S

Artus. articulis enumerandis, diſtione, membri, uti primum in hac ſententia;
Membra. Si breuius adhuc membrum eſt, & oſſa loco ſuo non ſunt. Item donec id membrum confirmetur, de humeris, brachijs, cruribus, feminibus, digitisq; confractis uerba faciens.

I N C V I I . C A P V T .

μοχλι- σκός. **A**daptamus uero oſſa ueſte. Hoc eſt in locum ſuum commodè reſtituimus. Caterum μοχλιſκόν quod à μοχλός descendit, ueſtē reddidimus uide Hippoc. libr. de fracturis. ubi habet. σιδίρια χερὶ ποιέειν εἰς τοῦτον τὸν τρόπον ὃν περὶ ἔχουσιν οἱ μοχλοὶ οἷς ἡ λατύνουσι χεῖρες, τὸ μέντοι πλατύτερον τὸ δ' ἐτι στενότερον, &c.

Membra coniugalia. Membris coniugalibus. Dicuntur membra coniugalia, cum duo inuicem iungantur, ut in cubito duo oſſa, in tibia item duo. Rurſus aiuga, quæ ſola ſunt, nulli conſimili iuncta, ut brachium, femur, aliæq; id genus. Apud Galenum in anatomicis φλέψ ἄζυγος de uena, quæ ex paribus thoracem intercurrentibus, ſola abſq; pari relinquitur, mentionem faciens.

μοτοφύλαξ. **ἐμμοτόν.** Vt in litera χ. Græce eſt κατὰ τὸν χιεσμένον, male, pro χιεσμός, ut in ſequentibus etiam habetur. Eſt autē χιεσμός, imitatio literæ χ. Linamento illitū. Idē μοτοφύλαξ & ἐμμοτόν apud græcos eſt. prius quæ in lintheolo ſeruatum ſignificat: alterum in linthocolo illitū.

I N C X I . C A P V T .

παράρρημα. **ἐξάρρημα.** **μα.** **D**ifferentias. Celfus ita ſcriptum reliquit. Mouentur autem ea ſcēdibus ſuis duobus modis. Nam modo quæ iuncta ſunt inter ſe dehifcunt: ut cum latum ſcapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito & in crure, tibia à ſura. Interdum ſaltu, calcis os à talo. Modo articuli ſuis ſcēdibus excidunt &c. primū παράρρημα dicere poteris: alterum ἐξάρρημα.

Vſque ad ſuperficiē. In græco legitur μέχρι τ' ὀσφύος male nimirum pro μέχρι τ' ὀσφύος. neglexerūt locū Oroſcius, et Gemuſeus.

I N C X I I . C A P V T .

χᾶται. **Σχᾶται.** **D**emaxilla. apud Græcos γένυσ cum κατὰ ſignificat maxillam. cum uoce αἶω, malas. quanquam barbari maxillam inferiorem & ſuperiorem appellent. Græci etiam diſtione γνάθος in eodem ſignificatu utuntur.

Σχᾶται. Galenus commentario ſecundo in librum Hippocratis, de articulis exponit quid ſibi uelit σχᾶται. in hunc modū ὥς τε τὸ σχᾶσαι μὲν καὶ ὑδρῶν ἐστὶ πάθος καὶ δὲ ἀεὶ δρῆμα τῶ. ὁ ποῖον δ' ἐστὶ τὸ πάθος τοῦ τ' ἐστὶ, δὲ ἡ λαν μὲν καὶ τὸν φανῶναι παραλλαγαί. hoc

est, quare σχῶδοι musculorum & neruorum affectus est citra articulum. Qualis autem affectus hic sit, constat quidem ex eo quod dicit, peruersiones.

Maxillam committunt. Hippocrates legit συμβάλλουσι τὰς κατω γνάθος. codex impressus Pauli dictionem κατω non habet. Tm lectionem corrigito secundum Hippocratem. ex quo haec ad uerbum sumpsit. Omisit Orosius, & Castigator Basiliensis.

Sin autem utraq; maxilla. Graeca sonant, ὡς δὲ ἀμφοτέρου αἱ γνάθοι. Hoc est si maxilla utraq; parte laxata fuerit non ut recentiores interpretantur, maxilla inferior, & superior, quae male rectius dicende sunt. Galenus orationē Hippocratis, unde haec sunt transcripta, in eum modum interpretatur. ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει δόξα γνάθους ὀνομάζαν οὐ τιὼ γένω ὅλως, ἀλλ' ἐκάτερον τῶν μερῶν, καὶ ἃ πλατύνεται αὐτῇ. δόξα δὲ καὶ τὰ κατω πέρατα κατ' ἀγμνον καὶ ἄσπερον τὸ ὅσῳ ὀνομάζαν γένωας. &c. Quae ita exponere possis. In hac oratione uidetur γνάθους non absolute maxillam appellare, sed utraq; partem, in quibus ipsa dilatescit. uidetur etiam ima extrema in quibus os nudum & ex carne est, maxillas nominare.

Interpre-
tatio Hip-
pocr.

Secundū horū directā acie. Pauli codex graecus habet κατὰ τὰ ξί, forte κατὰ ξί et ut Gal. dicit κατὰ δὲ ἐνὶ ποσὶ, ut scilicet dentes primores in maxilla, primoribus in malis, Canini caninis, molares molaribus respondeant. Hippocratis uerba haec sunt, τὸ δὲ ἀσπερὲς μάλιστ' αἱ γνάθες τοῖσιν ὀρείοις τῶν ὀδόντων τῶν τε αὐτῶν καὶ τῶν κατω κατὰ ξί. Non annotauit Orosius, nec Gemusaeus correxit.

Orosius.

Nam musculi hi dum alterantur, & praeter naturam intenduntur, carum inducunt. Graeca ita sonant. καροειδῆς οἱ μῦες οὐ καροει-
ται καὶ ἄλλοι οὐ μὲν οἱ, καὶ ἐντείνονται μὲν οἱ παρὰ φύσιν. Galenus locum δὲ eis οἱ
exponens commentario supra citato inquit, utrumq; & alteratio, & μῦες.
musculorum tensio carum potest efficere. Nam tensio haec fit, filamentis
quae prius erant laxa, nunc omnibus secundū rectam lineam extensis.
Alteratio, dum calefacti, aut refrigerati, aut humectati, praeter modum
fuerint, aut inflammationem, aut erysipelas fuerint experti.

Quomo-
do caros.

Hic igitur decimo die potissimum moriuntur. Mutilus est codex Graecus Pauli. habet enim οὐτοι οὐ καὶ διήσκουσι καὶ μέλισσα. pro quo legendum est, οὐτοι οὐ καὶ διήσκουσι δὲ κατὰ οἱ μάλισσα, ut habet Hippo. lib. de articulis. Gal. ibidem exponit dictionem μάλισσα. pro ὡς τὸ πολὺ, quod est plurimum, magna ex parte, & ut nos diximus, potissimum. Orosius & Gemusaeus locum praeterierunt.

C O M M E N T A R I V S
IN CXIIII. CAPVT.

PROCESSUS ancorę similis. Est hic processus interiore in parte exiguus, acutusq; anchorę modo, qui etiā ab alijs $\kappa\omicron\gamma\alpha\kappa\omicron\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ dicitur, quod extrema ipsius pars, ita corniculę rostrum exterius inclinatur.

Musculi bicipitis. Vide Galenum de usu particularum & de Anatomicis tractationibus. Est autem ex colli musculis anterioribus, qui in duplici capite ligamenta fortia obtinet, unum ex processu anchorali, alterum ex elata superficie scapularum cervicis.

Ipsūq; humeri fastigium. Quidam anatomici scapularum cū iugulo compactionem Græce nominant $\alpha\kappa\rho\omega\mu\iota\sigma\nu$ quasi dicas summū humerum. alij tertium os esse predicant, quod in ipsis tantum hominibus deprehenditur. ubi igitur in Græco codice habetur $\alpha\kappa\rho\omega\mu\iota\sigma\nu$, ego reddidi summum humerum, aut humeri fastigium.

Hyperon. Lignum quod Græci hyperon. Lignum est pistilli modo factū, unde etiam nomen habet, frequens apud Hippocratem de articulis.

**Scala gal-
linaria.** Atq; hoc in scalę gradu. Celsus lib. 8. de humero luxato Paulo consentit, sic (inquiens) brachium deligatum super scalę gallinarię gradum traicitur, ita alte, ut consistere homo ipse non possit. Hippocrates hanc restitutionem per scalę gradum separat ab ea quę fit per hyperium. estq; apud illum, quintus restituendi modus. quanquam in sexto modo, scalę etiam faciat mentionem.

**Ambe.
Celsus
imitatur
Hippocr.** Ambe. Aduerbum transcripsit ex Hippocrate. & Celsus Hippocratem lib. 8. quasi expressit in hunc modum. At si uastius corpus, uel ue robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, & quę crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos perueniat. In qua summa capitulum est rotundum & leniter cauum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit.

Panniculo circūdatū. Celsus idē alijs uerbis exponit. Ea q; spatha fascia inuoluta, quo neruis tactu ledat, ad alam à brachio dirigitur.

IN CXV. CAPVT.

**Metho-
dus simi-
tudinis et
disimili-
tudinis.** Sani cubiti inspectio. Methodus hæc est quam Hippocr. lib. de medicina exponit: quanq; Galenus similitudinis, & dissimilitudinis. Optime enim affecta pars cognoscitur, si cum sana conferatur. Codex autē Græcus male habet $\pi\alpha\delta\eta\sigma\iota\varsigma$ pro $\mu\alpha\delta\eta\sigma\iota\varsigma$. Quid enim sibi uult, $\epsilon\tau\omicron\upsilon\ \upsilon\gamma\iota\alpha\upsilon\omicron\nu\omicron\tau\ \&\ \alpha\gamma\kappa\omega\iota\nu\ \epsilon\lambda\epsilon\gamma\chi\epsilon\iota\ \pi\alpha\delta\eta\sigma\iota\varsigma$. hoc est sani cubiti affectus arguit. quomodo id quod sanum est, simul affectum est? Melius igitur mea sententia $\mu\alpha\delta\eta\sigma\iota\varsigma$ quod est disciplina. ego dixi in speculo. Aristarchi nostri non aduerterunt.

Appellavi Brachiale eam uincturam, qua brachium cum extrema manu committitur. Celsus palmam nominare uidetur in octauo. Graeci dicunt καρπὸν.

IN CXVII. CAPVT.

Vertebrae spinæ. Hoc caput Paulus magna parte ex Hippocrate transcripsit. Auicenna autem quasi ad uerbum ex Paulo translulit. In hoc discrepamus, ubi ego sculpturam uerti, ille foveam habet: ubi ego asserem, ille tabulam.

IN CXVIII. CAPVT.

Intenso autem affecto Crure. Mutilus est codex Græcus impressus uel Basileæ, uel Venetijs id quod etiam ex Auicenna manifeste constat. Habet autem codex in hunc modum. ἐν τεταμλίον τοῦ πεπονδοῦ τοῦ τῶν γένων ὡς δύο δακτύλους. nimirum ἢ ἐτεταμλίον δὲ τοῦ πεπονδοῦ σκελὸς πλεον τοῦ ἑτέρου ὡς δύο δακτύλους. quod miror Orosc. ex suo castigato exēplari nō aduertisse.

Comprehendens qua crassissimum. Hic etiam male in Græco legitur κατὰ τὸ βραχύτατον, pro κατὰ τὸ παχύτατον. Id etiam omiserunt Oroscius & Gemusæus. Ex superioribus lectio poterat corrigi, nisi in aliorum erratis nimium fuissent oculati.

FINIS LIBRI SEXTI
COMMENTARIORVM.

COMMENTARIO- RVM IN PAVLVM AEGINE- TAM LIBER SEPTIMVS.



LIBER hic septimum Pauli de simplici & composita medicina, partim ex Galeno, partim ex Dioscoride, partim etiam ex Oribasio, transcriptus est. ordines Galenus præcipue, vires et descriptionem Dioscorides: compositionem medicamentorum Oribasius tradidit: quanquam hic quoque à Galeno & alijs musturarum rationem acceperit. In codice Græco habetur ἐννεκῶν hoc est ad uerbum, emortuum reddit: nos diximus sensum aufert. Orosius male dicit legendum ὁδὸς ποῖ, cum potius Orosius. quadraret ἐννεκῶν, quod est encruat.

IN II. CAPVT.

Moderatum sane medicamentum. Galenus secundum genera inquit, medicamentum affectioni cui adhibetur, potentia respondere oportet. Caterum hic ordines quatuor enumerat, quos Græci τὰ ξεία, ξεία καὶ ὀσεία nominat. Galenus etiam ἀγείδμους hoc est numeros appellat, nos ordines, interualla, abscessus, et gradu appellamus. **τὰ ξεία.** **ὀσεία.** Utiam sensu priuent. Græce est, ὥς ἢ ἐννεκῶν, quasi dicas, ut iam morificent, hoc enim frigida uehementer, in membris efficiunt, ut emoriantur, sensuque priuentur. In summa nihil aliud est ἐννεκῶν quam uita & sensu priuare. **ἐννεκῶν.** Poterat Orosius ex hoc loco, superiorem lectionem satis castigatam deprehendere, uerum calumniandi animus eò illum prouexit, ut bene dicta etiam deteriora faciat.

IN III. CAPVT.

Lignum aloes. **A** Gallochum. Actius lignum hoc describens, à similitudine quadam coloris Aloes, Xilalocn nominauit. Hunc secuti recentiores

quidam non dubitarunt Lignum aloes appellare. In sumatra nuper à Lhsitani sinuenta, magna copia esse fertur. Ad odorem gentes ha-
utuntur. Nam si in manu lignum hoc retineatur, optimum spirat
odorem.

Flaccidum ex superfl. Gale. $\pi\lambda\acute{\alpha}\delta\omicron\nu$ interpretatur $\pi\epsilon\acute{\iota}\tau\iota\lambda\omega$ $\pi\lambda\acute{\alpha}\delta\omicron\varsigma$
 $\delta\gamma\lambda\acute{o}\tau\eta\tau\alpha$. Cum itaq; humiditate ea stomachus est irriguus flaccescit,
resoluiturq;. Hec dixi ut intelligas, Lector, uersionis meae rationem.

Anchusē quatuor. Ex Galeno transcripsit: quanquam & Dio-
scorides fere omnia habeat. Verum Galenus & Paulus in hoc à Dio-
scoride dissentiunt, quod onochelon uiperarum moribus conuenire di-
cant, forma cataplasmatidis adhibitam, ad alligatum, et comestam his
uerbis, $\kappa\alpha\tau\alpha\pi\lambda\epsilon\sigma\omicron\mu\lambda\iota\kappa\epsilon\tau\epsilon\pi\omicron\upsilon\pi\tau\omicron\mu\lambda\iota\kappa\epsilon\kappa\alpha\iota\epsilon\omicron\delta\iota\omicron\mu\lambda\iota\kappa\epsilon$. Dioscori
des de folijs $\epsilon\varsigma\delta\iota\omicron\mu\lambda\iota\kappa\epsilon\kappa\alpha\iota\pi\alpha\omicron\mu\lambda\iota\kappa\epsilon$, $\kappa\alpha\iota\pi\omicron\upsilon\pi\tau\omicron\mu\lambda\iota\kappa\epsilon$.

Adiantum. Adiantum & Polytrichon idem sunt Callitrichum, Polytri-
& Trichomanes etiam idem. Duae igitur species tantum sunt, nō qua-
tuor, ut officinae putant. Vna herba est adianthos in duas partes sepa-
rata. una proprie adiantum dicitur, de qua Dioscorides priuatim in Tricho-
manes. uno capite tractat: folijs magis albis, coriandro similibus & longiori-
bus. Altera pars sequenti capite explicatur, diciturq; Trichomanes,
folijs filicis tenuibus, nigrioribus primo, & breuioribus. haec proprie
uocatur Callitrichon. Pharmacopoea in duobus communis uocabulo ca-
pilli ueneris utuntur. Capilli
ueneris.

Athera. Ex Dioscoride sumptum. uerum clausula haec apud illum
non adest, $\alpha\pi\delta\sigma\iota\tau\omicron\nu$ quod est è frumento. nec apud Galenum, nec
Oribasium inuenitur.

Aegilops. Auenae secundum genus. Primum $\beta\epsilon\omicron\mu\omicron$ dicitur.

Acatia. Veterum acatiam non habemus. utimur autem quadam
ex fructu pruni syluestris facta. uerum recte aliquis utetur loco aca-
ciae ueteris, rhu obsoniorum, quod sumach uocant officinae, ut quidam
eruditus annotauit. Quid lo-
co acatiae
ueterum
possit.

Acanthus. Si Dioscoridis acanthum, & nostram Brancham ur-
sinam confcras, idem plane esse intelliges. Verg. dixit, mollis acanthus. Brancha
ursina.

Acinos. Ex Dioscoride tantum hoc transcriptum est, ubi $\phi\upsilon\gamma\epsilon-$
 $\theta\lambda\omicron\nu$ interpretatus sum panum, & $\epsilon\pi\iota\sigma\upsilon\pi\epsilon\lambda\alpha\tau\epsilon$ sacros ignes.

Acoron. Acorus ueterum, Galanga nostra est: nosster autem aco-
rus species glandioli. Acorus
ueterum.

Amaracus. Paulus & Galenus duo capita de amaraco & sam-
puchio faciunt: easdemq; uires utrique attribunt. ac si autores con-

COMMENTARIUS

Amara - feras idem plane sunt. Amaracus autem magis apud cyprum celebra-
cus. tus. sampsuchus in tota Græcia præterea amaracus paulo erit odora-
Sampsu - tior, quam hodie apud Gallos maioranam gentilem dicunt quæq; ma-
chus. gis humi serpit. Sampsuchus erectior minusq; odoratus. Dioscorides
 etiam diuersa fecit capita de unguento amaracino & sampsuchino,
 quod alterum ex nobiliori maioranain Cypro & cylicenis, alterum

Matrica - per totam græciam fieret. Galeni autem Amaracus est, quam hodie
ria. Matricariam nominamus.

**Amaran-
thus.** Amaranthus. Nota herba est apud Gallos. uocant eam passuelu-
 tum, quod coloris gratia sericum coccineum uincat. annotauit Ruellius.

Ambrosia Ambrosia. Frequens reperitur in gallia inter exiles & madidas
 segetes qua messores se coronant. Vinosa herba rusticis dicitur, alijs ui-

Polemo - nosa ruta, quod folio rutam, & odore uinum imitetur. Quam officina-
nium, ambrosiam nominant. polemonium antiquorum est, non ambrosia.

Ampeloprasium. Exulcerat. Græcus codex habet κκκῶ. at ego le-
 gendum ex Galeno censo ἑλκῶ. quod castigator Basiliensis dissimulat
Orosius. me annotasse priorem. Orosius neglexit.

**Duo gene-
ra anemo-
næ.** Anemonæ omnes. Hoc est omnes sativæ species. Duo enim gene-
 ra tantum habentur. Satium, & sylvestre. Satium nos papauer ru-
 brum appellamus: eoq; utimur in triticis nascente. ueteres autem nun-
 quam papaueris nomine uocarunt. Germani clapperrosen, galli passe-
 fleur. Ipsa nomenclatura à uento sumpta est, quod eo flante. flos ipsius
 aperiat. Erratica nuncupatur gallis coquerelles, primo uere crescit
 flore purpureo, muliercule hac noua tingunt.

Lac in mammas suggerunt. Ex Galeno hæc omnia sunt transcri-
αἰααῶσι pta. Verum in illo αἰααῶσι quasi dicas, sursum in mammas addu-
σι. cunt: In Paulo autem & Dioscoride κατὰ σπῶσι.

Aparine. Addendum in codice græco particula τι. nam sententia
 imperfecta est si tantum legas ἔχει δὲ καὶ λεπτομερὲς. fac igitur ἔχει
 δὲ καὶ τι λεπτομερὲς. Hoc Orosius & Castigator Basiliensis anno-
 tasse debuerant, uel exemplari adiecisse.

Aristolochia. Duabus tantum speciebus in officinis utimur, Lōga,
 & Rotunda. Sarmentacea negligitur, unguentis alioquin utilissima.

**Lappa-
Maior.
Minor.** Arction proloptis. Herba est, quam officinae uocant Lappam
 maiorem. Alterum arction uirbasco simile, Lappam minorem appellant.

Armeniacum. Hoc est lapis armenius apud Dioscoridem libr. 5.
Arnabo. Arnabo. Idem est, quod Serapio uocat Zurumbet, Cassia fistula,
 & cubebis uiribus respondens.

Arthemisia

Arthemisia. Duplex, monoclonis, & polyclones, matricaria species illius est, per unum & plures ramos distincte. Nam & hæc plures habet ramos. Arthemisia.

Asarum. Vulgus Baccharum appellat. Germani Hasel uurt. Baccara.
Galli, Racabarant.

Fuligo. In græco est κατὰ γματα. Sic etiam habet Dioscorides. Nescio cur Orosius τρυματτα legendum censcat: cum ipse quoque fracture ossium ad cicatricem uenire dicantur siquidem raro sine ulcere carnis fractura accidat, nec κατὰ γματα solum de capitis fracturis dicitur, ut putat Orosius, sed omnium membrorum, quod intellexisset Orosius si Hippocratis librum de fracturis legisset. Orosius.

Aspalthus. Vero aspaltho in officinis caremus. Possumus autem ipsa Mumia loco ipsius uti. Nam in Syria pauperes mortui bitumine impleantur, uendunturq; postea. Diuites autem myrrha, aloë, croco, balsamo, alysq; id genus conduntur. Mumia.

Asphodelus. Pharmacopole aphrodilorum uocant.

Atriplex. In græco codice uidetur addendum ταχέως. Nam διὸ καὶ κατὰ γαστέρα διεξερχεται, quod est, quare etiam per uentrem transit, imperfecta est sententia, & communis cum alijs omnibus. Nam per uentrem uniuersa quidē transeunt; alia uero cito, quæ ταχύπορα, alia tarde, quæ βραδύπορα dicuntur. Legendum igitur cum Galeno διὸ καὶ κατὰ γαστέρα διεξερχεται ταχέως, non aduerterunt nostri Aristarchi.

Bechion. Officine uocant ungulam caballinam.

Buglossum. Dioscoridis & antiquorum Buglossum est, quam hodie boraginem uocamus. Ei uero quam buglossam appellant officine, respondet ueterum Cirsion dictum. Itaq; buglossum duplex erit alterum minus, diciturq; nostra uulgaris borago; alterum maius, quod Cirsion apud ueteres dici monuimus. Ungula
caballina.

Sabina. Duplex est, altera Cupresso similis, altera tarmarici. Germani seuerbaum, Galli saunier appellant.

Musculus marinus. Officine Corallinam uocant. In græcia ad æcer Corallinae puerorum quasi presentaneo remedio utuntur. Imo etiam purgare dicitur, etiam uim astringentem ueteres ei ascripserunt. Borago.
Buglossum.

Lemnium minium. Celsus minium uertit μιαντον. Manardus corrigit Barbarum, quod minium dixerit, non rubricam, ipse culpandus. Ceterum officine uocant Terram Sigillatam, quam multis annis fœticiam, imo etiam hodie uendunt, rubricam quandam ex Minium.

C O M M E N T A R I V S

terra sigillata & bolo armeno mixtam exhibentes. ueram nunc Venetis ex Lemno allatam habes: quæ ibi in colle quodam fuluo colore nascitur. olim Diana sigillo eam imprimebant, unde etiam sphragis dicitur. nunc Turcico insignita est.

Terra armenia. Hactenus globulos quosdam in medio impressos ex Germania allatos pro bolo armeno officinæ uendiderunt, uerus autem bolus armenus est, terra illa sigillata turcicis literis, si supremam & inferiorem partem auferas. nam cū in Turcia imprimunt, adiungunt sabulum album, ut melius signum recipiat.

Senecta anguis. Hoc est exuuium, quod uerno tempore deponunt.

Nuclei acinorum vuæ. Græcus codex deprauatus est, qui habet $\psi\upsilon\chi\epsilon\alpha$ hoc est frigidi. pro $\sigma\epsilon\upsilon\phi\upsilon\alpha$ quod est acerbi. Dioscorides dixit $\sigma\upsilon\pi\tau\iota\alpha$ hoc est astringentes. Oroscius omisit. Gemusæus inuitus cōcedit ita legendum, dissimulans me id antea annotasse.

Nota.

Gingidium. Paulus siccare dicit ordine tertio: Galenus $\kappa\alpha\tau\alpha\tau\omega\delta\epsilon\upsilon\tau\epsilon\pi\alpha\nu\alpha\pi\acute{o}\sigma\alpha\sigma\iota\nu$, hoc est secundo ordine uel abscessu.

Pollen farinaceus. Triticum intelligendum est.

Teda.

Tede. Teda proprie dicta, à græcis $\delta\acute{\alpha}\varsigma$ & $\delta\acute{\alpha}\delta\iota\omicron\nu$ uocatur. sui generis arbor in Illyrico est: redundantior humore quàm reliquæ, parci-
cior liquidiorq; quàm picea. flammis & lumini sacrorū quoque grata. Improperie tedas appellamus, tū piceæ satine partes imas tū alia quæque ligna, quæ flāma olei uel picis illitu concepta facule modo lucent.

Daucos. Vero dauco caremus, qui in Creta nascitur, Noster daucus in officinis est species pastinacæ syluestris. Cum autem casilem uires habeant, nil refert hoc loco dauci uti.

Dictam-
nus.

Dictamnus. Hanc non habemus. In Creta tantum nascitur. Unde facile haberi potest, quam officinæ pro Dictamno uendunt, non est, nec etiam pseudodictamnus.

Dracunculus. Duplex est: maior, & minor. maior Serpentaria in officinis appellatur.

Quercus. Quod subglandis corio. Dioscorides etiam habet. Tunica glandis putamini subiecta.

Ehenus. Paulus habet græce $\omega\delta\iota\sigma\tau\alpha\tau\omicron\upsilon\upsilon\tau\alpha$ nullo sensu pro $\epsilon\pi\iota\sigma\kappa\omicron\tau\omicron\upsilon\upsilon\tau\alpha$. Sic etiam Dioscorides Oroscius non aduertit, nec Basiliensis castigat.

Veratrum. Olim ueratrum album in usu frequentissimum erat: nunc nigrum, ulque solum forte quod illud molestius euacuet. At ueratrum album si recte correctam exhibeatur, citra molestiam purgat,

maxime atrabile laborantes, & lue hispanica.

Hermodactylus. alius hic est ab eo quem officinae hermodactylū Hermo-
dactylus. appellant. Hermodactylus serapiones duo comprehendit, ephemorum, & colchicum. Illud nō lethale, hoc perniciosum. Sed in Italia colchicū minus noxium est: officinarumq; hermodactylus, colchicum existit. Soluit ad sanguinem usq; Ephemero c. remus.

Eupatorium. Eupatorium antiquorum est nostra agrimonia: quid autem nostrum Eupatorium sit adhuc me nescire fatcor.

Zea In Germania inferiori, & Italia speltam appellant.

Zithus. Potus est ex ordeo aqua resoluto. uocant ubiq; cereuisiam: Spelta. quanquam ea ex alijs etiam frugibus fieri soleat.

Isatis. Glastum latini uocant. Galli Guadam.

Caucamum Serapionis lacca est, non autem ea quam officinae uendunt. Tria enim nomine lacce ueneunt: unum uerum caucamū: alterum grana quedam arte facta: Tertiū unde color carmesinus cōfit.

Cadmia. Manifestus error in græco. Legendum enim βοτρυτῆς λεπτομεγέτης & πλακίτις δὲ παχυμεγέτης & α. Orosius omisit Ge- Orosius. museus dissimulat me annotasse.

Calamintha. Nepita Romanis uocatur. Tres sunt species. Prima folijs ocymi, altera odorem pulegij habet. Tertia folijs mentastri. Officinae secundam uocant herbam cattorum. Tertiā calamenthum, quæ cæteris est ignauior. Quidam secundam speciem proprie Nepitam à Ro Calamin-
thæ. manis nominari dicunt. Galenus autem libello de paratu facilibus inquit, Calamintham absolute Nepitam Romanis appellari.

Caros. Officinae Carui appellant.

Carpesium Myropole Cubebas nominant.

Nux. In græco deesse aliquid ex dictione καὶ intello. Nam Ga- Cubebæ lenus ita habet, καὶ ἐν τῷ δ' ἐν δ' ὅν ἐχει μὴ τι καὶ τοῖς βλαστῶσι συπτικόν, καὶ τοῖς φύλλοις. Tu igitur hinc restitue. Castigatores neglexerunt.

Cassia. De Cassia odorata hic intellige. Cassia fistula antiquis eadem er. ut quæ odorata. Officinarum Cinamomum, seu canella uulgaris frustra, Cassia illa antiquorum uidetur. Nunc autem uulgas cassiā fistulam accipit pro siliqua illa humore nigro intus plena, ueteribus incognita. qua purgamus hodie bilem.

Ceralia. acida inquit conueniunt phlegmaticis & excrementosis stomachis. Male in codice græco legitur φλεγματώδεις καὶ φλεγμα- φλεγμα-
τικῶς. Mutanda autem ex Galeno φλεγματώδεις καὶ τῶν πτωμα- πτωμα-
τικῶς.

COMMENTARIUS

τικῶς. quod Censores nostri non annotarunt.

Nota. Ceratonix. Pauli codex græcus habet, ξηραντικὸς ἐστὶν ψυκτικὸς. hoc est siccantis facultatis est & refrigeratis. Galenus pro ψυκτικὸς, legit συπτικὸς. hūc nos sumus imitati nō admonuerunt castigatores.

Galla. Duo gallarum genera tantum in usu medicorū sunt: unum solidum, alterum perforatum. aliorum complurium nullus est usus.

Cinamomum. Hoc caremus. Nam quod nos Cinamomum, aut cancellam uocamus cassia potius fistula antiquorum existit. Nam cinamomum fistula aut canella non est, sed arbutum uide Galenum de Antidotis.

Gummi Hederae. Hedera quod officinae gummi hederae, appellant, non est lachryma hederae, sed alterius cuiusdam arboris quam ignoramus. potest autem haberi lachryma uera hederae.

Intybi species. Cichoreum. Paulus uocat cichoreum syluaticam serem, seu intybum. Græci tamen alij cichorei uocabulo tam domesticam, quā agrestem appellant. Domestica duplex est. una latioribus folijs, lactuce similibus quam uulgus corrupto uocabulo Endiuia quasi intybum nuncupant. Altera strictioribus folijs. Officinae has duas scariolam quoque nominant. Iam syluatica etiam duplex habetur: ac proprio nomine cichoreum seu picris ab amaritudine dicitur. Quanquam græci alij cichorei nomine, tam domesticā quā agrestem serim accipiant. At quam hodie uulgus herbariorum Endiuia ostendit in aruis sponte nascentem, folio lactuce pusillo, aculeato, caule spinulis horrido, candidante, cui succus inest lacteus, syluestris lactuca existit.

Orosius. Bis habetur in codice græco κληματῆς pro κληματίς.

Cnicus. Officinae Cartamum appellant.

Gummi. Arabicum intellige, absolute dictum.

Lixiuum protocton. Lixiuum. Protocton. multi etiam celebres uiri transtulerunt cinerem qui primus distillauerit, uerum ideo non est dictum lixiuum protoctum, sed quod primum sit lixiuum, & principale.

Costus. Vero costo caremus. Potest autem ex Arabia, aut Syria haberi.

Hordeum. Polenta græcis ἄλφις dicitur. Est autem proprie ordeum torrefactum. Pisanā uero ordeum decortatum.

Si illum Mariæ. Cyclaminus. Duplex, prima species panis porcinus officinis, aut Rapum terræ latinis a rotunditate dicitur. Altera Sigillum Mariæ, officinis appellatur.

Lichen Hæc est herba, quam officina hepaticam nominant, iocorum fibris similis.

Leucoion Per se signat uiolâ albâ quâ gariophyllatam albam uulgus nominat. Refertur tamen nomen hoc leucoion, etiâ ad omnes alias uiolas: præsertim ad eas quæ primo uere nascuntur, siue albæ, siue purpureæ, siue luteæ fuerint. Apud Columellam, habetur. Leucoia candida.

Fuligo. Fuliginem pini, coni, & piceæ acriorem esse prodit. Mirum in modum uariant interpretes in his cocibus reddendis, misereq; se torquent. Gaxa πύκλυ transfert pinum: πύτυν, piceâ. Κώνον, Conum. πεύκης. Hunc fere secutus est Marcellus, nisi quod πύκλυ exponat tedam. πύτις. Conum autem nucem pineam interpretatur: ut accipit Dioscorides, κώνον. alijq; ueteres græci. Galenus autem Conon arborem appellat. fructum eius, hoc est nucem. κόκκαλον, et στίβιλον. Atque hoc pacto apud Paulum accipi debet.

Lapides. In græco est μέροξ, lege μύροξ. Dioscorides uocat μύροχθον alij etiam μύροχθον.

Lycium. Officina uerum Lycium non habent.

Atramentum Indicum. Dioscorides uocat lapidem Indicum. præterea astringentis esse naturæ tradit. unde codex Pauli græcus emendari debet. legendumq; τὸν συφόντων pro τὸν λυχόντων, quod Orosius non annotauit. Gemusæus dissimulat me id ostendisse, textumq; relinquit deprauatum.

Melantheria. Verti, creta sutoria, ex Scribonio qui ea caligulas calceamentorum tingi scribit.

Melanthium. Nigella est. Quam officina ostendunt, uera non est. Nam semen est subflauum, cum nigrum esse debeat, acutum; boni odoris. Galli melle noyre, Germani ratten appellant.

Myxa. Officina Sebastem nominant.

Oenanthe. Duplex, una solani folijs herba, quæ uitis non est. sed ob fructum racemosum uitis appellatur. Altera labrusca, quæ à uite domestica nihil differt, nisi quia syluestrem habitum referat, nec colitur. uocant Oenanthe, labruscæ flores, quanquam & herba sit eiusdem nominis.

Opos. Codex Pauli Græcus ὀπίον habet, Galenuro πόν. Superius ὀπὸν de lachryma papaueris quæ opium dicitur, actum est. Hic de la serpitiij liquore: qui partim belZuinum partim asæ fetida dicitur officinis.

Eruum. Dubitatur, an officinarum eruum uerum sit. nam inus fl. nescit, cum album esse debeat

COMMENTARIUS

Orminum. Vulgus in Gallia uocant: Toute bonne, aut Balsamitie.

Rizum. Oryza. Vulgus Rizum appellat, prima adempta litera.

Petroselinum. Verum petroselinum non habemus. forte nostrum est apium hortense, quod Dioscorides condimentis accommodatum dicit.

Peuce Vbiq; interpretes graecorum $\pi\delta\upsilon\lambda\omega$ pinum, interim pinastrum reddunt.

Phytica. Pistacea. Officina phytica nominant, aut phyticorum grana. codex graecus male habet $\lambda\epsilon\pi\tau\omega\nu$, pro $\lambda\epsilon\pi\omega\nu$. Non emendarunt censes nostri.

Pityides. Dioscorides pini piccae; fructus nominat. Galenus piceae tantum. illosq; abuti dictione ait qui utriusque arboris fructum ita appellant. Sunt autem interni nucum pinearum nuclei.

Sigillum. Poligonatum. Officina Sigillum Mariae, uel Salomonis dicunt, uel genicularem & fraxinellam.

Mariae. Pompholyx. Officina Tutiam nominant. codex Graecus $\sigma\alpha\phi\alpha\delta\epsilon\sigma\iota$ hoc est carnosus ulceribus, pro $\kappa\alpha\gamma\kappa\iota\nu\omega\delta\epsilon\sigma\iota$ habet. Non aduertunt Aristarchi nostri.

Tutia. Propolis. Unguentarij Ceram uirginem nuncupant.

Resinae. Dici non potest, quam interpretes Graecorum tum antiqui, tum recentiores in arborum quae resinas fundunt, nomenclaturis euarient. E pinu dixi, quam Graeci $\pi\delta\upsilon\lambda\omega$ uocant. hanc Marcellus Thedam exponit, qua ratione, ignoro. Gazza, Hermolaus pinum aut pinastrum. Strobilena. Hermolaus uertit, Resina est Strobilo. ut haec etiam sit arbor. Nam Plinius de pina & pinastro agens, Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiae, quas strobilas uocant, plerique arbitrantur &c. Eadem igitur arbor est Strobilus, quae Conos superius dicta est, pineas nuces ferens. Ruellius interpretatus est Resinam Strobilinae quae ex nucibus pineis fiat: secutus Plinium, qui sextodecimo libro inquit. pinus fert minimum Resinae, interdum ex nucibus ipsis. Itaque confundunt haec nomina $\pi\delta\upsilon\lambda\omega$, $\kappa\omega\nu\omega\nu$, $\sigma\tau\acute{o}\beta\iota\lambda\omega\nu$ addit etiam $\pi\acute{\upsilon}\tau\iota\nu$. pro pinu aut pinastro, aut picea. cum inter se etiam uiribus respondeant eoq; minus periculi est in expositionum diuersitate.

Nota.

Rhus. Officina sumach appellant.

Sagapenum. Soplasarij Serapinum uocant.

Sandaracha. Sandaracha Officina ueram sandaracham non habent. aut saltem ignorant, uernicem eam uocantes. uera autem est quae in argentisodinis cum auro & argento inuenitur, flammeo colore rufescit, ita

et cinnabarim quasi referat, odore sulphuris uirus. Id quod in auripigmento rubrum est. uera est sandaracha, licetq; auripigmento loco sandarachæ uti, cum idem quasi sint, simulque, alteri iunctum ex fodinis colligantur. Hoc solum differunt, quod auripigmentum nondum à natura perfectum sit: sandaracha autem per concoctionem naturæ, debitum colorem acceperit.

Seseli. Tria sunt genera seselios, Massiliense, Aethiopicum & peloponnesiacum. Massiliensis descriptio conuenit cum nostro, sileri montano, ut uocant uulgares. at quod officinæ ostendunt, Aethiopici semen uidetur. facillimum est, ucrum comparare.

Sylphium. Laserpitium herba est. Liqueor Laser uocatur. Affertur partim ex aphrica armenia, & india suauissimo odore, præsertim cyrenaicum unde etiam liqueor Cyrenæicus apud autores uocatur atq; hic officinis dicitur, assa odorata. seu belZuinum partim ex Media & Syria uiroso odore, quod liqueorem Medicum, & Syriacum nuncupant, officine uero, assam foetidam.

Silymbrium. In Gallia officinæ mentam aquaticam appellant. In Italia Menta florentina uel menta gentilis aut nobilis. Nam magis odoratum est. Nisi colatur, in nepetam degenerat.

Scammonium. Officinæ raro uerum habent.

Scolopendrium Sepalsiarum Cetrac existit.

Scordion. In fine sententiæ legitur in græco codice ἐπιπλάτῳ-
μλιν, pro ἐπιπλάτῳ μλιν. croco enim illini sed inspergi sicca debent. Castigatores præterierunt.

Mirra. Quam officinæ uendunt mirram, est deterrima species mirræ. Optima subuirdis esse debet: confecta, candida unguinum modo. Legitur rursus in codice Græco male ἐπιπλάτῳ μλιν, pro ἐπιπλάτῳ μλιν. Nec hoc annotarunt censes nostri.

Solanum. Vulus Solatrum nominat.

Alumen. alumen scissile officinæ uocant alumen plumæ, nimirum quod si frangitur, capillamenta ipsius, ueluti pluma esse uideantur. Alumen rotundum raro in officinis inuenitur. nonnunquam tamen inter figulorum lapides conspicitur, quibus uetis plumboq; mistis, utrum paternum & laucium parant. Alumen liquidum, uocat seplasia roche alumen cum foditur, liquidum est postea dure scit: & si igni admoueat rursus liquefit. Quod placitum & latercularium à Galeno & Paulo nuncupatur, forte est officinarum alumen sciaola, ex Gipsi fodinis, pellucens tanquam subtilissima ipsius portio.

m 219

Assa odorata.

Assa foetida.

Ceteras.

Orosius.
Mirra.

Orosius.

Aluminis
species.

COMMENTARIUS

Sunt adhuc alia aluminis Genera in officinis sed fictitia, Zuccarinū, quod ex alumine liquido aqua rosacea, & albumine oui conficitur. Mulieres hinc fucum parant. Item alumen catinum ex herba quadam cali uulgo dicta quæ autem sit adhuc ignoro.

Styrax. Styrax. Officine storax dicunt. Sed quam illæ uocant, Styracem liquidam uocant, murrha est stacte. Calamitis autem storax, uerus Styrax est de quo ueteres tractant.

Nota. Simphitum. Variat sententiæ recentiorū in huius herbe cognitione. Adiectū est ī codice Græco γλισχρόν τὶ τῆς κνησμοῦ δες Galenus habet γλισχρόν τὶ καὶ δακνῶ δες, quod est viscosum quippiam & mordax.

Schœni anthos. Officine squinanthos corrupto uocabulo appellant. uerti ego odorati ad differentiam palustris, & rotundi, ad differentiam quadrati seu angulosi. Sæpe autem alterum tantum adyccio, uel odorati, uel rotundi.

Oroscius. Calx. Perperam in codice græco erat. σωτέιναι pro θερμαίνει hoc est calefacit. Oroscius non aduertit. Gemuscus dissimulat me id ante eum annotasse.

Tragus frumentaceus. Ita dicitur, ut ab herba distinguatur Nā herba quedam etiam Tragos dicitur.

Altercum. Deerat in codice græco τῶν ψυχόντων. Instaurauī ex Galeno. Oroscius libenter, omisit, & si necessario addatur. Gemuscus fingit se in exemplari antiquo inuenisse : sed textum tamen impressum, mutilum edidit.

Aes. In sicciore corporibus conuenire dicit ad cicatricem ducendam. Sin autem eluatur, in teneris ultima clausula, deerat in codice Græco, necessario addenda, propter superiore sententiam, nempe in sicciore corporibus, hoc est duris. Legendum itaque uenit, εἰ δὲ πλυθέν τοῦ ἀπλὺ τοῦ ὑπὲρ τῶν ἀπαλάσσεσθαι χρησιμότερον. Ad uerbum fere ex Galeno. Non obseruarunt censores nostri.

Chamædrys. Quasi dicas humilis quercus. unde etiam uulgas, querculam minorem appellat.

Iua musca Chamæpitys. Hoc est humilis pinus aut picea. officine Iuam muscatam uocant hanc antiquorum chamæpitin.

Chrylocolla. Officine uocant Borax.

Ocymum. Vulgo Basilicum dicitur.

IN IIII. CAPVT.

AD affectum induratum. Recte dixit μοχλῶσαι quasi ueste quadam agitare. Male autem in codice græco δυνίξαι ὡρμηλῶ pro

Ἀκλινῶν λι'ω. neglexerunt castigatores.

Sed etiam à neruis & neruosis partibus. Orosius diligens ut ipse sibi uidetur, castigator, legit in codice græco ἀπὸ πλὺθύνων, quod est à costis aut latere ut idem uertit, pro ἀπὸ ἰσθμῶν. Aetius et Oribasius nobiscum sentiunt.

Elaterium. Paulus aliter quàm Dioscorides Elaterium commendat porraceum. Nam candidum colore optimum uidetur Dioscoridi, nisi porraceum aliter intelligi debeat, quod Græci περασίον nominant.

Lathyrus. Species Tithymali est. Capit hic Paulus Lathyrus pro ipsis graminis fruticis, cum alioquin lathyrus ipse frutex uocetur. Dioscorides, & Aetius περιματῖα hoc est grana Lathyrus septem aut octo propinant.

Polypodium. In Græco codice est ἐπιπλαῖσα pro ἐπιπα-
δαῖσα. Non emendarunt Aristarchi nosiri.

IN V. CAPVT.

Crocynthidis medullæ. Hæc sunt Catapotia, quæ officina uocant cochlias. Depravata autem est scriptura in codice Græco, habet enim ἀλὸς με. α. hoc est, aloes pars una. Gale. unde Paulus transcripsit, libro primo de compositione medicamentorum secundum locos, ἀλὸς habet με. ω hoc est partes duæ. Castigatores omiserunt.

Purgatio ex maliscotoneis. Nimis magnum uidetur pondus piperis, nempe uncie sex forte drachmæ sex.

Oliuæ purgantes. Habetur in compositione oliuarum colymbadum, scissarum, hoc est, ut melius perfundi liquore possint. Aetius libro tertio, inquit, oliuas sigillatim tribus scissuris insectas in eodem liquore aliquot diebus conficito & utere.

Catapotia ex lapide armenico. Scammonie pondus erat nimis grande, uncie sex, mendumq; in codice Græco esse puto, nam legitur Σο. s. hoc est uncie sex pro Γο. S. quod est semuncia facilis lapsus, cum quasi eadem literæ utriusq; facies sit.

Vbi venter inanitus. In Græco lege post κενωσιν, γὰρ ἐστὶν. Non fuit uersa in γὰρ ἐστὶν, ὁ βόλως dictio, ut putat Castigator Basiliensis. Orosius hunc & superiorem locum præ studio omisit.

Puls. In titulo est Græce ὠδιδ'ινδ'ισ tu fac οἰδ'ινδ'ινδ'ισ, quasi oedematosis.

IN VII. CAPVT.

Frictione & medicaminum potu non purgantium, sed obtundentium uim medicaminis præsumpti, intelligito.

COMMENTARIUS

IN VIII. CAPVT.

Mellis quod sufficit. Post τὸ ἀρκουῖν. In codice Græco, adde, ἄλλως Hoc est aliter. omiserunt censores nostri.

Hiera Archigenis. In Græco cod pro πολίου quidā φύλλον legūt.

IN X. CAPVT.

Præcipue induratis. Melius in codice Græco legitur τῶν ἐσκληρωμένων pro τῶν ἐσκληρωμένων, quod est scyrrho obductis. Nam scyrrhus nunquam potest emolliiri aut discuti, aut medicamentis intro sumptis amoueri.

Apij radices. Apios herba est, cuius radices alia pars sursum, alia infra purgat. ne putes hic apium, quod Græci σέλινον dicunt, intelligi.

Purgatio paulatim respondeat In Græco est κατὰ λόγον, facit κατ' ὀλίγον. neglexerunt castigatores.

IN XI. CAPVT.

Hedychroi. Paulus ad uerbū quasi ex cōmentario Galeni ad Pamphilianum transcripsit: sed exemplaria mirum in modū uariant.

Carpobalsami. Huc usq; conueniunt scriptura: Galenus in citato libello Carpobalsamum non habet: uerū primo de Antidotis, opobalsamum addit: non Carpobalsamum. Præterea in ponderibus dissentiunt, & in nonnullis alijs simplicibus medicamentis. Galeni itaq; ad Pamphilianum codex ita pergit. Iunci odorati floris drachmæ duodecim, amomi, Casie, rhapontici singulorum drachmæ quindecim. nardi indice folij singulorū drachmæ sedecim, myrrhe, croci, singulorū drachmæ duodecim, urino salerno excipito in opobalsamū maius. intingens. Alia habetur in commentario de Antidotis, sed uariat magis.

Pastilli scillini. Carnis ipsius partes duæ, hoc est, ut Galenus ait drachmæ centum uiginti, erui farinæ drachmæ sexaginta.

Pastillorum Hedychroi. Deest in Græco ἀγρίσκων. Antea uerteram magmatis hedychroi, secundū Galenum de Antidotis, quod Oroscius reprehendit sine causa.

Rosarum siccarū drachmæ duodecim. Textus Græcus habet.

Nota.

¶ u. hoc est drachmæ quindecim. Oroscius castigans locum, ait legendū <.II quod est drachmæ undecim Ego < 1β. hoc est drachmæ duodecim. scribendū esse iudico Galeni exemplaribus tum de Antidotis, tum ad Pamphilianum, tum uersibus Andromachi consentientibus.

Napi feminis. Galenus adiicit γογγύλιος ἀγρίος, quod est Rapi Oroscius. syluestris. præteritū Oroscius.

Dictamni. Post dictamni habetur in Græco αἰθους, quod ex-

pungi debet. Oroscius ex Galeno.

Mastiche Chiæ. Pauli codex Chiæ non habet. Ex Galeno addendum.

Cassiae nigrae. Galenus Cassiae fistula nigra.

Nardi Indicæ. Paulus νάργος ἄχυνος hoc est spice nardi. Sed Galenus ubiq. nardi indicæ habet, quanquam. Aetius spice nardi etiam legat. Post nardi Indicæ, deest pondus in Græco <. S. hoc est drachme sex.

Carpobalsami. In Codice Græco tantum erat βαλσάμου. Ex Galeno instaurandum καὶ τοῦ βαλσάμου

Phu pontici. male legebatur i Græco φου, ὅπνυν, ἢ που ποντικῶν.

Centaurij. Omnes Theriaca descriptiones apud Galenum habent κενταυρίου quod est centaurij tenuis.

Liquore hypocisthidos Perperam in Græco ὅπνον ὑποκιστίδου pro ὅπον ὑποκιστίδου.

In nephriticis cum mulso. Male Græcus codex habet ὡδὶ νεφριῶν μετ' ὅξυμέλιτος pro ὡδὶ νεφριτικῶν μετ' ὀνομέλιτος, ex Galeno castigatum. Basilienfis castigator omisit.

Sumuntur viperæ. Ex libello Galeni de Theriaca ad Pamphilium ad uerbum sunt transcripta nisi quod deest in illo, ἀπὸ.

Rutæ sativæ seminis libra. Paulus habet ζζ. S. hoc est sextarj duo, male nimirum pro λι: ᾧ ut habet Galenus, omisit, Oroscius.

Malabathri foliorum. Codex Pauli habet singulorum uncia. Galenus uncis quatuor. Ita etiam Aetius. Neglexit Oroscius.

Thymi summitatum. Hic quoque castigandus codex. Legendum: Γο. θ. pro Γο. β. secundum Galenum & Aetium.

Piperis nigri, sceniculi singulorum libris. Male in codice Græco Pauli λι η. habet pro λι β. sed facilis error erat, ponere ω. pro η. primum signat. β. secundum, literam ητϰ, quam Latini in e uertunt. ualuit autem in numero, octo.

Tordyli montani. Deest in codice Pauli, ex Galeno plane restituendum Neglexerunt Oroscius, & Gemuseus, tanquam non addenda compendio.

Philonis antidotum. In Græco est ὁ σκυνάμου <. η. ubi legendum ὁ σκυνάμου <. κ. quod præterierunt Aristarchi nostri.

Esdra. in fine compositionis quidam legunt σέρεως hoc est intybi pro σεσέλεως.

Medicamentum Cyphoides. Textus Græcus & mutilus, &

COMMENTARIUS

deprauatus est. Legendi enim καλῶμον <β. S. & ἑλλίου <β. S. & κασσίας <α. S. & κινάμωμου & τριώβολον & νάρδον & ἄχυν <γ. S. & οὐροῦ & αὐθούς <β. S. Orosius & castigator Basilienfis reliquerunt textum deprauatum.

Compositio atactos, Piperis albi & nigri. Deest in codice Græco πινέρεως. Orosius omisit.

IN XII. CAPVT.

TErra samia cum cremore ptisanæ. In Græco est ὄξυ χυλόν & πτίσανης, forte μετὰ χυλόν. Notauit etiam Orosius. Gemusauit autem omisit.

Herbæ pulicaris succo. In fine capituli puto Græcum codicem esse deprauatum: quam proxime autem licuit, ad ueritatem conuerti.

IN XVI. CAPVT.

Siquidem vino aut succo. Codex Græcus hic rursus deprauatus est. Habet enim, εἰ μὴ οἶνον ἢ χύλω τινι λεισῶντε καὶ τριβέντῃ &c. pro εἰ μὴ οἶνον καὶ τριβέντῃ αὐτὰ. Neglexit castigator Basilienfis.

Leccio
Græca de
prauata.

IN XVII. CAPVT.

OEsypo. In principio Capituli Græcus codex habet, ὁ σὺ πῶ hoc est Oesypo. Aristarchi nostri præterierunt.

Lixiui è ficu cui calx. Græci hoc lixiuium uocant κοινὸν & προπύμα. Orosius, τὸ στάκτον. Orosius, alijs; multi uertunt, lixiuium quod primum coactum stillauerit. Paulus autem libro septimo ipse interpretatur, lixiuium cuius calx sit admixta.

Emplastrum ex dictamno. Textus Græcus deprauatus corrigendus debet ex Galeno de compositione medicamentorum secundum genera in hunc modum λεπίδῳ <β. S. χαλκῷ & κεκαύ μλιον <β. S. αλοῖς. <β. S. χαλβόινς. <β. ut nos uertimus.

Aristolochiæ rotundæ & longæ drachmæ quatuor. In empla-
plastro dia cinnabareos codex Græcus habet post pondus præscriptum quatuor & ο. S. quod est semuncia. Sed quatuor drachmæ ualent semuncia. præscriptum
to superfluum. Neglexerunt Castigatores.

Olei veteris. In fine Emplastri ex lapidis asij flore. Græcus codex superflue habet ὁ ξὺς δ' ἐν μὲν αὐτῷ. Nam superius mentionem
aceti fecerat Paulus. Orosius & Gemusæus omiserunt.

IN XVIII. CAPVT.

Sertulæ campanæ. In malagmate polyarchio, Deest πελιδύτον & ἰν-
Instauratum ex Galeno. Neglexerunt hoc correctores.

No

Or

Pentamyron. In medicamento quedam sunt superflua, & non ipsum Græcum indicat, quinque tantum significans. & Oribasius consentit. Ita autem sonant ea que adijciuntur. folia tum, phylli uncia tres, ammoniaci uncia. Cassia uncia sex, Ladani &c. aut in fine addendum, ladani uncia sex.

Seui Taurini. In medicamento diaspermato deest codici Græco. Ut sit seui Taurini libra. Sic etiam habet Alexander medicus. misit Oroscius & Castigator Basiliensis.

Copton. Sic dicitur medicamentum, quod non coquitur, uerum unditur, & succis aut liquidis affusis, ad figuram malagmatis redigitur.


FINIS LIBRI VLTIMI
COMMENTA-
RIORVM.




REGISTRVM

* aa bb cc A B C D E F G H I K L M N O P Q R S
V X Y Z Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk
Ll Mm Nn a b c d e f g h i k l m

Quaterniones omnes; preter cc qui est sexternus



VENETIIS
Apud Federicum Turrisanum
Anno M D LIII.




REGISTRUM

ANNO DOMINI MDCCLXXIII
KALendas Martias

Die Martis

AL. DVS



IN PRAESENTIA

Apud Federicū Potrianum

Anno MDCCLXXIII

